凍結・融解マウス胚の酵素組織化学的観察

新村末雄・白石哲也・石田一夫

(新潟大学農学部畜産学科)

マウス¹⁾とウサギ²⁾の凍結胚は、融解して培養すると発生が遅延するといわれている。著者ら³⁾も凍結・融解したマウス 8 細胞胚を培養したところ、胞胚に発生するまでに約 24 時間遅れることを確かめた。前報⁴⁾では、この発生遅延の原因を微細構造に求め、融解直後の 8 細胞胚を調べた。その結果、線維状封入体の消失と結晶状封入体の減少、ミトコンドリア基質の電子密度の低下および細胞質における亀裂の出現が認められたが、培養中にこれらの形態変化は正常に戻ることを観察した。このことから、凍結・融解胚の発生遅延は凍結・融解によって生じた形態変化の修復に時間を要するためであろうと推察した。一方、WHITTINGHAM & ANDERSON¹⁾と WHITTINGHAM & ADAMS²⁾は、凍結・融解胚の発生の遅延は胚の代謝能や合成能の回復に時間を要するためであろうと考えている。しかしながら、凍結・融解胚の代謝能や合成能を実際に調べた報告は現在までのところ見当たらない。

本実験は、凍結・融解したマウス 8 細胞胚およびそれらを培養して得られた桑実胚と胞胚について、各種の酵素活性を組織化学的に検出し、凍結・融解が胚の代謝に及ぼす影響について検討したものである。

材料および方法

供試動物として約 3 カ月齢の ICR 系成熟マウス (*Mus musculus*) を使用した。飼育はコイトロン (EA-8HW) 内で行い、室温は 24°C に保ち、点灯は午前 4 時から午後 6 時までの 14 時間とした。胚を採取するために、PMSG (セロトロピン、帝国臓器) 5 IU を腹腔内に注射し、48 時間後に HCG (ゴナトロピン、帝国臓器) 5 IU を腹腔内に注射して過排卵処理を施した。処理した雌は直ちに同系統の雄と同居させ、翌朝、腔腔

のみられたものを実験に用いた。8 細胞胚は HCG 注射後 66 時間において 37°C に保った WHITTINGHAM の修正リン酸緩衝液 (PBS)⁵⁾ 中で卵管から採取した。これらの胚のうち、実体顕微鏡下で正常な形態を示すものを実験に供した。

胚の凍結と融解は WHITTINGHAM *et al.* の方法⁶⁾ に準じて行った。(1) 凍結. 20°C に保った PBS 0.1 ml を含む人工授精用ストロー精液管 (1 ml 用) に胚を約 20 個入れ、毎分 1°C の割合で 0°C まで冷却し、10 分後に 2 M の dimethylsulfoxide (DMSO) を含む PBS 0.05 ml を 10 分間隔で 3 回加えて DMSO 平衡を行ったのち、毎分 0.33°C の割合で -5°C に冷却し植氷した。なお、DMSO の最終濃度は 1.2 M とした。5 分後ドライアイス・アルコールを用い毎分 0.67°C の割合で -70°C まで冷却し、直接液体窒素中へ移し 24 時間保存した。(2) 融解. 液体窒素中のストローを -70°C のドライアイス・アルコールに移し、毎分 4°C の割合で 0°C まで温度を上昇させて融解した。PBS 中の DMSO を希釈するために、0°C で PBS を 0.2 ml, 0.2 ml および 0.4 ml ずつ 10 分間隔で段階的に 3 回加えた。融解した胚は室温の PBS で数回洗浄したのち、室温の培養液中に移した。

これらの胚は実体顕微鏡下で退行割球の含まれているものを除いて培養された。すなわち、時計皿に盛った 1 ml の WHITTINGHAM の培養液 (pH 7.2)⁷⁾ に約 20 個ずつ胚を入れ、その上に滅菌したパラフィンオイルをかぶせ、炭酸ガス培養装置 (WJ-3C, 平沢製作所) により、炭酸ガス 5%, 空気 95% の気相下で 37°C で 24 ないし 52 時間培養した。

酵素活性の検出のために用いた胚は、未凍結 8 細胞胚、凍結・融解した 8 細胞胚、融解後 24 時間培養して得られた桑実胚、48 時間培養して得られた桑実胚と胞胚および 52 時間培養して得られた胞胚である。

検出した酵素は cytochrome oxidase, NADH₂ dehydrogenase (NADH₂-DH), succinate dehydrogenase (SDH), lactate dehydrogenase (LDH), 4⁵-3 β -hy-

Enzyme-histochemical observations of frozen-thawed mouse embryos.

NIIMURA, Sueo, Tetsuya SHIRAISHI & Kazuo ISHIDA (Department of Animal Husbandry, Faculty of Agriculture, Niigata University, Niigata 950-21)

Japan. J. Anim. Reprod., 28 (2), 1982.

Table 1. Enzymes and their substrates

Enzymes	Substrates	Methods
Cytochrome oxidase	<i>p</i> -Aminodiphenylamine	BURSTONE ⁸⁾
NADH ₂ -DH	NADH	BARKA & ANDERSON ⁹⁾
SDH	Sodium succinate	NACHLAS <i>et al.</i> ¹⁰⁾
LDH	Sodium DL-lactate	BARKA & ANDERSON ⁹⁾
4 ^s -3 β -HSD	Dehydroepiandrosterone	DICKMANN & DEY ¹¹⁾

Table 2. Enzyme activities in unfrozen and frozen-thawed 8-cell mouse embryos

Treatments	Unfrozen	Frozen-thawed			
Embryos		Group I	Group II		Group III
Blastomeres	Normal	Normal	Normal	Degenerated	Degenerated
Cytochrome oxidase	++	+	+	+++	+++
NADH ₂ -DH	++	—	—	+++	+++
SDH	+	—	—	+++	+++
LDH	++	—	—	+++	+++
4 ^s -3 β -HSD	++	—	—	+++	+++

— negative, + weak, ++ moderate, +++ strong.

Group I: Embryos wholly composed of healthy blastomeres.

Group II: Embryos composed of both healthy and degenerated blastomeres.

Group III: Embryos composed of only degenerated blastomeres.

droxysteroid dehydrogenase (4^s-3 β -HSD) で、それぞれの酵素の基質と検出方法は表 1 に示した通りである。なお、いずれの酵素を検出する場合にも、基質を含まない液を対照として用いた。

処理した胚はあらかじめワセリン・パラフィンのカバーガラスの四隅に位置するようにおいたスライドガラスの中央に移し、カバーガラスをかぶせ静かに胚を押し、光学顕微鏡下で観察した。

各酵素の検出のために使用した胚はそれぞれ 30 個以上である。酵素活性の判定は、cytochrome oxidase については基質とカップリングしたピラゾロンの赤褐色顆粒の沈着量、各種脱水酵素についてはジホルマザンの沈着量により行った。

結 果

1. 未凍結 8 細胞胚

cytochrome oxidase 活性は基質とカップリングしたピラゾロンの赤褐色顆粒として、また、各種の脱水酵素はジホルマザン顆粒として、すべての割球の細胞質に一樣に沈着していた (図 1, 2)。表 2 にみられるように、SDH 活性は弱かったが、その他の酵素活性は中等度であった。

2. 凍結・融解した 8 細胞胚

凍結・融解した 8 細胞胚のなかには、光学顕微鏡下ですべての割球が正常な胚 (I 群)、一部の割球が退行している胚 (II 群) およびすべての割球が退行している胚 (III 群) が含まれていた。各群の胚における各種酵素の活性は表 2 に示した通りである。

I 群と II 群の胚の正常な割球の細胞質には、cytochrome oxidase 活性を示す赤褐色顆粒が少量沈着していたが (図 3)、ジホルマザン顆粒の沈着はみられず、NADH₂-DH, SDH, LDH および 4^s-3 β -HSD の活性は全く認められなかった (図 4)。一方、II 群と III 群の胚の退行割球の細胞質には、cytochrome oxidase や各種脱水酵素の活性を示す顆粒が多量に沈着していた (図 5, 6)。

3. 融解後培養して得られた桑実胚と胞胚

すべての割球が正常な胚 (I 群) を培養して得られた桑実胚と胞胚の酵素活性を調べ、表 3 に示すような成績を得た。

cytochrome oxidase 活性を示す赤褐色顆粒は、いずれの発生時期においてもすべての割球 (桑実胚) または栄養膜細胞と内細胞 (胞胚) の細胞質全域に中等量沈着していた。NADH₂-DH 活性を示すジホルマザン顆粒は

Table 3. Changes in enzyme activities in frozen-thawed mouse embryos during culture

Enzymes	Frozen-thawed 8-cell embryos*	Cultured embryos			
		Morulae		Blastocysts	
		24**	48	48	52
Cytochrome oxidase	+	++	++	++	++
NADH ₂ -DH	—	++	++	++	++
SDH	—	—	—	—	+
LDH	—	—	++	++	++
Δ^5 -3 β -HSD	—	—	++	++	++

— negative, + weak, ++ moderate, +++ strong.

* Embryos from Group I (embryos wholly composed of healthy blastomeres).

** Hours after culture.

24 時間培養して得られた桑実胚のすべての割球の細胞質に様に中等量出現し (図 7), その活性はそのまま胞胚まで維持された。SDH 活性を示すジホルマザン顆粒は 48 時間培養して得られた胞胚まで認められなかったが, 52 時間の胞胚にはじめて少量出現した (図 8)。LDH と Δ^5 -3 β -HSD 活性を示すジホルマザン顆粒は 48 時間培養して得られた桑実胚から出現し, すべての割球 (桑実胚) または栄養膜細胞と内細胞 (胞胚) の細胞質全域に中等量沈着していた (図 9)。

考 察

既に述べたように, 凍結・融解胚は発生の遅れることが知られており, その原因の一つは胚の代謝能・合成能が正常に回復するのに時間を要するためであろうと考えられている^{1,2)}。本実験において, 各種の酵素活性を組織化学的に検出したところ, 未凍結 8 細胞胚では cytochrome oxidase, NADH₂-DH, LDH および Δ^5 -3 β -HSD の活性は中等度, SDH 活性は弱度に認められたが, 融解直後においてすべての割球が正常な胚には cytochrome oxidase 活性が弱く認められるのみで, 脱水素酵素活性は全くみられなかった。この結果から, 凍結中の胚では物質代謝はほとんど停止していることが推察されるが, cytochrome oxidase は融解と同時にまず活性化されるものと推察される。その後において脱水素酵素活性が出現する時期は, NADH₂-DH, LDH と Δ^5 -3 β -HSD, SDH の順に早かった。

マウスの桑実胚と胞胚について酵素活性を組織化学的に検出した報告によると¹²⁻¹⁵⁾, 桑実胚では NADH₂-DH および SDH の活性は中等度^{12,13)}, Δ^5 -3 β -HSD 活性は強度¹²⁾であるが, cytochrome oxidase と LDH の活性

はその存在が知られているのみで, 活性の強さについては不明である¹⁴⁾。一方, 胞胚では cytochrome oxidase と Δ^5 -3 β -HSD の活性は強いが^{12,15)}, NADH₂-DH, SDH および LDH の活性は弱度ないし強度であるという^{12,15)}。これらの結果と, 本実験において融解直後正常な形態を示す 8 細胞胚を培養して発生した桑実胚と胞胚の酵素活性を比較すると, NADH₂-DH および LDH の活性は両者の間でほとんど差がみられないが, cytochrome oxidase, SDH および Δ^5 -3 β -HSD の活性は凍結・融解胚のほうが明らかに低かった。また, 2 細胞胚を培養して得られた胞胚の酵素活性¹⁵⁾と本実験における結果とを比較しても, LDH 以外の酵素の活性はいずれも凍結・融解胚のほうが低かった。なお, マウスの培養胞胚と子宮内胞胚において, これらの酵素活性の強さはほとんど差のないことが知られているので¹⁵⁾, 今回凍結・融解後培養して得られた桑実胚と胞胚において酵素活性が低いのは凍結・融解による影響と思われる。

前報¹⁾において著者らは, 凍結・融解したマウス 8 細胞胚について線維状封入体の消失と結晶状封入体の減少, ミトコンドリア基質の電子密度の低下および細胞質における亀裂の出現を電顕的に観察した。これらの形態変化のうち, 線維状と結晶状の封入体の変化, および細胞質の亀裂は酵素活性とは無関係のように思われるが, ミトコンドリア基質の電子密度の低下は酵素活性と関係があるように推察された。

先に著者ら³⁾は, 凍結・融解したマウス 8 細胞胚が培養して胞胚に発生するのに 48 時間を要し, 未凍結のものに比べ約 24 時間遅れることを確かめた。本実験において, 融解後酵素活性が回復するためには 52 時間を要することが明らかとなったことから, 胚の発生遅延は代

謝能の回復に要する時間と密接に関係していることが推察された。実際に、ウサギの 2 細胞胚では 10°C に保存するとグルコースの利用は変化しないがビルビン酸の利用が低下する¹⁶⁾。しかし、これらの胚を培養して得られた胞胚ではビルビン酸の利用が回復し、DNA, RNA および蛋白質の合成も正常であったと報告されている^{16, 17)}。

本実験において、融解直後の 8 細胞胚の正常な割球では、cytochrome oxidase 活性は弱く、脱水素酵素活性は全く認められなかったが、退行割球ではいずれの酵素活性も強かった。このことは、細胞が壊死する過程でミトコンドリアの変化が起こるが、その初期に酸化酵素の活性が強まるという報告¹⁸⁾から察知できる。

要 約

WHITTINGHAM *et al.* の方法 (1972) によって凍結・融解したマウス 8 細胞胚と、これらを培養して得られた桑実胚と胞胚について cytochrome oxidase, NADH₂-DH, SDH, LDH および 4^β-3^β-HSD の活性を組織化学的に検出し、次の結果を得た。

1. 8 細胞胚. 融解直後の 8 細胞胚には、光学顕微鏡下ですべての割球が正常なもの (I 群)、一部の割球が退行しているもの (II 群) およびすべての割球が退行しているもの (III 群) が含まれていた。I 群と II 群の胚の正常な割球には弱い cytochrome oxidase が出現したが、その他の酵素活性は全くみられなかった。一方、II 群と III 群の胚の退行割球では、いずれの酵素活性も異常に強く出現した。

2. 桑実胚および胞胚. 融解後すべての割球が正常な 8 細胞胚を培養すると、NADH₂-DH 活性は 24 時間培養して得られた桑実胚に、LDH と 4^β-3^β-HSD の活性は 48 時間培養して得られた桑実胚と胞胚に、また、SDH 活性は 52 時間培養して得られた胞胚に、それぞれ、はじめて出現した。

このように、凍結・融解後、胚の代謝能の回復に時間を要することが発生遅延の要因の一つであることが示唆された。

終わりに、胚の凍結・融解技術を御指導いただいた農林水産省畜産試験場の角田幸生博士に心から感謝いたします。

(1981. 10. 5 受付)

文 献

- 1) WHITTINGHAM, D. G. & E. ANDERSON: *J. Reprod. Fert.*, **48**, 137, 1976.
- 2) WHITTINGHAM, D. G. & C. E. ADAMS: *J. Reprod. Fert.*, **47**, 269, 1976.
- 3) 白石 (哲)・新村 (末)・石田 (一): 本誌, **27**, 133, 1981.
- 4) 白石 (哲)・新村 (末)・石田 (一): 本誌, **28**, 67, 1982.
- 5) WHITTINGHAM, D. G.: *Nature*, **233**, 125, 1971.
- 6) WHITTINGHAM, D. G., S. P. LEIBO & P. MAZUR: *Science*, **178**, 411, 1972.
- 7) WHITTINGHAM, D. G.: *J. Reprod. Fert.*, Suppl. **14**, 7, 1971.
- 8) BURSTONE, M. S.: *Enzyme Histochemistry*, p. 461, Academic Press, New York & London, 1962.
- 9) BARKA, T. & P. J. ANDERSON: *Histochemistry*, p. 296, Hoeber Medical Division, Harper & Row, Publishers, New York, Evanston & London, 1965.
- 10) NACHLAS, M. M., K. C. TSOU, E. D. SOUZA, C. C. CHENG & A. M. SELIGMAN: *J. Histochem. Cytochem.*, **5**, 420, 1957.
- 11) DICKMANN, Z. & S. K. DEY: *J. Reprod. Fert.*, **35**, 615, 1973.
- 12) 新村 (末)・石田 (一): 本誌, **26**, 89, 1980.
- 13) LIN, C. H., C. F. HUANG & T. K. CHANG: *Acta Biol. Exp. Sinica*, **9**, 281, 1964.
- 14) SKINNER, A. & R. G. SPECTOR: *Experientia*, **24**, 905, 1968.
- 15) 新村 (末)・石田 (一): 日不妊会誌, **26**, 89, 1981.
- 16) ANDERSON, G. B. & R. H. FOOTE: *Exp. Cell Res.*, **87**, 302, 1974.
- 17) ANDERSON, G. B. & R. H. FOOTE: *Exp. Cell Res.*, **90**, 73, 1975.
- 18) OFIK, H.: *Planta (Berl.)*, **122**, 269, 1975.

PLATE

Summary

The activities of cytochrome oxidase, NADH_2 dehydrogenase, succinate dehydrogenase, lactate dehydrogenase and Δ^5 - 3β -hydroxysteroid dehydrogenase were histochemically examined in 8-cell mouse embryos frozen and thawed by the method of WHITTINGHAM *et al.* (1972) and in those cultured subsequently into morulae and blastocysts. The results obtained were as follows.

1. Frozen-thawed 8-cell embryos were divided into three groups: embryos wholly composed of healthy blastomeres (Group I), those composed of both healthy and degenerated blastomeres (Group II), and those composed of only degenerated blastomeres (Group III). Healthy blastomeres from Groups I and II showed no enzyme activity except for a weak one of cytochrome oxidase. Degenerated blastomeres from Groups II and III showed abnormally strong activities of all the enzymes examined.

2. Recovery in the enzyme activities was seen as follows: that of NADH_2 dehydrogenase in the morulae cultured for 24 hours and developed from wholly healthy frozen-thawed 8-cell embryos (Group I), and that of lactate and Δ^5 - 3β -hydroxysteroid dehydrogenases in the morulae and blastocysts cultured for 48 hours, and that of succinate dehydrogenase in the blastocysts cultured for 52 hours.

These results suggest that the length of time needed for the recovery of metabolic ability in frozen-thawed embryos causes much a delay in the development of embryos.

Explanation of Plate

All figures are of mouse embryos. Scales show 50 μm .

Fig. 1. A moderate activity of cytochrome oxidase in an unfrozen 8-cell embryo.

Fig. 2. A moderate activity of lactate dehydrogenase in an unfrozen 8-cell embryo.

Fig. 3. A weak activity of cytochrome oxidase in a frozen-thawed 8-cell embryo wholly composed of healthy blastomeres (Group I).

Fig. 4. No activity of NADH_2 dehydrogenase in a frozen-thawed 8-cell embryo from Group I.

Fig. 5. A strong activity of NADH_2 dehydrogenase in two degenerated blastomeres of a frozen-thawed 8-cell embryo composed of both healthy and degenerated ones (Group II).

Fig. 6. A strong activity of NADH_2 dehydrogenase in a frozen-thawed 8-cell embryo composed of only degenerated blastomeres (Group III).

Fig. 7. A moderate activity of NADH_2 dehydrogenase in a morula cultured for 24 hours.

Fig. 8. A weak activity of succinate dehydrogenase in a blastocyst cultured for 52 hours.

Fig. 9. A moderate activity of Δ^5 - 3β -hydroxysteroid dehydrogenase in a morula cultured for 48 hours.