ボツリヌス神経毒素複合体の腸管吸収機構に関する研究

松 村 拓 大

金沢大学医薬保健研究域医学系細菌学
〒920-8640 石川県金沢市宝町 13-1
E-mail: t-matsu@med.kanazawa-u.ac.jp

ボツリヌス神経毒素は、ボツリヌス菌 (*Clostridium botulinum*) などによって産生されるエンドペプチダーゼ活性を持つ極めて生物活性（毒性）の高いタンパク質毒素である。本毒素は常に無毒成分との複合体として産生される。食餌性ボツリヌス症（ボツリヌス食中毒）は、神経毒素複合体が経口摂取され腸管から吸収された後、神経・筋接合部において神経毒素が SNARE タンパク質に作用することにより引き起こされる。本症の発症には、毒素が活性を保持したまま腸管から吸収される過程が必須であるが、巨大分子である本毒素が腸管上皮細胞バリアを通過する機構については不明であった。我々は腸管上皮細胞株を用いた *in vitro* の解析から無毒成分の一種である hemagglutinin (HA) が細胞間バリアを破壊する強力な新規的作用があることを発見し、その標的分子が E-cadherin であることを明らかにした。さらに実際の生体内 (*in vivo*) では神経毒素複合体がパイエル板を覆う濾胞被覆上皮に存在する特異的な細胞、Microfold cell (M 細胞) から吸収されることを発見した。

本稿では我々の解析の結果から明らかとなったボツリヌス毒素の巧妙な体内侵入機構について述べたい。

はじめに

ボツリヌス神経毒素 (BoNT) はボツリヌス菌 (*Clostridium botulinum*) およびその類縁菌から産生されるタンパク質毒素である。本毒素の活性は非常に高く、バイオテロの手段としても懸念されている。アメリカ疾病管理予防センター (CDC) においても国の安全保障に影響を及ぼす最優先病原体 (カテゴリー A) に分類され、国際的にも規制の必要性の高い危険な毒素である。本毒素は抗原性の違いから A~G 型に分類される。最近、新型の血清型毒素として H 型が報告されたが、のちに A 型と F 型のハイブリッドであることが明らかになっている。ヒトに中毒を引き起こす血清型は A, B, E, F 型であり、主な病型としては食餌性ボツリヌス症（ボツリヌス食中毒）と乳児ボツリヌス症がある。ボツリヌス食中毒は食品中などに産生された毒素を経口摂取することにより引き起こされる。乳児ボツリヌス症は本菌芽胞を経口摂取した後に腸管内で本菌が増殖し本毒素を産生することによる。2017 年には本邦において初めて乳児ボツリヌス症による死者が出ている。

本毒素は常に無毒成分 (non-toxic neurotoxin-associated proteins, NAPs) との複合体 (progenitor toxin complex, PTC) として産生される (図 1A) (7)。無毒成分には赤血球凝集活性のない non-toxic non-HA (NTNHA) と赤血球凝集活

性を持つ hemagglutinin (HA) があり、HA は異なる 3 つのサブコンポーネント HA1, HA2, HA3 から構成されている (1)。ボツリヌス神経毒素複合体は、神経毒素および NTNHA で構成される M-PTC と M-PTC に HA が結合した L-PTC が存在する。また、L-PTC の二量体である LL-PTC も存在するが、複合体の濃度が十分高くない場合は L 毒素として存在することが報告されている (3)。ボツリヌス食中毒はこれらの神経毒素複合体を経口的に摂取することにより引き起こされる。経口摂取された神経毒素複合体は胃を通過し、小腸上部より吸収される。その後、主にコリン作動性末梢神経において、神経毒素の結合ドメイン (重鎖 C 末端) により神経細胞に取り込まれ、チャネル形成ドメイン (重鎖 N 末端) により細胞質内へ移行する。そしてプロテアーゼ活性を持つ酵素活性ドメイン (軽鎖) がシナプス小胞が細胞膜と融合する際に必要な蛋白質群である soluble N-ethylmaleimide sensitive fusion protein attachment protein receptor (SNARE) を選択的に切断することにより神経伝達物質の放出を抑制する (図 1B) (18)。その結果、運動神経麻痺による呼吸失調を主症状とする致死性の高い重篤な中毒を引き起こす。本症の発症には、毒素が活性を保持したまま腸管から吸収される過程が必須であるが、巨大分子 (分子量 150 kDa) である本毒素が腸管上皮細胞バリアを通過する機構については不明であった。

図 1. ボツリヌス神経毒素複合体の構造およびボツリヌス食中毒発症機構

A) ボツリヌス神経毒素は無毒成分 hemagglutinin (HA), non-toxic non-HA (NTNHA) との複合体として産生される。M-PTC は神経毒素と NTNHA で構成され、L-PTC は神経毒素、NTNHA および HA で構成される。点線はタンパク質翻訳後にニックが入る部位を示す。文献より (14) より改変。B) 神経毒素複合体は経口摂取された後、胃を通過し、小腸より吸収される。その後、血中に移行し、神経・筋接合部において神経毒素（軽鎖）が SNARE に作用することにより、アセチルコリンの放出が抑制され、筋の弛緩性麻痺が引き起こされる。

我々は、腸管上皮細胞株を Transwell で培養した *in vitro* の系およびマウスを用いた *in vivo* の系の両面から神経毒素複合体の腸管吸収機構について解析した。本稿では、その解析から明らかになった本毒素の巧妙な体内侵入戦略について述べたい。

1. 無毒成分複合体の機能

ボツリヌス神経毒素複合体の経口毒性は、BoNT < M-PTC < L-PTC と、分子量が大きくなると著しく高まることが以前から知られている (17)。血清型 B 型の場合、経口致死量の相対値は、BoNT : M-PTC : L-PTC = ~15,000 : ~700 : 1 であり、無毒成分（特に HA）の付加により神経毒素の経口毒性が著しく高くなる。一方で腹腔内投与での致死活性はほぼ同等である。1970 年代～80 年代にかけて阪口らは、無毒成分には神経毒素を消化液による分解から保護する作用があり、そのため毒素複合体は高い経口毒性を持つということを報告した (17)。また、我々の研究室では、毒素複合体と腸管上皮との相互作用について解析し、L-PTC は M-PTC および BoNT 単独の場合と比較して腸管上皮組織への付着が顕著にみられること、さらに、この付着は HA に起因し、HA は小腸上皮細胞上の糖鎖を認識することを見出した (4-6)。さらに HA のサブコンポーネント中

の HA1 と HA3 が、それぞれ特異性の異なる糖鎖結合活性を持つことを明らかにした (7)。一方で、HA は腸管内に存在する Secretory IgA (SIgA) 上の糖鎖を認識し結合することにより毒素の腸管吸収に影響していることを示唆する結果も得られている (12)。いずれの結果からも無毒成分 (HA) の機能が毒素の吸収・ボツリヌス症の発症に大きく寄与していることが考えられた。

2. 無毒成分 HA の新たな機能、腸管上皮細胞間バリアの破壊

我々はヒト大腸ガン由来細胞株 Caco2 細胞や T84 細胞、イヌ腎上皮由来細胞株 MDCK 細胞を Transwell で培養することによりこれを *in vitro* の腸管上皮細胞バリアモデルとし、毒素複合体と腸管上皮細胞との相互作用を詳細に解析した。その結果、L-PTC を細胞に添加することにより、細胞間電気抵抗値 (transepithelial electrical resistance: TER) が低下する、すなわち細胞間バリア機能が破壊されることを発見した (図 2A) (13)。M-PTC には活性が全くないことから L-PTC 中に存在する HA に強力な新規の活性があることが明らかとなった。HA は ZO-1 や E-cadherin 等の細胞間接着分子の局在を著しく変化させた (図 2B)。そして本活性は *in vivo* においても神経毒素を含む巨大分

図2. 無毒成分 HA は腸管上皮細胞間バリアを破壊する

A) Caco2 細胞を Transwell 中で培養し, apical 側へボツリヌス菌由来タンパク質を添加した。その結果, HA を含む複合体 (HA, NAPs, L-PTC) を添加した群において細胞間電気抵抗値 (TER) の低下が確認された。B) Caco2 細胞 apical 側へ L-PTC を添加し, 24 時間後の細胞間接着分子の局在。HA を含む L-PTC を作用させることにより局在が著しく変化する。スケールバー: 10 μ m。C) マウス結紮腸管ループ内に, paracellular marker である FITC-dextran (4 kDa: FD-4, 10 kDa: FD-10) と NAPs (HA) を同時に投与した。NAPs (HA) により FD-4 と FD-10 の血中への移行が増大した。D) マウス結紮腸管ループ内に, M-PTC 単独もしくは M-PTC と NAPs を投与し, ボツリヌス症の発症を観察した。NAPs (HA) を投与することにより, M-PTC の吸収が増強された。すなわち細胞間からの毒素の吸収が考えられる。文献 (13) より改変。

子の吸収を促進した (図 2C, D)。すなわち HA の細胞間バリア破壊活性が毒素の吸収～食中毒の発症に大きく寄与している可能性が示唆された。さらにヒト由来の上皮細胞における本活性は A 型および B 型の HA でのみ確認された (9)。ヒトに中毒事例が非常に少ない C 型 HA はヒト由来の上皮細胞間バリアには無影響であった一方, MDCK 細胞等のいくつかの細胞に障害性を示した。この活性は細胞膜上のガングリオンド GM3 と結合することにより発現することが明らかになっている (21)。

3. HA の標的分子の同定および HA の多価性の意義

ボツリヌス無毒成分 HA に細胞間バリアを破壊する活性があることが明らかになったが, その標的分子については不明であった。我々は B 型 HA 組換えタンパク質を用いて Caco2 細胞 cell lysate から HA 結合タンパク質を単離することにより, E-cadherin が標的分子であることを同定した (19, 20)。E-cadherin は細胞間接着を形成するとともに, 細胞間バリア機能に重要な役割を果たしている (22)。Pull down assay により HA と cadherin との結合を解析した結果,

HA は直接 E-cadherin と結合すること, O および N-cadherin や VE-cadherin には結合しないことが明らかとなった。また HA-E-cadherin 結合には種特異性があり, human, mouse, bovine には結合するが, rat や chicken とは結合しなかった。さらに mouse E-cadherin を発現させた MDCK 細胞で確認できた HA のバリア破壊活性は, rat E-cadherin を発現させた MDCK 細胞では消失したことから, バリア破壊活性は, HA と E-cadherin の直接結合によって引き起こされることを示した (図 3A)。のちに HA と E-cadherin が結合した共結晶構造の解明が米国の研究グループによりなされている (11)。加えて, 我々は A 型 HA も B 型と同様に E-cadherin と結合するが, C 型は結合しないことを明らかにした。さらに, HA のバリア破壊活性の種特異性に関して *in vivo* でも *in vitro* の解析と相関性のある結果が得られており, HA-E-cadherin 結合がボツリヌス食中毒の種特異性を決定する重要な要因になっている可能性が示唆された。

HA は三つのプロトマーで構成される三量体を形成しており (1), この多価性が細胞間バリア破壊活性に影響を与

図3. HAの標的分子の同定およびHAの多価性

A) HAのバリア破壊模式図。HAは直接E-cadherinと結合し、細胞間バリアを破壊する。B、C) HAの多価性がE-cadherinとの結合および細胞表面(糖鎖)への結合に与える影響。B) HAとE-cadherinとの結合はsandwich ELISAにて解析した。E-cadherinとの結合は三量体を形成しない欠損変異体(mini-HA)において低下した。またE-cadherin結合変異体(KA)は結合しなかった。C) HAとCaco2細胞基底膜側への結合はTranswellを用いて行った。細胞基底膜側への相互作用は三量体を形成しない欠損変異体(mini-HA)において減少した。また糖鎖(ガラクトース)結合変異体は著しく結合が低下した。文献(2)より改変。

えている可能性が考えられた。HAには糖鎖結合による細胞表面接着とE-cadherin結合による細胞間バリア破壊という二つの機能が存在し、この作用により毒素の腸管吸収を促進していると考えられる。三量体および三量体を形成しない欠損変異体を作成し比較解析することにより、HAは多価であるほど、固定化した組み換えE-cadherinへの結合力およびCaco-2細胞表面への接着力が増強することを明らかにした(図3B, C)(2)。またHAは多価であるほどCaco-2細胞の細胞間バリアを破壊する活性が強かった。以上の結果より、HAの多価性は少なくとも上記二つの作用(糖鎖結合とE-cadherin結合)を増強することにより上皮細胞間バリアを効果的に破壊することを示した。

4. ボツリヌス神経毒素複合体L-PTCの体内侵入機構

これまでに、主に腸管由来上皮細胞株を用いた*in vitro*の解析などから神経毒素複合体と腸管上皮細胞との相互作用を明らかにしてきたが、実際の生体内(*in vivo*)における毒素複合体の腸管吸収機構については不明であった。我々は、生体内におけるボツリヌス神経毒素複合体の吸収部位の特定を目的とし、ヒトに中毒を引き起こすA1型ボツリヌス神経毒素複合体の腸管内での局在をマウス腸管結紮ループ法により解析した。その結果、経口毒性の低いM-PTCは、腸管組織に非常に弱くしか局在しなかった。それに対し、経口毒性が高く食中毒の発症に大きく寄与していると考えられるL-PTCはパイエル板を覆う濾胞被覆上皮(follicle-associated epithelium: FAE)に強く局在していた(図4A)(14)。この結果から我々は、L-PTCはFAEに存在する特異的な細胞から取り込まれているのではないかと考え、Microfold cell(M細胞)に着目した。M細胞はFAEの全細胞数中の5~10%を占めており、その形態は通常の上皮細胞とは大きく異なる。管腔側に微絨毛を持たず、細胞質は膜状に薄くなっている。側基底面にポケットを形成しており、そこに樹状細胞やリンパ球が抱え込まれてい

る。また、M細胞は管腔内に存在する細菌やウイルス等の抗原を取り込み基底膜側へ運ぶトランスサイトーシスと呼ばれる輸送機構が発達しており、抗原を免疫細胞へ受け渡し、抗原特異的な免疫応答を誘導させる役割を担っている(16)。マウスのM細胞マーカーである*Ulex europaeus* lectin 1(UEA-1)でFAEを染色し、L-PTCとの共局在を解析した結果、L-PTCはM細胞から取り込まれ、基底膜側へ移行していることが明らかとなった(図4B)。一方で、M-PTCのM細胞への局在は非常に弱かった。さらに、NAPsやHAもL-PTCと同様にM細胞から取り込まれていたことから、M細胞との相互作用にはHAが必要であることが明らかとなった(14)。

上記の結果から、M細胞がL-PTCの腸管吸収に重要であることが示唆された。そこで我々はM細胞を一過性に欠損させたマウスを作製し、L-PTCの腸管吸収および食中毒発症におけるM細胞の役割について解析した。サイトカインの一種であるReceptor activator of NF- κ B ligand(RANKL)はM細胞の分化に必要であり、RANKLに対する抗体をマウスに投与することによりM細胞の発現を抑えることができる(10)。この実験系を用いてFAEにおけるL-PTCの局在を解析した結果、抗RANKL抗体投与マウスではコントロールIgG投与マウスと比較してM細胞の数が著しく減少し、それに伴いL-PTCの局在も減少していた(図4C)。さらに、抗RANKL抗体投与マウスでは経口投与されたL-PTCへの感受性が顕著に低下していた(図4D)。これらの結果から、M細胞はL-PTCが食中毒を発症させるための主要な侵入門戸であることが明らかとなった。また、*in vitro*の系で確認されたHAの細胞間バリア破壊活性は、*in vivo*においては、M細胞周辺で起きていた(14)。M細胞からトランスサイトーシスされたL-PTC(HA)がM細胞周りのE-cadherinと結合し、バリアを破壊していると考えられた。

図4. A型ボツリヌス神経毒素複合体の体内侵入機構

腸管内での神経毒素複合体の局在をマウス腸管結紮法および蛍光免疫染色で解析した。A) 神経毒素複合体をマウス結紮腸管ループ内に投与し、2時間後に蛍光免疫染色を行った。L-PTCは、VEへの局在は非常に弱くFAEに強く局在していた。VE: villous epithelium (絨毛上皮)。FAE: follicle-associated epithelium (濾胞被覆上皮)。スケールバー: 100 μ m。B) L-PTCは、腸管のUEA-1陽性M細胞から取り込まれ、基底膜側へ移行していた。一方、M-PTCのM細胞への局在は非常に弱く、NAPs (NTNHA+HA)はL-PTCと同様にM細胞から取り込まれていた。スケールバー: 10 μ m。C) L-PTCを抗RANKL抗体投与マウスもしくはコントロールIgG投与マウス結紮腸管ループ内に投与し、局在を解析した。抗RANKL抗体投与マウスではM細胞数が減少し、FAEに局在するL-PTCも減少していた。スケールバー: 10 μ m。D) 抗RANKL抗体投与マウスはコントロールIgG投与マウスと比較して経口投与L-PTCに対する感受性が著しく低下していた。文献より(14)より改変。

5. M細胞上に存在するL-PTCの受容体

M細胞はラテックスビーズのような物質も取り込むことから、非特異的な貪食能を持つ細胞であると考えられていた。一方で、M細胞で発現している分子の解析が進むにつれ、受容体を介した特異的な取り込み機構が明らかになってきた(8, 15)。L-PTCもM細胞上の受容体を介して取り込まれている可能性が考えられた。我々はM細胞上の機能的な受容体として報告されているいくつかの分子のFc融合タンパク質を作製し、L-PTCもしくはHAとの結合を解析した。その結果、glycoprotein 2 (GP2)がL-PTCと強く結合することを明らかにした(図5A)。一方で、GP2はM-PTCとは結合しなかったことから、GP2との結合はHAを介していると考えられた。さらにGP2との強固な結合にはHAの全てのサブコンポーネント(HA1, HA2, HA3)が必要であった(図5B)。この結果はHAサブコンポーネントおよび再構成HAを用いたM細胞への局在の解析結果と相関性がある。GP2は大野らによってM細胞上に存在する細菌受容体として報告された glycosylphosphatidylinositol (GPI) アンカー型タンパク

質であり、大腸菌やサルモネラ菌とI型絨毛構成タンパク質FimHを介して結合し、M細胞から菌を取り込み、特異的免疫応答を誘導する事が明らかにされている(8)。GP2はM細胞内でL-PTCと共局在しており、GP2がL-PTCの受容体としてM細胞上で機能していることが示唆された(図5C)。HAとGP2との相互作用を詳細に解析するために、HA1およびHA3の糖鎖結合変異体を作製し、その変異体を含めたHAを再構成した後、GP2との結合を解析した。その結果、HA1ガラクトース結合変異体においてGP2との結合およびM細胞への局在が著しく低下し、HA3シアル酸結合変異体との組み合わせで完全に消失した(図5D)。また大腸菌で発現させた糖鎖を持たないGP2とHAが結合しないこと、HAとGP2との結合がガラクトースを含む糖鎖で阻害されることから、HAはGP2上に存在する糖鎖(主にガラクトース)を認識し結合していることが明らかとなった。

次に我々は、GP2ノックアウトマウス(*Gp2*^{-/-}マウス)を用いてL-PTCの腸管吸収(中毒発症)におけるGP2の役割について解析した。その結果、*Gp2*^{-/-}マウスでは野生型マウスと比較してL-PTCのM細胞への局在が減少し(図

図5. M細胞上に存在するL-PTCの受容体の解析

A) M細胞上の機能的受容体GP2, Uromodulin (Umod), PrP^cのFc融合タンパク質とHAとの結合をpull downにより解析した。L-PTCはGP2と強く結合したが、Uromodulin, PrP^cとの結合は弱かった。B) HAサブコンポーネント(HA1, HA3)および再構成HAとマウスGP2(mGP2)もしくはヒトGP2(hGP2)との結合をPull downで解析した。その結果、HA1/HA2/HA3が強くGP2と結合していた。C) M細胞内のL-PTCとGP2の局在を解析した。L-PTCはM細胞内でGP2と共局在していた(矢印)。スケールバー: 10 μm。D) HA1のガラクトース結合変異体(N285A)およびHA3のシアル酸結合変異体(R528A)を作製し、変異体を含んだHA1/HA2/HA3を再構成した後、M細胞への局在を解析した。N285AはM細胞への局在が著しく減少し、R528Aも僅かに減少していた。さらに二つの変異体を用いて再構成したHA(N285A/R528A)はM細胞への局在が消失した。スケールバー: 10 μm。E) 変異体を含んだHAとGP2との結合をPull downにより解析した。N285Aは著しく結合が低下し、N285A/R528Aでは全く結合が確認できなかった。文献より(14)より改変。

6A), 経口投与されたL-PTCに対する感受性が低下していた(図6B)。一方で、腹腔内投与では二群間に大きな差はなかった。これらの結果から、L-PTCはHAを介してGP2と結合し、M細胞から体内に侵入していることが明らかとなった。GP2はヒトのM細胞上でも発現しており(8), L-PTC(HA)はヒトのGP2(hGP2)とも強く結合することから、ヒトのボツリヌス食中毒においても、その発症にGP2およびM細胞が大きく寄与していることが示唆される。

おわりに

ボツリヌス食中毒の発症においてボツリヌス神経毒素の腸管吸収は必須な過程であるにも関わらず、その詳細な機構については長らく不明であった。本研究から血清型A型およびB型HAの新たな機能として上皮細胞間バリア破壊活性を発見し、生体内においてA型L-PTCがパイエル板FAEに存在するM細胞からHAとGP2との結合を介して体内に侵入することを明らかにした。本来、M細胞は病原体等の抗原を取り込み、特異的な免疫応答を誘導さ

せ、病原体を排除する生体防御の役割を担っている。L-PTCは腸管上皮細胞バリアという堅牢な城壁をM細胞の機能を利用することにより突破する巧妙な体内侵入機構を持つことが明らかとなった(図7)。筆者はB型(B1)L-PTCはA型と比較して高い経口毒性を持ち、全く異なる腸管内局在を示すことも明らかにしており、今後は、血清型間の毒素活性・腸管内局在(吸収機構)の違いに関与している宿主側および毒素側の因子について明らかにしていきたい。これらの知見は毒素の種特異性を決定する因子の同定さらにはボツリヌス食中毒発症機構の全貌解明に繋がる。また、毒素が腸管上皮を超えた後で血中へ移行する機構やM-PTCのみを産生するE型やF型の食中毒発症機構の解明、本毒素の侵入機構を利用した新しい経粘膜薬物送達システム(経粘膜ワクチン)の開発など興味が尽きない。筆者は大学院在学中から現在に至るまで一貫してボツリヌス毒素の腸管吸収に関する研究を続けてきた。並行してボツリヌス中毒の治療法の開発やボツリヌス症診断のための効率の良い菌・毒素の検出方法の開発および実施にも尽力している。今後も基礎研究と対策研究、両面からこのボツ

図6. GP2 欠損マウス (*Gp2*^{-/-} マウス) における L-PTC の腸管吸収

A) L-PTC を野生型マウスあるいは *Gp2*^{-/-} マウス結紮腸管ループ内に投与し、局在を解析した。*Gp2*^{-/-} マウスでは L-PTC の M 細胞への局在が減少していた。スケールバー：10 μ m。B) *Gp2*^{-/-} マウスは野生型マウスと比較して経口投与された L-PTC に対する感受性が減少していた。腹腔内投与の場合二群間で差はなかった (NS, not significant)。文献より (14) より改変。

リヌス毒素 (菌) 研究を深めていければと考えている。

本邦におけるボツリヌス症発症件数は年間数例であるのに対し、米国では年間平均 145 例発生している。これは環境要因や遺伝的要因が関与する可能性がある一方で、本邦におけるボツリヌス症への関心の低さ、診断の難しさが影響していると思われる。本稿を目にした方が少しでもボツリヌス症という疾患に興味を持ち、症状を念頭に置き、本疾患を診断する際の一助となれば幸いである。

謝 辞

本研究は金沢大学医薬保健研究域医学系細菌学 藤永由佳子教授のご指導のもとで遂行されました。多大なるご助言・ご指導に心より感謝申し上げます。また、多大なるご助言をいただきました岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病原細菌学分野 小熊恵二教授に深く感謝致します。また、黒屋奨学賞にご推薦いただき、ご助言・ご指導をいただいております大阪大学微生物病研究所分子細菌学教室、堀口安彦教授に深く御礼申し上げます。また、HA の細胞間バリア破壊の解析でご助言をいただきました大阪大学微生物病研究所、目加田英輔教授に深く御礼申し上げます。そしてこれまでに多くのご助言・ご協力をいただきました研究室の皆さん、共同研究の先生に深く感謝致します。最後に、常に支えてくれる家族にこの場を借りて感謝します。

図7. A 型ボツリヌス神経毒素複合体の腸管吸収機構
神経毒素複合体 L-PTC は HA を介して M 細胞上の GP2 と結合し、M 細胞内をトランスサイトosis して腸管上皮細胞バリアを突破する。ボツリヌス毒素は M 細胞の機能を利用することにより生体内に侵入する巧妙な体内侵入機構を持つ。

発表内容に関し、開示すべき COI 関係にある企業等はありません。

文 献

- 1) Amatsu, S., Sugawara, Y., Matsumura, T., Kitadokoro, K., Fujinaga, Y. (2013): Crystal structure of *Clostridium botulinum* whole hemagglutinin reveals a huge triskelion-shaped molecular complex. *J. Biol. Chem.* **288**, 35617–35625.
- 2) Amatsu, S., Matsumura, T., Yutani, M., Fujinaga, Y. (2018): Multivalency effects of hemagglutinin component of type B botulinum neurotoxin complex on epithelial barrier disruption. *Microbiol. Immunol.* **62**, 80–89.
- 3) Eisele, K.H., Fink, K., Vey, M., Taylor, H.V. (2011): Studies on the dissociation of botulinum neurotoxin type A complexes. *Toxicon* **57**, 555–565.
- 4) Fujinaga, Y., Inoue, K., Watanabe, S., Yokota, K., Hirai, Y., Nagamachi, E., Oguma, K. (1997): The haemagglutinin of *Clostridium botulinum* type C progenitor toxin plays an essential role in binding of toxin to the epithelial cells of guinea pig small intestine, leading to the efficient absorption of the toxin. *Microbiology* **143**, 3841–3847.
- 5) Fujinaga, Y., Inoue, K., Nomura, T., Sasaki, J., Marvaud, J.C., Popoff, M.R., Kozaki, S., Oguma, K. (2000): Identification and characterization of functional subunits of *Clostridium botulinum* type A progenitor toxin involved in binding to intestinal microvilli and erythrocytes. *FEBS Lett.* **467**, 179–183.
- 6) Fujinaga, Y., Inoue, K., Watarai, S., Sakaguchi, Y., Arimitsu, H., Lee, J.C., Jin, Y., Matsumura, T., Kabumoto, Y., Watanabe, T., Ohyama, T., Nishikawa, A., Oguma, K. (2004): Molecular characterization of binding subcomponents of *Clostridium botulinum* type C progenitor toxin for intestinal epithelial cells and erythrocytes. *Microbiology* **150**, 1529–1538.
- 7) Fujinaga, Y., Sugawara, Y., Matsumura, T. (2013): Uptake of botulinum neurotoxin in the intestine. *Curr. Top. Microbiol. Immunol.* **364**, 45–59.
- 8) Hase, K., Kawano, K., Nochi, T., Pontes, G.S., Fukuda, S., Ebisawa, M., Kadokura, K., Tobe, T., Fujimura, Y., Kawano, S., Yabashi, A., Waguri, S., Nakato, G., Kimura, S., Murakami, T., Iimura, M., Hamura, K., Fukuoka, S., Lowe, A.W., Itoh, K., Kiyono, H., Ohno, H. (2009): Uptake through glycoprotein 2 of FimH(+) bacteria by M cells initiates mucosal immune response. *Nature* **462**, 226–230.
- 9) Jin, Y., Takegahara, Y., Sugawara, Y., Matsumura, T., Fujinaga, Y. (2009): Disruption of the epithelial barrier by botulinum haemagglutinin (HA) proteins—differences in cell tropism and the mechanism of action between HA proteins of types A or B, and HA proteins of type C. *Microbiology* **155**, 35–45.
- 10) Knoop, K.A., Kumar, N., Butler, B.R., Sakthivel, S.K., Taylor, R.T., Nochi, T., Akiba, H., Yagita, H., Kiyono, H., Williams, I.R. (2009): RANKL is necessary and sufficient to initiate development of antigen-sampling M cells in the intestinal epithelium. *J. Immunol.* **183**, 5738–5747.
- 11) Lee, K., Zhong, X., Gu, S., Krueel, A.M., Dorner, M.B., Perry, K., Rummel, A., Dong, M., Jin, R. (2014): Molecular basis for disruption of E-cadherin adhesion by botulinum neurotoxin A complex. *Science* **344**, 1405–1410.
- 12) Matsumura, T., Fujinaga, Y., Jin, Y., Kabumoto, Y., Oguma, K. (2007): Human milk SIgA binds to botulinum type B 16S toxin and limits toxin adherence on T84 cells. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* **352**, 867–872.
- 13) Matsumura, T., Jin, Y., Kabumoto, Y., Takegahara, Y., Oguma, K., Lencer, W.I., Fujinaga, Y. (2008): The HA proteins of botulinum toxin disrupt intestinal epithelial intercellular junctions to increase toxin absorption. *Cell Microbiol.* **10**, 355–364.
- 14) Matsumura, T., Sugawara, Y., Yutani, M., Amatsu, S., Yagita, H., Kohda, T., Fukuoka, S., Nakamura, Y., Fukuda, S., Hase, K., Ohno, H., Fujinaga, Y. (2015): Botulinum toxin A complex exploits intestinal M cells to enter the host and exert neurotoxicity. *Nat. Commun.* **6**, 6255.
- 15) Nakato, G., Hase, K., Suzuki, M., Kimura, M., Ato, M., Hanazato, M., Tobiume, M., Horiuchi, M., Atarashi, R., Nishida, N., Watarai, M., Imaoka, K., Ohno, H. (2012): Cutting Edge: *Brucella abortus* exploits a cellular prion protein on intestinal M cells as an invasive receptor. *J. Immunol.* **189**, 1540–1544.
- 16) Neutra, M.R., Mantis, N.J., Kraehenbuhl, J.P. (2001): Collaboration of epithelial cells with organized mucosal lymphoid tissues. *Nat. Immunol.* **2**, 1004–1009.
- 17) Sakaguchi, G. (1982): *Clostridium botulinum* toxins. *Pharmacol. Ther.* **19**, 165–194.
- 18) Schiavo, G., Matteoli, M., Montecucco, C. (2000): Neurotoxins affecting neuroexocytosis. *Physiol. Rev.* **80**, 717–766.
- 19) Sugawara, Y., Matsumura, T., Takegahara, Y., Jin, Y., Tsukasaki, Y., Takeichi, M., Fujinaga, Y. (2010): Botulinum hemagglutinin disrupts the intercellular epithelial barrier by directly binding E-cadherin. *J. Cell Biol.* **189**, 691–700.
- 20) Sugawara, Y., Yutani, M., Amatsu, S., Matsumura, T., Fujinaga, Y. (2014): Functional dissection of the *Clostridium botulinum* type B hemagglutinin complex: identification of the carbohydrate and E-cadherin binding sites. *PLoS One* **9**, e111170.
- 21) Sugawara, Y., Iwamori, M., Matsumura, T., Yutani, M., Amatsu, S., Fujinaga, Y. (2015): *Clostridium botulinum* type C hemagglutinin affects the morphology and viability of cultured mammalian cells via binding to the ganglioside GM3. *FEBS J.* **282**, 3334–3347.
- 22) Takeichi, M. (1991): Cadherin cell adhesion receptors as a morphogenetic regulator. *Science* **251**, 1451–1455.

Mechanism of intestinal absorption of botulinum neurotoxin complex

Takuhiro MATSUMURA

Department of Bacteriology, Graduate School of Medical Sciences, Kanazawa University

Botulinum neurotoxins (BoNTs) produced by the anaerobic bacterium *Clostridium botulinum* and related species cause botulism, a neuromuscular disease associated with a high mortality. BoNTs are always produced as large protein complexes (progenitor toxin complexes, PTCs) through association with non-toxic components (NAPs) including hemagglutinin (HA) and non-toxic non-hemagglutinin (NTNHA). Food-borne botulism is caused by the ingestion of PTCs. PTCs in the gastrointestinal tract cross the intestinal epithelial barrier, enter the blood stream, and reach the nerve endings, where BoNTs cleave the SNAREs required for vesicle fusion. Consequently, BoNTs inhibit neurotransmitter release and cause paralysis. To cause food-borne botulism, BoNTs must traverse the intestinal epithelial barrier. However, the mechanism used to cross this barrier remains unclear. Using an *in vitro* epithelial barrier system, we previously showed that the interaction of HA with E-cadherin results in disruption of tight junctions. Furthermore, we previously reported that microfold (M) cells in the follicle-associated epithelium (FAE) of mouse Peyer's patches (PPs) are major sites where type A1 BoNT breaches the intestinal epithelial barrier. Here, I would like to demonstrate an ingenious invasion mechanism of the BoNT complex.