膀胱, 膽囊並ニ子宮腔内沈降元注入ニ因ル沈降素ノ產生並ニコレガ消長ニ關スル實驗的研究

日本赤十字社大阪支部病院研究科 (醫長 秋山靜一博士)

醫學士 山 本 一 夫

Kazuo Yamamoto

(昭和12年1月16日受附)

【内 容 抄 録】

家兎膀胱, 膽囊及子宮腔内ヨリ健常山羊血清 0.7ccヲ注入シ, コレニヨリテ招來セラルル血清中ノ沈降素ノ發生並ニ消長ヲ研究シ, コレガ發生機轉ノ考察ヲ下サントメ注入局所ノ病理組織學的檢索ヲ行ヒ且ツ一定ノ損傷ヲ與ヘタル是等臟器腔内ニ同様ニ山羊血清ヲ注入シタリ.

目 次

緒 言	病理組織學的變化
第1章 研究材料並ニ研究方法	第3節 家兎子宮ニ於ケル肉眼の所見並ニ
第2章 家兎膀胱, 膽囊並ニ子宮腔内沈降元	病理組織學的變化
注入後ニ於ケル沈降素產生並ニコレ	第4節 小 括
ガ消長	第4章 同一程度ノ粘膜炎傷ヲ與ヘタル家兎
第1節 膀胱腔内注入試験	膀胱, 膽囊並ニ子宮腔内沈降元注入
第2節 膽囊腔内注入試験	後ニ於ケル血清内沈降素產生ノ消長
第3節 子宮腔内注入試験	第1節 膀胱ニ於ケル實驗成績
第4節 小 括	第2節 膽囊ニ於ケル實驗成績
第3章 沈降元ヲ注入セシ家兎膀胱, 膽囊並	第3節 子宮腔ニ於ケル實驗成績
ニ子宮ノ肉眼の所見並ニ病理組織學的	第4節 小 括
檢索	第5章 實驗成績ノ總括並ニ考按
第1節 家兎膀胱ニ於ケル肉眼の所見並ニ	結 論
病理組織學的變化	文 献
第2節 家兎膽囊ニ於ケル肉眼の所見並ニ	

緒 言

文献ノ教フル所ニ從ヘバ臟器腔内ニ直接抗原ヲ注入シ, ソレニヨリテ招來スル抗體ノ研究業績ハ決シテ乏シカラズ, 即チ正司, 赤枝⁽⁴⁾等ハ膀胱腔内ヘ抗原ヲ注入シ血清中ニ於ケル抗體ノ發生ヲ證明シ, 井岡, 街風⁽³⁾ 近藤⁽¹⁾ 竹村⁽³⁾等ハ同様實驗ヲ子宮腔ニ就テ行ヒソレゾレ血清中ニ抗體ノ產生スルヲ證明セリ.

然レドモ膽囊腔内ヨリノ抗原注入ニヨル觀察ハ未ダコレヲ試ラレタルモノナク又此等諸臟

器腔内ヨリノ觀察ヲ同時ニ行ヒ比較檢討ヲ行ヒタル業績ハ未ダ之アルヲ聞カズ、加フルニ此等諸臟器腔内ヨリノ抗元吸收ガ果シテ健康ナル粘膜ヨリセララルヤ否ヤニ就キテハ定説ナシト云フモ敢ヘテ過言ニアラザルベシ。

茲ニ於テ余ハ此等三種腔内ヨリノ抗元注入ニヨル抗體產生狀態並ニ消長ヲ比較檢討シ、ソレゾレノ特種性ト病理解剖學的並ニ組織學的の所見ヲ比較對照シ更ニソノ粘膜ヲ毀損セルモノニ就キテソノ抗體發現ノ狀態ヲ檢シ此等臟器腔内ニ注入セラレタル抗元吸收機轉ニ關スル若干ノ知見ヲ得タルヲ以テ茲ニ説述シ大方諸賢ノ批判ヲ乞ハントスルモノナリ。

第 1 章 研究材料並ニ研究方法

1. 試驗動物： 體重約 2kg. ノ雌性ノ家兎ニシテ實驗前一定期間本研究科動物室ニ飼育シタルモノヲ使用シ、實驗中ノ飼育條件ハ嚴ニ此レヲ等シクセリ。
2. 抗元： 山羊血清ヲ使用シ各臟器腔内ヘノ注入量ハ各頭 0.7cc ヲ用ユ。
3. 開腹手術： 先ヅ家兎背部皮下ニ 1.0% 鹽酸もるひね水溶液ノ 1.0cc ヲ注射シ、輕キ麻醉ノ狀態ニ移行スルヲ俟テ手術臺上ニ仰臥位ニ固定シ、下腹部ヲ剃毛シ、沃度丁幾ヲ塗布シ、70.0%あるこほーニテ沃度丁幾ノ色ガ消失スル程度ニ拭キ爾後無菌的操作ヲ以テ膀胱並ニ子宮ノ場合ニハ耻骨縫合ノ上 1.0cm. ヨリ腹部正中線上 4.0cm. 長ニ皮膚切開ヲ施シ。膽嚢ノ場合ニハ右季肋部ニ約 4.0cm. 長ノ縱切開ヲ施シ後述ノ抗元注入處置ヲ行ヒタル後腹壁ヲ二層ニ縫合シ 10.0% よーどふおるむころぢうむヲ塗布シ手術ヲ完了ス。コレニ要スル時間ハ前者ニ於テハ僅カ 18 分乃至 20 分、後者ニ於テハ 20 分乃至 25 分ニシテ手術ニヨル失血ハ殆ンドナク手術後 1,2 時間ニテ覺醒ス。

4. 抗元注入處置：

イ。膀胱腔内ヘ抗元ヲ注入スル場合ニハ開腹ヲナシ、直ニ膀胱ヲ取り出シ内容ヲ空虚ニシ、丸針ヲ用ヒ血管ヲ避ケ底部ニ家兎常時子宮大ノ小膀胱ヲ造リ注入液ノ漏泄ヲ避クルタメ極メテ細キ注射針ヲ小膀胱腔内ヘ挿入シテ山羊血清ヲ 0.7cc 注入シ直チニ該部ニ結紮ヲ行ヒココニ注入處置ヲ終リ膀胱ヲ腹腔内ニ整復ス。

ロ。膽嚢腔内抗元注入ノ場合ニハ開腹後直チニ膽嚢ヲ露出シ底部ニ膀胱ノ場合ト同様ナル小膽嚢ヲ造リ該小膽嚢中ニ 0.7cc ノ山羊血清ヲ注入シ、直チニ該部ニ結紮ヲ行ヒ膽嚢ヲ腹腔内ニ整復ス。

ハ。子宮腔内ヘ抗元ヲ注入スル場合ニハ開腹後直チニ子宮ヲ取り出シ右側ニ山羊血清 0.7cc 左側ニハ對照トシテ滅菌生理的食鹽水ヲ 0.7cc 注入ス。注入液ノ漏泄ヲ避クルタメ子宮ノ腔ヘノ移行部ニテ第一結紮ヲ行ヒ豫メ子宮輸卵管端ニ糸ヲ通ジ置キ注入後直チニコレニテ第二結紮ヲ行ヘリ。

5. 沈降反應試驗方法：沈降反應試驗ハ うーれんふーと 氏法ノ重層法ヲ用ユ，即チ山羊血清ヲ5倍，10倍，20倍，50倍，100倍，200倍，500倍，1000倍，2000倍，5000倍，10.000倍，20.000倍ノ倍數稀釋法ヲ行ヒ次ニ各試験管ニ同量ノ試験家兎血清ヲ重層ス，其後30分毎ニ輪環ノ發現有無ヲ検査シ，2時間後ニ成績ヲ判定セリ．コノ場合必要ナル對照試験ヲ行ヒタルハ言ヲ俟タズ，但シ後述實驗成績記載ノ表ニハ記載ヲ省略セリ．

6. 剖檢並ニ組織標本：剖檢ハ抗原注入後24時間目即チ第1日ヨリ第20日迄毎日コレヲ行ヒ抗原ヲ注入セル臓器ヲ剔出シ，肉眼の檢索ヲ行ヒタル後コレヲ10.0%ふおるまりん水ニ固定シコレヨリ組織小片ヲ取り型ノ如クあるこほーる脫水ヲ經テちえろいでん又ハばらふいんニ包埋シ，約7 μ ノ切片ヲ作製シ，へまときしりん一えおじんノ複染色ヲ施シ鏡查ノ用ニ供セリ．

第2章 家兎膀胱，膽囊並ニ子宮腔内沈降元注入 後ニ於ケル血清内沈降素產生ノ消長

第1節 膀胱腔内注入試験

家兎膀胱腔内ニ山羊血清ヲ0.7cc注入シタル後血清内ニ出現スル沈降素ノ消長ヲ精査セリ其ノ成績ヲ表示スレバ第1表乃至第5表ノ如シ．

第1表 家兎第46號

検査 日 數	試験管 番 號 山羊血清 稀釋倍數 體 重(g.)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2050	—											
第1日	2020	—											
第2日	2000	—											
第3日	2000	—											
第4日	2030	±	—										
第5日	2020	+	+	—									
第6日	2030	+	+	±	—								
第7日	2020	++	++	+	+	+	+	—					
第8日	2040	++	++	++	++	++	+	+	+	+	±	—	
第10日	2050	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	—	
第12日	2070	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	±
第14日	2100	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	+	+	±
第16日	2120	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	±	—
第18日	2150	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	±	—		

(280)

膀胱, 膽囊並ニ子宮腔内沈降元注入ニ因ル沈降素
ノ產生並ニコレガ消長ニ關スル實驗的研究

第 2 表 家兎第259號

檢 查 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 體 重(g.)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2100	-											
第1日	2060	-											
第2日	2040	-											
第3日	2050	-											
第4日	2050	±											
第5日	2030	+	+	+	-								
第6日	2040	+	+	+	+	-							
第7日	2060	+	+	+	+	-							
第8日	2080	+	+	+	+	+	±	-					
第10日	3080	++	++	++	+	+	±	-					
第12日	2070	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	±	-	
第14日	2080	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	±	-
第16日	2100	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	-		
第18日	2130	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	±	-		

第 3 表 家兎第260號

檢 查 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 體 重(g.)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2010	-											
第1日	2000	-											
第2日	2000	-											
第3日	1890	-											
第4日	1880	-											
第5日	1950	±	-										
第6日	2000	±	±	±	±	±	-						
第7日	1980	++	++	+	+	+	-						
第8日	2000	++	++	++	++	++	+	+	±	-			
第10日	2000	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	+	±	-
第12日	2020	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	±
第14日	2000	+++	+++	+++	+++	++	+	+	+	±	-		
第16日	2000	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	-			
第18日	2020	+++	+++	++	++	++	+	+	±	-			

第 4 表 家兎第263號

檢 查 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 體 重(g.)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2150	—											
第1日	2120	—											
第2日	2100	—											
第3日	2060	—											
第4日	2050	±	—										
第5日	2080	+	—										
第6日	2100	+	+	+	+	±	—						
第7日	2090	+	+	+	+	+	+	—					
第8日	2120	+	+	+	+	+	+	±	—				
第10日	2140	++	++	++	++	+	+	+	±	—			
第12日	2130	++	++	++	++	+	+	+	±	—			
第14日	2150	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	±	—	
第16日	2140	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	—			
第18日	2160	+++	+++	++	++	+	+	+	±	—			

第 5 表 家兎第279號

檢 查 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 體 重(g.)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2110	—											
第1日	2090	—											
第2日	2080	—											
第3日	2080	—											
第4日	2050	—											
第5日	2040	±											
第6日	2070	+	+	—									
第7日	2060	+	+	+	+	+	+	—					
第8日	2070	++	++	++	+	+	+	+	±	—			
第10日	2090	++	++	+	+	+	+	+	±	—			
第12日	2090	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	±	—	
第14日	2120	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	±	—
第16日	2130	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	±	—
第18日	2120	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	±	—	

今第1表—第5表ヲ點檢スルニ家兎膀胱腔内ニ山羊血清0.7ccヲ注入スルトキハ5例共血清中ニ沈降素ノ發現ヲ證明シ，中(46)(259)(263)號ニ於テハ夫々第1第2第4表ニ示ス如ク第4日ニ，(260)(279)號ニ於テハ夫々第3第5表ニ示ス如ク第5日ニ沈降素ノ產生ヲ證明シ何レモ徐々ニ上昇シ，(46)號ニ於テハ第1表ニ示ス如ク第12日乃至第14日ニ，(260)號ニ於テハ第3表ニ示ス如ク第12日ニ，(263)號ニ於テハ第4表ニ示ス如ク第14日ニ，(259)號ニ於テハ第2表ニ示ス如ク第14日ニ，(279)號ニ於テハ第5表ニ示ス如ク第14日乃至第16日ニ最高沈降價ヲ示シ以後各例共徐々ニ下降ス。(第1圖參照)

膀胱 (第1圖)

第2節 膽囊腔内注入試験

家兎膽囊腔内ニ山羊血清ヲ0.7cc注入シタル後血清内ニ發現スル沈降素ノ消長ヲ精査セリ其ノ成績ヲ表示スレバ第6表乃至第10表ノ如シ。

第6表ヨリ第10表ニ至ル5表ヲ檢スルニ家兎膽囊腔内ニ山羊血清0.7ccヲ注入スルトキハ5例共第5日ニ血清中ニ沈降素ノ發現ヲ證明シ。(252). (253). (255). (256)號ニ於テハ夫々第7, 8, 9, 10表ニ示ス如ク稍々急速ニ，(249)號ニ於テハ第6表ニ示ス如ク徐々ニ上昇シ，(252),

第 6 表 家兎第249號

檢 查 日 數	試 驗 管 番 號	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2040	--											
第1日	2010	-											
第2日	2000	-											
第3日	1970	-											
第4日	1950	-											
第5日	1900	±	-										
第6日	1920	+	+	+	+	-							
第7日	1910	++	++	+	+	+	±	-					
第8日	1930	++	++	++	++	+	+	±	-				
第10日	1920	+++	+++	+++	++	+	+	+	-				
第12日	1950	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	±	-		
第14日	1980	+++	+++	+++	+++	++	+	+	±	-			
第16日	2010	+++	+++	+++	++	+	+	±	-				
第18日	2030	+++	+++	++	+	+	±	-					

第 7 表 家兎第252號

檢 查 日 數	試 驗 管 番 號	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2060	-											
第1日	2010	-											
第2日	1980	-											
第3日	1960	-											
第4日	1940	-											
第5日	1970	±	-										
第6日	2000	±	±	-									
第7日	1980	+	+	+	+	±	-						
第8日	2000	++	++	++	++	++	+	+	+	+	±	-	
第10日	2010	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	+	±	-
第12日	2020	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	±	-
第14日	2040	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	±	-
第16日	2030	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	±
第18日	2050	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+	-	

(284)

膀胱，膽囊並ニ子宮腔内沈降元注入ニ因ル沈降素
ノ產生並ニコレガ消長ニ關スル實驗的研究

第 8 表 家兎第253號

檢 査 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 體重(瓦)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2100	—											
第1日	2050	—											
第2日	2030	—											
第3日	2030	—											
第4日	2010	—											
第5日	2020	±	—										
第6日	2010	+	+	+	—								
第7日	2000	+	+	+	+	+	+	±	—				
第8日	2020	++	++	++	++	++	++	+	+	±			
第10日	2040	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	±	—	
第12日	2070	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	+	±	—
第14日	2080	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	+	+	±
第16日	2100	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+	—	
第18日	2110	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	±	—	

第 9 表 家兎第255號

檢 査 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 體重(瓦)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2120	—											
第1日	2080	—											
第2日	2040	—											
第3日	2050	—											
第4日	2020	—											
第5日	2040	±	—										
第6日	2060	±	—										
第7日	2050	+	+	±	—								
第8日	2080	++	++	++	++	++	++	++	+	±	—		
第10日	2100	++	++	++	++	+++	++	++	+	+	—		
第12日	2130	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	±	—	
第14日	2100	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	—	
第16日	2130	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+	—
第18日	2140	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+	—	

第 10 表 家兎第256號

檢 查 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 體重(瓦)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2070	—					●						
第1日	2020	—											
第2日	1990	—											
第3日	1970	—											
第4日	1960	—											
第5日	1960	±	—										
第6日	1950	+	+	—									
第7日	1920	+	+	+		+							
第8日	1920	++	++	++	+	+	+	±	—				
第10日	1930	++	++	++	+	+	+	+	—				
第12日	1930	++	++	++	+	+	+	+	+	±	—		
第14日	1950	+	+	+	+	+	+	±	—				
第16日	1980	+	+	+	+	+	±	—					

膽 囊 (第2圖)

膀胱、膽嚢並ニ子宮腔内ニ沈降元ヲ注入ニ因ル沈降素ノ產生並ニコレガ消長ニ關スル實驗的研究

第 3 節 子宮腔内注入試験

第 11 表 家兔第203號

檢 查 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 胎重(瓦)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2030	—											
第1日	1980	—											
第2日	1960	—											
第3日	1930	—											
第4日	1920	—											
第5日	1930	—											
第6日	1920	—											
第7日	1950	+	+	—									
第8日	1970	++	++	++	+	+	+	+	+	—			
第10日	1980	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	—		
第12日	1980	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	±	—
第14日	2000	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	—
第16日	2020	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	±
第18日	2050	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	+	±	—
第20日	2070	++	++	++	++	++	+	+	+	±	—		

第 12 表 家兔第204號

[illegible]

檢 查 日 數	試 驗 管 號 山羊血凝 稀釋倍數 體溫(度)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
第4日	2070	—											
第5日	2080	—											
第6日	2110	±	±	±	—								
第7日	2100	+	+	+	+	+	—						
第8日	2090	++	++	++	+	+	+	+	±	—			
第11日	2100	++	++	++	++	+	+	+	+	±	—		
第13日	2110	++	++	++	++	++	++	+	+	+	—		
第15日	2050	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	— 死亡	

第 13 表 家兔第205號

檢 查 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 體重(克)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2060	—											
第1日	2020	—											
第2日	1970	—											
第3日	1980	—											
第4日	1950	—											
第5日	1950	—											
第6日	1960	±	±	—									
第7日	1950	++	++	+	+	+	+	±	—				
第8日	1940	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+	—	
第11日	1960	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	±	—
第13日	2000	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	+	—
第15日	2030	+++	+++	+++	++	++	++	++	++	+	+	—	
第17日	2070	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	+	—	
第19日	2070	+++	+++	+++	++	+	+	+	+	+	±	—	

第 14 表 家兔第206號

[illegible]

検査 日 數	試 管 番 號 山羊血清 稀釋倍數 重體(瓦)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
第2日	1950	-											
第3日	1930	-											
第4日	1900	-											
第5日	1910	-											
第6日	1900	+	-										
第7日	1920	++	++	++	+	+	+	+	+	-			
第8日	1910	++	++	++	++	++	++	+	+	+	±	-	
第11日	1930	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	±	-
第13日	1960	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	±	-
第15日	1980	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	±
第17日	2020	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	+	±	-
第19日	2040	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	±	-	

第 15 表 家兎第262號

検査 日 數	試 管 番 號 山羊血清 稀釋倍數 重體(瓦)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2150	-											
第1日	2110	-											
第2日	1990	-											
第3日	1960	-											
第4日	1940	-											
第5日	1960	+	+	+	-								
第6日	1950	+	+	+	+	+	+	+	+	-			
第7日	1950	+++	++	++	++	++	+	+	+	+	-		
第8日	1970	+++	+++	++	++	++	++	+	+	+	±	-	
第10日	2000	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	±	-	
第12日	1980	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	±
第14日	2060	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	-	
第16日	2100	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	-	
第18日	2170	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	+	-	
第20日	2180	+++	+++	+++	++	++	++	++	+	+	±	-	

第11表ヨリ第15表ニ至ル5表ヲ觀察スルニ家兎子宮腔内ニ山羊血清ヲ0.7cc注入シタルニ5
例共血清中ニ沈降素ノ發現ヲ證明シ(262)號ニ於テハ第15表ニ示ス如ク第5日ニ、(203)號ニ

於テハ第11表ニ示ス如ク第7日ニ、(204)(205)(206)號ニ於テハ夫々第12第13第14表ニ示ス如ク第6日ニ、血清中ニ沈降素ノ產生ヲ證明シ、何レモ急速ニ上昇シ、(203)號ニ於テハ第11表ニ示ス如ク第14日乃至第16日ニ、(205)號ニ於テハ第13表ニ示ス如ク第13日ニ、(206)號ニ於テハ第14表ニ示ス如ク第15日ニ、(262)號ニ於テハ第15表ニ示ス如ク第12日ニ、最高沈降價ヲ示シ、以後各例共徐々ニ下降ス、(第3圖參照)

但シ(204)號ハ第15日採血後死亡セリ、

子 宮 (第 3 圖)

第 4 節 小 括

第2章ニ行ヒタル實驗成績ヲ小括スルコト次ノ如シ。

(1). 膀胱ノ場合:

家兎膀胱腔内ニ山羊血清ヲ注入シタルニ 5例共血清内ニ沈降素ヲ證明ス。而シテ其ノ消長ハ特有ナル曲線ヲ示セリ、即チ沈降素ノ發現ハ5例中3例ニ於テハ第4日目ニ他ノ2例ハ第5日目ニ之ヲ證明シ徐々ニ其ノ沈降價ヲ増シ而シテ第12表乃至第16日ノ間ニ於テ最高沈降價ニ達シ以後何レモ徐々ニ下降ス。

(2). 膽囊ノ場合:

家兎膽囊腔内ニ山羊血清ヲ注入シタルニ5例共血清内ニ沈降素ヲ證明ス、而シテソレガ消長ハ一定ノ曲線ヲ示セリ即チ沈降素ノ發現ハ5例共膀胱ノ場合ニ比シテ稍遅レテ第5日ニ之ヲ證明シ而シテ第12乃至第16日ノ間ニ於テ最高沈降價ニ達シ以後何レモ徐々ニ下降ス。

(3). 子宮ノ場合:

家兎子宮腔内ニ山羊血清ヲ注入シタルニ5例共血清内ニ沈降素ヲ證明ス、而シテ其ノ消長ハ特有ナル曲線ヲ示セリ即チ沈降素ノ發現ハ最モ晚ク5例中3例ハ第6日ニ、他ノ2例ハ夫々第5第7日ニ之ヲ證明シ急速ニ沈降價ヲ増シ、而シテ第12日乃至第16日ノ間ニ於テ最高沈降價ニ達シ以後何レモ徐々ニ下降ス。此ノ最高沈降價ニ達スル時期ハ近藤⁽²⁾氏ノ實驗ト同様ナリ。

(4). 即チ膀胱, 膽囊及ビ子宮等ニ山羊血清ヲ注入スルトキハ其ノ血清内ニ沈降素ノ發現及ビ其消長ニハ夫々特有ナルモノアルヲ知ル。(第4圖參照)

(第4圖)

第 3 章 沈降元ヲ注入セシ家兎膀胱，膽囊並ニ子宮 ノ肉眼の所見並ニ病理組織學的檢索

第 1 節 家兎膀胱ニ於ケル肉眼の所見並ニ病理 組織學的變化

第 1 日

肉 眼 の 所 見

小兒小指頭大ニ腫大シ殆ンド透明ナル稀薄液ヲ容ル。

顯微鏡の所見

内容。 えおじんニヨリ淡紅色ニ染色セル同質性ノ物質中ニ比較的多數ノ中性多核白血球，赤血球，少數ノ淋巴球，小圓形細胞及脱落シ膨大セル上皮細胞ヲ混ズ。

粘膜上皮細胞層。 上皮細胞ハ大部分ニ於テ健態ヲ呈スルモ所々ニ細胞ノ境界不明ナル部分介在シ又所ニヨリテハ著シク菲薄ニナリテ境界不明ナル一層ノ上皮細胞ヲ以テ覆ハルルニ至リ殊ニ前記ノ内容ニ於テ細胞性分ニ豐饒ナル部分ニ接セル部ノ上皮細胞層ニ於テハ全々コレヲ缺損スルニ至ルモノ稀ナラズ。

上皮層。 一般ニ浮腫狀ヲ呈シ所ニヨリテハふいぶりンヲ含ミタル同質性ノ物質ノ浸出顯著ニシテ或ハ疎ニ或ハ稍々密ニ赤血球ノ存在セルヲ認ム，コノ傾向ハ前記ノ上皮細胞ノ脱落セル部ニ於テ殊ニ顯著ナリ。

筋 層。 筋間結締織著シク鬆疎ニシテ浮腫狀ヲ呈シタメニ筋纖維束ノ走行ハ所ニヨリテ著シク亂サレ殊ニ上皮細胞脱落部位ニ於テハ筋纖維ノ變性著シク其ノ核ハ何レモ萎縮或ハ膨大ヲ示シ核染色性ニ異常ヲ呈セリ。又此部ニ於テ筋纖維束間ニ稍々多數ノ赤血球ノ存在ヲ認ム。

漿膜下層。 著シク浮腫狀トナリふいぶりンヲ混ゼル同質性ノ物質ニテ浸漬セラレ所々稍々著明ナル出血竈ヲ認ム。

漿膜上皮細胞層。 漿膜上皮細胞ハ所ニヨリテハ缺損セルモノアリ。

血 管。 一般ニ殊ニ小血管ニ於テ著シク其ノ管腔擴大充盈セルヲ認ム。

細胞浸潤。 各層ヲ通ジテ炎性ノ細胞浸潤ハ輕度ナレド主トシテ多核白血球瀰漫性ニ浸潤セリ

第 2 日

肉 眼 の 所 見

第1日ト同様ナルモ内容稍々出血性ナリ。

顯微鏡の所見

内容中ニハ稍々多量ノ赤血球ヲ混ジ又粘膜上皮細胞ノ脱落稍々著シク，壁ノ出血ト白血球ノ浸潤第1日ヨリ強シ。

第 3 日

肉 眼 の 所 見

前同様ナルモ内容出血性ナリ，

顯微鏡的所見

内容中ニハ血球ヲ混ズル事多ク壁ノ變化ハ第2日ヨリ一層強シ。

第 6 日

肉眼的所見

殆ンド前同様ナリ。

顯微鏡的所見

内容 略々前同様ナリ。

粘膜上皮細胞ノ脱落顯著ナリ。白血球ノ浸潤並ニ出血一層顯著ニシテ所ニヨリ膿瘍ノ如ク見ユル部分アリ。

第 7 日

肉眼的所見

大サ稍々小トナリ、内容尙出血性ナレドモ液量稍々少量トナル。

顯微鏡的所見

内容中ニ血球ヲ混ズルモ其ノ量少シ。

粘膜上皮細胞ノ原形實ハ稍々膨大シ昌明トナリ、又其ノ脱落モ前例ニ於ケル程顯著ナラズ一般ニ出血少ク浮腫ノ狀態モ輕度トナリ炎性ノ細胞浸潤ハ著明ナルモ主トシテ小圓形細胞及ビ造結締組織細胞ヨリナル。

第 12 日

肉眼的所見

大サ前例ヨリモ縮小シ内容モ亦前例ヨリモ少量トナル。

顯微鏡的所見

内容ハ略々前例ニ於ケルト同様ナリ。

粘膜上皮細胞ノ脱落ハ尙稍々著シク認メラルルモ浮腫ハ愈々輕度トナル。炎性ノ細胞浸潤ハ略々前例ニ於ケルト同ジ。

第 14 日

肉眼的所見

大サ前例ト同様ナルモ内容極メテ少量トナル。

顯微鏡的所見

内容中ニ血球ヲ證明セズ。

粘膜上皮細胞ノ脱落一般ニ僅少トナル。細胞浸潤ハ上皮層ノ所々ニ於テ尙認め得。

第 18 日

肉眼的所見

大サ前例ヨリモ縮小シ内容殆ンド空虚。

顯微鏡的所見

特種ナル内容ヲ認メズ。

輕度ノ血管ノ管腔ノ擴大並ニ細胞浸潤アルモ一般ニ殆ンド健康ヲ呈ス。

第 2 節 家兎膽囊ニ於ケル肉眼の所見並ニ病理組織學的變化

第 1 日

肉 眼 的 所 見

小兒小指頭大ニ腫大シ殆ンド透明ナル稀薄液ヲ容ル。

顯微鏡的所見

内容 えおじんニヨリ淡紅色ニ染着セル同質性ノ物質中ニ僅ニ中性多核白血球、赤血球、及ビ脫落上皮細胞ヲ混ズ。

粘膜上皮細胞層。 上皮細胞ハ概シテ健康ナルモ所々ニ於テ核ノ染着性ノ低下及ビ細胞境界ノ不鮮明等ノ變性ヲ示シ所ニヨリテハ上皮細胞ノ脫落セル部分ヲ認ム。

上皮下層。 上皮細胞ノ直下ニ於テハふいぶり混ゼル同質性物質ノ浸漬ヲ認メ一般ニ浮腫狀ヲ呈セリ又所々ニ輕度ナル出血ヲ認ム。

筋 層。 筋纖維束ノ走行ニハ著變ナキモ所ニヨリテ其ノ配列ヲ亂シ筋間結締織ハ著シク鬆疎トナリ浮腫狀ヲ呈シ輕キ出血アリ。

漿膜下層。 一般ニ鬆疎トナリ浮腫狀ヲ呈シ輕キ出血ヲ認ム。

漿膜上皮細胞層。 上皮細胞ハ略々健康ナルモ所ニヨリコレヲ缺損ス。

血 管。 一般ニ其ノ管腔ノ擴大充盈ヲ示ス。

細胞浸潤。 各層ヲ通ジ炎症ノ細胞浸潤ハ輕度ナレド認メラレ主トツテ中性多核白血球瀰漫性ニ浸潤セルヲ認ム。

第 2 日

肉 眼 的 所 見

大サ第1日ト同様ナルモ内容稍々出血性トナル。

顯微鏡的所見

内容 多數ノ赤血球ヲ混ジ殆ンド全部血球ヲ以テ充填セラレタル像ヲ示シ所々ニ於テ第1日ト同様ナル内容ノ介在セルヲ認ム。白血球ノ混入顯著ニシテ淋巴球小圓形細胞モ混ズ。

粘膜上皮細胞層。 上皮細胞ハ所ニヨリテ附着セルヲ認ムルモ其ノ大部分ニ於テ脫落シ。附着セル上皮細胞モ内容ニ壓迫サレテ扁平化セルモノ多シ且ツ前例ニ記セルガ如キ變性ハ所々ニ於テコレヲ認メラル。

又粘膜ノ皺襞ハ一般ニ至ツテ貧弱トナル。其他各層ニ於ケル變化ハ第1日ト同様ナルモ浮腫ノ程度出血ノ狀態等ハ前例ニ比シ顯著ナリ。

第 3 日

肉 眼 的 所 見

略々前同様ナルモ内容出血性ナリ。

顯微鏡的所見

内容並ニ壁ノ状態ハ殆ソド前同様ナルモ壁ニ於ケル白血球瀰漫性浸潤ハ前2例ノ如ク顯著ナラズシテ却ツテ小圓形細胞, 造結締織細胞等ノ瀰漫性浸潤ヲ認ム, 出血モ前例ヨリ一般ニ輕度ナリ。

第 4 日

肉眼的所見

略々前同様ナリ。

顯微鏡的所見

内容 略々前例ニ於ケルト同様ナルモ粘膜上皮細胞ノ脱落及變性ハ顯著ナラズ炎症性ノ細胞浸潤ハ殊ニ漿膜下層ニ於テ多ク認メラレ其ノ構成分ハ小圓形及造結締織細胞ニ富メリ, 出血ハ略々同程度ニ認メラル。

第 6 日

肉眼的所見

大サ稍々縮小シ内容ハ尙出血性ナレドモ液量稍々少量トナル。

顯微鏡的所見

内容 前記ト殆ソド同様ナルモ比較的赤血球ニ乏シ,
粘膜上皮細胞層 上皮細胞ハ所々ニ於テ剝離セラル。
炎症性ノ細胞浸潤ハ可ナリ顯著ニシテ前例ト同様ナル個所ニ同様ナル構成分ノ細胞浸潤ヲ認ム。
出血竈ハ殆ソド之ヲ認メズ。

第 12 日

肉眼的所見

大サ前例ヨリモ小トナリ内容モ稀薄ナル液少量トナル。

顯微鏡的所見

内容 ハ輪廓不鮮明ナル少量ノ赤血球ヲ混ジえおじんニヨリ淡紅色ニ染着セル同質性ノ物質ニシテ以上ニ混ズルニ比較的少量ノ中性多核白血球ト小圓形細胞及ビ脱落上皮細胞ヲ以テス。
粘膜ハ皺襞ニ乏シク上皮細胞ハ大部分ニ於テ扁平トナリ圓柱狀ヲ呈スルモノ少ク所々ニ於テ脱落セリ。

炎症性ノ細胞浸潤ハ比較的密ニシテ瀰漫性ニ存在シ多核白血球ヲ混ズルモ主要ナルモノハ小圓形細胞, 造結締織細胞等ナル事ハ前同様ナリ。

出血竈ハ所々ニ小出血竈ヲ認ムルモ餘リ顯著ナラズ。

第 15 日

肉眼的所見

大サ愈々縮小シ内容愈々少シ

顯微鏡的所見

内容 略々前同様ナルモ血球ヲ混ズル事少ク壁ノ變化ニ於ケル上皮細胞ノ變性, 炎症性ノ細胞浸

潤及ビ浮腫等ノ状態ハ一般ニ前例ヨリモ輕度ナリ。

第 18 日

肉 眼 的 所 見

大サ前例ヨリモ稍々小内容殆ンド空虚。

顯 微 鏡 的 所 見

細胞浸潤及輕キ血管腔ノ擴大ヲ見ルモ一般ニ殆ンド健態ニ近シ。

第 3 節 家兎子宮ニ於ケル肉眼的所見並ニ病理 組織學的變化

第 1 日

肉 眼 的 所 見

子宮小兒小指頭大ニ腫大シ稍々透明ナル稀薄液ヲ容ル。

顯 微 鏡 的 所 見

内容. えおじんニヨリ淡紅色ニ染着セル同質性ノ物質中ニ中性多核白血球, 赤血球, ふいぶりん及ビ脱落セル上皮細胞ヲ混ズ。

粘膜上皮細胞層. 上皮細胞ハ一般ニ稍々扁平トナリ, 核ノ染着性, 細胞ノ境界等ニ著變ナキモ所々ニ於テ上皮細胞ハ變性ニ陥リ且ツ脱落ス。

粘膜ノ雛襞ハ比較的貧トナル。

上皮下層. 浮腫狀トナリ肥厚シ所々ニ輕度ノ出血ヲ見ル。

筋 層. 筋纖維ニ著變ナキモ筋纖維束, 筋間結締組織ハ浮腫狀ヲ呈スル事膀胱及膽囊ノ場合ト同様ニシテ出血モ輕度ニ認メラル。

漿膜下層. 比較度ナレド浮腫狀ヲ呈シ出血竈ハ主トシテ本層及ビ其ノ附近ニ於テ認メラル。

漿膜上皮細胞層. 殆ンド健態ナリ。

血 管. 何レモ其ノ管腔ノ擴大充盈強シ。

細胞浸潤. 炎性ノ細胞浸潤ハ中性多核白血球ガ主トシテ瀰漫性ニ散在シ所ニヨリテハ稠密ニ集積スル部分アレド其ノ稠密ナル浸潤ノ多少ト各層トハ特定のナ關係ナシ。

第 2 日

肉 眼 的 所 見

前同様ナルモ内容稍々出血性ナリ。

顯 微 鏡 的 所 見

内容並ニ各層ニ於ケル變化ハ略々前例ニ於ケルト同様ナリ。

第 3 日

肉 眼 的 所 見

大サ前同様ナレド内容稍々著シク出血性ナリ。

顯 微 鏡 的 所 見

内容 第1日ノ内容ト略々同様ナルモ中性多核白血球, 赤血球殊ニ脱落セル上皮細胞ニ富メリ
淋巴球モ可ナリ多數ニ混ズ.

粘膜上皮細胞層. 上皮細胞ノ脱落セル部分及變性セル部分前例ヨリモ廣範圍ナリ.

上皮下層, 筋層, 漿膜下層, 等ニ於ケル變化ハ前例ト略々同様ナリ.

出血並ニ炎症ノ細胞浸潤ハ前例ヨリモ強度ナリ.

第 5 日

肉眼的所見

略々同様ナリ.

顯微鏡的所見

内容. 略々同様.

壁ノ變化殆ンド第3日ト同様ナリ. 出血ハ粘膜下層ニ於テ比較的多ク認メラル.

炎症ノ細胞浸潤モ粘膜下層ニ於テ比較的顯著ニ認メラレ可成多數ノ小圓形細胞, 淋巴球及ビ造
結締織細胞等ガ中性多核白血球ニ混ジテ浸潤セルヲ認ム.

第 6 日

肉眼的所見

略々前同様ナリ.

顯微鏡的所見

前同様ナリ.

第 7 日

肉眼的所見

大サ稍々小トナリ内容尙出血性ナルモ液量稍々少量トナル.

顯微鏡的所見

殆ンド前同様ナルモ内容ニ血球ヲ減ジ壁組織ニ於ケル出血及炎症ノ細胞浸潤ハ輕度トナル, 所
ニヨリテハ殆ンド出血竈ヲ見ザルニ至ル.

第 11 日

肉眼的所見

大サ前例ヨリモ稍々縮少シ内容モ亦少量トナル.

顯微鏡的所見

内容ニ少量ノ血球及ビ變性セル上皮細胞ヲ見ル.

壁ノ變化ハ一般ニ前例ニ於ケルト略々同様ナルモ炎症ノ細胞浸潤ハ粘膜下層ト筋層トノ境界部
ニ於テ殊ニ顯著トナル.

第 12 日

肉眼的所見

大サ前例ト略々同様ナルモ内容愈々少シ.

顯微鏡的所見

内容並ニ壁ノ變化略々前例ニ於ケルト同様ナルモ、炎症ノ細胞浸潤ハ前例ヨリモ輕度ナリ

第 18 日

肉 眼 的 所 見

大サ略々前同様ナルモ内容殆ンド空虚。

顯微鏡的所見

壁ノ變化ハ前例ニ於ケルト略々同様。

第 19 日

肉 眼 的 所 見

大サ愈々縮少シ内容モ殆ンド空虚。

顯微鏡的所見

殆ンド健態ナルモ炎症ノ細胞浸潤ハ粘膜下層ニ限局シテ輕度ナリ、小圓形細胞、淋巴球等ノ單核細胞及ビ造結締組織細胞ヲ其ノ構成ノ主成分トス。

第 4 節 小 括

第3章ニ於ケル成績ヲ小括スレバ次ノ如シ。

1. 膀胱ノ場合ニ於テハ

内容ハ第1日ニ於テ既ニ出血性トナリ、コレニ混ズルニ脱落上皮細胞ヲ以テス而シテ之等ノ内容ハ第7日ヨリ徐々ニ減少シ始メ第18日ニハ殆ンド空虚トナル。

壁ノ變化ハ第1日ニ於テ既ニ粘膜上皮細胞ノ缺損、上皮下層、筋層、漿膜下層、等ノ浮腫及ビ出血、血管ノ管腔ノ擴大充盈、主トシテ中性多核白血球ヨリナル瀰漫性ノ細胞浸潤ヲ認メ之等ノ變化ハ第6日マデ増惡シ第1週ノ終ヨリ徐々ニ輕度トナリ同時ニ炎症ノ細胞浸潤モ主トシテ小圓形及造結締組織細胞ニ代ル而シテ第18日ニハ殆ンド健態トナル。

2. 膽囊ノ場合ニ於テハ

内容ハ第1日ニ於テ既ニ出血性トナリコレニ混ズルニ脱落上皮細胞ヲ以テス而シテ之等ノ内容ハ第6日ヨリ徐々ニ減少シ始メ第18日ニハ殆ンド空虚トナル。

壁ノ變化ハ膀胱ノ場合ト略々同様ナルモ炎症ノ細胞浸潤ハ第3日ニ於テ小圓形及ビ造結締組織細胞ヲ多ク混ジ來リ、ヤガテ主トシテ之等ヲ以テ構成セララルニ至ル。

而シテ以上ノ變化ハ第6日ヨリ徐々ニ輕度トナリ始メ第18日ニハ殆ンド健態トナル。

3. 子宮ノ場合ニ於テハ

内容ハ第1日ニ於テ既ニ出血性トナリ之ニ混ズルニ脱落上皮細胞ヲ以テス、而シテ之等ノ内容ハ第7日ヨリ徐々ニ減少シ始メ第19日ニハ殆ンド空虚トナル、壁ノ變化ハ膀胱及膽囊ノ場

合ト略々同様ナルモ炎症ノ細胞浸潤ハ第5日ニ於テ小圓形, 造結締織細胞ヲ多ク混ジ始メ次第ニ之等ヲ構成ノ主成分トスルニ至ル而シテ以上ノ變化ハ第7日ヨリ徐々ニ輕度トナリ第19日ニハ殆ンド健態トナル,

4. 即チ組織學的ニ膀胱, 膽囊及子宮等ノ間ニ特定セル變化ヲ見ズ, 3者共ニ第1日ニ於テ既ニ其ノ粘膜毀損セラレ之ニ續テ3者共ニ急性ノ炎症發現シ, 續テ亞急性トナリ. 第2週ニ入リテ恢復セラルルノ狀ヲ示シ, 膀胱, 膽囊及子宮等ノ間ニ特定の變化ヲ見ルコトナシ. 即チコレヲ膀胱, 膽囊及子宮ハ第18日乃至第19日ニシテ夫々健態ニ復ス.

第4章 同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル家兎膀胱, 膽囊並ニ 子宮腔内沈降元注入後ニ於ケル沈降素產生ノ消長

本章ニ於テハ膀胱, 膽囊並ニ子宮等ノ各臟器ニ抗元注入前ニ銳匙ヲ以テ同一程度ノ損傷ヲ與ヘタル後第2章ニ於ケル實驗ト同一手技ヲ以テ山羊血清ヲ注入シ且ツ同章實驗ニ於ケルト同一期日ニ於テ血清内ニ於ケル之ガ沈降素發現ノ狀態ヲ檢シタリ.

第1節 膀胱ニ於ケル實驗成績

同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル家兎膀胱腔内ニ山羊血清ヲ0.7cc注入シタル後血清内ニ發現スル沈降素ノ消長ヲ精査セリ其ノ成績ヲ表示スレバ第16表第17表ノ如シ.

第16表 家兎第70號

検査 日 數	試 管 號 山羊血清 稀釋倍數	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	10000
山羊血清 注入日	2030	—											
第1日	1970	—											
第2日	1950	—											
第3日	1910	—											
第4日	1910	±	—										
第5日	1920	+	—										
第6日	1930	+	+	+	—								
第8日	1950	++	++	++	++	+	+	+	±	—			
第10日	1950	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	±	—		
第12日	1980	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	±	—	
第14日	2010	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	—		
第16日	2050	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	±	—		

第 17 表 家兎第90號

檢 査 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 體重(克)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2080	—											
第1日	2010	—											
第2日	1990	—											
第3日	1970	—											
第4日	1970	±	—										
第5日	1960	±	—										
第6日	1980	±	—										
第7日	1970	++	++	++	+	+	±	±	—				
第9日	1990	+++	+++	++	++	++	+	+	+	±	—		
第11日	2020	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	±	—	
第12日	2040	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	—			
第14日	2070	+++	+++	+++	++	++	+	+	±	—			
第16日	2110	+++	++	++	+	+	+	±	—				

第16, 第17表ノ2表ヲ見ルニ同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル家兎膀胱腔内ニ山羊血清 0.7cc
ヲ注入スルトキハ(70)(90)號共ニ各第16表第17表ニ示ス如ク第4日ニ血清中ニ沈降素ノ發現
ヲ證明シ, 其ノ消長ハ2例共稍々急速ニ略々同様ナル曲線ヲナシテ上昇シ, 前者ニアリテハ第
12乃至第14日, 後者ニアリテハ第11日ニ其ノ最高沈降價ニ達シ以後徐々ニ下降ス(第5圖參照)

第 2 節 膽囊ニ於ケル實驗成績

同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル家兎膽囊腔内ニ山羊血清 0.7cc ヲ注入シタル後血清内ニ發
現スル沈降素ノ消長ヲ精査セリ次ニ其ノ成績ヲ表示スレバ第18第19表ノ如シ。

第18第19表ノ2表ヲ見ルニ同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル家兎膽囊腔内ニ山羊血清 0.7cc ヲ
注入スルトキハ(75)(65)號共ニ各第18, 第19表ニ示ス如ク第4日ニ血清中ニ沈降素ノ發現ヲ
證明シ其ノ消長ハ2例共稍々急速ニ略々同様ナル曲線ヲナシテ上昇シ前者ニアリテハ第12日後
者ニアリテハ第11日乃至第12日ニ其ノ最高沈降價ニ達シ以後徐々ニ下降ス。(第5圖參照)

第 3 節 子宮腔ニ於ケル實驗成績

同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル家兎子宮腔内ニ山羊血清 0.7cc ヲ注入シタル後血清内ニ發

(300)

膀胱, 膽囊並ニ子宮腔内沈降元注入ニ因沈降素ル
ノ產生並ニコレガ消長ニ關スル實驗的研究

第 18 表 家兎第75號

檢 査 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 體重(克)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2120	—											
第1日	2090	—											
第2日	2090	—											
第3日	2070	—											
第4日	2020	±	—										
第5日	2010	+	—										
第6日	2020	+	+	+	—								
第8日	2010	++	++	++	++	++	+	+	±	—			
第10日	2030	++	++	++	++	++	++	+	+	±	—		
第12日	2070	++	++	++	++	++	++	+	+	+	+	±	—
第14日	2090	++	++	++	++	++	++	+	+	+	±	—	
第16日	2140	++	++	++	++	+	+	+	+	±	—		

第 19 表 家兎第65號

檢 査 日 數	試 驗 管 號 山羊血清 稀釋倍數 體重(克)	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11	12
		5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2090	—											
第1日	2080	—											
第2日	2080	—											
第3日	2050	—											
第4日	2000	±	—										
第5日	2000	+	—										
第6日	1970	+	±	—									
第7日	1960	++	++	++	+	+	±	—					
第9日	1970	++	++	++	++	+	+	+	—				
第11日	1990	++	++	++	++	++	+	+	+	±	—		
第12日	2030	++	++	++	++	++	++	+	+	±	—		
第14日	2070	++	++	++	++	+	+	+	±	—			
第16日	2050	++	++	++	++	+	+	±	—				

現スル沈降素ノ消長ヲ精査セリ次ニ其ノ成績ヲ表示スレバ第20第21表ノ如シ。

第 20 表 家兎第94號

檢 查 日 數	試 驗 管 號	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	山羊血清 稀釋倍數 體重(克)	5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2080	-											
第1日	2050	-											
第2日	2030	-											
第3日	2040	-											
第4日	2050	±											
第5日	2040	±	-										
第6日	2020	±	±	-									
第7日	2030	+	+	+	+	-							
第9日	2020	++	++	++	++	++	+	+	+	-			
第11日	2050	++	++	++	++	++	+	+	+	+	±	-	
第12日	2050	++	++	++	++	++	+	+	+	±	-		
第14日	2070	++	++	++	++	++	+	+	+	-			
第16日	2100	++	++	++	++	+	+	±	-				

第 21 表 家兎第72號

檢 查 日 數	試 驗 管 號	沈 降 反 應											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	山羊血清 稀釋倍數 體重(克)	5	10	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
山羊血清 注入日	2110	-											
第1日	2080	-											
第2日	2070	-											
第3日	2050	-											
第4日	2040	±	-										
第5日	2030	+	-										
第6日	2000	+	+	-									
第8日	2010	++	++	+	+	+	+	-					
第10日	2020	++	++	++	++	+	+	+	+	±	-		
第12日	2010	++	++	++	++	++	++	+	+	+	±	-	
第14日	2050	++	++	++	++	+	+	+	+	±	-		
第16日	2080	++	++	++	+	+	+	-					
第18日	2100	++	++	++	+	+	±	-					

第20第21表ノ2表ヲ見ルニ同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル家兎子宮腔内ニ山羊血清 0.7ccヲ注入スルトキハ(94)(72)號共ニ各第20第21表ニ示ス如ク第4日ニ血清中ニ沈降素ノ發現ヲ證明シ其ノ消長ハ2例共稍々急速ニ略々同様ナル曲線ヲナシテ上昇シ前者ニアリテハ第11日ニ後者ニアリテハ第12日ニ其ノ最高沈降價ニ達シ以後徐々ニ下降ス。(第5圖参照)

(第 5 圖)

第 4 節 小 括

第4章ニ行ヒタル實驗成績ヲ小括スレバ次ノ如シ。

1. 膀胱ノ場合ニ於テハ

同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル家兎膀胱腔内ニ山羊血清ヲ注入スルトキハ2例共第4日ニ血清内ニ沈降素ヲ證明シ、其ノ消長ハ略々同様ナル曲線ヲナシテ稍々急速ニ上昇シ1例ハ第11日ニ他ノ1例ハ第12日乃至第14日ノ間ニ其ノ最高沈降價ニ達シ以後徐々ニ下降ス。

2. 膽囊ノ場合ニ於テハ

同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル家兎膽囊腔内ニ山羊血清ヲ注入スルトキハ2例共第4日ニ血清内ニ沈降素ヲ證明シ、其ノ消長ハ膀胱ノ場合ニ於ケルト略々同様ナル曲線ヲ示シ夫々第

11日第12日ニ其ノ最高沈降價ニ達シ以後徐々ニ下降ス。

3. 子宮ノ場合ニ於テハ

同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル家兎子宮腔内ニ山羊血清ヲ注入スルトキハ2例共第4日ニ血清内ニ沈降素ヲ證明シ、其ノ消長ハ膀胱膽囊ノ場合ニ於ケルト略々同様ナル曲線ヲ示シ夫々第11日第12日ニ其ノ最高沈降價ニ達シ以後徐々ニ下降ス。

4. 即チ同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル膀胱膽囊及ビ子宮腔内ニ山羊血清ヲ注入スルトキハ其ノ血清内ニ於ケル沈降素ノ發現及ビ消長ハ3臓器共同様ナル状態ヲ示シ、各臓器ニヨル特有性ヲ失ヒ又其ノ發現並ニ最高沈降價ニ達スル時期ハ粘膜ヲ損傷セザルモノヨリモ早シ。

第5章 實驗成績ノ總括並ニ考案

1. 第2章第4節ニ記載セル如ク家兎膀胱、膽囊並ニ子宮腔内ニ山羊血清ヲ注入セル場合ニハ血清内ニ於ケル沈降素ノ產生及ビ消長ニハ夫々特有ナル状態ヲ呈ス。而シテ其ノ沈降素出現ノ順序ハ膀胱、膽囊、子宮ノ順ナリ。サレド其ノ最高沈降價ヲ示ス時期ハ何レノ場合ニ於テモ略々同様ニシテ第2週ノ終リ即チ第12乃至第16日ナリ、而シテ下降ハ何レモ第3週目頃ヨリ始マル。今は等試獸ノ沈降素ノ出現及ビ消長ガ3臓器ニヨリテ夫々特有ナル状態ヲ示セル事實ハ、此等腔内ヨリノ抗原吸收機轉ヲ考察スル材料トシテ甚ダ興味アリト謂ヒ得ベシ。即チ此種特異性ハ抗原ガ全く健態ナル粘膜ヲ通ジテ吸收セラルルモ各臓器粘膜ノ抗原透過性ノ差ニヨリテ招來セラルルヤ、或ハ又抗原吸收ガ主トシテ粘膜損傷部ヨリ行ハレ其ノ損傷ノ程度及ビ損傷招來ノ遲速ニ由來シテ惹起セラルルヤノ問題ナリ。

2. 然ルニ抗原ヲ注入セル場合ニ於ケル3臓器ノ解剖學的並ニ組織學的所見ヲ觀ルニ第3章第4節ニ記載セル如ク、山羊血清ヲ注入セラレタル家兎膀胱、膽囊並ニ子宮ニ於テハ共ニ第1日ニ於テ既ニ腔内出血、粘膜上皮細胞ノ變性脱落ヲ招來シ又粘膜下層ノ浮腫並ニ出血、筋層ノ浮腫、變性及ビ出血、漿膜下層ノ浮腫及ビ出血ヲ認メ且ツ血管ハ一般ニ其ノ管腔擴大充盈シ、炎性ノ細胞浸潤ハ中性多核白血球ノ瀰漫性ノ浸潤ヲ來ス、而シテ此等ノ變化ハ何レノ場合ニ於テモ齊シク第1週ノ終リヨリ徐々ニ回復シ始メ次第ニ全般的ニ健態ニ復ス、其ノ時期ハ第18日乃至第19日ナリ又炎性ノ細胞浸潤モ逐次其ノ構成分ヲ變ジテ多核白血球ヨリ小圓形及ビ造結締組織細胞ニ代リ來ル、茲ニ注目スベキ變化トシテ抗原ヲ注入第1日ニ於テ例外ナク見ラルル上皮損傷是ナリ。即チ抗原吸收機轉ナルモノガ粘膜損傷部ヨリ行ハルルト言フ事ハ見逃ス可カラザル機轉ナリト信ズ。

果シテ抗原吸收ガ主トシテ粘膜損傷部位ヨリ行ハルルトスレバ余ガ前段ニ説述セル如ク其ノ粘膜損傷ノ程度ハ實ニ沈降素ノ產生ト消長ニ相當ノ影響ヲ招來スルモノナル可シ。

3. 余ガ第4章ニ於テ記載セル實驗ハ當ニコノ間ノ消息ヲ窺ヒ知ル好個ノ材料タル可シ, 即チ人工的ニ同一程度ニ粘膜ヲ損傷シタル場合ニ於ケル血清内沈降素ノ產生及ビ消長ハ全ク同様ナル状態ヲ示シ, 各臓器ニ因ル特異性ヲ失ヒ, 且ツ又粘膜ヲ損傷セザル場合ニ比シ沈降素發現ノ時期モ一般ニ早く且ツ最高沈降價ニ達スル時期モ亦早シ.

4. 以上ノ事實ヨリシテ思考スルニ臓器腔内ヨリノ抗元吸收機轉ハ粘膜ノ損傷ガ極メテ重大ナル役割ヲ演ズベク且ツコレ等損傷ハ各臓器ノ性状ニヨリ夫々相當ノ差異アルベク, 因ツテ抗體產生並ニ消長ニ於テモ各臓器特有ノ状態ヲ示スモノナル可ク, 組織學的ニ完全ナル健全組織ヨリノ吸收ハ不可能事タルヲ思ハシム.

結 論

1. 家兎膀胱, 膽囊, 並ニ子宮腔内ニ山羊血清ヲ注入スルトキハ何レノ場合ニ於テモ試獸血清中ニ沈降素ヲ證明ス, 出現ノ順序ハ膀胱ヨリセルモノ最モ早く, 膽囊之ニ次ギ, 子宮腔内ヨリスルモノ第3位ニアリ, 而シテ夫等ガ消長ハ各特有ナリ, 最高沈降價ヲ示ス時期ハ何レモ第12乃至第16日ニシテ, ソレヨリ何レモ下降シ始ム.

2. 家兎膀胱, 膽囊, 並ニ子宮腔内ニ山羊血清注入セシ是等臓器ノ解剖學的並ニ組織學的所見ハ何レモ第1日ニ於テ腔内出血, 粘膜上皮細胞ノ變性脱落, 粘膜下層ノ浮腫並ニ出血, 筋層ノ浮腫及ビ出血, 漿膜下層ノ浮腫及ビ出血ヲ認メ, 且ツ血管ハ一般ニ其ノ管腔擴大充盈ス. 炎性ノ細胞浸潤ハ主トシテ中性多核白血球ナリ, 此等ノ變化ハ何レモ第1週末ヨリ徐々ニ回復シ第18乃至第19日ニハ殆ンド健康ニ復ス, 此ノ場合ノ細胞浸潤ハ小圓形及ビ造結締組織細胞ナリ.

3. 人工的ニ同一程度ノ粘膜損傷ヲ與ヘタル之等3種臓器腔内ニ山羊血清ヲ注入スル場合ニ於ケル沈降素ノ發現及ビ消長ハ3臓器略々同様ニシテ決シテ特性ヲ認メズ. 而シテ其ノ出現並ニ最高沈降價ヲ示ス時期ハ一般ニ粘膜ヲ損傷セザルモノニ於ケルヨリモ早シ.

4. 此等臓器腔内ヨリノ山羊血清吸收機轉ハ健康ナル粘膜ヨリ行ハルルニ非ズシテ血清ニ因リテ惹起セラレタル上皮細胞缺損部ヨリセラルルモノナリト思推ス.

擱筆ニ臨ミ御校閲ヲ辱セル神奈川縣第2衛生試驗所長渡邊博士並ニ御校閲御指導ヲ煩セシ研究科醫長秋山靜一博士ニ衷心ヨリノ謝意ヲ示ス, 尙本研究ニ當リ特別ノ御高庇ヲ賜リタル前田院長, 井岡副院長ニモ茲ニ御芳名ヲ録シテ感謝ノ意ヲ表ス.

文 献

- 1) 近藤養平 諸種刺激ニ因ル子宮變化ノ組織學的研究並ニ子宮吸收作用ノ血清學的觀察. 大

正婦人科學會會報，第11號，大正11年。 2) 街風俊雄 女性生殖管壁ニ於ケル免疫原及其他ノ吸收ニ就テ，日本婦人科學會雜誌，第18卷，大正12年。 3) 竹村直治 日本微生物學會雜誌，第20卷，大正15年。 4) 赤枝守一 膀胱ニヨル抗原ノ吸收並ニ局所反應ニ就テ岡山醫學會雜誌，第46年，第11號，昭和9年。 11月30日。 第48年，第9號，昭和11年9月。

組織寫眞説明

- 第1圖** 膀胱第1日ノ組織學の所見。粘膜上皮細胞ハ極メテ扁平化シ其ノ多クハ境界不明瞭トナリ所ニヨリテハ之ヲ缺ク。
腔内容中ニハ脱落セル上皮細胞及ビ赤血球ヲ含メリ。
- 第2圖** 膀胱第2日ノ組織學の所見。粘膜上皮細胞ノ缺損並ニ各層ニ於ケル出血ヲ認ム。
- 第3圖** 膀胱第3日ノ組織學の所見。第2日ヨリ一層其ノ變化ノ度強シ。
- 第4圖** 膀胱第7日ノ組織學の所見。一般ニ出血少ク浮腫ノ狀態稍々輕度トナリ細胞浸潤ハ主トシテ小圓形細胞及ビ造結締織細胞ヨリ成ル。
- 第5圖** 膀胱第12日ノ組織學の所見。炎症ノ細胞浸潤ハ第7日ト同様ナルモ浮腫愈々輕度トナル。
- 第6圖** 膽囊第1日ノ組織學の所見。粘膜上皮細胞ノ核染色性低下及ビ脱落セル部分ヲ示ス。
- 第7圖** 膽囊第2日ノ組織學の所見。粘膜ハ著シク皺襞ニ乏シクナリ内容中ニハ赤血球多量ニ存在セリ。
- 第8圖** 膽囊第3日ノ組織學の所見。粘膜ノ著シキ變性ヲ示ス。
- 第9圖** 膽囊第5日ノ組織學の所見。各層ニハ尙稍々顯著ナル出血竈ヲ認ム。
- 第10圖** 膽囊第12日ノ組織學の所見。炎症ノ細胞浸潤ハ主トシテ造結締織細胞及ビ小圓形細胞ヨリナルヲ示ス。
- 第11圖** 子宮第1日ノ組織學の所見。粘膜上皮細胞ノ脱落，細胞浸潤及ビ出血ヲ認ム。
- 第12圖** 子宮第2日ノ組織學の所見。粘膜上皮細胞ノ脱落及ビ内容中ノ赤白血球ヲ示ス。
- 第13圖** 子宮第3日ノ組織學の所見。粘膜上皮細胞ノ脱落顯著ナルヲ示ス。
- 第14圖** 子宮第7日ノ組織學の所見。出血竈減少シ内容モ次第ニ少量トナリ吸收ノ起リツツアルヲ示ス。
- 第15圖** 子宮第12日ノ組織學の所見。粘膜深層部殊ニ筋層トノ境界ニ於ケル炎症ノ細胞浸潤ヲ示ス。

以上各圖共(イ)ハ粘膜上皮細胞ノ缺損セル部分ヲ示シ。(ロ)ハ腔内容。(ハ)ハ細胞浸潤。(ニ)ハ出血竈ヲ示ス。

山 本 論 文 附 圖

第 1 圖

第 2 圖

第 3 圖

第 4 圖

第 5 圖

山 本 論 文 附 圖

第 6 圖

第 7 圖

第 8 圖

第 9 圖

第 10 圖

山 本 論 文 附 圖

第 11 圖

第 12 圖

第 13 圖

第 14 圖

第 15 圖