日本微生物學雜誌 (第卅一卷) (第九號) (昭和十二年六月一日發行)

(原 著)

全乳並ニ乳汁蛋白質ふらくちおーん間ノ相互關係ニ關スル血清學的研究

第2編 全乳ノ乳汁蛋白質各ふらくちおーんニ對スル血清學的關係

其ノ2 補體結合反應ニ依ル實驗

京都帝國大學醫學部微生物學教室 (主任 木村教授)

大學院學生 醫學士 宮 川 敬 一

Keiichi Miyakawa

(昭和11年5月26日受付)

【内 容 抄 録】

主トシテ補體結合反應ニ依リテ、全乳ノ乳汁蛋白質ふらくちおーんニ對スル血清學的關係ヲ檢索シ、以テ凝ニ行ヒタル沈降反應ニ依ル實驗成績ト比較對照シテ其ノ間ノ異同ニ就テ論ジタリ。

目 次

緒 言	反 應
第1章 實驗材料並ニ方法	第4項 抗乳汁血清ノ煮沸乳清ニ對スル反應
甲 實驗材料	第5項 抗乳汁血清ノ煮沸かぜいんニ對スル反應
A 抗 原	第6項 抗乳汁血清ノ該煮沸全乳及ビ煮沸乳汁蛋白質各ふらくちおーんニ對スル反應
B 免疫血清	第2節 煮沸全乳ノ生、煮乳汁蛋白質ふらくちおーんニ對スル血清學的關係
乙 實驗方法	第1項 抗煮沸乳汁血清ノ煮沸乳清ニ對スル反應
第2章 實驗成績	第2項 抗煮沸乳汁血清ノ煮沸かぜいんニ對スル反應
第1節 生全乳ノ生、煮沸汁蛋白質ふらくちおーんニ對スル血清學的關係	
第1項 抗乳汁血清ノ乳清ニ對スル反應	
第2項 抗乳汁血清ノかぜいんニ對スル反應	
第3項 抗乳汁血清ノ該全乳及ビ乳汁蛋白質各ふらくちおーんニ對スル	

第3項 抗煮沸乳汁血清ノ該煮沸全乳及
ビ煮沸乳汁各蛋白質ふらくちお
ーんニ對スル反應

第4項 抗煮沸乳汁血清ノ生乳清ニ對ス
ル反應

第5項 抗煮沸乳汁血清ノ生かぜいんニ
對スル反應

第6項 抗煮沸乳汁血清ノ該生全乳及ビ
生乳汁蛋白質各ふらくちおーん
ニ對スル反應

第3章 總括並ニ考按

結 論

主要文獻

緒 言

補體結合反應ニ依リテ、全乳ノ乳汁蛋白質各ふらくちおーんニ對スル血清學的關係ヲ檢索
セン先人ノ業績ハ極メテ寥々タルモノニシテ、而モ斷片的ナル記載ヲ見ルニ過ギズ。

1910年 *Kollmeyer*⁽¹⁵⁾ ハ抗牛乳血清ハ特ニ牛かぜいんニ對シ強度ナル反應ヲ呈シ、牛乳あ
るふみん物質ニ對シテハ弱度ノ結合ヲナス。而シテ抗山羊乳血清ハ山羊かぜいんニ對シ最モ
強度ニ反應シ、牛かぜいんニ對シテハ弱度ヲ反應ヲ呈スレドモ、人かぜいん及ビ牛乳ある
ふみんニ對シテハ反應ヲ呈セザルヲ報ジタリ。 *Versell*⁽¹³⁾ ハ抗牛乳及ビ抗人乳血清ハ該全乳
ニ最モ強度ニ反應シ、該乳清之ニ次ギ、該かぜいん最モ低度ナル反應ヲ呈スルヲ實驗センモ
何等考察ヲ加フル處無カリキ。

余ハ補體結合反應ニ依リテ、全乳ノ乳汁蛋白質各ふらくちおーんニ對スル血清學的關係ヲ
檢シ、以テ曩ニ行ヘル沈降反應ニ依ル實驗成績ト比較對照シテ其ノ間ノ異同ニ就テ論ゼント
欲ス。

第1章 實驗材料並ニ方法

甲 實 驗 材 料

A. 抗 原

生、煮乳汁抗原及ビ乳汁蛋白質ふらくちおーん抗原等ハ總テ既ニ沈降反應ニ於テ使用セル
ト同一物ナリ。

B. 免 疫 血 清

沈降反應ニ依ル實驗ニ使用セント同一免疫血清ヲ56°C、30分間加溫シテ非働性トナセルモ
ノナリ。

乙 實 驗 方 法

補體結合反應ニ依ル。其ノ術式ニ關シテハ、第1編、其ノ2ニ於テ詳述シタルヲ以テ省略
ス可シ。

成績ハ溶血ノ程度ニ從ヒ、下記ノ符號ヲ以テ表示ス。

K. 完全溶血 fk. 殆ド完全溶血 st. 強度溶血
 m. 中等度溶血 w. 弱度溶血 sp. 痕跡溶血
 spch. 殆ド完全溶血阻止 O. 完全溶血阻止

第 2 章 實 驗 成 績

第 1 節 生全乳ノ生、煮乳汁蛋白質ふらくちおーんニ對スル血清學的關係

第 1 項 抗乳汁血清ノ乳清ニ對スル反應

第 1 表 抗牛乳血清ノ各種乳清ニ對スル補體結合反應

家 番	免 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400	800
81		人 乳 清	m	fk	K	K	K	K
		牛 乳 清	O	O	sp	m	fk	K
		山 羊 乳 清	sp	m	K	K	K	K
82		人 乳 清	fk	fk	K	K	K	K
		牛 乳 清	O	O	fk	K	K	K
		山 羊 乳 清	sp	fk	K	K	K	K
84		人 乳 清	K	K	K	K	K	K
		牛 乳 清	O	O	fk	K	K	K
		山 羊 乳 清	fk	K	K	K	K	K

第 1 表. 抗牛乳血清ハ牛乳清ニ對シテ低度ヲラ明カニ反應ヲ呈スルノミナラズ、山羊乳清ニ對シテモ、更ニ弱度ヲラ反應ヲ認ム。人乳清ニ對シテハ微弱ナル反應ヲ呈スルカ或ハ反應セズ。

第 2 表 抗山羊乳血清ノ各種乳清ニ對スル補體結合反應

家 番	免 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400	800
7		人 乳 清	m	fk	K	K	K	K
		牛 乳 清	m	st	K	K	K	K
		山 羊 乳 清	O	O	w	fk	K	K
9		人 乳 清	fk	fk	K	K	K	K
		牛 乳 清	st	fk	K	K	K	K
		山 羊 乳 清	O	O	st	fk	K	K
10		人 乳 清	fk	K	K	K	K	K
		牛 乳 清	fk	K	K	K	K	K
		山 羊 乳 清	O	O	K	K	K	K

第2表. 抗山羊乳血清ハ山羊乳清ニ對シ低度ヲ明カナル反應ヲ呈スルノミナラズ, 牛乳清ニ對シテモ, 更ニ弱度ヲ反應ヲ認ム.

人乳清ニ對シテハ極メテ微弱ナル反應ヲ呈スルカ或ハ反應セズ.

第3表. 抗人乳血清ノ各種乳清ニ對スル補體結合反應

家番	兎號	稀釋倍數 抗原	25	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
			25	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
13	人乳清	抗原	O	O	O	O	O	spch	sp	m	m	fk
	牛乳清	抗原	fk	fk	K	K	K	K	K	K	K	K
	山羊乳清	抗原	fk	K	K	K	K	K	K	K	K	K
14	人乳清	抗原	O	O	O	O	O	sp	sp	st	K	K
	牛乳清	抗原	fk	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	山羊乳清	抗原	fk	K	K	K	K	K	K	K	K	K
17	人乳清	抗原	O	O	O	O	O	O	O	sp	m	K
	牛乳清	抗原	fk	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	山羊乳清	抗原	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

第3表. 抗人乳血清ハ人乳清ニ對シ比較的高度ナル反應ヲ呈スレドモ, 牛乳清及ビ山羊乳清ニ對シテハ極メテ微弱ナル反應ヲ呈スルカ, 或ハ反應セズ.

以上ノ成績ヲ通覽スルニ一般ニ全乳ハ該乳清ニ對シテ低度ヲ最モ明カナル反應ヲ呈シ, 近緣動物乳清ニ對シテハ更ニ弱度ナル反應ヲ見ル. 疎緣動物乳清ニ對シテハ極メテ微弱ナル反應ヲ呈スルカ, 或ハ反應セズ.

第2項 抗乳汁血清ノカゼインニ對スル反應

第4表. 抗牛乳血清ノ各種カゼインニ對スル補體結合反應

家番	兎號	稀釋倍數 抗原	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
			50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
81	人カゼイン	抗原	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	牛カゼイン	抗原	O	O	O	O	O	O	sp	m	fk
	山羊カゼイン	抗原	m	m	st	fk	K	K	K	K	K
82	人カゼイン	抗原	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	牛カゼイン	抗原	O	O	O	O	O	O	m	m	K
	山羊カゼイン	抗原	O	O	sp	w	m	m	fk	K	K
84	人カゼイン	抗原	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	牛カゼイン	抗原	O	O	O	O	O	O	fk	fk	K
	山羊カゼイン	抗原	sp	m	m	m	st	K	K	K	K

第4表. 抗牛乳血清ハ牛カゼインニ對シテ最モ高度ニ反應シ, 山羊カゼインニ對シテハ弱

度々明カニ反應ス。人かぜいんニ對シテハ全然反應セズ。

第 5 表 抗山羊乳血清ノ各種かぜいんニ對ズル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600
			50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600
7		人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		牛かぜいん	sp	m	m	st	K	K	K	K	K	K
		山羊かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	sp	m	fk
9		人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		牛かぜいん	O	w	m	m	K	K	K	K	K	K
		山羊かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	sp	K	K
10		人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		牛かぜいん	st	fk	K	K	K	K	K	K	K	K
		山羊かぜいん	O	O	O	O	O	O	m	K	K	K

第5表. 抗山羊乳血清ハ山羊かぜいんニ對シテ最モ高度ニ反應陽性ニシテ, 牛かぜいんニ對シテハ弱度々明瞭ニ反應ヲ呈ス。人かぜいんニ對シテハ反應ヲ認メズ。

第 6 表 抗人乳血清ノ各種かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600
			50	100	200	400	800	1600
13		人かぜいん	O	O	sp	fk	K	K
		牛かぜいん	K	K	K	K	K	K
		山羊かぜいん	K	K	K	K	K	K
14		人かぜいん	O	O	w	fk	K	K
		牛かぜいん	K	K	K	K	K	K
		山羊かぜいん	K	K	K	K	K	K
17		人かぜいん	O	O	O	m	K	K
		牛かぜいん	K	K	K	K	K	K
		山羊かぜいん	K	K	K	K	K	K

第6表. 抗人乳血清ハ人かぜいんニ對シ低度々明カナル反應ヲ呈ス。牛かぜいん及ビ山羊かぜいんニ對シテハ反應ヲ認メズ。

以上ノ成績ヲ要約スレバ, 一般ニ全乳ハ該かぜいんニ對シ最モ高度ニ反應シ近緣動物かぜいんニ對シテハ弱度々々反應スレドモ, 疎緣動物かぜいんニ對シテハ反應セズ。

第 3 項 抗乳汁血清ノ該全乳及ビ乳汁蛋白質 各ふらくちおーんニ對スル反應

抗乳汁血清ノ該乳汁蛋白質各ふらくちおーんニ對スル補體結合性抗體價ノ優劣ヲ知ラント

セリ。

第 7 表 抗牛乳血清ノ全乳、乳清及ビかぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	1600	3200	6400	12800	25600	25600
			50	100	200	400	1600	3200	6400	12800	25600	25600
81		全 乳	O	O	O	O	O	O	O	sp	w	m
		乳 清	O	sp	m	fk	K	K	K	K	K	K
		かぜいん	O	O	O	O	O	O	sp	m	fk	K

第 8 表 抗山羊乳血清ノ全乳乳清及ビかぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600
			50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600
7		全 乳	O	O	O	O	O	O	O	spch	sp	m
		乳 清	O	w	fk	K	K	K	K	K	K	K
		かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	sp	m	fk

第7表第8表. 抗牛乳及ビ抗山羊血清ハ各該かぜいんニ對シ該全乳ト略々同程度ノ反應ヲ呈スレドモ該乳清ニ對シテハ低度ナル反應ヲ見ル。

第 9 表 抗人乳血清ノ全乳乳清及ビかぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600
			50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600
17		全 乳	O	O	O	O	O	O	O	w	m	fk
		乳 清	O	O	O	O	O	O	sp	m	st	K
		かぜいん	O	O	O	m	K	K	K	K	K	K

第9表. 抗人乳血清ハ乳清ニ對シテ全乳ト略々同程度ノ反應ヲ呈スレドモ、かぜいんニ對シテハ低度ナル反應ヲ見ル。

以上ノ成績ヲ要約スルニ、抗牛乳及ビ抗山羊乳血清ニ於テハ、かぜいんニ對スル抗體價ハ極メテ高價ニシテ全乳ニ對スルト略々同價ナレドモ、乳清ニ對スル抗體價ハ極メテ低價ナリ。之ニ反シ抗人乳血清ニ於テハ、乳清ニ對スル抗體價ハ極メテ高價ニシテ全乳ニ對スルト略々同價ナルニモ拘ラズ、かぜいんニ對スル抗體價ハ低シ。

第 4 項 抗乳汁血清ノ煮沸乳清ニ對スル反應

各種乳清ヲ生理的食鹽水ヲ以テ25倍ニ稀釋シ、之ヲ試験管ニ取り、綿栓ヲ施シソノ上ヲばらふいん紙ヲ以テ被包シ、重湯煎上ニ於テ100°C、30分間加熱ス

第 10 表 抗牛乳血清ノ各種煮沸乳清ニ對スル補體結合反應

家 番	兔 號	稀釋倍數		25	50	100	200
		抗 原					
82		煮沸人乳清		K	K	K	K
		煮沸牛乳清		st	K	K	K
		煮沸山羊乳清		K	K	K	K
84		煮沸人乳清		K	K	K	K
		煮沸牛乳清		m	fk	K	K
		煮沸山羊乳清		fk	K	K	K
85		煮沸人乳清		K	K	K	K
		煮沸牛乳清		K	K	K	K
		煮沸山羊乳清		K	K	K	K

第10表. 抗牛乳血清ハ煮沸牛乳清ニ對シ極メテ微弱ナル反應ヲ呈スルカ或ハ全然反應セズ.
煮沸山羊及ビ煮沸人乳清ニ對シテハ殆ド反應セズ.

第 11 表 抗山羊乳血清ノ各種煮沸乳清ニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數		25	50	100	200
		抗 原					
7		煮沸人乳清		K	K	K	K
		煮沸牛乳清		fk	K	K	K
		煮沸山羊乳清		m	m	fk	K
9		煮沸人乳清		K	K	K	K
		煮沸牛乳清		K	K	K	K
		煮沸山羊乳清		m	fk	K	K
10		煮沸人乳清		K	K	K	K
		煮沸牛乳清		K	K	K	K
		煮沸山羊乳清		K	K	K	K

第11表. 抗山羊乳血清ハ煮沸山羊乳清ニ對シ極メテ微弱ナル反應ヲ呈スルカ或ハ全ク反應
ヲ認メズ. 煮沸牛乳清及ビ煮沸人乳清ニ對シテハ殆ド反應セズ.

第 12 表 抗人乳血清ノ各種煮沸乳清ニ對スル補體結合反應

家番	兔號	稀釋倍數		25	50	100	200	400
		抗 原						
13		煮沸人乳清		m	m	fk	K	K
		煮沸牛乳清		K	K	K	K	K
		煮沸山羊乳清		K	K	K	K	K
14		煮沸人乳清		w	m	m	fk	K
		煮沸牛乳清		K	K	K	K	K
		煮沸山羊乳清		K	K	K	K	K

家 番	現 號	稀釋倍數	25	50	100	200	400
		抗 原					
17		煮沸人乳清	fk	fk	fk	K	K
		煮沸牛乳清	K	K	K	K	K
		煮沸山羊乳清	K	K	K	K	K

第12表. 抗人乳血清ハ煮沸人乳清ニ對シ弱度ナラ明カナル反應ヲ呈スルモ, 煮沸牛乳清及ビ山羊乳清ニ對シテハ反應セズ.

本項ノ成績ヲ小括スレバ、一般ニ全乳ハ該煮沸乳清ニ對シ微弱ナル反應ヲ呈スルカ、或ハ反應セズ。異種動物ノ煮沸乳清ニ對シテハ殆ト反應ヲ認メズ。

第 5 項 抗乳汁血清ノ煮沸かせいんニ對スル反應

各種かぜいんノ25倍稀釋液ヲ試験管ニ取り嚴重ニ綿栓シテ、100°C30分間加熱ス。

第 13 表 抗牛乳血清ノ各種煮沸かぜいんニ對スル補體結合反應

家番	兎號	稀釋倍數	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
		抗 原									
81	煮沸人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	煮沸牛かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	st	fk	K
	煮沸山羊かぜいん	st	st	fk	fk	K	K	K	K	K	K
82	煮沸人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	煮沸牛かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	st	K	K
	煮沸山羊かぜいん	w	m	m	fk	K	K	K	K	K	K
84	煮沸人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	fk	K
	煮沸牛かぜいん	sp	spch	O	O	O	spch	fk	K	K	K
	煮沸山羊かぜいん	sp	m	m	st	st	K	K	K	K	K

第13表. 抗牛乳血清ハ煮沸牛カゼインニ對シ高度ニ反應ヲ呈スルノミナラズ, 煮沸山羊カゼインニ對シテモ, 弱度ニ反應ヲ呈ス, 煮沸人カゼインニハ反應セズ.

第 14 表 抗山羊乳血清ノ各種煮沸カゼインニ對スル補體結合反應

[illegible]

家番	死 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
19		煮沸人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		煮沸牛かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		煮沸山羊かぜいん	O	O	O	O	O	O	m	K	K

第14表. 抗山羊乳血清ハ煮沸山羊カゼインニ對シ高度ニ反應ヲ呈スルノミナラズ, 煮沸牛カゼインニ對シテモ弱度ニ反應ヲ呈ス. 煮沸人カゼインニ對シテハ反應セズ.

第 15 表 抗人乳血清ノ各種煮沸カゼインニ對スル補體結合反應

案 番	更 號	稀釋倍數	50	100	200	400	800
		抗 原					
13		煮沸人かぜいん	O	O	m	st	K
		煮沸牛かぜいん	K	K	K	K	K
		煮沸山羊かぜいん	K	K	K	K	K
14		煮沸人かぜいん	O	w	m	fk	K
		煮沸牛かぜいん	K	K	K	K	K
		煮沸山羊かぜいん	K	K	K	K	K
17		煮沸人かぜいん	O	O	w	m	K
		煮沸牛かぜいん	K	K	K	K	K
		煮沸山羊かぜいん	K	K	K	K	K

第15表. 抗人乳血清の煮沸人かぜいん=對シ低度乍ら明カナル反應ヲ呈スレドモ, 煮沸牛及ヒ山羊かぜいん=對シテハ全然反應セズ.

以上ノ成績ヲ要約スレバ、全乳ハ該煮沸カゼインニ最モ高度ナル反應ヲ呈シ、近縁動物煮沸カゼインニ對シテハ弱度ニラ反應ス。疎縁動物煮沸カゼインニ對シテハ反應セズ。

第 6 項 抗乳汁血清ノ該煮沸全乳及ビ煮沸乳汁蛋白質各ふらく
ちおーんニ對スル反應

抗乳汁血清ノ煮沸全乳ニ對スル反應ハ、煮沸乳汁蛋白質ノ如何ナルふらくちおーんニ對スル反應ニ依リテ表現セラルルモノナリヤヲ窺知セントセリ。

第 16 表 抗牛乳血清ノ煮沸全乳煮沸乳清及ビ煮沸
かぜいんニ對スル補體結合反應

家番	兎號	稀釋倍數	25	50	100	200	400	800	1500	3200	6400	12800
		抗原										
81		煮沸全乳	O	O	O	O	O	O	O	spch	sp	st
		煮沸乳清	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		煮沸かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	sp	fk	K

(1094)

全乳並ニ乳汁蛋白質ふらくちおーん間ノ相互關係ニ關スル血清學的研究

第 17 表 抗山羊乳血清ノ煮沸全乳煮沸乳清及ビ煮

沸かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	20560
			25	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	20560
9		煮沸全乳	O	O	O	O	O	O	O	O	spch	m	s
		煮沸乳清	fk	fk	K	K	K	K	K	K	K	K	fk
		煮沸かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	O	sp	st	K

第 18 表 抗人乳血清ノ煮沸全乳煮沸乳清及ビ煮沸

かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400	800
			25	50	100	200	400	800
13		煮沸全乳	O	O	O	sp	m	K
		煮沸乳清	m	m	fk	K	K	K
		煮沸かぜいん	O	O	O	m	K	K

以上ノ成績ヲ括シテ、一般ニ抗乳汁血清ノ煮沸全乳ニ對スル反應ハ煮沸乳汁蛋白質ふらくちおーんノナル煮沸かぜいんニ對スル反應ニ依リテ略々代表セラルルモノニシテ、煮沸乳清ニ對スル反應ハ殆ド關與セザルモノナルヲ知ル。

第 2 節 煮沸全乳ノ生煮乳汁蛋白質ふらくちおーんニ對スル血清學的關係

煮沸全乳ノ生及ビ煮沸乳汁蛋白質ふらくちおーんニ對スル血清學的關係ニ關スル業績ハ殆ド無キガ如シ。然レドモ、乳兒ノ人工榮養ニ際ツテ、使用セラルル乳汁ノ多クハ煮沸殺菌セル乳汁ナルヲ以テ、煮沸乳汁ノ斯ル方面ノ研究ハ乳兒榮養學上緊要ナル問題ナリト稱スルヲ得ベシ。

煮沸乳清及ビ煮沸かぜいんノ調製法ニ關シテハ既述セリ。

第 1 項 抗煮沸乳汁血清ノ煮沸乳血ニ對スル反應

第 19 表 抗煮沸牛乳血清ノ各種煮沸乳清ニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400	800
			25	50	100	200	400	800
90		煮沸人乳清	K	K	K	K	K	K
		煮沸牛乳清	O	sp	m	fk	K	K
		煮沸山羊乳清	st	st	K	K	K	K

家 番	更 號	稀釋倍數		25	50	100	200	400	800
		抗	原						
91		煮	沸	人	乳	清		K	K
		煮	沸	牛	乳	清		sp	K
		煮	沸	山	羊	乳	清	fk	K
93		煮	沸	人	乳	清		K	K
		煮	沸	牛	乳	清		0	sp
		煮	沸	山	羊	乳	清	K	K

第19表. 抗煮沸牛乳血清ハ煮沸牛乳清ニ對シ低度ナガラ明カニ反應ヲ呈スルノミナラズ、
煮沸山羊乳清ニ對シテモ、更ニ微弱ナレドモ反應ヲ認メ得ル事多シ。煮沸人乳清ニ對シテハ
反應セズ。

第 20 表 抗煮沸山羊乳血清ノ各種煮沸乳清ニ對スル補體結合反應

家 番	兔 號	稀釋倍數			25	50	100	200	400	800
		抗 原								
105		煮 沸 人 乳 清	K	K	K	K	K	K	K	
		煮 沸 牛 乳 清	K	K	K	K	K	K		
		煮 沸 山 羊 乳 清	O	sp	K	K	K	K		
106		煮 沸 人 乳 清	K	K	K	K	K	K		
		煮 沸 牛 乳 清	fk	fk	K	K	K	K		
		煮 沸 山 羊 乳 清	sp	sp	fk	K	K	K		
107		煮 沸 人 乳 清	K	K	K	K	K	K		
		煮 沸 牛 乳 清	fk	fk	K	K	K	K		
		煮 沸 山 羊 乳 清	O	spch	m	st	K	K		

第20表、抗煮沸山羊乳血清ハ煮沸山羊乳清ニ對シ低度ヲ明カニ反應ス、煮沸牛乳清ニ對シテ微弱ナル反應ヲ呈スルカ或ハ反應セズ、煮沸人乳清ニ對シテハ反應セズ。

第 21 表 抗煮沸人乳血清ノ各種煮沸乳清ニ對スル補體結合反應

[illegible]

第21表. 抗煮沸人乳血清ハ煮沸人乳清ニ對シ高度ナル反應ヲ呈スレドモ、煮沸牛乳清及ビ煮沸山羊乳清ニ對シテハ反應ヲ認メズ。

以上ノ成績ヲ通覽スルニ、一般ニ煮沸全乳ハ該煮沸乳清ニ對シテ低度ニラ最モ明カナル反應ヲ呈シ、近縁動物煮沸乳清ニ對シテハ極メテ微弱ナル反應ヲ呈スルカ反應セズ。疎縁動物煮沸乳清ニ對シテハ反應セズ。

第 2 項 抗煮沸乳汁血清ノ煮沸かぜいんニ對スル反應

かぜいん抗原ノ耐熱性ニ關シテハ *Bauer*,⁽¹¹⁾ *Kudicke* 及ビ *Sachs*,⁽¹²⁾ *Versell*⁽¹³⁾ 等ノ業績アレドモ、抗煮沸乳汁血清ノ異種屬煮沸かぜいんニ對スル反應ヲ試ミタル文献ヲ知ラズ。

第 22 表 抗煮沸牛乳血清ノ各種煮沸かぜいんニ對スル反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600
90	煮沸人かぜいん		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	煮沸牛かぜいん		O	O	O	O	O	O	O	w	m	fk
	煮沸山羊かぜいん		m	m	st	fk	K	K	K	K	K	K
91	煮沸人かぜいん		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	煮沸牛かぜいん		O	O	O	O	O	O	O	spch	m	st
	煮沸山羊かぜいん		w	m	fk	K	K	K	K	K	K	K
93	煮沸人かぜいん		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	煮沸牛かぜいん		O	O	O	O	O	O	O	m	fk	K
	煮沸山羊かぜいん		st	fk	K	K	K	K	K	K	K	K

第22表. 抗煮沸牛乳血清ハ煮沸牛かぜいんニ對シ極メテ高度ノ反應ヲ呈スレドモ、煮沸山羊かぜいんニ對シテハ弱度ノ反應ヲ見レ。煮沸人かぜいんニ對シテハ反應セズ。

第 23 表 抗煮沸山羊血清ノ各種煮沸かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600
105	煮沸人かぜいん		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	煮沸牛かぜいん		st	st	fk	K	K	K	K	K	K	K
	煮沸山羊かぜいん		O	O	O	O	O	O	O	m	m	st
106	煮沸人かぜいん		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	煮沸牛かぜいん		m	m	st	K	K	K	K	K	K	K
	煮沸山羊かぜいん		O	O	O	O	O	O	O	sp	m	K
107	煮沸人かぜいん		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	煮沸牛かぜいん		w	fk	fk	K	K	K	K	K	K	K
	煮沸山羊かぜいん		O	O	O	O	O	O	sp	sp	K	K

第23表. 抗煮沸山羊乳血清ハ煮沸山羊かぜいんニ對シ高度ノ反應ヲ呈スルモ, 煮沸牛かぜいんニ對シテハ弱度ナル反應ヲ見レ. 煮沸人かぜいんニ對シテハ反應セズ.

第 24 表. 抗煮沸人乳血清ノ各種煮沸かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	免 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600	3200
95		煮沸人かぜいん	O	O	O	spch	st	fk	K
		煮沸牛かぜいん	K	K	K	K	K	K	K
		煮沸山羊かぜいん	K	K	K	K	K	K	K
99		煮沸人かぜいん	O	sp	m	m	fk	K	K
		煮沸牛かぜいん	K	K	K	K	K	K	K
		煮沸山羊かぜいん	K	K	K	K	K	K	K
100		煮沸人かぜいん	O	O	O	spch	st	fk	K
		煮沸牛かぜいん	K	K	K	K	K	K	K
		煮沸山羊かぜいん	K	K	K	K	K	K	K

第24表. 抗煮沸人乳血清ハ煮沸人かぜいんニ對シ低度ヲ明カナル反應ヲ呈ス. 煮沸牛及ビ煮沸山羊かぜいんニ對シテハ全然反應ヲ認メズ.

以上ノ成績ヲ要約スレバ, 一般ニ煮沸全乳ハ該煮沸かぜいんニ對シ, 最モ高度ニ反應シ近緣動物煮沸かぜいんニ對シテハ弱度ヲ反應ス. 疎緣動物煮沸かぜいんニ對シテハ全然反應ヲ認メズ.

第 3 項 抗煮沸乳汁血清ノ該煮沸全乳及ビ乳汁蛋白質各 ふらくちおーんニ對スル反應

抗煮沸乳汁血清ノ該煮沸乳汁蛋白質各ふらくちおーんニ對スル補體結合性抗體價ノ優劣ヲ知ラントセリ.

第 25 表 抗煮沸牛乳血清ノ煮沸全乳煮沸乳清及ビ煮沸
かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	免 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600
90		煮沸全乳	O	O	O	O	O	O	O	O	O	spch	sp
		煮沸乳清	O	sp	m	fk	K	K	K	K	K	K	K
		煮沸かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	O	w	m	fk

第 26 表 抗煮沸山羊乳血清ノ煮沸全乳煮沸乳清及ビ煮沸
かぜいんニ對スル補體結合反應

(1098)

全乳並ニ乳汁蛋白質ふらくちおーん間ノ相互關係ニ關スル血清學的研究

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600
106		煮沸全乳	O	O	O	O	O	O	O	O	spch	sp	m
		煮沸乳清	sp	sp	fk	K	K	K	K	K	K	K	K
		煮沸かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	O	m	fk	K

第25表及ビ第26表. 抗煮沸牛乳及ビ抗煮沸山羊乳血清ハ各該煮沸かぜいんニ對シテ該煮沸全乳ニ對スルト略同程度ノ反應ヲ呈スルニ反シ, 該煮沸乳清ニ對スル反應ハ極メテ低度ナリ.

第 27 表 抗煮沸人乳血清ノ煮沸全乳煮沸乳清及ビ煮沸かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
100		煮沸全乳	O	O	O	O	O	O	O	spch	m	fk
		煮沸乳清	O	O	O	O	O	O	O	m	fk	K
		煮沸かぜいん	O	O	O	O	spch	m	K	K	K	K

第27表. 前2表ト異リ, 抗煮沸人乳血清ハ煮沸乳清ニ對シ煮沸全乳ニ對スルト略々同程度ノ反應ヲ呈スレドモ, 煮沸かぜいんニ對シテハ比較的低度ナル反應ヲ呈ス.

以上ノ成績ヲ通覽スルニ, 抗煮沸牛乳及ビ抗煮沸山羊乳血清ニ於テハ, 煮沸かぜいんニ對スル抗體價ハ極メテ高價ニシテ煮沸全乳ニ對スルト略々同價ナレドモ, 煮沸乳清ニ對スル抗體價ハ極メテ低度ナリ. 之ニ反シ抗煮沸人乳血清ニ於テハ, 煮沸乳清ニ對スル抗體價極メテ高價ニシテ煮沸全乳ニ對スルト略々同價ナルニモ拘ラズ, 煮沸かぜいんニ對スル抗體價ハ低度ナリ.

第 4 項 抗煮沸乳汁血清ノ生乳清ニ對スル反應

第 28 表 抗煮沸牛乳血清ノ各種生乳清ニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200
40		生 人 乳 清	K	K	K	K
		生 牛 乳 清	K	K	K	K
		生 山 羊 乳 清	K	K	K	K
91		生 人 乳 清	K	K	K	K
		生 牛 乳 清	m	fk	K	K
		生 山 羊 乳 清	K	K	K	K
93		生 人 乳 清	K	K	K	K
		生 牛 乳 清	m	st	fk	K
		生 山 羊 乳 清	fk	K	K	K

第28表. 抗煮沸牛乳血清ハ生牛乳清ニ對シ極メテ微弱ナル反應ヲ呈スルカ或ハ反應セズ.
生山羊乳清及ビ生人乳清ニ對シテハ殆ド反應セズ.

第 29 表 抗煮沸山羊乳血清ノ各種生乳清ニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200
105		生 人 乳 清	K	K	K	K
		生 牛 乳 清	K	K	K	K
		生 山 羊 乳 清	m	fk	fk	K
106		生 人 乳 清	K	K	K	K
		生 牛 乳 清	K	K	K	K
		生 山 羊 乳 清	K	K	K	K
107		生 人 乳 清	K	K	K	K
		生 牛 乳 清	fk	K	K	K
		生 山 羊 乳 清	m	m	fk	K

第29表. 抗煮沸山羊乳血清ハ生山羊乳清ニ對シ極メテ微弱ナル反應ヲ呈スルカ、或ハ反應セズ. 生牛乳清及ビ生人乳清ニ對シテハ殆ド反應セズ.

第 30 表 抗煮沸人乳血清ノ各種生乳清ニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400
97		生 人 乳 清	w	m	fk	fk	K
		生 牛 乳 清	K	K	K	K	K
		生 山 羊 乳 清	K	K	K	K	K
99		生 人 乳 清	m	m	fk	fk	K
		生 牛 乳 清	K	K	K	K	K
		生 山 羊 乳 清	K	K	K	K	K
100		生 人 乳 清	st	st	fk	K	K
		生 牛 乳 清	K	K	K	K	K
		生 山 羊 乳 清	K	K	K	K	K

第 30 表 抗煮沸人乳血清ハ生人乳清ニ對シテ、煮沸牛乳及ビ煮沸山羊乳ノ場合ニ比シテ弱度ナラ明カナル反應ヲ呈ス. 煮沸牛乳清及ビ煮沸山羊乳清ニ對シテハ反應セズ.

以上ノ成績ヲ通覽スルニ、補體結合反應ニ於テ、煮沸牛乳及ビ煮沸山羊乳ハ各該生乳清ニ對シテ極メテ微弱ナル反應ヲ呈フルカ、或ハ反應セズ. 異種生乳清ニ對シテハ殆ド反應ヲ呈セズ. 之ニ反シ煮沸人乳ニ在リテハ弱度ナラ生人乳清ニ對シテ比較的明カニ反應ス. 而シテ異種生乳清ニ對シテハ全ク反應セズ.

第 5 項 抗煮沸乳汁血清ノ生かぜいんニ對スル反應

第 31 表 抗煮沸牛乳血清ノ各種生かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
			50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
90		生人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		生牛かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	m	K
		生山羊かぜいん	fk	fk	K	K	K	K	K	K	K
91		生人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		生牛かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	m	fk
		生山羊かぜいん	fk	K	K	K	K	K	K	K	K
93		生人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		生牛かぜいん	m	spch	O	O	O	O	sp	m	K
		生山羊かぜいん	fk	K	K	K	K	K	K	K	K

第31表. 抗煮沸牛乳血清ハ生牛かぜいんニ對シ高度ニ反應シ得レドモ, 生山羊かぜいんニ對シテハ辛ウジテ微弱ナル反應ヲ認メ得ルノミ. 生人かぜいんニ對シテハ反應セズ.

第 32 表 抗煮沸山羊乳血清ノ各種生かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
			50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
105		生人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		生牛かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		生山羊かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	m	m
106		生人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		生牛かぜいん	m	fk	K	K	K	K	K	K	K
		生山羊かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	m	fk
107		生人かぜいん	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		生牛かぜいん	fk	K	K	K	K	K	K	K	K
		生山羊かぜいん	O	O	O	O	O	O	sp	sp	K

第32表. 抗煮沸山羊乳血清ハ生山羊かぜいんニ對シテ高度ニ反應シ得レドモ, 生牛かぜいんニ對シテハ極メテ微弱ナル反應ヲ呈スルカ或ハ反應セズ. 生人かぜいんニ對シテハ反應セズ.

第 33 表 抗煮沸人乳血清ノ各種生かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600	3200
			50	100	200	400	800	1600	3200
96		生人かぜいん	O	O	sp	sp	m	m	K
		生牛かぜいん	K	K	K	K	K	K	K
		生山羊かぜいん	K	K	K	K	K	K	K
		生人かぜいん	O	sp	m	m	K	K	K

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	50	100	200	400	800	1600	3200
99		生牛かぜいん	K	K	K	K	K	K	K
		生山羊かぜいん	K	K	K	K	K	K	K
100		生人かぜいん	O	O	O	sp	fk	K	K
		生牛かぜいん	K	K	K	K	K	K	K
		生山羊かぜいん	K	K	K	K	K	K	K

第33表. 抗煮沸人乳血清ハ生人かぜいんニ對シテ低度ナル反應ヲ呈スレドモ, 生牛及ビ生山羊かぜいんニ對シテハ反應セズ.

以上ノ成績ヲ通覽スルニ, 煮沸全乳ハ該生かぜいんニ對シ高度ナル反應ヲ呈スレドモ, 近縁動物生かぜいんニ對シテハ極メテ微弱ナル反應ヲ認メ得ルノミ. 疎縁動物生かぜいんニ對シテハ反應セズ.

第 6 項 抗煮沸乳汁血清ノ該生全乳及ビ生乳汁蛋白質各 ふらくちおーんニ對スル反應

抗煮沸乳汁血清ノ該生全乳ニ對スル反應ハ, 生乳汁蛋白質ノ如何ナルふらくちおーんニ對スル反應ニ依リテ表現セラルルモノナリヤヲ知ラントセリ.

第 34 表 抗煮沸牛乳血清ノ生全乳生乳清及ビ生かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400	800	1600	3300	6400	12800
91		全 乳	O	O	O	O	O	O	O	O	O	sp
		乳 清	fk	fk	K	K	K	K	K	K	K	K
		かぜいん	O	O	O	O	O	O	O	O	spch	m

第 35 表 抗煮沸山羊乳血清ノ生全乳, 生乳清及ビ生かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
106		全 乳	O	O	O	O	O	O	O	O	spch	m
		乳 清	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
		かぜいん	sp	sp	spch	spch	O	O	O	O	m	fk

第 36 表 抗煮沸人乳血清ノ生全乳生乳清及ビ生かぜいんニ對スル補體結合反應

家 番	兎 號	稀釋倍數 抗 原	25	50	100	200	400	800	1600	3200
97		全 乳	O	O	O	O	sp	sp	K	K
		乳 清	w	m	fk	fk	K	K	K	K
		かぜいん	O	O	O	sp	sp	m	K	K

以上ノ成績ヲ通覽シテ、一般ニ抗煮沸乳汁血清ノ生全乳ニ對スル反應ハ、生乳汁蛋白質ふらくちおーンノ一ナル生かぜいんニ對スル反應ニ依ツテ、略々代表セラルルモノニシテ生乳清ニ對スル反應ハ殆ド關與セザルモノナルヲ知ル。

第 3 章 總 括 並 ニ 考 按

補體結合反應ニ依ル實驗成績ヲ總括シテ考按ヲ試ミル事次ノ如シ。全乳ハ該種屬乳清及ビかぜいんニ對シ最モ強度ニ反應シ、近緣動物乳清及ビかぜいんニ對シテハ弱度ナル反應ヲ認ム。疎緣動物乳清及ビかぜいんニ對シテハ反應ヲ呈セズ。沈降反應ニ於テ、抗牛乳及抗山羊乳血清ノ牛及ビ山羊かぜいんニ對スル反應度ノ差僅少ニシテ、牛及ビ山羊かぜいんノ極メテ近似セル蛋白質ナルヲ推想セシムレドモ、補體結合反應ニ於テハ各々極メテ特異的ニ反應ス。

抗牛乳及ビ抗山羊乳血清ガ人乳清ニ弱度ナル反應ヲ呈スルハ、牛乳及ビ山羊乳ノ人乳清ニ對スル反應ト看做スヨリモ、寧ロ家兎正常血清ノ人乳ニ對スル反應出現セルモノト考フルヲ妥當トナス可シ。家兎正常血清ノ各種乳清ニ對スル補體結合反應ニ關シテハ、本研究ノ第 1 編其ノ 2 ニ於テ詳述セリ。

沈降反應ニ於テ、抗牛乳及ビ抗山羊乳血清ノ各該乳清及ビかぜいんニ對スル抗體價ハ優劣無ク、該全乳ニ對スル抗體價ト略々同價ナリシガ、補體結合反應ニ於テハ、抗牛乳及ビ抗山羊血清ノ該かぜいんニ對スル抗體價ハ極メテ高價ニシテ全乳ニ對スル抗體價ト略々同價ナレドモ、該乳清ニ對スル抗體價ハ低度ナリ。然ルニ抗人乳血清ニ在リテハ、沈降反應ニ於テモ將又補體結合反應ニ於テモ乳清ニ對スル抗體價ハ極メテ高價ニシテ全乳ニ對スル抗體價ト略々同價ナルニモ拘ラズ、かぜいんニ對スル抗體價ハ低シ。即チ、茲ニ於テモ乳汁抗原性ニ關シ、沈降反應ニ於テハ乳清抗原性ノ質的ニ優秀ナルヲ推知セシメ、補體結合反應ニ於テハ *Bauer* ノ所謂量的關係ニ支配セラルルモノナルヲ窺ハシム。(本研究、第 1 編、其ノ 1 ノ總括並ニ考按參照) 補體結合反應ニ於テ、一般ニ全乳ハ該煮沸乳清ニ對シ微弱ナル反應ヲ呈スルカ、或ハ反應セズ。異種動物煮沸乳清ニ對シテハ殆ド反應セズ。但シ人乳ニ於テ煮沸人乳清ニ比較的著明ナル反應ヲ呈スルハ、抗人乳血清ノ人乳清ニ對スル抗體ノ高價ナルニ依ル。以上ノ事實ヨリ、乳清ハ 100°C、30 分ノ加熱ニ依リテモ、抗乳汁血清ニ對スル反應原性ノ悉ク喪失スルモノニ非ルヲ知ル。

補體結合反應ニ於テ、全乳ハ該煮沸かぜいんニ對シ高度ニ反應陽性ナレドモ、近緣動物煮沸かぜいんニ對シテハ弱度ナル反應ヲ呈ス。疎緣動物煮沸かぜいんニ對シテハ反應セズ。

補體結合反應ニ於テ、生全乳ノ煮沸全乳ニ對スル反應ハ煮沸乳汁蛋白質ふらくちおーンノ一ナル煮沸かぜいんニ對スル反應ニ依リテ略々代表セラルルモノニシテ、煮沸乳清ニ對スル反應ハ殆ド關與セザルモノナル事實ハ沈降反應ニ於ケル場合ト略々同様ナリ。

次ニ煮沸全乳ノ生煮沸乳汁蛋白質各ふらくちおーんニ對スル血清學的關係ニ於テモ略々同様ナル事實成立スルヲ見タリ。

補體結合反應ニ於テ、煮沸全乳ハ該種屬煮沸乳清及ビ煮沸かぜいんニ對シ最モ強度ニ反應シ、近縁動物煮沸乳清及ビ煮沸かぜいんニ對シテハ弱度ナル反應ヲ呈ス。疎縁動物煮沸乳清及ビ煮沸かせいんニ對シテハ反應セズ。沈降反應ニ於テ抗煮沸牛乳及ビ抗煮沸山羊乳血清ノ煮沸牛及ビ煮沸山羊かぜいんニ對スル反應度ノ差ハ僅少ナレドモ補體結合反應ニ於テハ極メテ著明ナリ。

沈降反應ニ於テ、抗煮沸牛乳及ビ抗煮沸山羊乳血清ノ各該煮沸乳清及ビ煮沸かせいんニ對スル抗體價ハ殆ド優劣無ク、該煮沸全乳ニ對スル抗體價ト略々同價ナレドモ、補體結合反應ニ於テハ抗煮沸牛乳及ビ抗煮沸山羊乳血清ノ該煮沸かぜいんニ對スル抗體價ハ極メテ高價ニシテ該煮沸全乳ニ對スルト略々同價ナレドモ、該煮沸乳清ニ對スル抗體價ハ低度ナリ。然レニ抗煮沸人乳血清ニ在リテハ沈降反應ニ於テモ、將又補體結合反應ニ於テモ煮沸乳清ニ對スル抗體價極メテ高價ニシテ煮沸全乳ニ對スルト略々比較スルニモ拘ラズ。煮沸かぜいんニ對スル抗體價ハ低シ。即チ沈降反應ニ於テハ煮沸乳清ノ抗原性質的ニ優秀ナルヲ推知セシメ、補體結合反應ニ於テハ *Bauer*⁽¹¹⁾ ノ所謂量の關係ニ支配セラルルモノナルヲ想像セシム。補體結合反應ニ於テ、一般ニ煮沸全乳ハ該生乳清ニ對シ微弱ナル反應ヲ呈スルカ、或ハ反應ヲ認メズ。異種動物生乳清ニ對シテハ殆ド反應セズ。但シ煮沸人乳ニ於テ比較的著明ニ該生乳清ニ對シテ反應ヲ呈スルニ、抗煮沸人乳血清ノ煮沸人乳清ニ對スル抗體價ノ高キニ依ルモノナリ。

補體結合反應ニ於テ、煮沸全乳ハ該生かぜいんニ對シラ強度ナル反應ヲ呈スレドモ、近縁動物生かぜいんニ對シテハ極メテ微弱ナル反應ヲ呈スルノミ。疎縁動物生かぜいんニ對シテハ反應セズ。沈降反應ニ於テハ抗煮沸牛乳及ビ抗煮沸山羊乳血清ノ生牛及ビ生山羊かぜいんニ對スル反應度ノ差異ハ比較的小ナルニ反シ、補體結合反應ニ於テハ極メテ特異的ナリ。

補體結合反應ニ於テモ沈降反應ニ於ケルト同様ニ、煮沸全乳ノ生全乳ニ對スル反應ハ生乳汁蛋白質ふらくちおーんノ一ナル生かぜいんニ對スル反應ニ依リテ略々代表セラルルモノニシテ、生乳清ニ對スル反應ハ殆ド關與セザルモノナリ。

最後ニ人工榮養ノ目的ニ煮沸乳汁ヲ使用スルノ可否ニ就キテ、血清學の見地ヨリ觀タル余ノ見解ヲ附加セント欲ス。

人トシテ生ヲ受ケ、而モ慈愛深キ母ノ手ニ抱カレ、天ノ惠物タル母乳ヲ以テ哺育セラルル事ノ乳兒ニトリテ無上ノ幸福ナルハ論ヲ俟タザル所ナリト謂ヘドモ、遺憾ナル哉、近時時代ノ進歩發展ニ伴ヒ、世相漸ク複雑トナルニ及ビ、人工榮養益々流行スルノ傾向アリ。

人工營養ニ使用セラルル乳汁ハ通常異種屬乳汁ニシテ、就中牛乳及ビ山羊乳最も多ク使用セラル。而シテ是等乳汁ハ生ノ儘使用セラルル事尠ク、殆ド煮沸殺菌セラレタル乳汁使用セラル。

煮沸ニ依リテ生乳汁中ニ含有セラルル Vitamin ノ損失ヲ免レザルハ之ヲ暫ク措キ、血清學的ニ言ヘバ、煮沸乳汁中ニ含有セラルルカゼインハ殆ド障害ヲ蒙ル事無ク、生乳汁ニ含有セラルルモノト略々同性狀ヲ呈示スルニ反シ、煮沸乳汁中ニ含有セラルル乳清蛋白ハ煮沸ニ依リテ容易ニ變質セラレ既ニ生乳汁中ニ含有セラルルモノト其ノ性狀ヲ異ニスルニ至ル。從ツテ今若シ煮沸乳汁ヲ以テ人工營養ヲ試ミルトセンカ、乳兒ハ生乳汁ニ於ケルト極メテ其ノ性狀ヲ異ニスル乳清蛋白ヲ以テ哺育セラル。

乳兒ガ斯ル異種乳汁而モ煮沸ニ依リテ變質センメラレタル乳汁ヲ攝取シテ自己ノ營養ノ資ニ供センガ爲ニハ、生乳ニ對スルヨリモ乳兒消化管ハ過重ノ勞働ヲ強要セラルルニ至ル可シ是即チ人工營養兒ニ於ケル消化器系統疾患ノ主要原因ヲ形成スルモノナリト信ズ。

余ハ上述ノ所論ニ從ヒ、若シモ母乳營養ヲ廢棄シ人工營養ノ止ム無キノ境遇ニ至ラバ、須ク健康ナル牛或ハ山羊ヨリ無菌的ニ搾取セル新鮮ナル生乳汁ヲ使用スルノ可ナルヲ強調シ、煮沸乳汁ヲ使用スルノ非ナルヲ提唱セント欲ス。然シ乍ラ現今無菌の新鮮生乳汁ヲ容易ニ入手シ得ザルハ甚ダ遺憾ニ堪ヘザル所ニシテ、若シ夫レ無菌の新鮮生乳汁ヲ要ニ臨ミテ常ニ之等不幸ナル乳兒ニ供シ得ル國家の牛乳販賣所ノ設置ヲ見ルニ至ラバ、必ズヤ人工營養ニ起因スル幾多乳兒ノ消化器疾患ヲ減少センメ、以テ不遇ナル人工營養兒ニ大ナル福音ヲ與ヘ得ベキヲ信ジテ疑ハザルモノナリ。

結 論

1. 全乳ハ該種屬乳清及ビカゼインニ對シ最も強度ニ反應シ、近縁動物乳清及ビカゼインニ對シテハ弱度ナル反應ヲ認ム。疎縁動物乳清及ビカゼインニ對シテハ反應ヲ呈セズ。

2. 抗牛乳及ビ抗山羊乳血清ノ該カゼインニ對スル抗體價ハ極メテ高價ニシテ全乳ニ對スルト略々同價ナレドモ、該乳清ニ對スル抗體價ハ極メテ低價ナリ。之ニ反シテ抗人乳血清ニ於テハ、乳清ニ對スル抗體價ハ極メテ高價ニシテ全乳ニ對スルト略々同價ナレドモ、カゼインニ對スル抗體價ハ低シ。即チ補體結合反應ニ於テハ、抗乳汁血清ノ乳汁蛋白質各ふらくちおーんニ對スル抗體價ハ、Bauer⁽¹¹⁾ノ所謂量的關係ニ支配セラルルヲ推知シ得。

3. 全乳ハ該煮沸乳清ニ對シ微弱ナル反應ヲ呈スルカ、或ハ反應セズ。異種屬煮沸乳清ニ對シテハ殆ド反應セズ。

4. 全乳ハ該煮沸カゼインニ對シ強度ノ反應ヲ呈スレドモ、近縁動物煮沸カゼインニ對シ

テハ弱度ナル反應ヲ呈ス。疎縁動物煮沸かぜいんニ對シテハ反應セズ。

5. 生全乳ノ煮沸全乳ニ對スル反應ハ煮沸乳汁蛋白質ふらくちおーんノ一ナル煮沸かぜいんニ對スル反應ニ依リテ略々代表セラルルモノニシテ、煮沸乳清ニ對スル反應ハ殆ド關與セザルモノナリ。

6. 煮沸全乳ハ該種屬煮沸乳清及ビ煮沸かぜいんニ對シ最モ強度ニ反應シ、近縁動物煮沸乳清及ビ煮沸かぜいんニ對シテハ弱度ナル反應ヲ呈ス。疎縁動物煮沸乳清及ビ煮沸かぜいんニ對シテハ反應セズ。

7. 抗煮沸牛乳及ビ抗煮沸山羊乳血清ノ該煮沸かぜいんニ對スル抗體價ハ極メテ高價ニシテ該煮沸全乳ニ對スルト略々同價ナレドモ、該煮沸乳清ニ對スル抗體價ハ低價ナリ。之ニ反シ抗煮沸人乳血清ニ於テハ、煮沸乳清ニ對スル抗體價極メテ高價ニシテ煮沸全乳ニ對スルト略々同價ナレドモ、煮沸かぜいんニ對スル抗體價ハ低シ。即チ、煮沸乳汁ノ場合ニ於テモ *Bauer*⁽¹¹⁾ ノ量ノ關係成立ス。

8. 煮沸全乳ハ該生乳清ニ對シ微弱ナル反應ヲ呈スルカ、或ハ反應セズ。異種屬生乳清ニ對シテハ殆ド反應セズ。

9. 煮沸全乳ハ該生かぜいんニ對シテ強度ナル反應ヲ呈スレドモ、近縁動物生かぜいんニ對シテハ極メテ微弱ナル反應ヲ呈スルノミ。疎縁動物生かぜいんニ對シテハ反應セズ。

10. 煮沸全乳ノ生全乳ニ對スル反應ハ生乳汁蛋白質ふらくちおーんノ一ナル生かぜいんニ依リテ略々代表セラルルモノニシテ、生乳清ニ對スル反應ハ殆ド關與セザルモノナリ。

11. 血清學の見地ニ立脚シテ、余ハ人工榮養ノ目的ニ煮沸乳汁ヲ使用スルノ非ヲ認メ、健康ナル牛又ハ山羊ノ乳房ヨリ無菌的ニ搾取セル新鮮生乳汁ヲ使用スルノ是ナルヲ提唱セントス。

擧筆ニ臨ミ、御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ忝ウセル恩師木村教授並ニ辻教授ニ對シ謹シミテ滿腔ノ感謝ヲ捧グ。

主 要 文 献

- 1) **Bordet**, Ann. de l' Inst. Past. 1900, Nr.4, S. 273.
- 2) **Sebelin**, Zeitschr. f. physiolog. Chem. Bd 9, 1885, S. 445.
- 3) **Hamburger**, Wien. Klin. Wochenschr. 1901, Nr.49, S. 1202.
- 4) **Bauereisen**, Arch.f. Gynaekolog. Bd 90, 1910, S. 349.
- 5) **近江**, 社會醫學雜誌, 昭和3年, S. 1177.
- 6) **Schlossmann u. Moro**, Münch. med. Wochenschr. Nr.14, 1903, S. 597.
- 7) **Gengou**, Ann. de l' Inst. Past. 1902, T. 16, S. 747.
- 8) **長谷川**, 衛生學傳染病學雜誌, 昭和3年, S. 714.
- 9) **Engel**, Biochem. Zeitschr. Bd 14, 1908, S. 234.
- 10) **Friedheim**, Biochem. Zeitschr. Bd 19, 1909, S. 141.
- 11) **Bauer**, Berlin. Klin. Wochenschr. Nr. 18, 1910, S. 835.
- 12)

- Kudicke u. Sachs**, Zeitschr. f. Imm. Forsch. Bd 20, 1914, S. 316. 13) **Versell**, Zeitschr. f. Imm. Forsch. Bd 24, 1916, S. 267. 14) **Bauer**, Münch. med. Wocheuschr. Nr. 16, 1908, S. 847. 15) **Kollmeyer**, Zeitschr. f. Biolog. Bd 54, 1910, S. 64. 16) **Bauer u. Engel**, Biochem. Zeitschr. Bd 31, 1911 S. 46. 17) **Lewis**, Journ. of Infect. Dis. Vol. 55, 1934, Nr.2, S. 168. 18) **Carpenter & Hucker**, Journ. of Infect. Dis. Vol. 47, 1930, S. 435. 19) **Bauereisen**, Zeitschr. f. Imm. Forsch. Bd 10, 1911, S. 306. 20) **近藤**, 蛋白質物理化學, 1927. 21) **Hammarsten**, Lehrb. d. Physiolog. Chemie, 1923, S. 516. 22) **田所**, 蛋白質化學各論, S. 97. 23) **Abderhalden**, Handb. d. biolog. Arbeitsmethoden, Abt X III, T. 2, 1, 1922, S. 504, S. 551. 24) **Wells**, Die chem. Anschauung über Imm. Vorgänge. 1927, S. 69. 25) **Wassermann u. Schütze**, Deut. med. Wocheuschr. No. 29 Vereins-Beilage 1900, S. 178.; Deut. med. Wocheuschr. No. 30 Vereins-Beilage S. 182. 26) **Fuld**, Hofmeister's Beiträge Z. chem. Physiolog. u. Patholog. Bd. 2, 1902, cit. n. Centsalb. f. Bakt. Ref. Bd 32, 1933, S. 404. 27) **Müller**, Münch. med. Wocheuschr. (Vorläufige Mitt.) No. 7, 1902, S. 272. 28) **Wells and Osborne**, Jour. of Infect. Dis., Vol. 29, 1921, S. 200. 29) **Amberg**, Journ. of med. Research, Vol 12, 1904, cit. n. (28). 30) **Chermayer u. Pick**, Wien. Klin. Wocheuschr. Nr. 17, 1904, S. 265. 31) **Fornet u. Müller**, Zeitschr. f. Hyg. Bd 66, 1910, S. 215. u. S. 243. 32) **Schmidt**, Biochem. Zeitschr. Bd 14, 1908, S. 294. 33) **Furth**, Journ. of Immun. Vol, 10' 1925, S. 777. 34) **近江**, 内外治療, 昭和2年11月, S. 1299. 35) **Reuss**, Wien. klin. Wocheuschr Nr. I, S. 14, 1931. 36) **宮川**, 日本微生物學病理學雜誌, 昭和12年2月, S. 159, S. 198. 及ビ同雜誌, 昭和12年3月號, S. 377. 37) **Doer u. Halber**, Zeitschr. f. Imm. Forsch. Bd 47, S. 363. 38) **木村**, 日本微生物學病理學雜誌, 大正14年, 第19卷, S. 581. 39) **Bauer-Dusseldorf**, Ergebnisse d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd., 5, S. 183, 1910.