むこーず中耳炎患者ヨリ分離シタル所謂 粘液性連鎖状球菌ノ研究

京都帝國大學醫學部微生物學教室 (主任 木村教授)

京都帝國大學醫學部耳鼻咽喉科教室 (主任 星野教授)

醫學士 加 藤 新

Kato Arata

(昭和13年1月28日¹受付)

(本研究ノ大要ハ昭和12年5月新潟ニ於テ開催セラレタル 第11回聯合微生物學會ニ於テ發表シタ)

【内 容 抄 録】

昭和10年7月ヨリ同12年6月末ニ始ル滿2ケ年間ニ京都帝國大學耳鼻咽喉科臨床ヲ訪レタ化膿性中耳炎患者(主トシテ急性化膿性中耳炎)950名ヨリ 巨大ナル莢膜ヲ有シ、血液寒天上ニ於テ溶血作用ナク著明ナル粘液產生ヲ營ム球菌、即所謂粘液性連鎖状球菌73菌株ヲ分離シ、本菌ノ微生物學的並ビニ免疫學的研究ヲ行ヒ、本菌ハ總テ肺炎双球菌ニ屬シ、而モ80%ハ肺炎菌Ⅲ型菌血清ニ依リ凝集セラレルガ、標準血清ニ對スル凝集性ノ如何ニ拘ラズ、本菌相互間ニハ免疫學的ニ極メテ密接ナル關係アルコトヲ證明シ、且本菌ノ診斷ニ論及シタ。

目 次

第1章 緒 論	6. 普通寒天培養
第2章 實驗材料及ビ分離方法	7. <i>Loeffler</i> 氏凝固血清培養
第3章 實驗成績	8. ぶいよん培養
第1節 形態學的研究	9. <i>Hies</i> 氏血清水培養
第1項 形 狀	10. らくむす牛乳及ビ乳清培養
第2項 大 さ	11. げらちん、へふとん水、馬鈴薯培養等
第3項 連 鎖	12. 瓦斯及ビいんどー形成ニ就テ
第4項 莢膜及ビ莢膜染色法	13. 嫌氣性培養
第2節 微生物學的研究	第2項 赤血球溶解作用
第1項 培養實驗	1. 血液寒天平板流注培養法
1. 血液寒天培養(山羊、家兎、人血液寒天)	2. 血液ぶいよん培養法
2. 煮沸血液寒天培養	3. 液體培養遠心沈澱上清ヲ血球ニ作用セシムル方法
3. 血液水寒天培養	第3項 本菌ノ變性ニ就テ
4. 枸橼酸曹達加血液培養(家兎、山羊、人血液)	第4項 膽汁及ビ膽汁酸鹽ニヨル溶菌作用(家兎膽汁, <i>Taurocholsaures</i>)
5. 腹水寒天及ビ血清寒天培養	

Natron, Glycocholsaures Natron)

ニ就テ

第5項 おふとにんニ對スル態度ニ就テ

第6項 糖類及ビあるこーる分解試験特

ニいぬりん分解ニ就テ

第7項 試験動物ニ對スル病原性

1. まうすニ對スル毒力試験

2. 海狸ニ對スル毒力試験

3. 家兎ニ對スル毒力試験

第8項 毒力維持ニ就テ

1. Heim 氏法ニ就テ

2. 眞柄氏法ニ就テ

第3節 免疫學的研究

第1項 凝集反應

第2項 補體結合反應

第4章 總 括

第5章 考 按

第6章 結 論

第 1 章 緒 論

むこーす中耳炎ハ臨床上特異ノ病症ヲ示シ、且重篤ナル合併症ヲ惹起シ易キヲ以テ耳鼻科醫ニ依リ往時ヨリ注目サレシ疾患ナルニ拘ラズ、本症ノ經過ハ頗ル遷延緩徐ナルヲ常トシ一見治癒セルカノ如ク見ヘ患者ニ苦痛ヲ與フルコト少キガ故ニ看過サレ易イ。而シテ早期診斷ノモトニ適當ナル處置ヲ施サバ豫後ハ必ズシモ惡シキモノデハナク、早期ニ於ケル其ノ特異症狀並ニ本菌ノ微生物學的檢索ニヨル本中耳炎ノ診斷ハ頗ル重要ナルコトデアアル。Urban-tschitsch 及ビ Lambrakis 一派ハむこーす中耳炎ヲ臨床用語ナリト解シテ臨床的ニ特異ナル經過ヲ示ス中耳炎ナリトシ、必ズシモ粘液性連鎖球菌（以下粘液性連菌ト記ス）ニ依ラザルコトヲ主張シタガ、余ハ數百例ノ患者ヲ觀察シタル結果、重篤ナル合併症ヲ來シタルモノニ於テ起炎菌ヲ證明セザリシモノナク、又假ニ一步ヲ譲ツテ Mucosusotitis ohne Mucosusナル極メテ小數ノ例外的存在ヲユルストスルモ、むこーす中耳炎ノ殆ド總テハ本菌ニヨリ惹起セララルガ故ニ、本中耳炎ノ特徴ハ全ク所謂粘液性連菌ノ特異性ニ歸ス可キモノデアツテ、本菌ノ形態學的並ニ微生物學的研究ハ頗ル重要デアアル。

サテ本菌ハ古ヨリ人體各部ノ膿瘍、副鼻腔蓄膿症、中耳炎分泌物、化膿性腦膜炎ニ於ケル腦脊髄液、肺炎患者ノ喀痰、健康者ノ咽喉分泌物等ヨリ證明セルノ記載アリ。1901年 Howard and Perkins ガ腹膜炎患者ヨリ本菌ヲ分離シ粘液性連菌ト命名シ、次デ1903年 Schottmüller ガ Howard 等トハ關係ナク血液寒天上ノ性質ニヨリ粘液性連菌ヲ溶血性連菌ヨリ區別シ、次デ Süpfle ガ其ノ微生物學的性質ヲ一層強固ニ確定シタモノデアツテ、時ニ肺炎及ビ爾餘ノ化膿性疾患ヲ惹起スルコトガアルガ最モ多ク中耳炎ノ原因ヲナシ、耳科學上誠ニ重要ナモノデアアルガ、此レガ記載ハ1906年 Wittmaack ガ其ノ臨床上ノ經驗ト微生物學的檢査成績トヲ報告シタルヲ以テ嚆矢トシ、次デ Neumann, Ruttin, Wrebbel, Zemann, Hesse, Stütz, Eckert-Möhrus 等ノ詳細ナル報告ヲ見ルニ至ツタガ、何レモ臨床的觀察ヲ主トシ、本菌ノ微生物學的殊ニ免疫學的研究ハ誠ニ寥々タルモノデアアル。

次ニ1913年ヨリ米國 *Rockefeller* 研究所ニ於テ *Dochez, Gillespie, Avery, Chickering, Cole* 等ガ肺炎菌ヲ凝集反應及ビ免疫血清ノ感染防禦力ニヨツテ分ツテ以來、本菌ハいぬりん分解、膽汁ニ對スル被溶解性、おふとひんニ對スル敏感性等ヨリ肺炎菌ニ屬ストナシ、本菌ヲ肺炎菌Ⅲ型即粘液性肺炎菌ト同一ナリト主張スル者ガ多キヲ加ヘルニ至ツタガ、此等ノ菌ハ何レモ肺炎患者ノ喀痰ヲ主トシ、其他種々ノ化膿竈ヨリ分離シタモノデアツテ、中耳炎ヨリ分離セルモノニ就キ系統的研究ヲナセル者ナク、且其ノ形態學的並ニ生物學的性狀ニ就テモ全ク一致セル記載ヲ見ズ。宛モ種々ノ病竈ヨリ分離シタル本菌ヲ思ハシムル菌ガ別種ノ菌、或ハ分離個所ニ依リ全ク性質ヲ異ニスルヤノ感ヲ抱カシメル。我國ニ於テモ本菌ノ耳科學的研究ハ中村、鎌田、齊藤、白川、梶浦、松井、島津等可成多數ヲ數ヘ得ルガ、何レモ臨床的研究ヲ主トシテ微生物學的研究ハ僅ニ梶浦ノソレヲ舉ゲ得ルニ過ギズ。而モ免疫學的研究ノ記載ヲ見ナイ。

余ハ専門の見地ヨリ特ニ中耳炎分泌物ヨリ分離シタル本菌ニ就テ、系統的ニ微生物學的及ビ免疫學的研究ニ着手シ、些カ新見ヲ得タノデ此處ニ報告スル次第デアル。

第2章 實驗材料及ビ分離方法

實驗材料、昭和10年7月ヨリ昭和12年6月末ニ至ル滿2ケ年間ニ京都帝國大學耳鼻咽喉科臨床ヲ訪レタ急性及ビ慢性中耳炎患者950名ノ材料ヲ使用シタ。

本菌分離方法、準備トシテ *Politzer* 氏耳鏡、1g注射筒及ビ針（長サ5—7cm、太サ1mm即針ハ濃厚粘稠ナル鼓室内内容物ヲモ吸引可能ナル様充分太キヲ要シ、且先端ハ餘リ尖鋭ナラザルヲ可トス）ヲ使用直前煮沸消毒ス。

先ヅ外聽道ヲ充分清掃シ滅菌綿棒ニテ外聽道内ニアル分泌物ヲ全ク除去シタ後、煮沸冷却シタ耳鏡ヲ成ル可ク深く挿入シ穿孔ヨリ新シク湧出シタ分泌物ヲ灼熱消毒シタ白金耳ニトリ、直ニコレヲ血液寒天平板又ハ斜面ニ接種シ37°Cノ孵室中ニ培養シ、他方塗抹標本ヲ作りぬれんぶらう染色、*Gram* 染色及ビ特殊染色法（莢膜染色、極小體染色等）ヲ施シテ檢査シタ。尙急性化膿性中耳炎ニテ檢鏡上 *Gram* 陰性桿菌ノ認メラレタル場合ハ、更ニ煮沸血液寒天斜面ニモ培養ヲ試ミタ。

鼓膜穿孔ナキ場合ハ外聽道及ビ鼓膜ヲ沃丁ニテ消毒シタ後、鼓膜切開或ハ穿刺吸引ニ依リ得タル分泌物ニ就テ同様ノ檢査ヲ行ツタ。鏡檢及ビ培養上菌陰性ノ場合ハ2—3日後更ニ同様ノ檢査ヲ行ツタ。

更ニ同期間中、乳嚢突起開鑿術及ビ中耳根治手術ヲ行ツタ者160例ニ就キ、分泌物ノ多量ニアル場合ハ分泌物ニ就テ、分泌物ガ少量ナルカ、或ハ肉芽ノ發生アル場合ハ肉芽及ビ乳嚢蜂窩骨片ニ就テ同様ノ方法ニテ檢査ヲ行ツタ。

余ハ所謂粘液性連鎖菌トシテ、塗抹標本ニテ巨大ナル莢膜ヲ有シ、血液寒天上ニテ溶血作用ナク、著明ナル粘液發生ヲ營ムモノヲ撰ビ、73菌株ヲ分離シ得タ。勿論同一人ニテ外聽道分泌物及ビ乳嘴突起手術創ノ双方ヨリ分離シ得タモノハ多イガ、此ノ兩者ハ同一菌株ニヨルコトハ明デアルカラ單一菌株トシテ取扱ツタ。同一患者ニテ兩側耳ヨリ分離シ得タモノハ其ノ形態及ビ血液寒天上ノ性質ノミヲ檢シ、何レカ一方ノ耳ヨリ分離シタモノニ就テノミ検査ヲ行ツタ。同期間中化膿性腦膜炎ヲ併發シタ者ニ於テハ腦脊髄液中ヨリ、下垂膿瘍及ビ轉移ヲオコシタモノニ於テハ何レモ化膿電ヨリモ本菌ヲ分離シ得タガ、形態及ビ血液寒天上ノ性質ノミヲ檢シ、同患者ノ外聽道或ハ乳嘴突起手術電ヨリ分離セルモノノミヲ研究對象トシタ。分離シタ本菌ハ10%山羊血液寒天又ハ家兎血清加ぶいよんニ植ヘ纖維一部分ハ *Heim* 氏法ニ從ヒ全身感染まうすノ心臓及ビ脾臓ヲ乾燥器ニ入レ保存シタ。

外聽道ヨリ得タモノハ屢々非溶血性ノ葡萄狀球菌ノ混在ヲ認メタガ極メテ分離シ易ク、外ニ溶血性連鎖菌ト混ゼルモノガ數回アツタガ同患者ニ就テ乳嘴突起手術電ヨリハ本菌ノミヲ證シ、又塗抹標本ニテ明ニ本菌ヲシキ巨大ナル莢膜ヲ有スル球菌ヲ認メタガ、絲膿菌ト混在セル爲分離シ得ナカツタモノモ2, 3アツタガ、同症例ニ於テモ乳嘴突起手術電ヨリハ本菌ノミヲ分離シ得タ。同様ニ他ノ症例ニ於テモ乳嘴突起手術電ヨリハ本菌ノミヲ分離シ他菌ト混在セルヲ認メナカツタ。即本菌ハ本菌ノミニ依ツテ中耳炎、乳嘴突起炎其他重篤ナル合併症ヲ併發スルモノデ、巷間稱ヘラルルガ如キ混合感染ヲ認メ得ナカツタ。

第3章 實驗成績

第1節 形態學的研究

第1項 形 狀

粘液性連鎖菌ノ形態學的觀察ハ培養上或ハ其他ノ性狀觀察ヨリモ既ニ古ク觀察セラレタ所デアツテ、本菌ガ粘液性被膜即莢膜ヲ有スルコトニヨリ莢膜連鎖菌トシテ夙ニ莢膜ナキ連鎖菌ト區別モラレテ居タ。既ニ1890年頃ヨリ莢膜ヲ有スル連鎖菌ノ記載アリ (*Netter, Ortmann, Bab's, Schumacher* 等)。此等ハ何レモ粘液性連鎖菌ヲ意味シタモノト思ハルルガ特有ノ形態ノ記載ハナカツタ。然ルニ1906年 *Wittmaack* ハ耳漏中ニ於ケル粘液性連鎖菌ハ所謂蛆形 *Fliegenmadenform* ヲ呈スルヲ特徴トシ、且ちをにん染色ニヨリ莢膜ノ染色シ得ラルルコトニ依リ容易ニ肺炎菌ト鑑別シ得ト稱シタ。

余ノむこーす中耳炎ヨリ分離シタル本菌ノ形狀ハ他ノ病菌ヨリ分離シタル本菌ノ形狀ノ如ク種々デアツテ、單細胞菌トシテ球形ヲ呈シ、双球菌トシテ兩端尖銳ニシテらんせつと形ヲナシ、肺炎双球菌(以下肺炎菌ト記ス)ヲ思ハセルモノ、正圓球形菌ノ2個連續セルモノ、腎臟形ノ球菌ガ平面ヲ以テ相接シ、所謂ぜんめる型ヲナシ流行性腦脊髄膜炎菌或ハ淋菌ヲ思ハセルモノ等ガアル。更ニ又連鎖ヲ形成スルモノガアルガ溶血性連鎖菌ニ比シ一般ニ菌體大ニ

シテ連鎖中ノ各菌體ハ大小不同ニシテ均一ナラズ、特ニ終端菌細胞ハ大ナルコト多ク連鎖稍々彎曲シテ所謂蛆形ヲ呈スルコトアリ。又連鎖ヲ形成スルモノニ於テハ連鎖ニ平行ニ屢々分裂溝ヲ認メ、連鎖ニ直角ニ分裂溝ヲ認ムルハ、極メテ稀ニ終端菌細胞ニ於テ認ムルコトアルノミ。而シテ此等ノ形態ヲ示スモノハ何レモ單獨ニ存スルモノデハナク、2—3種混在シ粘液性連菌トシテノ特有ノ形態ヲ認メルコトハ出来ヌ (*Arzt, Wirth*). *Wittmaack* ノ粘液性連菌ニ特有ナリト稱スル蛆形ハ寧ロ少クシテ僅ニ40—50%ニ認メ得ルニ過ギズ、從ツテ形態ニ依ツテ分類スルコトハ不可能デアル。

第 2 項 大 サ

むこーす中耳炎ヨリ分離シタ粘液性連菌ノ大サニ就テ圓形ノモノハ其ノ直径ヲ、腎臓形ノモノハ其長徑ヲ、*Objektivmikrometer* 及ビ *Ocularmikrometer* ヲ用ヒテ測定シタノニ小ナルモノハ直径 0.5μ 、大ナルモノハ 1.5μ ニ達シ、分裂直前ノモノハ 1.8μ ニ達スルヲ認メタ。最も多イノハ $0.7-0.8\mu$ デアル。染色ハ *Gram* 染色又ハ *Hiss* 氏染色ヲ用ヒ、中耳耳漏ヨリ塗抹標本ヲ製シ充分乾燥スルヲ待チ固定ヲ行フコトナク染色シテ測定シタ。

第 3 項 連 鎖

中耳耳漏ヨリ塗抹標本ヲ製シ其ノ連鎖ニ就キ檢シタノニ本菌ハ一般ニ長連鎖ヲ作ルコトハ稀デ短連鎖ヲナスモノガ多イ。連鎖ノ多クハ5—6—10個ニシテ20個以上ノ連鎖ハ極メテ稀デアル。而シテ双球菌ガ縦ニ連鎖ヲ作ルコトモ稀デハナイ。諸文献ヲ涉獵シテモ (*Schottmüller, Arzt, Neumann, Eckert-Möbius*) 例外的ニ極メテ長キ連鎖ヲ作ルコトガアルガ (*Schumacher, Bürger*) 一般ニ連鎖ハ短シトサレテキル。

人工培養ヲ重ネル時ハ長連鎖ヲ形成スルニ至ルモノデ、特ニ液體培地ニ於テハ100個以上ノ連鎖ヲ形成スルニ至ルコトガアル。

第 4 項 莢膜及ビ莢膜染色法

粘液性連菌ガ莢膜ヲ有スルコトハ他ノ連菌トノ大ナル鑑別點デアツテ、莢膜粘液性連菌等ノ名ノアル所以デアル。本菌ハ動物體內ニ於テハ幅廣キ大ナル莢膜ヲ有スルモノデアツテ、特ニ中耳耳漏中ニ於テハ菌體ノ10倍以上ノ廣キ莢膜ニ包マレタル本菌ヲ認メルコトガアル。然ルニ人工培養ヲ重ネル時ハ2—3代ニシテ既ニ莢膜ハ著シク小トナリ殆ド認メ得ザルニ至ル。一般ニ液體培地ニ於テハ莢膜ヲ失フコト遅ク、表面培養ニ於テハ植繼1—2代ニシテ尙著明ナル粘液產生アルニ拘ラズ殆ド莢膜ヲ認メ得ザルニ至ルヲ普通トス。且人工培養ニヨリ植繼5代以上即10週以上ニ亘ツテ莢膜ヲ保有セシメル事ハ不可能デアル。

縮小セル莢膜ヲ有スル本菌ヲ直接法ニヨリまうすヲ通過セシムル事20回ニ及ンダガ分離當時ノ如ク美麗ナル莢膜ハ得ラレナカツタ。又未ダ莢膜ヲ消失セザル菌株ニ於モモ同様ニ直接法ニ依リ通過ヲ試ミタノニ莢膜ハ稍々擴大セルヲ認メタガ、分離當時ニ於ケルガ如キ美麗ナル莢膜ヲ得ル事ハ出来ナカツタ。然ルニ未ダ粘液產生及ビ莢膜ヲ完全ニ失ハザル菌株ヲ0.5% 枸橼酸曹達加家兎血液中ニ18—24時間毎ニ數回植繼グ時ハ、時ニ人體ヨリ分離當時ノ如ク大ナル莢膜ヲ得タ事ガアリ、又菌株ニヨツテハ分離當時ノ如キ莢膜ヲ得ラレナカツタガ、コレニまうす通過ヲ施セバ單ニまうす通過ヲ施ヨリモ更ニ大ナル莢膜ヲ得ル事が出来タ。即動物實驗のニまうす通過ノミニ依ツテ大ナル莢膜ヲ得ル事ハ不可能デアルガ、數回枸橼酸曹達加家兎血液内ニ移植スルカ、或ハコレヲ更ニ1回動物ヲ通過スルコトニヨリ美麗ナル莢膜ヲ得ルコトアリ。少ク共單ニ動物通過ノミヲ行フヨリモ常ニ大ナル莢膜ヲ得タ。又人工培養ニ於テハ液體培養ハ表面培養ヨリモ長ク、動物體液、血液等ヲ含有スル培養基ハ、然ラザルモノヨリモ長ク莢膜ヲ保有シ得ルモノデアル。

本菌ノ莢膜ハ各1個ノ菌體ニ應ジテ狹窄ヲ呈スル所ナキヲ特徴トスト主張スルモノガアルガ (*Bürger, Süpfle*), 双球狀ヲ呈スル菌ニ於テ明ニ狹窄ヲ示スモノ、連鎖ヲ形成スルモノニ於テ1個ノ菌體ニ應ジテ莢窄ヲ呈スルモノ、双球狀ヲナセル菌ガ縦ニ連リ連鎖ヲ呈スルモノニ於テハ双球ニ應ジテ莢窄ヲ呈スルモノ、又全ク狹窄ヲ呈シナイモノ等ガアリ、莢膜ノ狹窄ヲ以テ形態上ノ特徴トハナシ難イ。又菌體ハ形態ノ如何ニ拘ラズ莢膜ノ中央ニ存スルヲ常トス。

狹膜染色法.

一般ニ莢膜染色ハ比較的容易ナモノデアルガ、或細菌ノ莢膜染色法ガ他ノ細菌ニハ殆ド莢膜染色法トシテノ價值ヲ認メラレナイコトガアリ、同一細菌ト雖モ分離場所、培養基、分離時期等ニ依ツテ染色結果ノ大イニ異ルノハ周知ノ事實デアル。故ニ莢膜染色法ハ其ノ數ハ頗ル多イガ何レヲ或ル特定ノ細菌ノ莢膜染色法トシテ最良ナリヤヲ斷定スルコトハ頗ル困難デアツテ、本菌ニ就テモ古來多數ノ莢膜染色法ガ發表セラレテキル (*Schumacher, Wirth, Welch, Neumann, Wittmaack*).

余ハ本菌染色法トシテ次ノ4種ヲ撰ンデ比較シタ (標本ハ總テ中耳耳漏ヨリ得タル新鮮塗抹標本デアル).

- (1) 粘液性連鎖ノミニ良好ナル成績ヲ舉グト稱セラルルモノ:

Schumacker 法, *Wittmaack* 氏をにん染色法, 中村法等.

- (2) 一般細菌染色法トシテ用ヒラレ粘液性連鎖菌染色ニモ良好ナリトセラルルモノ:

Welch 法 (*Packard*), *Gram* 法 (*Süpfle*) 等.

- (3) 一般莢膜染色法

Hiss 法, *Johne* 法 (*Heim*).

(4) 單 染 色

めちれんぶらう, Pfeiffer 氏液, Azur-Eosin 染色法等

染色ニハ何レモ可檢分泌物ガ粘液性ヲ帶ビテ居タノデ空中デ充分乾燥スルヲ待チ特別ニ固定操作ハ行ハズ。

以上ノ方法ニテ檢シタルニ何レノ方法ニ依ツテモ莢膜ハ平等ニ染色サレ、結果ハ大同小異ニシテ特ニ良好ナル方法ヲ認メルコトハ出来ナカツタ。即、

(1) 粘液性連菌ノミニ良好ナリトセラルル Schumacher 法, Wittmaack 法, 中村法等ニ於テモ何レモ長所ト同時ニ缺點ガアリ、殊ニ Wittmaack 氏法ハ莢膜ヲスラ染色ン得ナイ事ガ屢々デアツタ。且 Wittmaack ハ本染色法ヲ以テ粘液性連菌ト肺炎菌トノ鑑別法ナリトシ、粘液性連菌ハ本染色法ニヨツテ莢膜ヲ染色ン得ルガ、肺炎菌ノ莢膜ハ染色ン得ズト稱シテキルガ、必ズシモ然ラズ。粘液性連菌ニシテ時ニ全ク莢膜ヲ染色ン得ナイコトガアルノミナラズ、肺炎菌莢膜モ時ニ染色ン得ルコトアリ。コレ恐ラク世界大戰前及ビ戰後ニ於ケルちをにんノ性質ノ差ニ歸セシム可キデアラウ (Wirth)。

(2) 次ニ Welch 法 (Packard) 及ビ Gram 法 (Supple) ニ依ツテモ充分莢膜ヲ認メ得ルガ、Gram 法ニ於テハ菌體ハ Gram (+) ニシテ莢膜ハ (-) ナリ。後染色ヲくりそいちニテ行フ時ハ特ニ良結果ヲ得ル。Welch 法ニヨツテモ良結果ヲ得ルガ永久標本ヲ得ラレナイ缺點ガアル。

(3) 一般莢膜染色法中特ニ Hiss 法ハ好結果ヲ擧ゲ得タ。即同一標本ニ於テモ莢膜ハ大ニシテ、莢膜及ビ菌體、莢膜ト外界トノ境界ハ甚ダ明瞭デアル。但此ノ場合げんちあな紫及ビ硫酸銅溶液ハ原法ハ共ニ稍々濃厚ニ過ギ、5 % げんちあな紫及ビ10 % 硫酸銅溶液ヲ用フル方ガ適當デアル。

(4) 莢膜ハ又單染色ニテモ充分認メ得ラレル。即最モ屢々用ヒラレルめちれんぶらう或ハふくしん稀釋液ニテ明瞭ニ認メ得ル。めちれんぶらう單染色ニ於テハ菌體ハ青色ニ莢膜ハ帶青赤色ニ染色シ、少量ノふくしんヲ加フル時ハ莢膜ハ一層赤ク明瞭トナルガ莢膜ガ他ノ染色法ニ於ケルヨリモ小トナル缺點ガアル。ふくしん稀薄液ニヨル時ハカカル缺點ナシ。あつーるえをじん溶液1滴ニ水1ccヲ加ヘタルモノニテ10—15分染色スル時ハ菌體ハ青色ニ莢膜ハ紫赤色ニ極メテ美麗ニ染色シ得。莢膜モ可成大デアアルガ屢々濃染スルノ憾ガアル。

要スルニ本菌ノ莢膜染色ニ從來多數ノ染色法ガ發表セラレテキルガ、何レモ大差ナク特ニ優秀ナル方法ハ認メラレナイガ、Hiss 法、ふくしん稀釋液法、及ビ Romanowsky-Giemsa 氏液ニヨルガ特ニ優秀デ、Wittmaack 氏ちをにん染色法ニハ賛意ヲ表シ難イ。

培養セル菌ノ莢膜染色ハ本菌ノ發育佳良ナル血液寒天ノ如キ生血清ヲ含メル培養基ノ新ニキ聚落ヨリ標本ヲ製スル事が必要デ、火焰或ハあるこーニテ固定スルヲ要ス。但枸橼酸曹

達加家兎血液ニ於テハあるこ一固定ヲ行フ時ハ血漿ガ濃染サレ、莢膜トノ境界不鮮明トナル爲不充分デハアルガ火焰固定ヲ行フノ外ハナイ。火焰ニテ固定セラレタル部分ニハ美麗ナル莢膜ヲ認メ得ル。

第2節 微生物學的研究

第1項 培養實驗

1. 血液寒天培養

1903年 *Schottmuller* ガ始メテ血液寒天培養ニヨリ、連鎖球菌ヲ分類シテヨリ血液寒天ハ連鎖球菌ノ鑑別其他諸性状ノ檢索ニ必要缺クカラザルモノトナツタ。*Schottmuller* ノ始メテ使用セルモノハ人血液ヲ約20%ニ寒天ニ加ヘタモノデアアルガ、今日ハ一般ニハ動物血液ヲ5—30%ニ加ヘタルモノヲ使用ス。余ハ山羊、家兎及ビ人血液ヲ使用シタ。

イ。實驗方法 2%普通寒天(牛肉ヨリ製シ P_H 7.4—7.6)ヲ溶融シテ15—50°Cニ冷却シ、コレニ10%ノ割合ニ山羊、家兎又ハ人血液(脱纖維素)ヲ加ヘテ一様ニナル如ク混和シ、速ニ滅菌シヤレニ3—4mmノ厚サニ分注シテ凝固セシメ2—3時間後37°Cノ孵室中ニ24時間入レ無菌ナルコトヲ確メテ使用シタ。糖類ヲ加ヘタル血液寒天ヲモ使用シ、次ニ此等血液寒天ニ本菌ヲ培養シ其ノ聚落ノ性状ヲ觀察シタ。

ロ。實驗成績 普通血液寒天ニ於テハ培養5—6時間後既ニ灰綠色ノ點狀聚落ヲ生ジ、37°C24時間ニテ直径3—4mmノ水滴様透明ノ粘液性光澤アル聚落ヲ作ル。聚落ノ形狀ハ小ナルモノニ於テハ正圓形ニシテ半球形ニ膨隆シ培養基面ニアル底縁ハ平滑ナリ。大ナルモノハ直径5mm以上ニモ達シ中央ハ稍々陥没ス。聚落ハ粘液性物質ヨリ成リ白金耳ヲ以テ搔キトレハ粘稠ニシテ縷ヲ引キ稍々灰白色ヲ呈ス。聚落下ノ培養基面ハ其ノ周邊1—2mmニ至ル迄灰稍々暗緑—綠色ニ着色サレル。聚落ハ時ニ相接シテ生ジ融合シテ大ナル菌苔ヲ形成シ一部分線ヲヒキタルガ如ク灰白色ヲ帶ビタル部分ガアル。又聚落ノ粘稠度少クシテ流動シ帶狀ノ菌苔ヲ作ル時ハ表面ハ平坦ナリ。37°C18時間ニ於テハ既ニ粘液性物質ノ乾燥ガ始マリ薄キ膜狀トナリ、其ノ邊緣ガ僅ニ周圍ヨリ高マレルヲ見ルノミ、72—96時間ニ於テハ培養基面ノ灰緑—綠色ノ變色及ビ稍々濕潤セルヲ認ムルノミトナル。此ノ時期ニ於テモ培養基面ヲ搔キトレバ灰白色ノ粘液性物質ヲ得ル。カカル變化ハ37°C24時間後室温乃至氷室ニ放置スル際ニモ現ハレ氷室ニ放置スル際ニモ72時間後ニハ著シク乾燥スルヲ認メ、1週間後ニハ肉眼的ニ辛シテ見得ル程度トナル。

生存期間ハ37°Cノ孵室中ニ貯ヘル時ハ5—6日ニシテ、37°C24時間後室温ニ放置フル時ハ分離直後ハ3—4日、2—3回培養後ハ2—3週間テ氷室ニ貯ヘル際ニモ大差ヲ認メナイ。一般ニ粘

液產生ノ大ナルモノハ生存期間短キモノノ如クデアル。

家兎血液ヲ以テ作ツタ血液寒天ニ於テモ聚落ノ性狀ニ大差ヲ認メナイ。人血液ヲ以テ作ツタ血液寒天ニ於テハ時ニ聚落ガ強ク灰白色ヲ帶ビ培養基面ヲモ同様ニ強ク變色セシメルコトガアル。斜面ニ植繼グ際凝固水ハ稍粘稠デ灰白色ニ濁ス。

1%葡萄糖加血液寒天ニ於テハ糖含有ナキモノニ比シテ發育ハ大差ナク、粘液產生ニモ變化ヲ認メナイ。生存期間ニモ大差ハナイ。

2. 煮沸血液寒天

本培養基ハ *Voges* ガいんふるえんぎ菌培養ニ始メテ使用シタモノテアルガ *Sternberg* u. *Boxer* ハ肺炎菌ト連菌トノ鑑別培養ニ使用シ、連菌ハ培養基ヲ變色シナイガ、肺炎菌ハ變色シテ聚落及ビ其ノ周邊ハ絳黃色トナルト稱シテキル。其後 *Bieling* ハ馬脫纖維素血液ヲ用ヒ *Gilbert* u. *Fournier* ハ *Loeffler* 氏法ニヨル全血液凝固培養基ヲ用ヒ、*Bingold* ハ *Bieling* ノ變法ヲ用ヒ、*Presting* ハ *Bieling* 法ヲ追試シ、*Bingold* モ亦其ノ變法ヲ用ヒテ略々其成績ヲ肯定シ、本培養基ヲ以テ肺炎菌及ビ連菌ノ鑑別ニ重要ナルモノトシテキル。

イ. 實驗方法. 余ハ *Bieling*, *Presting* 等ノ方法ニ倣ヒ、馬血液ノ代リニ山羊血液ヲ用ヒタ。即2%普通寒天ヲ煮沸溶融シテ90°Cニ保チコレニ15%ノ割合ニ脱纖維素山羊血液ヲ加ヘテヨク混和シ、ちよこれーと色トナツタモノヲ平板ニ分注シ、中耳耳漏ヨリ分離シタ粘液性連菌ヲ培養シ24時間後並ニ48時間後ニ觀察シタ。

ロ. 實驗成績. 分離直後ノモノニ於テハ37°C24時間培養後ニハ聚落下培養基面或ハ其ノ周邊ハ、僅ニ黃色一灰白色一黃綠色ヲ呈スルモノガ多イガ全ク變色シナイモノモアル。粘液產生ハ血液寒天培養ニ比シ遙ニ少ク、從ツテ周邊ハ平滑ヲ缺キ表面ハ光澤少ク稍々粗ナル感ヲ與ヘルガ尙露滴狀ト稱シ得ル。且聚落モ一般ニ小サク直径1mmニ過ギズ、血液寒天上ニ於ケルガ如ク大ナル菌苔ヲ作ルコトナシ。48時間後ニ於テモ大差ハナイガ黃色ノ度ヲ増シ僅ニ培養基面ヲ脱色スルモノガアル。コレニ反シ溶血性連菌ハ培養基ヲ變色セズンテ聚落ノ周邊ニ於テ急ニ凹ミ菊花狀ヲ呈シ、宛モ *Clauberg*, *Anderson* 氏培地ニ於ケルちふてりー菌ノ *Typus gravis* ノ聚落ヲ思ハセルモノガ多イ。

3. 血液水寒天

血液水寒天ハ *Bieling* ガ溶血性連菌ト肺炎菌トノ鑑別ニ使用シタモノデ其後 *Presting* 等ニヨリ粘液性連菌培養ニモ試ミラレタ。

實驗方法並ニ成績. *Bieling* ノ方法ニ倣ツタガ馬血液ノ代リニ山羊血液ヲ用ヒタ。即山羊血液1部ヲ水2部ニ混ジ一旦溶融シテ60°Cニ冷却セル寒天ニ同量加ヘタルモノヲしやーれニ分注シ、2—8時間後37°Cノ孵籠中ニ24時間入レ無菌ナルコトヲ確メテ使用シタ。37°C24時間

培養後ノ聚落ヲ觀察スルニ、粘液産出ヲ特徴トシ聚落ハ流動シ易ク其ノ周邊ニ少シク淡黃色帶ヲ認ム。

4. 枸橼酸曹達加血液

眞柄氏ハ0.5%枸橼酸曹達加家兎血液ニ肺炎菌ヲ培養セシニ數代ナラズシテ毒力甚ダシク増強シ、*in vitro*ニ於ケル唯一ノ肺炎菌毒力増強法ト稱シテキル。余ハ氏ノ所説ヲ確メ且本培養基上ニ於テ溶血性連鎖ト異ル性質ヲ有スルヤ否ヤニ就テ實驗シタ。

イ、0.5%枸橼酸曹達加家兎血液。家兎血液ハ總テ心臟穿刺ニヨツテ得タルモノデアル。分離直後ノ本菌ハ本培養基ニ可成ヨク發育ス。即37°C24時間ニシテ下層赤血球ノ部ハ稍々暗赤色トナリ、上層血漿部ハ少シク褐色ヲ帶ビテ輕後ノ瀰蔓性濁濁ヲ來シ浮游物ヲ認メナイ。37°C48時間ニ至ルモ同様デ血球ガ稍々黑色ヲ帶ブルニ至ルノミ。血漿ノ凝固ヲ來スコトナシ。又培養基中ニ於ケル本菌ハ連鎖ヲ形成スル傾向少ク且數代培養ヲ繰返スコトニヨリ著シク莢膜ハ大トナリ、時ニ殆ド人體ヨリ分離當時ト異ラザルニ至ル。(此際ノ固定ハ不充分デアルガ火焰固定ノ行フヲ可トス。あるこゝる、めたのゝる等ヲ用フル時ハ血漿ガ強く染色サレ莢膜ハ不鮮明トナル)。然ルニ分離後長時日ヲ經テ血液寒天上ニ於テ粘液産生能ヲ失ヒ、溶血作用ヲ顯著ニ營ムモノニ於テハ37°C、數時間ニシテ既ニ下層血球ハ黒クナリ、上層血漿部モ溶血ノ爲黑色トナリ、24時間後ニハ平等ニ黒變シ且血漿凝固ノ爲塊狀ヲナスニ至ル。カカル状態ニアルモノハ本培養基ニ培養ヲ繰返スモ溶血性及ビ血漿凝固性ヲ失フコトナク、且連鎖ヲ形成シテ莢膜ヲ證明セズ。肺炎菌Ⅰ—Ⅲ型ハ略本菌ノ分離當時ノ如キ性状ヲ示シ、溶血性連鎖ハ後者ト撰ブ所ナシ。家兎ノ性、年齢ニハ關係ナシ。

ロ、0.5%枸橼酸曹達加山羊血液。山羊血液ハ頸靜脈ヨリ採血シタモノヲ使用シタ。本菌ハ本培養基上ニ於テハ家兎血液ト撰ブ所ガナイガ發育ニハ家兎血液ヨリ不適當デアリ、且莢膜ヲ大ナラシムル事少シ。

ハ、0.4%枸橼酸曹達加人血液。人血液ハ總テ肘正中靜脈ヨリ得タモノデ枸橼酸曹達ハ血液ト滲透壓ヲ等シクスルタメニ0.4%トシタ。分離直後ノ本菌ハ本培養基ニ發育ヒズ。分離後時日ヲ經過シタモノハ分離直後ノモノニ比シテハヨク發育スルガ尙例外的ニ發育スルノミ。人血液ト家兎血液ヲ混合セル場合モ尙發育ハ極メテ不良デ同量ニ混合セル場合及ビ人血液ノ多量ナル場合ハ發育セズ、人血液ガ10%以下ノ場合ニ辛シテ僅ニ發育スル、即毒力ノ増強及ビ美麗ナル莢膜ヲ得ルニハ不適當デアル。

5. 腹水寒天及ビ血清寒天

本菌ハ本培養基ニハ發育良好トサレテ居ル、2%普通寒天ニ30%ノ腹水或ハ山羊血清ヲ加

ヘタル培養基ニ於テハ、本菌ハ總テ透明ニシテ粘液性光澤アル容易ニ流動スル水滴様聚落ヲ作り血液寒天上ニ於ケル其レト異ラズ、且聚落ガ融合シテ大ナル菌苔ヲ作ルコトガ多イ。

6. 普通寒天培養

本菌ハ寒天培養基ニハ發育良好ナリト稱スルモノガアルガ (*Bonome, Schottmüller, Heim, Neumann*) 一般ニハ發育不良ニシテぐりせりん或ハ糖類ヲ加フル時ハ比較的良好ナリトサレテキル。 (*Burger, Wirth, Cumingham*)

實驗方法並ニ實驗成績、法ノ如ク製シタル2%寒天培養基 ($P_H 7.4-7.6$) ニ中耳耳漏ヨリ分離シタル本菌ヲ培養シタルニ $37^\circ C$ 、24時間ニテハ大部分發育ヒズ。例外的ニ發育セルモノハ直徑1—2mmノ小ナル露滴狀聚落ヲ作ル。聚落ハ粘液性デ灰白色殆ド透明ニシテ血液寒天上ニ於ケル聚落ト大差ナシ、寒天ニ1%ノ糖類殊ニ葡萄糖ヲ加フル時ハ發育ハ稍々良好トナルカ尙發育シナイモノガ多イ。

7. Loeffler 氏凝固血清

Bonome, Neumann 等ハ發育不良ナリト稱シテキルガ一般ニハ發育良好ナリトサレテキル。 (*Howard and Perkins, Arzt, Burger, Wirth, Schumacher*) 殊ニ *Hiss* ハ粘液性連菌ト肺炎菌トノ鑑別ニハ本培養基ヲ最良ナリトシ、粘液性連菌ニ於テハーツノ融合セル圓滑ナル水様表面及邊緣ヲ有スル菌苔ヲ作ルガ、肺炎菌ニ於テハ孤立セル水様ノ聚落ヲ作り融合シテモ一樣ニ平滑ナラズシテ邊緣モ亦滑ナラズト稱シテキル。

余ハ法ノ如ク牛血清ヨリ製シタル凝固血清ヲ用ヒタノニ、發育極メテ良好ニシテ流動シ易キ粘液性光澤アル聚落ヲ作り、多クハ融合シテ大ナル菌苔ヲ作り邊緣ハ平滑デアル。弱擴大デ見ルニ平等ナル灰白色極メテ小ナル顆粒ヲ認メ得ル。

8. ぶいよん培養

普通ぶいよん中ニ於テハ本菌ハ發育良好トハイヒ難イガ尙ヨク發育ン得ルモノトサレテキル (*Howard and Perkins, Neumann, Schottmüller*)。殊ニ *Binaghi* ノ如キハ一面ノ潤濁及ビ叢レル沈澱物ヲモ生ズト記載シテキルガ、コレニ糖、腹水或ハ血清ヲ加フル時ハ發育頗ル良好トナルノハ衆知ノ事實デアル。

實驗方法並ニ成績。法ノ如ク製シタルぶいよん ($P_H 7.4-7.6$) ヲ30分宛連續3日間間歇減菌ヲ施シタモノニ本菌ヲ培養シタノニ分離當時ノモノハ發育不良デ $37^\circ C$ 、24時間ニシテ僅ナ瀰蔓性潤濁ヲ生ズルノミデ菌膜及ビ沈澱物ヲ生ゼズ。又全ク發育セザルモノモ20—30%ニノボル。分離後相當期間ヲ經タモノハ血液寒天上ニ於テ尙粘液產生豊富ナルモノニ於テモ總テ發育シ輕度ノ瀰蔓性潤濁ヲ生ズ。 $37^\circ C$ 48時間ニ至ルモ分離當時ノモノハ潤濁程度ニシテ少量ノ粉狀沈澱物ヲ證スルノミ。沈澱物ハ粘稠ニシテ縷ヲヒク性質ノモノナリ。形態學的ニハ殆

ド双球菌状ヲ呈シ、極メテ小數例ニ於テ (5—3%) 4—5個ノ連鎖ヲ形成スルモノヲ見ルノミ、
デアル。コレヲ室温ニ放置スレバ漸次少量ノ雲狀沈殿物ヲ生ジ、液ハ比較的透明トナル。高
壓蒸氣釜ニテ消毒シタぶいよんニハ菌ノ發育尙不良ナリ。

1. %葡萄糖加ぶいよんニ於テハ發育ハ稍々促進サレルガ尙困難デアツテ、37°C24時間ニテ
ハ僅ニ瀰蔓性濁濁ヲ生ズル程度デアル。更ニ多量ノ葡萄糖ヲ加ヘタル場合、乳糖、蔗糖等ヲ
加ヘタル場合ハ發育ニ殆ド影響ナシ。

本菌ハ血液ぶいよん中ニ於テハ發育良好デアルガ溶血作用ヲ認メ得ズ、血清ぶいよんと大
同小異ナレバ略ス。

10—20%血清ぶいよん又ハ腹水ぶいよん中ニ於テハ本菌ノ發育ハ極メテ良好ニシテ既ニ
37°C、7—8時間ニシテ輕度ノ濁濁ヲ來ス。37°C24時間ニ於テハ瀰蔓性濁濁ヲ生ジ屢々多量ノ
雲狀沈殿物ヲ生ズ。沈殿物ハ粘稠ニシテ縷ヲヒク性質ノモノナリ。血清中ノ血色素ハめとへ
もぐろびントナル爲ニ沈殿物及ビ培養液共ニ暗綠色ニ變色スルコト多シ。形態學的ニハ双球
菌ヲナスカ5—10個ノ連鎖ヲ形成スルコト多ク、普通ぶいよん中ニ於ケルト異リ一般ニ短連
鎖ヲ作ル傾向大ナリ。37°C48時間ニ達スレバ沈殿物ハ更ニ多量トナルコト多シ、家兎血液ニ
培養セル本菌ヲ本培養基中ニ培養スレバ沈殿物ハ一層多量トナリ殆ド液ノ半ニモ達シ、且血
色素ノ變色ノ爲著シク綠色トナリ奇觀ヲ呈スルコト多シ。

ぶいよん及ビ血清ぶいよん中ニ於ケル生存期間ハ分離直後ハ3—4日デアルガ、2—3回植繼
後ハ2—3週間トナル。最モ長キハ2ヶ月ニ達スルコトガアルガ例外ト稱スベク3週間ヲ經レ
バ大部分ハ死滅スルニ至ル。

9. Hiss 氏血清水

いぬりん分解ノ如何ハ肺炎菌ト連鎖菌トノ鑑別ニ重要ナル條件ノ一デアルガ、Hiss ハ本培
養基ニいぬりん及ビ指示薬トシテらくむすヲ加ヘテ其ノ分解ヲ檢シテキル。余ハ果シテ本培
養基ガ本菌ノ培養基トシテ適當ナリヤ否ヤ、若シ適當ナラバ糖類分解試験ノ培地トシテ使用
スル目的ヲ以テ試験ヲ行ツタ。余ハ牛血清1分ニ蒸留水3分ヲ加ヘ Koch 氏蒸氣釜ニテ15分
間宛連續3日間間歇滅菌シタモノヲ用ヒタ。本菌ハ本培養基ニハ總テ發育良好デアル。

10. 牛乳及ビ乳清培養基

古ク Howard and Perkins, Schottmüller 以來牛乳培養基ハ肺炎菌及ビ連鎖菌ノ鑑別培養基トシテ
使用サレ近來 Wirth, Gundel 等ガ連鎖菌及ビ肺炎菌ノ系統的研究ニらくむす牛乳ヲ用ヒテヨリ廣
ク使用セラルルニ至ツタ。本菌ハ牛乳中ニテ弱酸ヲ作ルガ凝固セズト稱スルモノ (Howard and
Perkins, Arzt) 及ビ凝固スト稱スルモノ (Bonome, Packard, Neumann, Wirth) トアリ所説一定
セズ。

實驗方法及び實驗成績、らくむす牛乳ハ新鮮脱脂乳ニ淡青色トナル迄らくむす液ヲ加ヘ4日間20分宛間歇滅菌シタモノヲ用ヒタ。分離直後ノ本菌ハ24時間デハ變化ナク、3—4日後ニ至リ周ニ輕度ノ赤變ヲ來シ、5—6日後ニ至レバ大部分ハ輕度ノ赤變ヲ來スガ凝固シタモノハ僅ニ5%内外ニ過ギズ。らくむす乳清ニハ本菌ハ發育セズ。

11. げらんちん培養其他

げらんちんニハ *Neumann* ハ發育可良ナリトイヒ、*Wirth*, *Schumacher* ハ25°Cニテ極メテ小ナル灰白色ノ聚落ヲ作ルト稱スルノミニテ一般ニハ發育ハ極メテ不良ナルカ、又ハ全ク發育セザルモノトサレテ居ル (*Bonone*, *Binaghi*, *Arzt*, *Heim*, *Cunningham*)。

余ハ25°Cニテげらんちん平板培養及び穿刺培養ヲ試ミタガ20例中僅ニ1例ニ於テ4日後平板培養ニ於テ極メテ小ナル灰白色水滴樣聚落ヲ認メタルノミデアル。液化ヲ來セルモノナシ。

P_H 7.4—7.6ノ普通ぺふとん水ニ本菌ヲ培養シタルニ發育セルヲ認メタルコトナシ。

Schottmüller, *Neumann*, *Bürger* 等ハ馬鈴薯培養基ニ本菌ノ發育ヲ認メタリト稱シテキルガ、余ハ本培養基ニ20菌株ヲ接種シタガ發育セルモノヲ認メナカツタ。

12. 瓦斯及ビいんどーる形成

余ハ2%葡萄糖寒天ニ本菌ノ高層穿刺培養ヲ試ミタルモ瓦斯形成ヲ認メズ。又ぶいよん培養ヲ北里—*Salkowski* 氏法ニヨリ檢索シタがいんどーる形成ヲ認メ得ナカツタ。

13. 嫌氣性培養

本菌ガ通性嫌氣性 *facultativ anaerob* ナルコトハ *Schottmüller* 其他ニヨリ既ニ認メラレテキル所デアル。余モ亦下記ノ實驗ニ依ツテ嫌氣性ニモ發育シ得ル事ヲ認メ、本菌ガ通性嫌氣性ニ屬スルコトヲ知り得タ。

實驗 1. 血清ぶいよんニ本菌ヲ接種シテ後、流動ばらふいんヲ重層シタモノヲ37°Cニテ培養シタルニ、本菌ハ發育シ流動ばらふいんヲ重層セザルモノニ比シ大差ヲ認メズ。

實驗 2. 細谷氏嫌氣性培養裝置 (内壓ヲ吸引ぼんぶニテ40mm Hg以下トナシ空中放電ニヨリ殘在セル O_2 ヲ水トナシタル後水素ヲ充滿更ニコレヲ吸引シタル後放電ス。コレヲ2—3回繰返シテ培養裝置中ノ O_2 ヲ殆ド完全ニ除去シ得) 中ニ血液寒天培養基ヲ入レ本菌ヲ培養シタルニ發育ハ遲延スルモ尙充分ニ發育スルヲ認メタ。

第2項 赤血球溶解作用 (第1—4表)

連鎖狀球菌ニ溶血作用ヲアルヲ發見シタノハ1903年 *Schottmüller* デアツテ其後多數ノ學者ニヨツテ研究サレ、コノ方面ヨリ連菌ノ分類ヲ企テタル業績モ頗ル多イ。即 *Schottmüller*

ハ血液寒天平板培養法ニ依リ連菌ヲ分チテ溶血性連菌(丹毒連菌)綠色連菌及ビ粘液性連菌トナシ、溶血性連菌ノ溶血環ハ圓形ノ透明帶ニシテ其ノ直徑ハ 37°C , 24時間ニテ2—3mmニ達スルガ綠色連菌及ビ粘液性連菌ハ溶血作用ヲ缺キ、粘液性連菌ハ深部聚落ヲ作ル時ハ 37°C 48時間ヲ過シテ暗綠色ノ聚落ノ周圍ニ僅ニ溶血作用ヲ示ストシタ。次デ 1915年 *Smith and Brown*ニ依リ血液寒天平板培養法ノ研究法ハ大イニ改良セラレ、又小林氏及ビ其ノ門下ハ馬、山羊血液及ビ葡萄糖加寒天ヲ用ヒテ溶血作用ニ依ル分類ヲ企テ、今日ニ於テハ溶血作用ハ連菌分類ニハ極メテ大ナル役割ヲ演ズルニ至ツタ。

サテ本菌ノ溶血作用ニ關シテハ血液寒天平板培養法及ビ血液ふいよん法ニテハナシトスルモノト(*Ludke, Zangemeister u. Levy, Schumacher, Scheuer*) 輕度ノ溶血作用ヲ認メルモノ(*Wirth, Arzt, Süpfle, Böcker u. Kaufmann*)トガアリ、更ニ *Bitter, Engelmann, Cunningham, Dudgeon* 等ノ如キハ粘液性連菌ニシテ極メテ著明ナル溶血作用ヲ營ムモノノ有ルヲ報告シ、1929年 *Oppenheim*モ溶血性連菌ニシテ著明ナル粘液產生ヲ營ムモノノアルヲ報告シ溶血性粘液性連菌ト稱シタ。一般ニ肺炎菌ハ溶血作用ハナキカアルモ極メテ輕度ノモノトサレテ居ルガ、殆ド常ニ其ノ存在ヲ主張スル者(殊ニ伊學派)ガアリ、殊ニ *Dehez and Gillespie*ノ如キモ粘液性肺炎菌中ニモいぬりん不分解、膽汁ニ不溶解ニシテ溶血作用有ルモノノ存在ヲ肯定シテキルガ、余ハサキニ述ベタルガ如ク粘液性連菌トシテ溶血作用ナキモノノミヲ撰ビ、而モ950例ノ中耳炎患者ヲ觀察シタル結果 *Bitter* 等ノ報告セルガ如キ菌株ニハ一例モ遭遇セザリシ點ヨリ見ルモ、カカル菌株ハ極メテ稀有ナル例外的菌株ニ屬スルモノト考ヘラレ從ツテ吾人ノ研究對象外トナシ得ル。即本菌ハ上記ノ諸文献ヨリ考察スルモ余ノ蒐集セル菌ノ性状ヨリ考フルモ、溶血作用ハナキカタクヘ存在スルモ極メテ輕度ノモノト考ヘラレル。

サテ細菌ノ溶血素證明方法トシテハ種々ノ條件ヲ考慮シテ菌ヲ培養セルモノヲ血球ニ作用セシメ、溶血現象ヲ呈スルヤ否ヤニ依リ其ノ溶血素產生ヲ證明スルニアル。而シテ從來使用サレタル方法ハ次ノ如クデアル。

- (1) 血液寒天平板培養法
- (2) 血液加ふいよん培養法
- (3) 菌浮游液法
- (4) 液體培地遠心沈澱上清液又ハ濾液ヲ作用セシムル方法

此等ノ内(2), (3)ハ唯菌ノ溶血素產生ノ有無ハ知り得ルガ、其ノ溶血素ガ血球ニ如何ニ作用スルカ事ハ不可能デアル。依テ余ハ(2), (3)ノ内(3)ヲ除キタル他ノ3方法ヲ撰ンダ。

1. 血液寒天平板培養法 (第1表)

血液寒天平板培養法ニヨリ連菌ノ溶血検査ヲナスニハ一定ノ條件ガ必要デアル (V. Lingheim, Becker, Smith and Brown). 即培養方法 (塗抹法ニ依ル表面聚落ト流注法ニ依ル深部聚落ノ相違) 培養基ノ性狀 (寒天ノ性狀及ビ量, 血液ノ種類, 性狀及ビ量) 培養溫度及ビ時間等ノ條件ニ依リ左右サレ, 且同一研究者ガ同一條件ノ下ニ研究セル場合ト雖モ溶血環ノ性狀ハ毎常同一デハナイカラ出來得ル限リ一定條件ノ下ニ検査スルコトガ必要デアル. 余ハ Smith and Brown 等ノ所謂標準血液寒天平板培養法ニ依リ其ノ深部聚落ノ性狀ヲ檢シ.

(1) 實試方法並ニ實驗成績

血液ハ馬ノ代リニ山羊脱纖維素血液ヲ用ヒ, 寒天ハ牛肉ヨリ製シPH7.0トシ聚落ハ1しやーれ中50—100トナル様血液寒天37°C, 18—24時間培養ノ菌ヲふいよんニテ稀釋シタルモノヲ, 流注法ニテしやーれ中ニ注入 (血液5ハ%) 寒天ノ稍々固化スルヲ待チ更ニ少量ノ寒天ヲ注入シ表在性ノ聚落ヲ全部深在性トナサシメタ. 然ル後37°Cノ孵籠中ニ入レ24時間及ビ48時間培養ノ聚落ノ性狀ヲ檢シ, 次デ氷室ニ放置スルコト48時間後, 第3回觀察ヲ其ノ深部聚落ニ就テ綠色帶, 溶血環ヲ觀察シ, 溶血帶ノ大サ或ハ遺殘血球, 境界等モ觀察シ. 勿論溶血環ノ重ナレルモノハ除外シ大サハ中等大ノ最モ多イト思ハレルモノ5個ヲ撰ビ其ノ平均値ヲ用ヒタ.

第1表ニ見ル如ク分離直後ノ本菌ハ37°C, 24時間後ニ小ナル灰白色橢圓形點狀ノ聚落ハ周圍ヲ灰白綠色乃至綠色ノ環ヲ以テ圍マルルヲ認ム. コノ綠色帶ハ多ク直徑1mm内外ヲ出デナイガ孤立性ノ時ハ4—5mmニ達スルコトガアリ, 聚落ノ多キ時ハ培養基全面ヲちよこれーと色乃至暗綠色ニ變色セシメ且輕度ノ溶血ノ爲ニ稍透明ノ度ヲ増サシメル. 37°C48時間後ニハ聚落ノ周圍ハ殆ド例外ナク灰綠色乃至綠色帶ニ圍マレ更ニ一部ニ於テハ綠色帶ハ幅1—2mm極メテ漠然タル溶血帶ニ圍マルルヲ認ム. 其ノ境界ハ漠然トシテ遺殘血球頗ル多シ. 氷室ニ48時間放置スル時ハ綠色帶ニハ變化ヲ認メザルモ溶血環ハ著シク其ノ直徑ヲ増ス. 但境界ハ依然トシテ漠然タリ. 即此時期ニハ例外的ニ溶血環ヲ認メザルモノアルモ, 詳細ニ觀察スレバ大部分ハ漠然タル溶血環ヲ認メ得ルモノデアル.

次ニ分離後久シク人工培養ヲ繼續シテ粘液產生減少シ, 溶血作用ノ著明トナレル菌株ニ於テハ分離後比較的新シキ菌株ニ於テハ37°C24時間後ニハ投圓盤狀灰白色ノ聚落ヲ圍ミテ暗綠色帶ヲ僅ニ認メ得ルモノデアルガ多クハ小ナル溶血環ヲ認ム. 且其ノ境界ハ漠然トシテ遺殘血球多シ, 48時間ニ至リテハ綠色帶ハ認めラレズ, 溶血環ノ大サヲ増加スルガ依然トシテ境界ハ尖鋭ナラズシテ遺殘血球ヲ認メ得ル. コレヲ氷室ニ48時間放置スレバ溶血環ノ透明度ハ増シ直徑モ2—4mmトナルガ, 溶血性連菌ニ於ケルガ如ク境界鋭ナラズシテ尙遺殘血球ヲ認ム. 又分離後尙長期間ヲ經タルモノニ於テハ既ニ37°C, 24時間ニシテ直徑2—4mmノ境界鋭

キ溶血環ヲ作り溶血性連鎖菌ト何等異ラザルニ至ル。即本菌ハ分離當時ハ極メテ弱キ溶血作用ヲ有スルニ過ギナイガ（表面塗抹培養法ニテハ認メ得ナイコトガ多イ）人工培養ヲ繼續スルニ從ヒ粘液產生能ヲ失ヒ、溶血ヲ營ムニ至リ遂ニハ溶血性連鎖菌ト全ク區別シ難キニ至ル。

2. 血液加ふいよん培養法

Schottmüller ハふいよんニ少量ノ血液ヲ加フル時ハ本菌ノ發育佳良デ37°C, 24時間ニシテ培養液ハ一面ニ濁濁シ綠色ニ着色スト稱シ、*Schumacher, Arzt* ハコレヲ肯定シテ培養液ハ綠色ニ濁濁シテ沈渣血球ハ褐紫色ヲ呈ストイヒ溶血作用ヲ認メテ居ナイガ、*Supple* ハ一部ノ菌株ニハ中等度ノ、*Wirth* ハ殆ト總テノ菌株ニ輕度ノ溶血作用ヲ認メテ居ル。

余ハ普通ふいよん (P_H 7.4) ニ山羊脱纖維素血液ヲ 20%ニ加ヘタル血液ふいよんニ本菌ノ血液寒天24時間培養一白金耳ヲ接種セルニ、分離直後ノモノハ37°C 24時間ニテ培養液ハ汚キ暗綠色ニ着色濁濁シ、管底ニハ赤褐色ノ血液沈澱ヲ見、溶血作用ヲ認メナカツタ。37°C, 48時間後ニモ殆ト變化ハナイガ一部ノ菌株ニハ暗綠色ノ雲狀沈澱物ヲ生ジ、溶血ヲ認メズ。氷室ニ48時間放置後モ溶血ヲ認メナカツタ。然ルニ分離後久シク既ニ血液寒天上ニ於テ著明ニ溶血作用ヲ認ムルモノハ、既ニ37°C, 5—6時間後培養液ハ溶血ノ爲暗赤色トナリ、24時間後ニハ著シク暗赤色ノ沈澱ヲ生ズ。即本菌ハ分離直後ニ於テハ溶血作用ヲ認メ得ナイガ、分離後久シキニ亙ル時ハ著明ノ溶血作用ヲ認ムルニ至ル。

3. 液體培地遠心沈澱上清ヲ血球ニ作用セシムル方法 (第2—4表)

本法ハ連鎖菌溶血素測定ニハ最良ノ方法デ、余ハ血球ノ抵抗測定ヲ應用セル *Hamburgers Blutkörperchenmethode* ヲ用ヒ、其ノ判定ニハ *Autenrieths Kolorimeter* ヲ用ヒタリ。故ニ供試材料ハ其ノ範圍ヲ擴メ、分離直後ノ菌、分離後長期間人工培養ヲ繼續セル後數十回まうす通過ヲ施シテ毒力増強シ、培養所見モ分離當時ト殆ト異ラザルニ至リシ菌、及ビ人工培養繼續ニ依リ血液寒天上ニ於テ著明ナル溶血作用ヲ營ム菌ノ3群ヲ用ヒタ。

實驗方法。本菌ノ血液寒天24時間培養ノ菌ヲ内徑約1cmノ試験管ニ10cc宛分注セル P_H 7.0ナルふいよん及ビ該ふいよんニ10%家兎血清ヲ加ヘタルモノニ各2—3mgヲ接種シ、37°Cノ孵籠ニ收容スルコト6時間後該培地ヲ1分間3000回轉ニテ30分間遠心沈澱シテ得タル上清ヲ、直ニ生理的食鹽水ニテ順次稀釋シテ各試験管内容ヲ各2cc宛ナラシメ、夫ニ各0.5cc宛ノ1%家兎、山羊及ビ人血球浮游液ヲ添加スル（血球ハ脱纖維素血液ヲ生理的食鹽水ニテ洗滌後遠心沈澱セシメ上清液ヲ捨テ更ニ洗滌遠心沈澱セシムルコト3回ニ及ビタル血球ヲ生理的食鹽水ニ浮游セシメタルモノデアル）、次デ37°Cノ孵籠中ニ2時間放置（其ノ間時々振盪混和セシム）後氷室ニ1夜靜置シ翌朝比色計ニテ結果ヲ判定シタ。尙對照ノ完全溶血溶液ニハふいよ

んと生理的食鹽水ノ等分溶液ニ計算量ノ血球浮游液ヲ加へさばにんニテ溶血センチメタルモノヲ使用シ、且血球ノ食鹽水浮游液ハ常ニ溶血指數殆ど零ナルコトヲ確メタ。

實驗成績、第2—4表ニ見ル如ク分離直後ノ菌及ビ分離後久シク人工培養ヲ繼續シタ後まうす通過ヲ施シタ菌ハ、本項 1, 2 ノ方法ト同様溶血作用ハ常ニ存スルガ極メテ弱キニ反シテ、分離後久シク人工培養ヲ繼續シタ菌ハ可成溶血作用ノ強キヲ認メ得タ。併シ定型的溶血性連菌ニ比シテハ、血液寒天平板流注培養法ニ依ル時ハ殆ど區別シ得ナイガ、本法ヲ用フレバ尙可成ノ相違アルヲ認メル。尙血液寒天平板流注培養法ニ依ル時ハ本菌ノ溶血作用ハ溶血性連菌ニ比シ遙ニ遅ク發現スルカラ、本法ヲ用ヒテ 6 時間ヨリ更ニ長時間後ニ於ケル溶血素產生ヲ檢スル時ハ、或ハ溶血性連菌ト異ラザルニ至ルカモ知シナイ、今後研究ノ對象トスベキ問題ナリト信ズル。

要スルニ本法ヲ以テスルトキハ粘液產生ヲ營ム菌ハ、培養 6 時間後ニ於テ極メテ弱キ溶血作用ヲ呈スルニ過ギナイガ、分離後長時日ヲ經テ血液寒天上ニ於テ著明ノ溶血作用ヲ營ムモノハ前者ニ比シテ遙ニ強度ノ溶血ヲ營ムヲ認メ得ルガ、溶血性連菌ニ比シテハ尙可成ノ相違アルヲ認メル。溶血素產生ハ血清ノ附加ニヨリ影響ヲ被ラナイ、各種血球ノ抵抗力ニ就イテハ家兎血球ハ山羊血球ヨリモ稍抵抗大デアルガ人血球ハ此ノ兩者ニ比シテ遙ニ抵抗ノ大ナルヲ認メ得タ。

第 1 表 本菌ノ山羊血液寒天平板培養法ニ依ル溶血試驗

菌株名	分離日 經過 シテセ ヨル	37°C 24時間		37°C 48時間		37°C 48時間後氷室48時間	
		綠色帶 及 性 狀	溶血帶ノ廣サ 邊緣ノ性狀遺 殘血球有無	綠色帶 及 性 狀	溶血帶ノ廣サ 邊緣ノ性狀遺 殘血球有無	綠色帶 及 性 狀	溶血帶ノ廣サ 邊緣ノ性狀遺 殘血球有無
高 堂	分離直後	＋ 灰綠色	0.5 mm 漠然 ＋	＋ 灰綠色	0.5 mm 漠然 ＋	灰 綠	0.5 mm 漠然 ＋
駒 井	〃	－	－	＋ 綠 色	－	綠 色	1.0 mm 漠然 ＋
野 間	〃	＋ 薄キ灰綠	0.5 mm 漠然 ＋	＋ 灰綠色	1.0 mm 漠然 ＋	灰 綠	2.0 mm 漠然 ＋
中 村	〃	－	0.5 mm 〃 〃	＋ 灰綠色	1.5 mm 〃 〃	綠 色	2.5 mm 〃 〃
小 田	〃	＋ 灰 綠	0.5 mm 〃 〃	＋ 綠 色	0.5 mm 〃 〃	綠 色	1.0 mm 〃 〃
三 澤	〃	＋ 綠 色	0.5 mm 〃 〃	＋ 綠 色	0.5 mm 〃 〃	綠 色	0.5 mm 〃 〃
梅原 I	〃	＋ 灰 綠	－	＋ 綠 色	－	綠 色	0.5 mm 〃 〃
吉 岡	〃	－	0.5 mm 漠然 ＋	－	0.5 mm 漠然 ＋	－	1.5 mm 甚漠然 〃
登 尾	〃	－	－	＋ 灰 綠	－	灰 綠	1.5 mm 漠然 〃
津 田	〃	＋ 薄 綠	0.5 mm 漠然 ＋	＋ 灰 綠	1.0 mm 漠然 ＋	灰 綠	2.0 mm 〃 〃

菌株名	分離日 シテ過 セル	37°C 24時間		37°C 48時間		37°C 48時間後氷室48時間	
		綠色帶 及 性 狀	溶血帶ノ廣サ 邊緣ノ性状遺 殘血球有無	綠色帶 及 性 狀	溶血帶ノ廣サ 邊緣ノ性状遺 殘血球有無	綠色帶 及 性 狀	溶血帶ノ廣サ 邊緣ノ性状遺 殘血球有無
野 木	〃	-	-	+ 薄 綠	-	暗 綠	±
田 中	〃	-	-	+ 薄 綠	-	綠 色	±
澤	〃	-	-	-	-	薄 綠	-
太 布	〃	-	-	+ 暗 綠	-	暗 綠	0.5 漠然 +
中 井	〃	+ 灰 綠	0.5 漠然 +	+ 灰 綠	1.0 漠然 +	暗 綠	1.0 〃 〃
奥	〃	-	-	+ 暗 綠	1.0 〃 〃	暗 綠	1.5 〃 〃
武 市	4ヶ月	-	1.0 漠然 +	-	2.5 漠然 〃	-	3.5 漠然 +
荒 川	7ヶ月	± 薄 綠	1.5 漠然 +	-	2.0 〃 〃	-	3.5 〃 〃
緒 方	3ヶ月	-	1.5 〃 〃	-	2.5 〃 〃	-	4.5 稍銳 ±
西 田	3ヶ月	-	1.5 〃 ±	-	3.5 〃 ±	-	4.0 〃 〃
仲	3ヶ月	-	1.5 〃 ±	-	2.5 〃 〃	-	4.5 〃 〃
廣 辻	6ヶ月	-	2.0 銳 -	-	2.5 銳 -	-	4.0 銳 -
高 堂	4ヶ月	-	2.0 漠然 ±	-	2.5 銳 -	-	3.0 〃 〃
溶血性連鎖菌 J		-	2.0 銳 -	-	4.0 銳 -	-	4.0 〃 〃
溶血性連鎖菌 B		-	2.0 銳 -	-	3.5 銳 -	-	4.0 〃 〃

第 2 表 分離直後ノ本菌ノ溶血作用 (溶血指數)

菌 株 名	培 地 種 類	溶血素稀釋 血球種類		2	4	8	16	32	64
		家 兎 山 羊 人	稀 釋 倍 數						
丹 生	血清ふいよん	家 兎 山 羊 人	29	29	26	20	10	0	
			30	27	10	10	0	0	
			10	5	0	0	0	0	
	ふ い よ ん	家 兎 山 羊 人	26	16	9	6	0	0	
			24	16	10	5	0	0	
			12	5	0	0	0	0	
今 井	血清ふいよん	家 兎 山 羊 人	40	37	32	11	9	0	
			33	32	27	12	9	0	
			14	10	5	5	0	0	
	ふ い よ ん	家 兎 山 羊 人	27	19	13	11	11	5	
			82	47	27	27	0	0	
			10	8	5	0	0	0	

菌 株 名	培 地 種 類	溶血素稀釋 倍數	2	4	8	16	32	64
		血球種類						
前 川	血清ぶいよん	家 兎	25	25	12	8	0	0
		山 羊	27	19	13	8	0	0
		人	5	5	0	0	0	0
	ぶ い よ ん	家 兎	27	17	6	5	0	0
		山 羊	24	19	16	10	5	0
		人	7	5	0	0	0	0

第 3 表 分離後一旦繼代培養ヲ行ヒタル後20回もうす通過ヲ施シタル
菌ノ溶血作用（溶血指數）

菌 株 名	培 地 種 類	溶血素稀釋 倍數		2	4	8	16	32	64
		血球種類							
肺炎菌Ⅲ (北研)	血清ぶいよん	家	兎	29	30	33	17	9	0
		山	羊	27	20	23	15	10	0
		人		9	5	0	0	0	0
	ぶ い よ ん	家	兎	27	16	12	9	0	0
		山	羊	29	20	15	10	5	0
		人		9	5	0	0	0	0
肺炎菌Ⅲ (本教室)	血清ぶいよん	家	兎	21	15	12	8	8	0
		山	羊	24	16	11	10	0	0
		人		8	5	0	0	0	0
	ぶ い よ ん	家	兎	23	17	8	5	5	0
		山	羊	27	20	10	5	0	0
		人		7	5	0	0	0	0
小 川	血清ぶいよん	家	兎	27	14	10	5	0	0
		山	羊	25	15	12	5	0	0
		人		7	5	0	0	0	0
	ぶ い よ ん	家	兎	19	11	11	9	0	0
		山	羊	17	15	10	0	0	0
		人		7	5	0	0	0	0
舟 崎	血清ぶいよん	家	兎	25	17	13	10	0	0
		山	羊	27	19	15	10	5	0
		人		8	5	5	0	0	0
	ぶ い よ ん	家	兎	25	18	12	10	0	0
		山	羊	29	10	0	0	0	0
		人		10	5	0	0	0	0

第 4 表 久シク人工培養ヲ繼續シタル本菌ノ溶血作用（溶血指數）

菌株名	培地種類	溶血素稀釋 血球種類 倍數		2	4	8	16	32	64	128	256
		家	兎								
廣 辻	血清ぶいよん	山	羊	100	100	95	80	55	27	15	10
		人		100	85	80	55	29	20	10	10
				70	63	60	33	20	5	0	0
	ぶいよん	家	兎	100	90	81	47	18	15	15	12
		山	羊	100	91	80	72	46	31	21	7
		人		73	65	65	31	20	10	0	0
今 井	血清ぶいよん	家	兎	95	80	70	37	20	15	10	0
		山	羊	100	80	75	70	47	20	10	0
		人		59	55	40	27	15	5	0	0
	ぶいよん	家	兎	95	79	63	30	17	12	10	10
		山	羊	100	81	80	69	45	25	10	0
		人		62	60	55	29	20	10	0	0

第 3 項 本菌ノ變性ニ就テ

連鎖球菌ノ變性ハ主トシテ形態學的及ビ生物學的性質ニ關スルモノデアツテ、古來コレニ關スル研究ハ枚舉ニ遑ノナイ程デアル。即形態學的研究ハ *V. Lingelsheim*, *Kurth und Thalmann* 等ガ連鎖ノ長短ニヨツテ之ヲ分類シタノニ始マルガ、其後連菌ハ環境ノ如何ニ依リ容易ニ連鎖ノ長短ヲ變化スルモノデアルコトガ知ラルルニ至リ漸ク其ノ價值ヲ失ヒ、現今ニ於テハ專ラ生物學的性質、殊ニ溶血作用及ビ糖類分解作用等ニヨリ連菌ノ一元說ヲ稱ヘルモノト (*Rosenau*, *Morgenroth*, *Schnitzer*, 小林, 紋谷, 弘中) 多元說ヲ主張スルモノ (*Schottmüller*, *Levy*, *Heim*, *Schlirf*, *Gundel*, 安東) トガアル。他方肺炎菌ノ變性ニ關スル研究モ頗ル多ク (*Reimann*, *Morgenroth*, *Griffith*, *Paul*, *Kimura*, *Sukneff* u. *Meyer*, *Neufeld und Levinthal*) 殊ニ *Rosenau*, *Kritschewski* 等ノ如キハ肺炎菌及ビ連菌ノ一元說ヲ主張シ、實驗的ニモ容易ニ肺炎菌、溶血性連菌、綠色連菌、粘液性連菌等ヲ相互ニ變性セシメ得ト稱シ、*Urbantschitsch* ハ臨床的ニモ同一患者ニ就テ同一病竈ヨリ時ヲ異ニシテ溶血性連菌、或ハ粘液性連菌ヲ證明シタコトヨリ人體内ニ於テモ本菌ハ容易ニ溶血性連菌ニ、又此ノ逆ノ變異モ極メテ容易ニ行ハルルニ非ズヤト稱シタガ、*Schottmüller*, *Arzt* 等ハ本菌ハ動物體内ニ於テハ勿論人工培養培養基中ニ於テモ變化セザルモノナリト主張シテ居ル。

余ハ本菌ヲ分離後山羊血液寒天ニ繼代培養ヲ試ミ、漸次粘液產生能ヲ失ヒ溶血ヲ營ムニ至ルヲ認メタ。而シテ溶血ヲ營ムニ至ル期間ハ分離後早キハ1ヶ月遅キモ3—4ヶ月デアツテ、尙可成粘液ヲ產生スルガ以後溶血作用ノ強クナルト共ニ粘液ヲ產生セザルニ至リ、強キ溶血環ヲ示ス透明ナル小聚落ヲ形成シ遂ニハ全ク溶血性連菌ノ聚落ト鑑別シ得ザルニ至ル、

(赤血球溶解作用ノ項参照)。

動物通過ヲ頻回繰返ス時ハ(10-15回)却ツテ粘液產生能ヲ失フニ至ルコトガアルガ、尙肺炎菌Ⅰ, Ⅱ型ニ比シテハ著明ノ粘液產生ヲ營ミ溶血作用ヲ獲得スルニ至ル。

人工培養繼續ニ依ツテ粘液產生能ヲ失ヒ溶血作用ヲ營ムモノハ未ダ全ク粘液產生能ヲ失ハザルニ先立チ、まうす通過ヲ施スカ、18-24時間毎ニ0.5%枸橼酸曹達加家兎血液ニ培養スル時ハ莢膜大トナリ、粘液ヲ產生シ溶血作用ヲ失フニ至ルガ、全ク粘液ヲ產生セザルニ至ツタモノハコレヲ回復センメ得ナイ。尙分離直後1回まうすヲ通過センメオク時ハ分離セルマヽ植繼續保存セルモノニ比シ遙ニ變性ヲ來シ難イ。余ハ此ノ際ニ於ケル免疫學的研究ヲモ行ツタカラ他日詳細ニ報告シ様ト思フ。

第4項 膽汁及ビ膽汁酸鹽ニ依ル溶菌作用(第5表)

1900年 *Neufeld* ハ肺炎菌ノ新鮮ナル肉汁培養ハ人及ビ家兎膽汁ニ依ツテ溶解サルコトヲ肉眼的及ビ顯微鏡的ニ證明シ、氏ハ此現象ヲ膽汁中ノ特殊成分タル膽汁酸鹽ノ作用ニ歸シ、從ツテ膽汁ハ加熱滅菌スルコトニ依ツテ何等溶菌力ニ變化ヲ來サナイモノデアルトナシ、又同時ニ無毒力ノ菌株或ハ熱ニ依ツテ殺菌サレタ菌ハ共ニ被溶解性ノナイコトヲ證明シタ。*Levy* ハ此ノ發見ニ基キ連菌ト肺炎菌トノ鑑別診斷ニ此ノ膽汁或ハ膽汁酸鹽ニヨル肺炎菌ノ溶菌現象ヲ應用シタガ膽汁中デハ膽汁酸鹽ノ含有量ガ一定シナイ爲ニ其ノ溶菌作用モ亦區々デアアルノ故ヲ以テ、主トシテ *Taurocholsaures Natron* ノ肉汁或ハ生理的食鹽水溶液ガ最モ使用ニ便ナル旨ヲ記載シタ。其後コノ肺炎菌ノ溶菌現象ハ多クノ研究者ニ依ツテ確認セラレテ肺炎菌ノ重要ナル特徴ノ一トサレ、連菌トノ鑑別ニハ必ズ施行セラルベキモノトサレルニ至ツタ。又一方種々ノ條件ニ依ツテ溶菌發現ノ程度ニ異動ノ現ハレルコトモ相次イデ報告セラルルニ至リ *Cotoni*, *Sukneff* 等ノ如キハ例外的ノ菌株ヲモ種々報告シテ居ル。

膽汁中ノ溶菌性物質ハ *Neufeld* 以來膽汁酸鹽ニアルモノトサレ、膽汁ハ膽汁酸鹽ノ含有量ニ平行シテ種々溶菌力ニ差異ヲ來スト信ゼラレテ居タガ、*Kozlowski* ハ高級不飽和脂肪酸ガ高度ノ稀釋ニ於テモ溶菌力ガアルヲ指摘シ、其ノ重要性ヲ主張シテキルガ未ダ是認セラレテ居ナイ。從ツテ余ハ膽汁及ビ膽汁酸鹽溶液ニ就イテノミ本菌ニ對スル溶解性及ビ殺菌作用ニ就イテ實驗ヲ行ツタ。

(1) 供試材料。供試材料ハ總テ分離直後ノ菌株ヲ使用シタ。即肺炎菌ノ膽汁ニ對スル被溶解性ハ菌ガS型即圓形濕潤ノ聚落ヲ形成シ、莢膜ヲ有シ、毒力强ク、おふとひんニ敏感ナルモノトサレテ居ルカラ分離直後ノ未ダ粘液產生及ビ莢膜ヲ失ハナイモノヲ用ヒタノデアアル。

(2) 供試膽汁及ビ膽汁酸鹽。膽汁ハ家兎ヲ無菌的ニ開腹シ、膽囊ニ潑溜セル膽汁ヲ注射器ニテ穿刺吸引シ、滅菌試験管ニ入レテ氷室ニ保存シ、用ニ臨ンデ生理的食鹽水ニテ稀釋シ

テ使用シタガ、可及的新鮮ナルモノヲ用ヒ保存1週間以上ニ亘ルモノハ原則トシテ用ヒナカ
ツタ。供試膽汁酸鹽トシテハ Taurocholsaures Natron (Merck) 及ビ Glycocholsaures Natron
(Merck) ノ2種ヲ使用シタ。

(3) 實驗方法. 上記ノ膽汁及ビ膽汁酸鹽ヲ滅菌生理的食鹽水ヲ以テ10倍ニ稀釋シ、1cc
宛滅菌試験管ニ分注シ(血液寒天培養菌ノミハ2cc宛分注シタモノヲ用ヒタ)コレニ3宛ノ
食鹽水對照試験管ヲ置キ、コノ各ニ血清ふいよん37°C、18—24時間培養ノ菌1ccヲ加ヘテヨ
ク混和シ、(一部ハ血液寒天24時間培養ノ菌ヲモ使用シタ)37°Cノ孵甕中ニ30分間放置シ(時
々振盪ス、血液寒天培養菌ハ室温ニ放置シタ)溶菌ノ結果ヲ肉眼約ニ觀察シ、且其ノ1滴ヲ
載物硝子ニノセ染色後顯微鏡的ニ檢査シタ(又念ノ爲一部ハ一白金耳ヲ血清ふいよんニ接
種シテ培養ヲモ行ツタ。殺菌力試驗ハ後編ニ於テ論述スル)。

(4) 實驗成績. 被檢菌73菌株中膽汁及ビ膽汁酸鹽ニ溶解セザルモノハ僅ニ6菌株デ爾餘
ノ67菌株ハ溶菌セラルルヲ認メタ。而シテ其ノ大部分ハ肉眼約モ顯微鏡的ニモ完全ニ溶菌セ
ラレ、僅ニソノ15%ニ顯微鏡約ニ少シク菌ノ殘渣ヲ認ムルノミデアル。(一)6菌株ニ就テモ
菌液ノ透明度ハ殆ド對照ト異ラナイガ顯微鏡的ニハ菌ハ甚ダ不整ナル形ヲ示シ、殊ニ莢膜ノ
如キハ殆ド認メ得ラレズ菌置モ圓形デナク周邊不平滑デ、膽汁及ビ膽汁酸鹽ニ依リ大ナル影
響ヲ受クルヲ知り得タ。尙表ニ依ツテモ明ナル如ク家兎膽汁ハ膽汁酸鹽ニ比シ作用ハ稍々弱
イガ Taurocholsaures Natron, Glycocholsaures Natron 兩者間ニハ殆ド差異ヲ認メ得ナイ。

要スルニ本菌ノ膽汁及ビ膽汁酸鹽溶液ニ對スル性質ハ肺炎菌ノソレニ對スル性質ト殆ド一
致スルコトヲ認メ得タ。

第 5 表 膽汁及膽汁酸鹽ノ本菌ニ對スル溶菌作用

菌株名	膽汁及膽汁酸鹽 家兎膽汁	10% Taurocholsa- ures Natron	10% Glycocholsa- ures Natron
荒川	↑ ₂	↑ ₃	↑ ₃
今井	↑ ₂	↑ ₃	↑ ₃
武市	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
三橋	↑ ₂	↑ ₃	↑ ₃
緒方	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
大西	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
辻田	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
上田	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
高堂	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
駒井	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
野間	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
細見	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
中村	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
小田	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃

菌株名	膽汁及膽汁酸鹽 家兎膽汁	10% Taurocholsa- ures Natron	10% Glycocholsa- ures Natron
三澤	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
樵木	↑ ₂	↑ ₃	↑ ₃
西田	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
仲田	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
瀬川	↑ ₂	↑ ₃	↑ ₃
木村	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
鹽貝	↑ ₂	↑ ₃	↑ ₃
竹本	—	—	—
長	+	↑ ₃	↑ ₃
堀江	+	↑ ₃	↑ ₂
樋口	↑ ₂	↑ ₃	↑ ₃
西村	↑ ₃	↑ ₃	↑ ₃
木村	—	—	—
林	+	↑ ₃	↑ ₂

胆汁及膽汁液濃度	10% 家兔胆汁	10% Taurocholsa- ures Natron	10% Glycocholsa- ures Natron
菌株名			
日下部	† ₂	† ₃	† ₃
梅原	† ₂	† ₃	† ₃
吉岡	† ₂	† ₃	† ₃
梅原	† ₂	† ₃	† ₃
登尾	† ₂	† ₃	† ₃
田中	—	—	—
津田	† ₃	† ₃	† ₃
木	† ₃	† ₃	† ₃
澤	† ₃	† ₃	† ₃
奥村	† ₃	† ₃	† ₂
細見	† ₂	† ₃	† ₃
太布	† ₃	† ₃	† ₃
中井	† ₃	† ₃	† ₃
奥	+	† ₃	† ₃
中平	† ₃	† ₃	† ₃
青谷	† ₃	† ₃	† ₃
伊藤	—	—	—
末包	+	† ₃	† ₃
嶋川	† ₃	† ₃	† ₃
舟崎	† ₂	† ₃	† ₃
山本	† ₂	† ₃	† ₂
白井	+	† ₂	† ₃
浅井	† ₃	† ₃	† ₃

胆汁及膽汁液濃度	10% 家兔胆汁	10% Taurocholsa- ures Natron	10% Glycocholsa- ures Natron
菌株名			
川越	† ₃	† ₃	† ₃
小林	—	—	—
舟岡	† ₂	† ₃	† ₂
岡野	† ₃	† ₃	† ₃
井上	† ₃	† ₃	† ₃
青木	—	—	—
南	† ₃	† ₃	† ₃
和氣	† ₃	† ₃	† ₃
宮田	† ₂	† ₃	† ₃
川合	+	† ₂	† ₂
田中	† ₂	† ₂	† ₂
小松	† ₃	† ₃	† ₃
關戸	† ₃	† ₃	† ₃
二谷	† ₃	† ₃	† ₃
森	† ₃	† ₃	† ₃
増田	† ₃	† ₃	† ₃
布川	† ₃	† ₃	† ₃
涌田	† ₂	† ₃	† ₃
荒木	† ₂	† ₃	† ₃
畑野	+	+	+
安藤	† ₃	† ₃	† ₃
中村	† ₂	† ₃	† ₃

表 説明 †₃ハ肉眼的ニ全ク透明トナリ顯微鏡ニモ全ク溶菌セルモノ。

†₂ハ肉眼的ニハ全ク透明トナツタガ顯微鏡的ニ少シク菌ノ残渣ヲ認ムルモノ。

＋ハ肉眼的ニハ著明ニ透明トナツタガ所々ニ菌ノ残骸ヲ認ムルモノ。

—ハ變化ナキモノ。

第 5 項 おふとひんニ對スル態度ニ就テ (第 6 表)

おふとひんハひんに誘導體 Äthylhydrocuprein デアツテ、本劑ノ藥用的價值ハ *Morgenroth* 等ノとりばのぞーま感染まうすノ治療ニ成功シタルニ始マリ、其後氏及ビ其ノ門下ハ肺炎菌ハ動物體內並ニ試験管内試験ニ於テおふとひんノ極微量ニ依ツテ發育ヲ阻止セラルガ連菌ハ其ノ100—500倍ノ濃度ニ於テ始メテ影響ヲ被ルコトヲ發見シタ。其後 *Wright*, *Neufeld*, *Schiemann*, *Schiemann und Ishiwara* 等ハ彼ノ所說ヲ確認シ、肺炎菌ハおふとひんノ含有量既ニ100萬分ノ1ニシテ發育ノ阻止セラルコトガ明ニサレタ。且一般ニハ粘液性連菌ハ既ニ其ノまうすニ對スル高キ病原性、膽汁ニ對スル被溶解性、いぬりんノ分解等ニ依リ肺炎菌ニ屬スト主張スル者ガ多イガ *Schnitzer*, *Becker und Kaufmann* 等ハ粘液性連菌ハ元來

おふとひん＝敏感ナルモノニ非ズト稱シ、*Nachmann, Levy* 等ハ肺炎菌中ニモおふとひん＝鋭敏ナラザル例外的菌株ノアルコトヲ報告シテキル。余ハおふとひん＝對スル敏感性モ本菌研究上重要ナル性質ナルヲ以テ、其ノ發育阻止濃度及ビ殺菌作用＝就テ實驗ヲ行ツタ。（殺菌試験ハ後編ニ於テ論述スル）

(1) 實驗方法. 余ハ培養基トシテ血清ふいよんヲ用ヒタ。おふとひんヲ夫々1萬, 10萬, 20萬, 50萬, 100萬, 200萬, 500萬及ビ1000萬倍＝含有セルふいよん ($P_H 7.4-7.6$) ヲ作り約20分間宛連續3日間間歇滅菌シタモノニ10—15%ノ家兎血清ヲ加ヘ24時間37°Cノ孵籠＝入レ無菌ナルコトヲ確メタおふとひん含有血清ふいよん＝血液寒天37°C, 24時間培養ノ菌10mgヲ約1ccノふいよん＝浮游セシメタモノ1白金耳ヲ加ヘ37°C, 24時間後、菌ガ發育スルヤ否ヤ＝依ツテ發育阻止濃度ヲ決定シタ。表中(—)ハ菌ノ發育セザルモノ, (+)ハ菌ノ發育セルモノヲ示ス。

(2) 實驗成績. 表ニ示ス如ク被檢73菌株中發育阻止おふとひん濃度ノ最高ハ10萬倍＝シテ僅＝3菌株, 20萬倍ハ6菌株, 50萬倍ハ32菌株, 100萬倍ハ27菌株, 200萬倍ハ4菌株, 最低濃度ハ實＝500萬倍ニテ發育ヲ阻止セラルモノガ1菌株アツタ。要スル＝本菌ハおふとひん＝對シテハ頗ル鋭敏デ10萬倍以上ノ濃度デハ發育シ得ズ。大多數ハ既＝50—100萬倍＝テ發育ヲ阻止セラレ、略 *Morgenroth* 等ノ所説ト相一致スルヲ認メタ。但シ其ノ範圍ハ菌株＝依リテ可成大ナル差異ヲ認メルガ溶血性連鎖菌ノ如ク濃度ノ高キモノノ中ニ於テハ發育シ得ナイ。

第 6 表 おふとひんノ發育阻止濃度

おふとひん濃度		1 10,000	1 100,000	1 200,000	1 500,000	1 1,000,000	1 2,000,000	1 5,000,000	1 10 ⁷
菌株名									
荒川	川	—	—●	—	+	+	+	+	+
今井	井	—	—	—	—	+	+	+	+
武市	市	—	—	—	—	+	+	+	+
三橋	橋	—	—	—	—	+	+	+	+
緒方	方	—	—	—	—	+	+	+	+
大西	西	—	—	—	—	+	+	+	+
廣辻	辻	—	—	—	—	+	+	+	+
上田	田	—	—	—	—	+	+	+	+
高堂	堂	—	—	—	—	+	+	+	+
駒井	井	—	—	—	—	—	+	+	+
野間	間	—	—	—	—	—	+	+	+
細見	見	—	—	—	—	—	+	+	+
中村	村	—	—	—	—	—	+	+	+
小田	田	—	—	—	—	+	+	+	+
三澤	澤	—	—	—	—	—	—	+	+
橋本	本	—	—	—	—	—	+	+	+

菌株名	おふとひん 濃度	1	1	1	1	1	1	1
		10,000	100,000	200,000	500,000	1,000,000	2,000,000	5,000,000
西 田		-	-	-	-	-	+	+
仲		-	-	-	-	-	+	+
瀬 川		-	-	-	-	-	+	+
木 村		-	-	-	-	-	+	+
鹽 貝		-	-	-	-	-	+	+
竹 本		-	-	-	-	-	+	+
長		-	-	-	-	+	+	+
堀 江		-	-	-	-	-	+	+
樋 口		-	-	-	-	-	+	+
西 村		-	-	-	-	+	+	+
木 林		-	-	-	-	+	+	+
日 下		-	-	-	-	-	+	+
梅 部		-	-	-	-	+	+	+
吉 岡		-	-	-	-	-	+	+
梅 原		-	-	-	-	+	+	+
登 尾		-	-	-	-	+	+	+
田 中		-	-	-	-	+	+	+
津 木		-	-	-	-	-	+	+
野		-	-	-	-	-	+	+
澤		-	-	-	-	+	+	+
奥 村		-	-	-	-	-	+	+
細 見		-	-	-	-	+	+	+
太 布		-	-	-	-	-	+	+
中 井		-	-	-	+	+	+	+
奥		-	-	-	-	+	+	+
中 平		-	-	-	+	+	+	+
青 谷		-	-	-	-	+	+	+
伊 藤		-	-	-	-	+	+	+
末 包		-	-	-	-	-	-	+
嶋 川		-	-	-	-	+	+	+
舟 崎		-	-	-	-	-	+	+
山 本		-	-	-	-	+	+	+
白 井		-	-	-	-	+	+	+
淺 越		-	-	-	+	+	+	+
川 林		-	-	-	-	+	+	+
小 岡		-	-	-	-	-	+	+
舟 野		-	-	-	-	+	+	+
岡 上		-	-	-	-	+	+	+
井 木		-	-	-	-	+	+	+
青		-	-	-	-	-	+	+
南		-	-	-	-	-	+	+

菌株名	おふとひん 濃度	1	1	1	1	1	1	1	1
		10,000	100,000	200,000	500,000	1,000,000	2,000,000	5,000,000	10 ⁷
和氣	氣	—	—	—	—	+	+	+	+
宮田	田	—	—	—	—	+	+	+	+
川合	合	—	—	+	+	+	+	+	+
田中	中	—	—	—	—	+	+	+	+
小松	松	—	—	—	—	+	+	+	+
二谷	谷	—	—	—	—	+	+	+	+
森		—	—	—	—	—	+	+	+
増田	田	—	—	+	+	+	+	+	+
布川	川	—	—	—	—	—	+	+	+
涌田	田	—	—	—	—	—	+	+	+
荒木	木	—	—	—	—	—	+	+	+
畑野	野	—	—	+	+	+	+	+	+
安藤	藤	—	—	—	—	—	+	+	+
中村	村	—	—	—	+	+	+	+	+
關戸	戸	—	—	—	+	+	+	+	+

表 説明 +ハ發育セルヲ示シ
 -ハ發育セザルヲ示ス

第 6 項 糖類及ビあるこーる分解作用 (第 7 表)

糖類分解作用ヲ始メテ連鎖菌及ビ肺炎菌ノ分類ニ應用シタノハ1905年 *Fränkel* ガ *Drigalski-Conradi* 氏培養基ニ綠色連鎖菌及ビ粘液性連鎖菌ハ發育良好ニシテ培養基ヲ赤變シ、殊ニ粘液性連鎖菌ハ容易ニ發育シテ粘液性聚落ヲ作ルガ、肺炎菌ハ然ラズト稱シタニ始マリ、其後 *Natvig*, *Gordon*, *Baumgarten*, *Schultze* 等ハ何レモ含水炭素分解能ニヨツテ連鎖菌ノ分類ヲ行ハント試ミタガ其ノ成績ニ就テハ見ル可キモノガナカツタ。然ルニ1908年 *Salomon* ガ糖加腹水寒天ニ依リ連鎖菌ヲ、特ニ粘液性連鎖菌ヲ

(1) ぐりせりん、あらびのーぜ、まんにつとヲ分解シ、らふいのーぜ、可溶性澱粉ヲ分解セザルモノ

(2) 37°C, 24時間ニテハ何レノ糖類ヲモ分解セズ、48時間ニシテ少シク分解シ得ルモノ (就中葡萄糖ヲ主トス)

ノ2種ニ分ツテヨリ漸ク世人ノ注目ヲ集ムルニ至ツタ。次デ *Hiss*, *Arzt*, *Bürger*, *Levy* 等ノ研究ニヨリ肺炎菌、粘液性連鎖菌及ビ連鎖菌等ノ糖類分解作用ハ漸ク明ニサレ、*Hiss* ハ氏創案ノ血清水ヲ用ヒ、本菌ハ肺炎菌ノ如クいぬりんヲ分解スルモ連鎖菌ハコレヲ分解シ得ズト稱シ、爾來多クノ米國學派ノ信ズル所トナリ、本菌ト他ノ連鎖菌トノ重要ナル鑑別點ナリト信ゼラレテ居ル。

(1) 實驗方法

最も重要ナルハ培地デアツテ、含水炭素ヲ含マズ而モ本菌ノ發育ガ充分良好ナルヲ要ス。
連菌又ハ肺炎菌ノ糖類分解試験ニ用ヒラルル培地ノ主ナルモノハ

a. 普通ぶいよん (*Gordon*) 少量デハアルガ糖類ヲ含ム缺點アリ。

b. 血清加ぶいよん及ビ血清加ぺふとん水, (*Holmann*), 少量ノ糖類ヲ含ミ且血清中ノ酵素ノ爲可檢糖類ガ分解セラレ、爲ニ宛モ被檢菌ガ該糖類ヲ分解スルカノ如ク誤ルコトガ屢々アル。余モ血清加ぺふとん水ヲ用ヒ同様ノ失敗ヲ演ジタコトガアル。

c. 血清水 (*Hiss*)

d. *Lingelsheim* 氏培地 (腹水一部ニ寒天三部ヲ加ヘタルモノ)

e. ペふとん加血清水 (*Bürger*)

f. 腹水寒天 (*Salomon*)

a), b) ハ上記ノ如ク不適當デアル。c), f) ノ固形培地ハ菌ノ發育ハ良好デアルガ分解シタカ否カノ鑑別ハ屢々困難デ且分解ガ著明デナイト識別不能ノ缺點ガアル。結局用ヒラルルモノハ *Hiss* 氏血清水及ビ *Bürger* 氏ぺふとん加血清水ノミデアル。此ノ兩者ハ大差ナシト稱セラレルガ余ノ實驗ニ依レバ後者ハ前者ヨリモ遙ニ本菌培地トシテ適シ、血清水中ニ於テハ分解セザルモノモぺふとん加血清水中ニ於テハ屢々分解スルヲ見ル。依テ余ハぺふとん加血清水ヲ用ヒタ。

(a) 培地製法。牛血清 1 分ニ 1.3% ペふとん水 ($P_H 7.4-7.6$) 3 分ヲ加ヘタルモノニ被檢糖類ヲ 1% 加ヘ適宜ニらくむす液ヲ加ヘタルモノヲ約 2cc 宛小試験管ニ分注シ、*Koch* 氏蒸氣釜ニテ 15 分宛 3 日間間歇滅菌セルモノヲ用ヒタ。而シテ牛血清中ニハ葡萄糖ヲ比較的多量ニ含ムモノガアルカラ、血清中ノ葡萄糖分解ト加ヘタル糖分解ニヨル誤謬ヲ避クル爲、豫メ糖ヲ加ヘザル培地ヲ對照トシ糖ヲ加ヘナイ培地ニ菌ヲ接種シテ培地ノ赤變又ハ凝固ヲ來シタモノハ除外シタ。

(b) 被檢糖類及ビあるこーる。單糖類トシテらむのーぜ、さしろーぜ、葡萄糖、果糖、がらくとーぜ、まんのーぜ、二糖類トシテ庶糖、麥芽糖、乳糖、三糖類トシテらふいのーぜ、多糖類トシテデキスとりん、可溶性澱粉、いぬりん、ぐりこーげんヲ、ぐるこしーどトシテざりちん、高級あるこーるトシテ、そるびつと、あどにつと、まんにつと及ビぐりせりんノ 19 種類ヲ用ヒタ。製品ハ總テ *Merck* 製ヲ用ヒタ。いぬりん分解ニハ特ニ注意ヲ拂ツタ。いぬりん製品ニハ

(イ) Alant starch Lot I (*Merck*)

(ロ) Alant starch Lot II (*Merck*)

(ハ) Inulin (highest Purity) (Merck)

(ニ) Inulin white (Merck)

(ホ) Inulin white (Bauschant Lomb)

等ガアルガ余ハ(ニ)ヲ用ヒ、1菌株=3本宛ノ試験管ヲ使用シタ。

(2) 實驗成績及ビ考按

分離後久シカラザル菌ノ血液寒天 37°C 、24時間培養1白金耳ヲ被檢培地ニ加ヘ、翌日ヨリ2週間最初5日間ハ毎日以後ハ3日置キニ連續2週間觀察セルモノヲ成績トシタ。表ニ示ス如ク單糖類中 Hexose (葡萄糖、果糖、がらしとーゼ、まんのーゼ) 二糖類中乳糖、麥芽糖、蔗糖、及ビ三糖類(らふいのーゼ)ハ分解セザルモノハ例外的デ大部分分解シテ培地ヲ赤變スルノミナラズ凝固ヲ來サシメル。就中葡萄糖及ビ乳糖ハ被檢73菌株ハ例外ナク培地ノ赤變、凝固ヲ來ス。Pentose ハ分解スルコト少ク、らむのーゼハ59菌株中僅ニ2菌株ガ培地ノ赤變ヲ來セルノミデ、きしろーゼハ73菌株中分解スルモノ64菌株ニ達スルガ培地ヲ赤變スルノミデ凝固ヲ來セルモノハ極メテ小數デアル。多糖類中、可溶性澱粉及ビデキスとりんハ大部分ノ菌株ハ培地ノ赤變及凝固ヲ來スガ、ぐりこーげんハ分解スルモノ僅ニ8菌株ニ過ギズ而モ培地ノ凝固ヲ來サナイ。

いぬりんハ大部分ノ菌株ハコレヲ分解シテ培地ノ赤變凝固ヲ來ス(73菌株中59菌株)ざりちんハ培地ノ赤變ヲ來スモ凝固ヲ來サズ、あるこーる類ハ一般ニ分解セラズ僅ニぐりせりんヲ7菌株ガまんにつとヲ12菌株ガ分解スルノミデあどにつと、そるびつとハ分解スル菌株ナシ。

要スルニ本菌ハ可成多クノ糖類ヲ分解シ得ルモノデ特ニ單糖類中 Hexose、2糖類、3糖類及ビ多糖類中ノ一部ハ殆ド全部ノ菌株ガ分解スルモノデアツテ、從來本菌ハ多クノ糖類ヲ分解セズト稱サレタノハ一ニ培地ノ選擇ヲ誤ツタ爲ト思考スル。又 Hiss, Park and Williams, Bürger, Levy 等ハ本菌ハいぬりんヲ分解シ、コレヲ以テ肺炎菌ニ極メテ近キモノ或ハ肺炎菌ニ屬ス可キ大ナル根據トナシ、一部ノ研究者ハ本菌ト肺炎菌Ⅲ型トヲ同一ナリト見做シタ。勿論此等ノ研究者モ分解セザル菌株ノ存在ヲ認メテキルガ、余ノ實驗ニヨレバ大部分ハいぬりんヲ分解シ培地ノ赤變凝固ヲ來スガ、分解セザルモノ亦20%ニ達スルコトヲ知り得タ。

近來 Glym ハ Phenolrot ヲ指示藥トナシ Puffersalz ヲ以テ培地ノ pH ヲ7.8トナセバ連菌モ大部分ハいぬりんヲ分解シ得ルモノナリト稱シテキルガ其ノ說ノ正否ハ知ラズ、連菌中ニモいぬりんヲ分解スルモノガ存在シ、肺炎菌中ニモ分解セザルモノノ存スルハ當然デ、いぬりん分解ノミニヨリ連菌ナリヤ肺炎菌ナリヤノ斷ヲ下スハ不當ナリト云ハザルヲ得ナイ。併シ本菌ガ大部分いぬりんヲ分解スルコトニ依ツテ肺炎菌ニ屬スル根據ノ一トハナシ得ルモノト考ヘルモノデアアル。

Holmann, Brown 等ハ連菌ヲ糖類特ニ乳糖まんにつと 及びざりちん分解ノ如何ニヨリ種々ニ分類ヲ試ミタガ、本菌ハ乳糖ハ例外ナク分解シ、まんにつと、ざりちんハ分類スルモノ及ビシナイモノ等類ル複雑デ彼等ノ分類ニ從ヘバ、本菌ハ更ニ數種ニ分類セラレル事トナルガ、本菌ヲ糖類分解ノミニ依ツテ更ニ分類ヲ試ミシトスルハ理論上當ヲ得タモノニ非ズト信ズル。

第 7 項 動物ニ對スル病原性ニ就テ

粘性連菌ガ試験動物ニ對シテ強キ病原性ヲ有スルコトハ諸家ノ等シク認ムル所デアル。即 Howard und Perkins, Neumann 等ハ、まうす、海狸及ビ家兎ニ對シ病竈ヨリ分離直後ノ菌ハ毒力強ク人工培養ヲ重ネルト急速ニ毒力ヲ失フト稱シ、Bonome ハまうす、家兎ニハ高キ病原性ヲ有スルガ海狸ニ對スル病原性ハ低ク且毒力ハ人工培養ニヨリ急速ニ低下スト稱シタ。然ルニ Schottmüller ハ諸種動物ニ高キ毒力ヲ有スルガ人工培養ニ依リ毒力ハ低下セズト主張シ、Wirth, Schumacher, Bürger 等モ數ヶ月間ハ毒性ヲ保有シ得ト稱シテキル。

余ハまうす、海狸及ビ家兎ヲ用ヒテ本菌ノ病原性ヲ檢シ、コノ 3 種ノ試験動物ニ對スル毒力ガ平行スルモノナリヤ否ヤ、又人工培養ニ依リ毒力ガ如何ニ低下スルカ、モシ低下スルトスレバ 3 種ノ動物間ニ平行ニ低下スルヤ否ヤヲ檢シタ。

(1) まうすニ對スル病原性 (第 8—10 表)

先腹腔内注射ニ依ル毒性ヲ檢スルニハ體重 10—13g ノまうすヲ使用シ、中耳耳漏ヨリ分離直後ノ本菌ヲ 10—20% 家兎血清 ぶいよん 37°C 24 時間培養セルモノヲ、所要菌量ヲ 0.5cc 中ニ含有スル様生理的食鹽水ヲ以テ稀釋シ、腹腔内ニ注射後 7 日間觀察シタ。斃死セルモノハ全部死後可及的短時間内ニ心血ヨリ塗抹標本ニ依リ本菌ノ證明ヲ行ツタ。

實驗成績。表ニ示ス如ク分離直後ノ本菌ノまうすニ對スル病原性ハ極メテ強ク、被檢菌 50 菌株中最モ強キハ血清 ぶいよん 37°C 24 時間培養 10⁻⁸cc ニテヨク 5 日以内ニまうすヲ斃死セシメ (4 菌株)、以下最小致死量 10⁻⁷cc 15 菌株、10⁻⁶cc 7 菌株、10⁻⁵cc 15 菌株、10⁻⁴cc 6 菌株、10⁻³cc 2 菌株、10⁻²cc 1 菌株ニテ最モ多イノハ 10⁻⁴—10⁻⁶cc デアツタ。

斃死まうすハ總テ敗血症ニヨリ斃レ心血ハ多少粘稠デらつく色ヲ呈シテ殆ド凝固セズ、中ニ無數ノ本菌ヲ證明ス。まうす心血中ノ本菌ハ主トシテ双球菌狀ヲ呈シテ所謂蛆形 (Fliegenmadenform) ヲ呈スルコトハ稀デアル。胸腔内ハ黃色粘稠ナル溶出液ニテ充サルルコト多ク、時ニ出血ノ爲胸腔全體特ニ心臟周圍ハらつく色ノ血液デ充滿サルルコトガアル。腹腔内モ黃色粘稠甚ダシク濁濁シ縷ヲ引ク滲出液ニテ充サレ、白色纖維素様物質ニテ被ハレ肝、脾等ニ肥大ヲ認メル。滲出液中ニハ無數ノ本菌ヲ證スル。

皮下注射法ニ依ル時ハ腹腔内注射法ニ依ルヨリモ多量ノ菌量ヲ必要トスルガ最小致死量ハ

尙 10^{-3} — 10^{-3} ccデまうすハ總テ敗血症ニテ斃レ常ニ汎發性化膿性腹膜炎ヲ伴ツテキルコトハ興味アル事實トイフコトガ出來ル。

貯藏菌株(血液寒天斜面培養ヲ繼續セルモノ)ニ於テハ一般ニ著シキ毒力ノ低下ヲ來スガ、殆ド低下ノ認メラレザルモノ(例ヘバ荒川菌株)モ存シ一様デハナイ。併シ一般ニハ表面培養ニ依ツテハ毒性ノ急激ナル低下ヲ來スノハ吾人ノ想像以上デ、遂ニハ血清ぶいよん 1ccヲ注射シテモまうすヲ斃シ得ザルモノモ存シ、荒川菌株ノ如キハ實ニ例外トモ稱スベキモノナリト思考スル。

(2) 海狸ニ對スル病原性 (第11表)

Bonome 以來本菌ハ海狸ニハサシテ強キ毒性ヲ有セザルモノト信ゼラレテキル。余ノ實驗ニ依ルモ病原性ハサシテ強カラズ、300—400gノ海狸ニハ腹腔内注射ニ依ルモ最小致死量ハ尙1ccヲ要スルコトガ多イ。斃死海狸ノ剖見所見ハまうすノ其レト殆ド等シク總テ汎發性化膿性腹膜炎ヲ惹起シテキルガ心血ヨリノ本菌ノ證明ハ屢々不可能ノコトガアル。

(3) 家兎ニ對スル病原性 (第12表)

連菌ガ家兎ニ對シテ強キ病原性ヲ有スルコトハ衆知ノ事實ニシテ極メテ少量ノ連菌ノ皮下感染ニ依ツテ速ニ全身感染ニ依リ斃死スルモノトサレ、肺炎菌モ亦極メテ強キ病原性ヲ有シ *Pane* ハ内汁培養 0.5×10^{-7} cc, *Mennes* ハ肺炎菌感染家兎血液 10^{-8} ccニヨツテヨク全身感染ニヨリ斃死セシメ、殊ニ強毒性菌株ニ於テハ感染局所ノ何處タルヲ問ハズ、全身感染ニ依リ斃ルモノトサレテキル (*Neufeld*)。即兩者ハ何レモ家兎ニ對シテハ病原性極メテ強ク全身感染ニヨリ斃死セシメルガ、肺炎菌ハ連菌ヨリモ遙ニ強キ病原性ヲ有スルモノノ如クデアル。余ハ果シテ本菌ガ家兎ニ對シテ強キ病原性ヲ有スルヤ否ヤ、又果シテ容易ニ全身感染ヲ惹起シ得ルモノナリヤ否ヤニ就イテ實驗ヲ行ツタ。

實驗成績。表ニ示ス如ク本菌ハ家兎ニ對シテハ殊ニ幼若家兎ニ對シテモ期待ノ如キ強イ病原性ヲ有セズ。體重 1kg 内外ノモノニ對シテモ血清ぶいよん培養ヲ少ク共 0.1cc 要スル。即溶血性連菌及ビ肺炎菌ニ於ケル *Pane*, *Mennes* ノ成績トハ大差ガアル。抑々肺炎菌ニ於テハⅡ及ビⅢ型ハⅠ型ニ於ケルガ如ク家兎ニ對シテ強キ病原性ヲ有セズトサレテ居ルガ、本菌ガ後述スル如クⅢ型及ビ *Gruppe X* ニ屬スルモノトスレバ肺炎菌型ニ依リ家兎ニ對スル病原性ニカクノ如ク大差ヲ認メ得ルノハ興味アル事實デアル。

次ニ斃死シタモノノ剖見スルニ、まうすニ於ケルガ如ク胸腔及ビ腹腔ハ灰黃色粘稠ナル滲出液ニテ充サレ、心血ハらつく色ヲ呈シテ凝固セズ、内ニ多數ノ本菌ヲ認ム。菌ハ多ク双球菌狀ヲ呈シ稀ニ短連鎖ヲ形成スルモノガアリ、莢膜ハ可成著明デアル。脾臓、肝臓等ノ腫大ヲ證明スルガ孤立性化膿ヲ認メ得タコトハナイ。即汎發性化膿性腹膜炎及ビ敗血症ニテ斃

死セルフ知り得タ。

第 8 表 まうすニ對スル毒力試験（腹腔内注射）

菌株名 \ 注射量	荒 川	今 井	武 市	三 橋	緒 方	大 西
10 ⁻³ cc	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+1 +2 +2	+1 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2
10 ⁻⁴	+2 +3 +3	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2
10 ⁻⁵	0 0 0	+2 +3 0	+2 +3 +3	+2 +2 +2	+2 +3 +3	+2 +3 +3
10 ⁻⁶	0 0 0	0 0 0	+3 +4 0	+2 +2 +3	+2 +3 +3	+2 +3 +3
10 ⁻⁷	0 0 0	0 0 0	0 0 0	+3 +3 +4	+3 +3 +3	+3 +3 0
10 ⁻⁸	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 +4	0 0 0
最小致死量	10 ⁻⁴ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁶ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁷ cc

菌株名 \ 注射量	廣 辻	上 田	高 堂	駒 井	野 間	細 見
10 ⁻³ cc	+1 +2 +2	+2 +2 +2	+1 +2 +2	+2 +2 +2	+1 +2 +2	+2 +2 +2
10 ⁻⁴	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+3 +4 0	+2 +2 +2	+2 +2 +2
10 ⁻⁵	+2 +3 +3	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+3 +5 0	+2 +2 +2	+2 +2 +2
10 ⁻⁶	+3 +3 0	+2 +3 +3	+2 +2 +3	0 0 0	+2 +2 +2	+2 +2 +2
10 ⁻⁷	+3 +4 0	+3 +3 0	+3 +3 +4	0 0 0	+3 +3 +3	+3 +4 0
10 ⁻⁸	0 0 0	0 0 +4	0 0 +4	0 0 0	+3 +5 0	0 0 0
最小致死量	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁸ cc	10 ⁻⁷ cc

菌株名 \ 注射量	中 村	小 田	三 澤	樫 木	西 田	仲
10 ⁻³ cc	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+1 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2
10 ⁻⁴	+2 +2 +2	+2 +3 0	+2 +2 +2	+2 +2 +3	+2 +2 +2	+3 +3 +3
10 ⁻⁵	+2 +2 +2	0 0 0	+2 +2 +2	0 0 0	+2 +2 +3	+3 +3 +3
10 ⁻⁶	0 0 0	0 0 0	+2 +2 +2	0 0 0	+3 +3 +3	+3 +3 +3
10 ⁻⁷	0 0 0	0 0 0	+3 +3 +3	0 0 0	+2 +3 +3	0 0 0
10 ⁻⁸	0 0 0	0 0 0	+3 +4 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
最小致死量	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁴ cc	10 ⁻⁸ cc	10 ⁻⁴ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁶ cc

菌株名 \ 注射量	鹽 貝	竹 本	瀬 川	木 村 I	長	堀 江
10 ⁻³ cc	+1 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +3 +3	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2
10 ⁻⁴	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2
10 ⁻⁵	+2 +2 +2	+2 +2 +2	0 0 0	+2 +2 +2	+2 +3 +3	+2 +2 +4
10 ⁻⁶	+2 +2 +2	0 0 0	0 0 0	+2 +2 +3	0 0 0	0 0 0
10 ⁻⁷	0 0 +4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 ⁻⁸	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
最小致死量	10 ⁻⁶ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁴ cc	10 ⁻⁶ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁵ cc

菌株名 注射量	樋口	西	木村Ⅰ	林	日下部	梅原Ⅰ	吉岡	梅原Ⅱ	登尾
10 ⁻³ cc	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2
10 ⁻⁴	+2	+2	+2	+2	+2	+3	+2	+2	+2
10 ⁻⁵	+3	+2	+2	+3	+2	0	+4	+2	+3
10 ⁻⁶	0	+3	+3	0	+3	0	+4	0	+3
10 ⁻⁷	0	+4	0	0	+3	0	0	0	+4
10 ⁻⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最小致死量	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁶ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁴ cc	10 ⁻⁶ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁷ cc

菌株名 注射量	田中	津田	野木	澤	奥本	細見	太布	奥	青谷
10 ⁻³ cc	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	0
10 ⁻⁴	+3	+3	+2	+2	+2	+2	+3	+2	0
10 ⁻⁵	0	+3	+3	+3	+2	+2	+3	+4	0
10 ⁻⁶	0	+4	0	+3	+3	+3	0	0	0
10 ⁻⁷	0	+4	0	+3	+4	+3	0	0	0
10 ⁻⁸	0	0	0	0	0	+4	0	0	0
最小致死量	10 ⁻⁴ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁸ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻² cc

菌株名 注射量	島川	舟崎	小林	川越	南	宮田	川合	涌田
10 ⁻³ cc	+1	+1 +2 +2	+2	+2	+2 +2 +2	+2	+2	+2 +2 +2
10 ⁻⁴	+2	+2 +2 +2	+2	+2	+2 +2 +3	0	0	+2 +2 +2
10 ⁻⁵	+2	+3 +3 +4	+2	+2	+3 +4 0	0	0	+2 +3 +3
10 ⁻⁶	+3	0 0 0	0	+3	0 0 0	0	0	+3 +4 +4
10 ⁻⁷	+3	0 0 0	0	0	0 0 0	0	0	0 0 0
10 ⁻⁸	+4	0 0 0	0	0	0 0 0	0	0	0 0 0
最小致死量	10 ⁻⁸ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻³ cc	10 ⁻³ cc	10 ⁻⁶ cc

+ハ試験ノ斃死セルヲ、傍ノ数字ハ注射後幾日目ニ死亡セルカヲ示ス。例ヘバ +3 ハ注射後 3 日目ニ斃死セルヲ示ス。

0 ハ観察期間中生存セルヲ示ス。

第 9 表 皮下注射ニ依ルようすニ對スル毒力試験

菌株名 注射量	西田	西	吉岡	田中	野木
10 ⁻¹ cc	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2
10 ⁻²	+2 +2 +2	+2 +2 +3	+2 +2 +3	+3 +3 +3	+3 +3 +3
10 ⁻³	+2 +3 +3	+3 +3 +3	+4 +4 0	+3 +3 +4	+3 +3 +3
10 ⁻⁴	+3 +4 +4	+3 +3 +4	0 0 0	+4 +4 0	+3 +4 0
10 ⁻⁵	+4 +4 0	+3 +4 +4			0 0 0
10 ⁻⁶	0 0 0	+4 +4 0			

菌株名 注射量	西 田	西	吉 岡	田 中	野 木
最小致死量	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁶ cc	10 ⁻³ cc	10 ⁻⁴ cc	10 ⁻⁴ cc
腹腔内注射 最小致死量	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁶ cc	10 ⁻⁴ cc	10 ⁻⁵ cc

第 10 表 貯蔵菌株ノ毒力

菌株名 貯蔵期間 注射量	荒 川 10ヶ月	今 井 9ヶ月	三 橋 7ヶ月	南 6ヶ月	三 澤 3ヶ月	西 田 2ヶ月	西 1ヶ月
1.0cc			+2 +2 +2	0 0 0			
0.1	+1 +2 +2	+2 +3 0	+3 0 0	0 0 0	+1 +2 +2	+2 +2 +3	+1 +2 +2
0.01cc	+2 +3 +3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	+2 +2 +3	+3 +3 +3	+2 +2 +2
0.001	+3 +3 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	+3 0 0	+4 0 0	+3 0 0
0.000.1	0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
0.000.01					0 0 0	0 0 0	0 0 0
最小致死量	10 ⁻³ cc	10 ⁻¹ cc	1cc	/	10 ⁻² cc	10 ⁻² cc	10 ⁻² cc
分離直後 最小致死量	10 ⁻⁴ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁸ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁷ cc

第 11 表 海獺ニ對スル毒力試験 (腹腔内注射)

菌株名 注射量	西 田	堀 江	三 澤	吉 岡	田 中
10cc	+2 +3 +3	+1 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2	+2 +2 +2
5	+3 +3 +3	+2 +3 +3	+3 +3 0	+2 +3 +3	+2 +2 +3
1	+3 0 0	+3 +4 0	0 0 0	+3 +4 0	+3 0 0
0.5	0 0 0	0 0 0	0 0 0	+3 0 0	0 0 0
0.1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
まうすニ對スル 最小致死量	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁵ cc	10 ⁻⁸ cc	10 ⁻⁶ cc	10 ⁻⁴ cc

第 12 表 家兎ニ對スル毒力試験 (靜脈内注射)

菌株名 注射量	西 田	三 澤	細 見	榎 木	堀 江
10cc	+3 體重1000	+3 體重1100	+2 體重1030	+2 體重1000	+2 體重 950
5	+2 930	+3 950	+3 1250	+3 1100	+3 950
1	0 1100	+4 950	+4 850	+3 1200	+3 1100
0.1	0 1050	0 1000	0 950	0 900	+4 850
まうすニ對スル 最小致死量	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁸ cc	10 ⁻⁷ cc	10 ⁻⁴ cc	10 ⁻⁵ cc

第 8 項 毒力ノ維持ニ就テ

前述セル如ク人工培養ヲ繼續スル時ハ漸次溶血作用ヲ獲得シ、粘液產生能及ビ毒力ヲ失ヒ

莢膜ヲモ消失スルニ至ル。カカル場合液體培地殊ニ血清ぶいよんニ培養スル時ハ比較的長ク毒力ヲ維持セシメ得ルガ尙數代ノ移植ニヨリ毒性ハ可成低下スルニ至ルヲ認メル。然ラバ毒力ヲ長ク保持セシメルニハ如何ナル方策ヲ講ズ可キデアルカ。

(1). 肺炎菌ノ毒力ヲ維持セシムルニハ *Heim* ハ絹絲ニ感染動物ノ心血ヲ浸シ乾燥器中ニ保存スレバ4—5ヶ月間モまうすニ對スル毒性ヲ失ハズト稱シ、*Supfle* モ培養シ難イ病原性莢膜連鎖菌ハまうすニ對スル毒力強ク、*Heim* 氏法ニ從ヘバ毒力ヲ失ハズシテ4ヶ月間保存シ得タト稱シタ。余モ本菌ガ少ク共肺炎菌ニ極メテ近似ノ菌ナルコトヲ知り得タカラ本法ヲ應用シタニ長キハ1ヶ年短キモ2ヶ月間保存シ得ルコトヲ認メタ。又保存ニハ心血ヲ絹絲ニ浸スヨリモ心臓及ビ實質性臟器殊ニ脾臟ヲ摘出シテ乾燥器中ニ貯ヘ、用ニ臨ミテ滅菌乳鉢ニテ磨碎後血清ぶいよん中ニ投入スルヲ可トスル。本法ニ依ル時ハ毒力ノ低下ヲ認メタコトハナイ。

(2) 眞柄氏法、即5%枸橼酸曹達加家兔血液内貯藏法

1935年眞柄氏ハ肺炎菌ハ5%枸橼酸曹達加家兔血液内ニ培養スル時ハ、まうす通過ヲ施シタノト同様ニ數回ニシテまうすニ對スル毒力ヲ増強シ得ト稱シタ。余モ前述セル如ク本法ニヨリ本菌ノ毒力ヲ増強セシメ得ルコトヲ知り得タガ、毒力ヲ増強セシメ得ルナラバ當然コレヲ維持セシメ得ルニ非ズヤト考ヘ毒力強大ナル本菌ヲ本培養基ニ接種シタノニ植繼ヲ毎日行ヘバ本培養基中ニ於ケル生存期間中ハ略々毒力ヲ維持セシメ得ルガ、植繼期間ヲ1週間—10日間トスレバ往々却ツテ低下スルコトガアルヲ認メタ。又本培養基ハ時ニ本菌ノ發育シ難イ缺點ガアルガ、他ノ人工培養法ハ總テ著明ニ毒力ヲ減弱セシメルカラ、本法ハ動物體外保存法トシテハ最も適當ナルモノト思考スル。

第3節 免疫學的研究

1903年 *Schottmüller* ガ粘液性連鎖菌各種ノ化膿竈及ビ肺炎患者ノ喀痰ヨリ分離報告シテカラ、コノ特殊ノ性狀ヲ具ヘタ菌ニ關スル研究ハ輩出シ、殊ニ *Dochez and Gillespie* ガ免疫血清ノ感染防禦力ヲ標準トシテ肺炎菌62菌株ヲ分類シテヨリ、本菌ハ肺炎菌Ⅲ型即粘液性肺炎菌ト同一ノモノナリト稱シ、次デ *Hannes* ガ肺炎菌ト粘液性連鎖菌間ニハ補體結合反應陽性ナルニ拘ラズ、溶血性連鎖菌ト粘液性連鎖菌トノ間ニハ何等ノ關係ナキコトヲ主張シテヨリ、本菌ハ殊ニ米國ニ於テハ粘液性肺炎菌ナル特殊ノ肺炎菌トシテ認メラルルニ至ツタ。然ルニ他方コレニ反對スル學派モアリ、其ノ免疫學的研究モ肺炎菌Ⅰ、Ⅱ型ニ比シ頗ル等閑ニ附セラレタル憾ガアル。依テ余ハ本菌ガ果シテ肺炎菌ナリヤ肺炎菌ナラバⅢ型ト免疫學的ニ如何ナル關係ヲ有スルヤ否ヤニ就テ研究ヲ行ツタ。

第 1 項 凝集反應 (第13—15表)

本實驗ニ於テハ本菌ガ肺炎菌Ⅰ—Ⅲ型血清ノ何レニ凝集セラルルカ、又本菌ヲ以テ免疫シタ血清ハ既知肺炎菌ノ何レノ型ヲ凝集スルカ、又多クノ本菌間ニハ免疫學的ニ近親關係アリヤ否ヤヲ定メル爲本菌ノ或ル菌株ハ他菌株ノ免疫血清ニヨリ凝集セラルルヤ否ヤ等ニ就テ實驗ヲ行ツタ。

(1). 本菌ハ肺炎菌Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ型血清ノ向レニ凝集セラルルカ. (第13表)

(イ). 供 試 材 料

被檢菌株ハ余ガ中耳ヨリ分離シタ本菌73菌株中68菌株ヲ使用シタ。標準血清ハ本教室所藏ノ肺炎菌Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ型、及ビ北里研究所ヨリ分譲ヲ受ケタル肺炎菌Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ型ヲ以テ家兎ヲ免疫シテ得タルモノデアル。(一部ハ傳染病研究所ヨリ分譲ヲ受ケタⅢ型ノ家兎免疫血清チモ使用シタガ省略スル)。

家兎免疫方法ニ就テ

肺炎菌ノ家兎免疫ニハ生菌ヲ用フル必要ナシト稱スルモノ (Neufeld, 吉岡) 生菌ヲ要スト稱スルモノ (田中) 等ガアリ所説一定セズ。又肺炎菌免疫ニハ少ク共 5—6 回ノ注射ヲ必要トスト信ゼラレテキルカラ余ハ60°C, 30分ニテ殺菌シタ菌ヲ生理的食鹽水ニ浮游セシメタモノヲ 0.5mg, 1mg, 2mg 宛各 5 日目毎ニ注射シタ後更ニ同様ノ死菌ヲ 3mg, 4mg 注射セルモノト 4 回目以後生菌ヲ 0.5mg, 1mg, 2mg 宛各 5 日目毎ニ注射セルモノトヲ比較シタノニ凝集價ハ後者ガ稍々高キヲ認メタ。依テ以後家兎免疫ニハ初 3 回死菌, 4 回目ヨリ 3—4 回生菌ヲ注射スルコトトシタ。但粘液性連菌血清ノ凝集價ハ如何ニシテモ 40—160 倍デ Ⅰ, Ⅱ型ノ如ク凝集價ノ高い血清ヲ得ルコトハ出来ナカツタ。又肺炎菌免疫ニ Cole ノ推賞スルぶいよんノ 12—15 時間培養ヲ注射スル方法 (最初ノ 1 週間ハ連續 1cc 宛注射, 1 週間休止後又 1 週間連日注射スル方法) モ本菌ニ就イテハ特ニ良好ナル成績ヲ擧ゲ得ナカツタ。加之本菌ハぶいよんニハ屢々發育シ難ク連日ノ注射材料ヲ得ルニ困難ナルノ缺點ガアリ。良好ナル方法ナリトハ稱シ難イ。

(ロ). 實 驗 方 法

標準血清ヲ Ⅰ, Ⅱ型ハ 20 倍, Ⅲ型ハ 5 倍ニ生理的食鹽水デ稀釋セルモノ 0.5cc ト血液寒天 24 時間培養ノ菌 10mg ヲ 10cc ノ生理的食鹽水ニ浮游セシメタルモノ 0.5cc トヲ混和セルモノヲ 37°C ノ孵籠中ニ 4 時間オキ翌朝迄室温 又ハ氷室ニ放置シテ成績ヲ判定シタ。(疑ハシキ場合ハ Agglutinoskop ヲ用フ)。尙對照トシテ菌ヲ生理的食鹽水ニ浮游セシメタルモノヲ使用シタガ自發凝集ヲ認メタルコトハナイ。

(ハ). 實 驗 成 績

第13表ニ依リ本菌ハ73菌株中62菌株ハ本教室或ハ北研所藏ノ肺炎菌Ⅲ血清ノ何レカニ凝集サレ而モ大部分ハ兩血清ニ依リ凝集セラレ、兩血清ノ何レニモ凝集セラレナイノハ僅ニ11菌株ニ過ギズ、即本菌ノ80%ハ肺炎菌Ⅲ型ニ免疫學的ニ密接ナル關係アルコトヲ知り得タ。Ⅱ型ニ輕度ニ凝集セラルルモノ 4 菌株ヲ認メタガ共ニⅢ型血清ニヨリⅡ型血清ヨリモ強ク凝集セラルルカラ、Ⅱ型ヨリモⅢ型ニ屬ストスルヲ至當トセン。更ニ茲ニ注意スベキハ標準血清ノ如何ニ依リ特定ノ菌株ハ凝集セラルルコト及ビ凝集セラレザルコトノ有ルコトデアル、即

本實驗ニ於ケルガ如ク稀ニ本教室所藏ノ肺炎菌Ⅱ型及ビ北研所藏ノ肺炎菌Ⅱ型ノ一方ニ凝集セラルルニ拘ラズ、他方ノ血清ニ凝集セラレナイコトノ存スルノハ本菌ノ如ク免疫反應施行

第 13 表 檢菌株ノ既知菌免血清ニ對スル凝集試驗

被檢菌株名	既知菌免血清	肺炎菌			
		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ(教室)	Ⅳ(北研)
荒	川	-	-	+	+
今	井	-	-	+	±
武	市	-	-	+	+
三	橋	-	-	+	±
緒	方	-	-	+	+
大	西	-	-	-	-
廣	辻	-	-	+	+
上	田	-	-	±	+
高	堂	-	-	+	±
駒	井	-	-	+	+
野	間	-	-	+	+
細	見	-	-	-	-
中	村	-	-	+	+
小	田	-	-	+	+
三	澤	-	-	+	+
權	木	-	-	+	+
西	田	-	-	+	-
仲	川	-	±	-	+
	村	-	-	+	+
瀨	貝	-	-	±	+
木	本	-	-	+	+
鹽	長	-	-	+	+
竹	江	-	-	+	±
堀	口	-	-	+	-
	村	-	-	+	+
西	林	-	-	+	±
木	下	-	-	±	±
日	部	-	-	-	-
梅	原	-	-	+	+
吉	岡	-	-	-	-
梅	原	-	±	+	+
登	尾	-	-	+	+
田	口	-	-	±	+
津	田	-	-	+	+
野	木	-	-	+	+
澤		-	-	+	+

被檢菌株名	既知菌免血清	肺炎菌			
		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ(教室)	Ⅳ(北研)
奥	本	-	-	+	+
細	見	-	±	+	+
太	布	-	-	+	+
中	井	-	-	+	+
奥	奥	-	-	+	+
	奥	-	-	-	+
中	平	-	-	+	-
青	谷	-	-	+	+
伊	藤	-	-	+	±
末	包	-	±	+	+
嶋	川	-	-	+	+
舟	崎	-	-	+	+
山	本	-	-	+	+
白	井	-	-	±	+
淺	井	-	-	-	+
川	越	-	-	+	+
小	林	-	-	±	+
舟	岡	-	-	±	±
岡	野	-	-	+	+
井	上	-	-	+	+
青	木	-	-	+	-
南	南	-	-	+	+
	南	-	-	+	+
和	氣	-	-	+	+
宮	田	-	-	+	+
川	合	-	-	+	+
田	中	-	-	-	-
小	松	-	-	-	-
二	谷	-	-	+	+
森	森	-	-	-	-
	森	-	-	+	+
增	田	-	-	+	-
布	川	-	-	-	-
涌	田	-	-	-	-
荒	木	-	-	-	-
畑	野	-	-	±	+
安	藤	-	-	+	+
中	村	-	-	+	+
關	戸	-	-	-	-

第14表 既知菌ノ被檢菌免疫血清

=對スル凝集試験

被檢菌	既知菌	肺炎菌 I	肺炎菌 II	肺炎菌 III(教室)	肺炎菌 IV(北研)
血清免疫					
中瀬	村川	—	—	+	+
仲		—	—	+	±
西	田	—	±	+	+
榑	田	—	—	±	+
駒	木	—	—	—	+
野	井	±	—	+	±
	間	—	—	+	+
西林		—	—	+	+
		—	—	—	+
細木	見	—	—	+	+
日	村	—	—	+	+
細	部	—	—	±	+
中	見	—	—	+	+
太	井	—	—	+	—
津	布	—	—	+	+
奥	田	—	—	+	+
竹	本	—	—	+	—
小	本	—	—	+	+
吉	田	—	—	+	—
野	岡	—	—	±	+
梅	木	—	—	+	+
	原	—	—	+	+

ノ困難ナル菌ニ於テハ出來得ルナラバ2個以上ノ標準血清ヲ用フルノヲ可トスルノデハアルマイカ。

第14表ニ依レバ本菌ノ免疫血清ハ肺炎菌III型ヲ凝集シ殊ニ肺炎菌III型血清ニ凝集サレザル中、細見、梅原等ノ諸菌株ノ免疫血清モ共ニ肺炎菌III型ヲ凝集スル。更ニ第15表ニ依リ本菌相互間ニハ凝集反應ニ依リ極メテ密接ナル關係アルヲ證シ得タ。殊ニ第15表ニ依リ Gruppe X ト目ス可キ菌株トIII型ニ屬ス可キ菌株トノ間ニモ密接ナル免疫學的關係アルヲ知り得タ。

要スルニ本菌ノ80%ハ肺炎菌III型血清ニ依リ凝集サレ其ノ免疫血清ハ肺炎菌III型ヲ凝集スル。且培養所見ノ等シキ本菌相互間ニハ肺炎菌III型血清ニ對スル凝集性ノ如何ニ拘

第15表 被檢菌ノ他ノ被檢菌

免疫血清ニ對スル凝集試験

被檢菌免疫血清	中村
他ノ被檢菌株	
野 木	+
西 田	+
仲 田	+
小 田	+
中 井	+

被檢菌免疫血清	駒井
他ノ被檢菌株	
奥 本	+
小 田	+
野 木	+
林 田	+
津 田	+

被檢菌免疫血清	西
他ノ被檢菌株	
奥 布	+
太 布	+
細 見	+
中 井	±
中 平	—

被檢菌免疫血清	日下部
他ノ被檢菌株	
奥 布	+
太 布	+
細 見	+
中 井	±
中 平	+

被檢菌免疫血清	奥本
他ノ被檢菌株	
津 田	+
細 見	+
太 布	+
西 田	+
西 田	+

ラズ免疫學的ニ極メテ密接ナル關係アルコトヲ認メ得ル。

第 2 項 補體結合反應 (第16—19表)

Hannes ハ肺炎菌ノ補體結合反應ハ粘液性連鎖球菌ト肺炎菌トノ間ニハ陽性デアガ溶血性連鎖球菌トノ間ニハ何等ノ關係ナキコトヲ證シ、次デ高野及ビ田中兩氏ハ補體結合反應ハ總テノ肺炎菌ニ共通ナルコトヲ證明シタガ、爾來肺炎菌ノ免疫學的研究ニ關シテハ凝集反應及ビ沈降反應ガ盛ニ行ハルルニ反シ補體結合反應ハ應用セラルル事ガ極メテ稀デアツタ。余ハ凝集反應ニ依ツテ本菌ノ肺炎菌Ⅲ型並ニ本菌相互間ニ極メテ密接ナル關係アルコトヲ知り得タガ、尙本反應ヲ用ヒテコレヲ確メント試ミタ。

(1). 供 試 材 料

菌株及ビ免疫血清ハ凝集反應ニ使用シタモノヲ用ヒタ。抗原ハ血液寒天37°C, 24時間ノ菌約20mgヲ生理的食鹽水10ccニ浮游セシメ100°C30分後振盪器ニテ約5—6時間振盪シ3000回30分間遠心沈澱シテ得タル上清ヲ用ヒタ。使用量ハ其ノ都度測定シタガ大略上清ヲ $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{60}$ ニ稀釋シタモノ0.5ガ使用ニ適スル。

(2). 實驗方法並ニ成績

實驗施行前抗原使用量ヲ決定シ(補體ハ海獺5頭以上ノ血清ヲ使用シ12倍ニ稀釋シタ)山羊血球溶血系ヲ指示トシタ。表中(—)ハ完全ニ溶血ヲ阻止スルモノ、(+)ハ少シク溶血セルモノ、(++)ハ中等度ノ溶血ヲ、(+++)ハ強度ノ溶血ヲ、(Ⅲ)ハ完全溶血ヲ示ス。

第16—18表ニ見ル如ク本菌ヲ抗原トセル場合ハ肺炎菌Ⅲ型血清及ビコレト殆ド同程度ニⅠ、Ⅱ型血清間ニモ補體結合反應陽性ナルニ拘ラズ溶血性連鎖球菌血清間ニハ陰性デアル。又第19表ニ於テハ第16—18表ニ於ケルト同様ニ實驗ヲ行ツタガ記載ノ煩雜ヲ避クル爲完全溶血ヲ阻止スル血清稀釋倍數ノミヲ記載シタ。

既知肺炎菌Ⅲ型ヲ抗原トシテ本菌免疫血清間ニ於ケル補體結合反應モ大略血清稀釋倍數40—80倍ニテ補體ヲ結合スルガ、溶血性連鎖球菌ヲ抗原トセル場合ハ補體結合反應ハ陰性デアル。

即本菌ト肺炎菌Ⅰ—Ⅲ血清間及ビ肺炎菌Ⅰ—Ⅲ型ト本菌血清間ニハ補體結合反應ハ何レモ陽性デアガ溶血性連鎖球菌血清トノ間ニハ陰性デアル。コレニ依ツテ本菌ハ肺炎菌トハ免疫學的ニ近親關係ガアルガ溶血性連鎖球菌トハ免疫學的關係ヲ證シ得ザルコトヲ知り得タ。

第 16 表 粘液性球菌及溶血性連鎖球菌ノ肺炎菌Ⅲ免疫血清ニ對スル補體結合反應 (教室保存)

血清稀釋倍數 抗 原	2	5	10	20	40	80	160
肺炎菌Ⅲ(教室)	—	—	—	—	+	++	Ⅲ
肺炎菌Ⅲ(北研)	—	—	—	—	+	++	Ⅲ

血清稀釋倍數 抗 原	2	5	10	20	40	80	160
荒 川	—	—	—	—	+	++	+++
三 橋	—	—	+	+	+++	+++	+++
緒 方	—	—	—	++	+++	+++	+++
溶 血 性 連 菌	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++

第 17 表 粘液性球菌及溶血性連菌ノ肺炎菌Ⅲ免疫血清（北研）ニ
對スル補體結合反應

血清稀釋倍數 抗 原	2	5	10	20	40	80	160
肺炎菌Ⅲ(教室)	—	—	—	—	+	++	+++
肺炎菌Ⅲ(北研)	—	—	—	±	++	+++	+++
荒 川	—	—	—	—	+	++	+++
三 橋	—	—	±	+	++	+++	+++
緒 方	—	—	—	—	++	+++	+++
溶 血 性 連 菌	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++

第 18 表 粘液性球菌及溶血性連菌ノ溶血性連菌免疫血清ニ對スル
補體結合反應

血清稀釋倍數 抗 原	2	5	10	20	40	80	160
肺炎菌Ⅲ(教室)	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
肺炎菌Ⅲ(北研)	+	++	+++	+++	+++	+++	+++
荒 川	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
三 橋	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
緒 方	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
溶 血 性 連 菌	—	—	—	+	++	+++	+++

第 19 表 本菌ノ肺炎菌Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及ビ溶血性連菌血清ニ對スル
補體結合反應（完全溶血ヲ阻止スル血清最大稀釋倍數）

抗 原 免疫血清	荒川	三橋	緒方	大西	廣辻	上田	高堂	駒井	野間	細見	中村
肺 炎 菌 Ⅰ	20	20	20	40	20	20	40	20	20	40	20
肺 炎 菌 Ⅱ	40	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40
肺炎菌Ⅲ(本教室)	80	40	40	80	40	40	40	80	40	80	80
肺炎菌Ⅲ(北研)	80	40	40	40	40	40	80	80	40	80	80
溶 血 性 連 菌	2	2	2	5	2	2	2	5	2	2	5

抗 原 免疫血清	小田	三澤	野木	西田	仲	瀬川	木村	鹽貝	竹本	長	堀江
肺炎菌Ⅰ	40	20	40	20	／	／	／	／	／	／	／
肺炎菌Ⅱ	40	20	40	40	／	／	／	／	／	／	／
肺炎菌Ⅲ(本教室)	40	40	80	40	40	160	80	40	80	160	80
肺炎菌Ⅲ(北研)	80	80	80	40	80	80	40	160	80	80	160
溶血性連鎖菌	2	5	5	2	5	5	2	2	2	5	5

抗 原 免疫血清	樋口	西	木村	林	日下部	梅原	吉岡	梅原	登尾	田中
肺炎菌Ⅲ(本教室)	40	80	80	40	80	160	80	40	80	80
肺炎菌Ⅲ(北研)	80	40	160	80	80	160	80	80	40	80
溶血性連鎖菌	5	2	2	5	2	5	2	2	2	5

抗 原 免疫血清	津田	野木	澤	奥村	細見	大布	中井	奥	青谷	伊藤
肺炎菌Ⅲ(本教室)	40	80	80	40	20	40	20	80	40	80
肺炎菌Ⅲ(北研)	40	80	160	40	40	40	40	40	80	40
溶血性連鎖菌	5	2	2	2	5	5	5	2	2	2

第 4 章 總 括

(1). 本菌ノ形状ハ種々ニシテ一定セズ。即單細胞菌、双球菌トシテ淋菌又ハ肺炎菌ヲ思ハシムルモノ、及ビ種々ナル形態ノ連鎖ヲ形成シテ特有ノ形態ヲ認メ難シ。菌體ノ大サハ不同ニシテ大小種々ノモノガ混在スルヲ常トシ、最大徑 1.8μ 、最小徑 0.5μ ニ達ス。最モ多キハ $0.7-0.8\mu$ ナリ。

中耳分泌物中ニ於テハ大ナル莢膜ヲ有シ時ニ菌體ノ10倍内外ニモ達スルコトアリテ、本菌ノ形態學上ニ於ケル唯一ノ特徴ヲナス。菌細胞間ノ狹窄ノ有無ハ一定セズ、又同一標本ニアリテモ莢膜ノ大サハ大小不同ナリ。

(2). 莢膜染色法ハ何レノ方法ニ依ルモ大ナル優劣ハ認メ難キモ、Hiss氏染色法及ビRomanoffsky-Giemsa氏溶液ニ依ルモノ特ニ優秀ナリ。Wittmaack氏をにん染色法ニハ賛意ヲ表シ難シ。

(3). 最モ發育良好ナル人工培養基ハ血液寒天培養基ニシテコレニ1%葡萄糖ヲ加フル時ハ發育尙少シク良好トナル。血清及ビ腹水寒天 Loeffler氏凝固血清培養基コレニ次ギ、煮沸血液寒天ハコレニ比スレバ發育著シク不良ナリ。液體培地トシテハ枸橼酸曹達加家兔血液、血清、腹水或ハ血液ぶいよん、Hiss氏血清水等ハ良好ナレ共、普通ぶいよん殊ニ高壓滅菌ヲ施セルモノ牛乳培養基等ハ發育良好ナラズ、人血液ぶいとん水等ニハ發育セズ。

普通寒天ニハ發育甚ダ不良ナリ。糖ヲ加フル時ハ稍々良好トナルモ尙甚ダ不良トイフベシ
馬鈴薯、げらんち其他ノ培養基ニハ發育セズ。

培地ノPHハ7.4—8.0ヲ適當トシ血液或ハ血清ハ10—15%ヲ適當トス。血液寒天培養基ニ
於テハ菌量多キ時ハ37°Cノ孵籠中ニ於テハ既ニ5—6時間ニシテ培養基全面ニ亘リ小水滴様聚
落ヲ作ル。37°C, 24時間培養ノ表面聚落ハ特有ニシテ水滴様透明ナル直徑2—3mmノ暗綠色
乃至灰白色粘稠ナル物質ヨリナル無色ノ粘液性聚落ヲ作り、培養基面ヲ灰綠色乃至綠色ニ着
色シ幅狭キ同色環ヲ聚落周邊ニ示ス。菌量多キ時ハ融合シテ一様ニ扁平ナル帶狀聚落ヲ作ル。
溶血環ナシ。時ニ殊ニ人血液寒天ヲ用ヒタル時ハ著明ナル灰白色聚落ヲ作ルコトアリ。

24時間以上培養スル時ハ乾燥シ始メ37°C, 24時間後室温或ハ氷室ニ放置スルモ1週間後ニ
ハ殆ド乾燥シ、培養基面ノ變色ヲ認ムルノミトナル。煮沸血液寒天ニ於テハ多ク培地ヲ脱色
シ乳白黃色或ハ黃綠色ヲ呈セシム。

(4). げらんち液化、瓦斯及ビいんどーる形成ヲ認メズ。本菌ハ嫌氣性ニモ發育シ得。

(5). 分離直後ノ本菌ハ平板流注血液寒天培養法ニ依リ48時間培養後氷室ニ放置スル時ハ
境界不鮮明ナル狹隘ナル溶血環ヲ示ス。

(6). 本菌ヲ分離後久シク人工培養基殊ニ血液寒天ニ植繼グ時ハ、漸次粘液產生能ヲ失ヒ
極メテ鋭利ナル溶血環ヲ示ス灰白色ノ小聚落ヲ形成シ溶血性連菌ノ夫ト鑑別シ得ザルニ至ル。
分離後まうす通過ヲ施シタル菌株ハカカル變性ヲ來スコト然ラザルモノニ比シ遙ニオソシ。

(7). 膽汁及ビ膽汁酸鹽ニ對シテハ被檢73菌株中67菌株ハ溶解セラル。且溶菌セラレザル
6菌株ニ於テモ菌體ノ形狀ハ不正トナリ大ナル影響ヲ被レルヲ知り得タリ。本菌ノ膽汁及バ
膽汁酸鹽ニ對スル性質ハ肺炎菌ノ夫ニ一致ス。

(8). おふとひんノ本菌ニ對スル發育阻止濃度ハ最高濃度10萬倍最小濃度500萬倍ニシテ
50萬—100萬倍ガ最も多シ。即おふとひんニ對スル鋭敏性ハ菌株ニヨリテ可成ノ差ヲ認ムルモ
殆ド肺炎菌ノ夫ニ一致ス。

(9). *Bürger* 培地即ベふとん加血清水ニ糖類ヲ加ヘらくむすヲ指示トシテ糖類分解試験
ヲ行ヒタルニ本菌73菌株ハ總テ葡萄糖及ビ乳糖ヲ分解シテ培地ヲ赤變凝固シ、がらくとーぜ
果糖、まんのーぜ、青芽糖、蔗糖、らふいのーぜ、可溶性澱粉、できすとりん、ざりちんハ
大部分分解シテ培地ヲ赤變凝固シ、特ニいぬりんハ73菌株中59菌株ハコレヲ分解シテ培地
ノ赤變凝固ヲ來ス。Pentose 中らふいのーぜ、きしろーぜハ大部分分解スルモ培地ノ赤變ヲ來
スノミニテ凝固ヲ來スコト稀ナリ。あるこーるハ一般ニ分解サレズ、即まんにつと、ぐりせ
りんヲ分解スルモノハ10%内外ヲ數ヘ得ルモ、あどにつと、そるびつとヲ分解スル菌株ナシ、
即本菌ハ培地ヲ適當ニ選擇セバ可成多數ノ糖類ヲ分解シ得ルモノナリ。特ニいぬりんハ80%

以上ノ菌株ガ分解スルヲ認メタリ。

(10). 分離直後ノ本菌ハまうすニ對シ腹腔内皮下注射法ニ毒力甚ダ強ク最モ強キハ最小致死量血清ふいよん24時間培養 10^{-8} ccニ達シ最モ弱キモノモ尙0.01 ccナリ。人工培養ヲ繼續スル時ハ急激ニ毒力ノ低下ヲ來スコト多ク、分離後久シキニ亘ルモノニ於テハ全ク毒力ヲ失フニ至ルコトアリ。海狸、家兎ニハ餘リ強キ毒力ヲ有サズ。

(11). 本菌ノ毒力ヲ維持セシムルニハ0.5%枸橼酸曹達加家兎血液ニ植繼グカ Heim 氏法ニ從ヒ全身感染まうすノ脾臟、心臟等ヲ乾燥保存スルヲ可トス。

(12). 本菌73菌株中62菌株ハ本教室及ビ北研所藏ノ肺炎菌Ⅲ型血清ノ何レカニ凝集サレ、本菌ノ免疫血清ハ上述ノ肺炎菌Ⅲ型ヲ凝集ス（肺炎菌Ⅲ型血清ニ凝集サレザル菌ノ免疫血清ニ於テモ）。且既知肺炎菌Ⅲ型血清ニ對スル被凝集性ノ如何ニ關係ナク、他ノ菌株ノ免疫血清ニヨリ凝集サルルコト多シ。

(13). 本菌ヲ抗原トセバ既知肺炎菌Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ型血清ニ對シテハ數十倍ノ血清稀釋ニ至ル迄補體ヲ結合スルモ、溶血性連鎖菌血清ノ補體結合血清稀釋倍數ハ2—5倍ニ過ギズ。

第 20 表 本 菌 ノ 主 要 性 狀

主要諸性状		いぬりん分解	おふとひん ノ發育阻止 濃度	膽汁及膽汁 酸鹽ニ對ス ル被溶解性	まうすニ對 スル最小致 死量	肺炎菌Ⅲ免疫 血清ニ對スル 被凝集性	肺炎菌Ⅲ免疫 血清ニ對スル 補體結合反應
菌株名							
荒	川	+	20萬倍	+	10^{-4} cc	+	+
今	井	+	50萬倍	+	10^{-5}	+	／
武	市	+	50萬倍	+	10^{-6}	+	／
三	橋	+	50萬倍	+	10^{-7}	+	+
緒	方	+	50萬倍	+	10^{-7}	+	+
大	西	—	100萬倍	+	10^{-7}	—	+
廣	辻	+	50萬倍	+	10^{-7}	+	+
上	田	+	50萬倍	+	10^{-7}	+	+
高	堂	+	50萬倍	+	10^{-7}	+	+
駒	井	+	100萬倍	+	10^{-5}	+	+
野	間	—	100萬倍	+	10^{-8}	+	+
細	見	—	100萬倍	+	10^{-7}	—	+
中	村	—	100萬倍	+	10^{-5}	+	+
小	田	+	50萬倍	+	10^{-4}	+	+
三	澤	+	200萬倍	+	10^{-8}	+	+
樫	木	+	100萬倍	+	10^{-4}	+	+
西	田	+	100萬倍	+	10^{-7}	+	+
仲		+	100萬倍	+	10^{-6}	+	+
瀬	川	+	100萬倍	+	10^{-4}	+	+
木	村	—	100萬倍	+	10^{-6}	+	+
鹽	貝	+	100萬倍	+	10^{-6}	+	+

主要諸性状 菌株名	いぬりん分解	おふとひん ノ發育阻止 濃度	膽汁及膽汁 酸鹽ニ對ス ル被溶解性	まうすニ對 スル最小致 死量	肺炎菌Ⅲ免疫 血清ニ對スル 被凝集性	肺炎菌Ⅲ免疫 血清ニ對スル 補體結合反應
竹 本	+	50萬倍	-	10 ⁻⁵ cc	+	+
長	+	50萬倍	+	10 ⁻⁵	+	+
堀 江	+	100萬倍	+	10 ⁻⁵	+	+
樋 口	-	100萬倍	+	10 ⁻⁵	+	+
西	+	100萬倍	+	10 ⁻⁵	+	+
木 村	+	50萬倍	-	10 ⁻⁶	+	+
林	-	50萬倍	+	10 ⁻⁵	+	+
日下 部	+	200萬倍	+	10 ⁻⁷	+	+
梅 原	+	50萬倍	+	10 ⁻⁴	-	+
吉 岡	+	200萬倍	+	10 ⁻⁶	+	+
梅 原	-	50萬倍	+	10 ⁻⁵	-	+
登 尾	+	50萬倍	+	10 ⁻⁷	+	+
田 口	+	100萬倍	-	10 ⁻⁴	+	+
津 田	+	100萬倍	+	10 ⁻⁷	+	+
野 木	-	100萬倍	+	10 ⁻⁵	+	+
澤	+	50萬倍	+	10 ⁻⁷	+	+
奥 本	-	100萬倍	+	10 ⁻⁷	+	+
細 見	+	50萬倍	+	10 ⁻⁸	+	+
大 布	+	100萬倍	+	10 ⁻⁵	+	+
中 井	+	20萬倍	+	/	+	+
奥	+	50萬倍	+	10 ⁻⁵	+	+
中 平	+	20萬倍	+	/	+	/
青 谷	+	50萬倍	+	10 ⁻²	+	+
伊 藤	+	50萬倍	-	/	+	+
末 包	+	500萬倍	+	/	+	/
嶋 川	+	50萬倍	+	10 ⁻⁸	+	/
舟 崎	+	100萬倍	+	10 ⁻⁵	+	/
山 本	+	50萬倍	+	/	+	/
白 井	+	50萬倍	+	/	+	/
淺 井	+	50萬倍	+	/	+	/
川 越	+	20萬倍	+	10 ⁻⁷	+	/
小 林	+	50萬倍	-	10 ⁻⁵	+	/
舟 岡	+	200萬倍	+	/	+	/
岡 野	+	50萬倍	+	/	+	/
井 上	+	50萬倍	+	/	+	/
青 木	+	50萬倍	-	/	+	/
南	+	100萬倍	+	10 ⁻⁵	+	/
和 氣	+	50萬倍	+	/	+	/
宮 田	-	50萬倍	+	10 ⁻³	+	/
川 合	+	10萬倍	+	10 ⁻³	+	/
田 中	+	50萬倍	+	/	-	/

主要諸性状 菌株名		いぬりん分解	おふとひん ノ發育阻止 濃度	膽汁及膽汁 酸鹽ニ對ス ル液溶解性	まうすニ對 スル最小致 死量	肺炎菌ニ對 血清ニ對スル 被凝集性	肺炎菌ニ對 血清ニ對スル 補體結合反應
小	松	+	50萬倍	+	/	-	/
關	戸	-	20萬倍	+	/	-	/
二	谷	-	100萬倍	+	/	+	/
森		+	100萬倍	+	/	-	/
増	田	-	10萬倍	+	/	+	/
布	川	+	100萬倍	+	/	-	/
涌	田	+	100萬倍	+	10 ⁻⁶ cc	-	/
荒	木	+	100萬倍	+	/	-	/
畑	野	+	10萬倍	+	/	+	/
安	藤	+	100萬倍	+	/	+	/
中	村	+	20萬倍	+	/	+	/

第 5 章 考 按

大ナル莢膜ヲ有スル球菌ノ記載ハ頗ル古ク既ニ1890年頃ヨリ枚舉ノ暇ナキ程ナルモ、(Netter, Ortmann, Bresser, Bonome, Herzog, Lubarsch u. Ostertag 等) 世人ノ注目ヲ牽クニ至リシハ實ニ1903年 Schottmüller ノ粘液性連鎖菌記載以來ノ事ナリ。氏ハ本菌ハ一般ニ連鎖ハ短ケレ共大ナル莢膜ヲ有シ、血清寒天上ニ於テ粘液產生著明ニシテ溶血ナキモノトナシ、溶血性連鎖菌トハ明ニ區別シ得ラルルモ、尙本菌ヲ以テ連鎖ニ屬ス可キモノトナシタリ。次デ Schumacher, Siggle, Scheuer 等ハ何レモ Schottmüller ノ所説ヲ肯定セルモ、Park and Williams, Bürger, Nachmann 等ハいぬりん分解、膽汁及ビ膽汁酸鹽ニ對スル被溶解性、おふとひんニ對スル敏感性等ニ依ツテ、粘液性連鎖菌ハ肺炎菌ニ屬ス可キコトヲ主張シテ譲ラズ。次デ1913年 Dochez and Gillepsie ガ免疫血清ノ感染防禦力ニ依ツテ肺炎菌ヲ分類シテ以來粘液性連鎖菌ハ粘液性肺炎菌(即ニ型)ト同一菌ナリト見做ス者多クナリシモ(殊ニ米國學派)、我國ニ於ケル肺炎菌ガ Rockefeller 研究所ノ分類法ニ依ツテ明確ニ分類シ得ザルハ既ニ田中氏ノ主張セン所ニシテ、小林氏モ中耳炎ヨリ分離セル本菌ハ肺炎菌ニ型血清ニ依リ凝集セラレザルモノノ多キコトヲ認メ、中耳耳漏中ノ所謂粘液性連鎖菌ハ培養所見ト免疫學的性質トガ一致セザルモノ多キニ非ズヤト稱セリ。

サテ余ノ分離セル本菌ハいぬりん分解、膽汁及ビ膽汁酸鹽ニ對スル被溶解性、おふとひん敏感性、まうすニ對スル高キ病原性、殊ニ本菌相互間及ビ本菌ト既知肺炎菌間ニ補體結合反應陽性ナルニ拘ラズ本菌ト溶血性連鎖菌間ニハ陰性ナルコトヨリ、本菌ハ總テ肺炎菌ニ屬ス可キコトハ論議ノ餘地ナク、從ツテ本菌ハ粘液性肺炎菌ト稱スルヲ至當トス。次ニ標準トセル肺炎菌ニ型血清(本教室所藏及ビ北研所藏菌)ノ何レカニ依ツテ本菌ノ80%ガ凝集セラルルコト

ハ本菌ガ大部分肺炎菌Ⅲ型ニ屬ス可キコトヲ示スモ、一方ノ標準血清ニ凝集セラルルニ拘ラズ他方ノ標準血清ニハ凝集サレザルモノノ存スルコトヨリ、何レノ血清ニモ凝集セラレザルモノノ内ニモ他ノ標準血清ヲ用フレバ凝集セラルルモノノ存スルナランコトハ想像ニ難カラズ。即凝集反應ハ標準血清ノ如何ニ依リ其ノ成績ガ多少左右セラルルモノナルヲ以テ、本菌ニ於テハ其ノ免疫學的近親關係ヲ證明スルニ絶對的價値ヲ有スルモノニ非ズ。又肺炎菌ニ於テハ吸收試驗モ、凝集反應ニ全ク平行スルモノナルヲ以テ (*Christensen*) 應用シ得ラズ、肺炎菌Ⅲ型血清ニ依リ凝集サレザル菌ノ免疫血清ガ肺炎菌Ⅲ型ヲ凝集スルコトガアリ、標準血清ニ對スル凝集反應ノ如何ニ拘ラズ、アル菌株ノ免疫血清ハ他ノ菌株ヲ凝集スル事等ニ依リ、本菌ハ大部分ハ免疫學的ニ肺炎菌Ⅲ型ニ極メテ密接ナル關係アルノミナラズ、或ル標準血清ニ對スル凝集反應成績ノ如何ニ拘ラズ、本菌相互間ニハ極メテ密接ナル關係アルコトヲ知り得。即一定ノ形態學的所見ト培養所見ヲ有スルモノハ、其ノ微生物學的並ニ免疫學的性質ハ略々一定スルモノニシテ本菌診斷ニ當リテハ免疫學的診斷法其他複雑ナル操作ヲ要セズ、一定ノ形態學的所見ト培養所見トヲ有スルモノヲ選ベバ充分ナリ、而モ肺炎菌Ⅲ型 (標準血清ニ依リ凝集セラルルモノ) ニヨル中耳炎ト Gruppe X ニ屬スル菌 (標準血清ニ凝集サレザルモノ) ニ依ル中耳炎ハ、其ノ症狀豫後等全ク同一ニシテ臨床上毫モ區別シ得ザルヲ以テ、臨床の見地ヨリスレバ本菌ニ強イテ免疫學的分類ヲ試ムルコトハ無意義ナリト信ズ。

尙凝集反應ノ術式ニ就キテハ、一般ニ球菌ハ免疫血清ニ依リテ凝集サルルニ長時間ヲ要スルヲ以テ、肺炎菌凝集試験ニ就キテモ孵籠ニ收容スルコト24時間後ニ成績ヲ判定スルモノアレド、本菌ノ如ク血清ノ凝集價低ク從ツテ濃厚ナル血清ヲ使用スル際ハ嚴重ニ無菌的ニ操作スルニ非ズンバ雜菌混入ノ爲反應ノ不明トナルコトアリ。依テ余ハ常ニ孵籠ニハ4時間收容スルコトセルモ本法ニ依ツテモ強ク凝集セラレタル菌株ハ菌ガ宛モ盤狀ニ塊マレルヲ認メ得タリ。サレド一般ニハ凝集程度ハ極メテ弱クシテ *Agglutinoskop* ヲ用ヒテ漸ク判定シ得ル程度ナリキ。即、本菌ノ凝集反應ハ標準血清ノ如何ニヨリ左右セラルルノミナラズ、其ノ程度モ菌株ニ依リ大ナル差異ヲ認ムルモノナリ。即本菌ノ凝集反應成績ガ研究者ニ依リ異ルハ、検査術式及ビ判定方法ノ僅少ノ差モ重要ナル役目ヲ演ズルモノナラン。

更ニ1922年 *Bitter* 次デ *Cunningham*, *Engelmann*, *Dudgeon* 等ハ聚落ノ大サ粘液產生能力ハ本菌ト等シク血液寒天上ニ於テ強キ溶血作用ヲ營ム連菌ニシテ、病原性極メテ低キ菌ヲ溶血性粘液性連菌ト稱シ、1929年 *Oppenheim* モ強キ溶血作用ヲ示ス連菌ニシテ、粘液產生ヲ營ミ、洗滌血球寒天ニ植繼グ時ハ粘液產生能ヲ失フ菌ヲ報告シ、溶血性粘液性連菌ト命名セルモ、余ガ分離セル菌ハ何レモ溶血作用ヲ有セズ、殊ニ動物ニ對シテモ強キ毒性ヲ有スルコトニ依リ除外シ得ルニ非ズヤ。即 *Bitter*, *Oppenheim* 等ノ稱スル粘液性連菌ハ詳細ナル

微生物學的研究殊ニ免疫學的研究ノ記載ナキヲ以テ、果シテ余ノ粘液性肺炎菌ニシテ溶血作用ヲ有スルモノナリヤ、又全然別種ノ菌ナリヤヲ知ルヲ得ザルモ余ガ950例ノ化膿性中耳炎患者ヲ觀察シタル結果、粘液性肺炎菌ニシテ溶血作用アルモノ（血液寒天平板表面塗抹培養法ニ依リ）即大ナル莢膜ヲ認メ血液寒天上ニテ著明ナル粘液產生ヲ營ムニ拘ラズ、溶血作用アルガ如キ菌ニハ遭遇セザリシ事ヨリ、カカル菌株ハタトヘ存在スルモ極メテ稀有ノ例外的菌株ニ屬シ、少ク共中耳炎起炎菌トシテハ除外シ得ルモノト思考ス。即粘液性肺炎菌ハ中耳炎起炎菌トシテハ溶血作用ヲ有セズト稱シ得。

更ニ本菌ノ診斷ニ就キテ一言センニ前述セシ如ク、本菌ハ形態學の所見及ビ培養所見一定セルノミナラズ、微生物學的及ビ免疫學的の性質モ略々一定シ且中耳炎起炎菌トシテ本菌ハ溶血作用ヲ有セザルヲ以テ、本菌ノ診斷ニハ塗抹標本ニテ大ナル莢膜ヲ有シ血液寒天上ニ於テ著明ナル粘液產生ヲ營ムモノヲ撰ベバ可ナルモ、余ハ中耳炎起炎菌トシテハ本菌ノ如ク大ナル莢膜ヲ有スル球菌ニシテ豐富ナル粘液產生ヲ營マザルモノ、本菌以外ニカクノ如ク豐富ナル粘液產生ヲ營ムモノハ *Friedländer* 氏肺炎桿菌以外ニハ1例モ遭遇セズ、又肺炎桿菌ト本菌トノ血液寒天上ニ於ケル培養所見ハ容易ニ鑑別シ得ラルヲ以テ、本菌ノ診斷ニハ形態學の所見或ハ血液寒天上ニ於ケル培養所見ノミニ依ツテ大過ナキモノト信ズ。殊ニ吾人臨床家ニトリテハ塗抹標本所見ノミニ依ツテ診斷シ得ルハ大ナル利點ナリトイハザルヲ得ズ、況ヤ前述ヒル如ク本菌ノ如ク一定ノ形態學的及ビ培養所見ヲ有スルモノハ、其ノ微生物學的及ビ免疫學的の性質モ略々一定セル菌ニ於テオヤ。

更ニ余ハ溶血性連鎖菌ニシテ粘液產生ヲ營ムモノ（粘液性肺炎菌ノ如ク豐富ナラズ又莢膜ヲ有セズ）、又可成著明ナル莢膜ヲ有スルニ拘ラズ粘液產生ナク溶血作用ノミ強キモノヲ時々認メ得タルモ、*Bitter*, *Cunningham* 等ノ粘液性連鎖菌及ビ *Oppenheim* ノ溶血性粘液性連鎖菌ハ余ガ上述セル溶血性連鎖菌ニ全ク一致ハセザルモ強キ溶血作用ヲ呈シ、粘液產生モ極メノ速ニ消失スル事等ヨリ恐ラク上述セル連鎖菌ノ一種ヲ指示セルニ非ズヤト思惟ス。即 *Bitter*, *Cunningham*, *Oppenheim* 等ノ粘液性連鎖菌ハ溶血性連鎖菌ノ特殊ナルモノニシテ、粘液性肺炎菌タル所謂粘液性連鎖菌トハ嚴ニ區別サルベキモノナリ。

第 6 章 結 論

(1). 950例ノ化膿性中耳炎患者ヨリ所謂粘液性連鎖菌73株ヲ分離シ得タリ。

(2). 本菌ハいぬりんヲ分解スルコト、膽汁及ビ膽汁酸鹽ニ溶解スルコト、おふとひんニ敏感ナルコト、まうすニ高キ病原性ヲ有スルコト及ビ本菌ト既知肺炎菌血清間ニ補結合反應陽性ナルニ拘ラズ本菌ト溶血性連鎖菌血清間ニハ陰性ナルコト等ニヨリ總テ肺炎菌ニ屬ス。即粘液性肺炎菌ト稱スルヲ妥當トス。

(3). 本菌ハ大部分肺炎菌Ⅲ型ニ爾餘ハ Gruppe X ニ屬ストナスヲ妥當トスルモ本菌相互間ニハ標準血清ニ對スル凝集反應ニ關係ナク極メテ密接ナル關係アリ。且臨床的ニモⅢ型及ビ Gruppe X 間ニハ何等ノ差異ヲ認メ得ズ。

(4). 本菌ノ中耳分泌物中ニ於ケル形狀ハ單細胞菌、双球菌等ヲナシ、種々ナル形態ノ連鎖ヲ形成シ而モ此等ガ混在シテ特有ノ形態ヲ認ムル能ハズ。菌體ノ大サ及ビ菌體間ニ於ケル莢膜ノ狹窄モ種々ニシテ只莢膜ノ大ナルコトノミヲ特徴トス。

(5). 莢膜染色法ハ何レノ方法ニ依ルモ、サシタル優劣ヲ認メ難キモ *Hiss* 氏法, *Romanoffsky-Giemsa* 氏溶液ニ依ルガ特ニ優秀ナリ。 *Wittmaack* 氏を以テ染色法ニハ贅意ヲ表シ難シ。

(6). 最も良好ナル人工培養基ハ血液寒天ニシテ鑑別培養基トシテモ最も優秀ナリ。其他血清、腹水等、蛋白ヲ多量ニ含ム培養基ニハ發育良好ナルモ然ラザルモノニハ殆ド發育セズ。

(7). 溶血ハ極メテ輕度ニシテ血液寒天表面塗抹培養法ニテハ認メ得ズ。

(8). 本菌診斷ニハ形態學的ニ大ナル莢膜ヲ有スルコト、或ハ血液寒天上ニ於テ灰白色乃至暗綠色ノ水滴様粘液性聚落ヲ形成シ粘液產生著明ナルモノヲ撰ベバ大過ナシ。

(攔筆スルニ當リ御指導御校閱ヲ賜リタル恩師星野、木村兩教授並ニ菌株蒐集ニ種々便宜ヲ與ヘラレタル耳鼻咽喉科教室ノ同僚諸氏ニ深甚ナル謝意ヲ表ス。)

(文 献 後 出)

附 圖 説 明

第1—4圖 中耳耳漏中ニ於ケル種々ナル形態ノ粘液性肺炎菌

第1圖 中耳耳漏中ノ粘液性肺炎菌，長連鎖ヲ形成セルモノ及ビ單細胞菌

第2圖 同上。双球菌ガ縦ニ連リ連鎖ヲ形成ス

第3圖 同上。主トシテ球菌及ビ短連鎖ヲ形成ス

第4圖 同上。單細胞菌，双球及ビ短連鎖ヲ形成セルモノ混在ス

第5圖 溶血性連鎖菌ノ溶血環，山羊血液寒天上ニ於ケル（37°C. 48時間）深部聚落溶血環。

第6圖 血液寒天上ニ3ヶ月間繼代培養ヲ行ヘル本菌ノ溶血環。

第7圖 血液寒天上ニ約六ヶ月間繼代培養ヲ行ヘル本菌血清ぶいよん24時間培養。

第8圖 溶血性連鎖菌血清ぶいよん24時間培養。

加藤論文附圖(其ノ1)

第 1 圖

第 2 圖

第 3 圖

第 4 圖

加藤論文附圖(其ノ2)

第 5 圖

第 6 圖

第 7 圖

第 8 圖