人系及ビ動物系抗酸菌ノ免疫學的研究

九州帝國大學醫學部細菌學教室(主任 戸田教授)

大學院學生 醫學士 池 田 令 吾

Reigo Ikeda

本研究ハ文部省科學研究費ノ補助ニ依ルトコロ大ナリ。記シテ謝意ヲ表ス。

(本研究ノ要旨ノ一部ハ昭和17年12月九大細菌學教室集談會及ビ昭和18年1月九大楠内科同門會ノ席上デ發表シタ。)

【内 容 抄 録】

人系及ビ動物系抗酸菌數株ヲ以テ Koch 氏現象ノ試験ヲ行ヒ、供試菌ハ多少ニ拘ラズ該現象ヲ呈スルヲ見タ。其中最モ強イ反應ヲ起シタ3菌株ヲ用ヒ結核免疫實驗ヲ行ツタ。1mgデハ1菌株ヲ除キ免疫力明カデナイガ、4~5mgデハ相當著明ナ感染防禦力ヲ示シタ。此ノ3菌株ト61株ノ各種抗酸菌ヨリ得タ沈降元トヲ用ヒ沈降反應ヲ試ミタ。之ニ依リ3株ノ中、1株ハ結核菌ノ變異種ト思ハレ、他ノ2株ハ結核菌ニヨク反應シ、之ト何等カノ關係ガアル様ニ思ハレタ。此ノ中2株ハ海獺、家兎ニ病變ヲ起サズ、他ノ1株ハ家兎ニBCG程度ノ輕キ病變ヲ起シタニ過ギナイ。

目 次

序 言	第2章 人系及ビ動物系抗酸菌ニヨル結核免疫實驗
第1章 人系及ビ動物系抗酸菌ニ依ル Koch 氏現象	第1節 供試菌及ビ供試動物
結 言	第2節 實驗方法
第1節 實驗方法	第1項 菌液ノ調製法並ニ豫防接種ノ方法
第1項 試 獸	第2項 結核菌感染方法
第2項 供試菌及ビ其ノ由來	第3項 經過並ニ成績ノ判定
第3項 BCG 感染方法	第3節 第1回實驗ノ成績
第4項 つべるくりん皮内反應檢査法	第4節 第2回實驗ノ成績
第5項 供試抗酸菌接種方法	第5節 第3回實驗ノ成績
第2節 實驗ノ成績	小 括
第1項 BCG 接種後つべるくりん反應	第3章 人系及ビ動物系抗酸菌ニヨル沈降反應試驗
第2項 供試菌接種後局所皮膚ノ變化	第1節 供試菌並ニ試驗方法
第3節 供試菌ノ健康海獺皮内接種實驗(對照)	第1項 供試菌及ビ其ノ由來
第1項 實驗方法	第2項 沈降元ノ製法
第4節 對照實驗ノ成績	第3項 免疫血清ノ製法
小括並ニ考按	

- 第4項 沈降反應實施法
- 第2節 實驗ノ成績
 - 小括並=考按
- 第4章 人系及ビ動物系抗酸菌ノ動物接種實驗並=他ノ2~3生物學的性狀
 - 第1節 供試菌ノ動物接種試驗
 - 甲 供試菌ノ海狸皮內接種試驗
 - 第1項 供試動物並=實驗方法
 - 第2項 成績ノ判定
 - 第3項 實驗ノ成績
 - 乙 供試菌ノ家兎=對スル接種試驗
 - 第1項 供試動物供試菌並=實驗方法
 - 第2項 成績ノ判定
 - 第3項 實驗ノ成績

- 第2節 聚落所見
- 第3節 硫酸=對スル抵抗力
 - 第1項 硫酸=對スル抗脫色性
 - 第2項 10%硫酸=對スル抵抗力
- 第4節 抗煮沸性
- 第5節 かたらーゼ
 - 第1項 定性試驗
 - 第2項 定量試驗
- 第6節 發育速度
 - 小括
 - 總括並=考按
- 結語
- 文獻

序 言

自然界ニ於ケル非病原性抗酸菌ノ發見ハ1885年 *Alvarez u. Tavel*⁽¹⁾ ガ恥垢ヨリ之ヲ分離シ、*Bacillus smegmatis* ト命名シタノヲ嚆矢トスル。其後 *Söhngen*⁽²⁾ ノ培養法ガ發見サレテ以來、此種抗酸菌ノ分離サレルモノ多ク、其ノ由來スル材料モ自然界ノアラユルモノニ及ビ、上水、下水、植物、動物、人體、糞便、土壤、塵埃等ヲ網羅セル有様デアル。是等自然界ノ抗酸菌ハ一般ニ病原性ナキモノトサレ、從來非病原性抗酸菌ト稱セラレタ。然ルニ其後結核菌培養法ノ進歩ニヨリ、從來結核性疾患ト考ヘラレタモノノ中ニ、此種ノ抗酸菌ニヨリ惹起サレタト思ハレル例ヤ、此抗酸菌ニヨル疾患トシテ報告サレタモノモアル。(Cobbet I⁽³⁾, Beaven⁽⁴⁾, Freeman⁽⁵⁾, 占部、橋本⁽⁶⁾, 三宅⁽⁷⁾, 大神、泰川、岸川⁽⁸⁾)。由來自然界抗酸菌ノ研究ガ先進學徒ニヨリ盛ニ行ハレタ重ナル理由ハ、癩菌及ビ結核菌檢索ノ際本菌トノ誤ヲ來サナイ爲デ、其ノ生物學的性狀ハ巨細ニワタリ究メラレタガ分類ノ必要上試ミラレタ若干ノ補體結合反應、凝集反應及ビ沈降反應ノ實驗ヲ除ケバ該菌殊ニ人系及ビ動物系抗酸菌ノ免疫學的研究ハ少イ。余ハ特ニ此種ノ抗酸菌ニヨル Koch 氏現象、結核免疫、沈降反應及ビ2~3ノ生物學的性狀ニ關スル實驗ヲ行ヒ、些カ知見ヲ得タルヲ以テココニ之ヲ述ベ先進諸賢ノ御教示ヲ仰ガントスルモノデアル。

第1章 人系及ビ動物系抗酸菌ニヨル Koch 氏現象

Koch 氏現象トハ、結核動物ニ結核菌ヲ再接種スル際其ノ接種部皮膚ニ炎症、硬結、潰瘍形成ガ起リ、痂皮形成ヲ伴ヒ速ヤカニ癰痕治癒ヲ來ス變化、即接種局所ノ特異ナル早期反應ヲ言フ。本現象ハ始メ Koch ニヨリ提唱セラレ、後 Römer⁽⁹⁾, Hamburger⁽¹⁰⁾ ニヨリ確證セ

ラレタモノデアル。尙結核菌ニヨル Koch 氏現象(以後K現象ト略記ス)ノ實驗例ハ多イガ非病原性抗酸菌ニヨル本現象ノ實驗例ノ報告ハ稀デアル。Weisfeiler⁽¹¹⁾ハ、結核菌ノ外ニ他種抗酸菌及ビ他種ノ菌ヲ用ヒテK現象ヲ起サセクト稱シ、從ツテ該反應ノ特異性ヲ否定シ、本現象ヲ以テ多數刺戟元ニ對スル凡過敏的狀態ナリトシ、之ヲ Heteroallergie ト稱スベシト唱ヘタ。Pugel⁽¹²⁾ハ非病原菌ハ少量デハK現象ヲ呈シ得ナイガ、大量デハ稀ニ起シ得ルト稱シタ。

第1節 實驗方法

第1項 供試動物

豫メつべるくりん反應(以後つ反應ト略記ス)陰性ナルコトヲ確メタ白色海猿ノ體重800kg前後ノモノヲ用ヒ、1群5匹ヅツトス。

第2項 供試菌及ビ其ノ由來

供試菌ハ福女、人痰80、人非39、牛膿(2)、肋膜株、犬ノ7株ナリ。福女以下5株ハ當教室デ分離保存セルモノデ、其中福女、人痰80兩株ハ共ニ健康者ノ喀痰ヨリ、人非39、人非5ハ人ノ結核材料ヨリ、牛膿(2)ハ牛ノ結核性淋巴腺ヨリソレゾレ分離セラレタモノデアル。肋膜株⁽⁷⁾ハ肋膜炎患者ノ浸出液ヨリ分離サレタモノデ、九州醫專細菌學教室ノ好意ニヨリ分譲ヲ受ケタ犬株⁽¹⁴⁾ハ北研ノ好意ニヨリ分譲サレタモノデ、犬ノ肺ヨリ分離セラレ BCGニ似タ抗酸菌トシテ報告セラレタモノデアル。尙犬株ノ結核免疫實驗ノ報告ニハ接シナイ。

第3項 BCG 感染方法

當教室保存ノBCGデ Petraghani 氏培地培養4週間ノモノヲ用ヒ、其ノ2mgヲ0.5ccノ食鹽水ニ含ム如ク調製シタ菌液0.5ccヲ、豫メ剪毛消毒シタ海猿ノ大腿部皮下ニ接種ス。

第4項 つ反應検査法

傳研製舊つべるくりん液ヲ生理的食鹽水デ10倍ニ稀釋シ、其ノ0.1ccヲ豫メ剪毛消毒シタ海猿皮内ニ注射シ48時間後ノ局所反應ヲ戸田氏規準⁽¹³⁾ニヨリ觀察ス。

第5項 供試抗酸菌接種方法

供試菌中6株ハ Petraghani 氏培地培養10日ノモノヲ、犬株ハ培養1ヶ月ノモノヲ用ヒタ。即生菌1mg、死菌1mg、生菌0.01mg、死菌0.01mgヲ生理的食鹽水0.2ccニ溶解シ、ぶいよん0.2ccヲ對照トシテ全試獸ノつ反應ガ陽性轉化セル後、5ヶ所ノ皮膚ヲ剪毛消毒シ、ソレゾレ

皮内ニ注射シタ。尙對照トシテ BCG ノ Petragnani 氏培地培養 1 ヶ月 ノモノヲ同様ニシテ接種シタ。

第 2 節 實驗ノ成績

第 1 項 BCG 感染ツ反應ノ變化

始メ 1 群ノ試獸 5 匹トシ、8 群 40 匹デアツタガ實驗ノ途中天氣寒冷ノ爲 16 匹斃死シタガ、残り 24 匹ハ BCG 接種後 4 週間マデニ全部ツ反應陽轉シタ。

第 2 項 供試菌皮内接種後局所皮膚ノ變化

(第 1 表參照)

供試菌接種局所ノ皮膚ハ接種翌日多少ニ拘ラズ發赤、腫脹又ハ硬結ヲ見タ。菌量ニ關シテハ、1mg ノモノハ 0.01mg ノモノヨリ反應遙カニ強ク、生菌ハ死菌ヨリ一般ニ強ク反應シ、ふいよい接種部ハ反應陰性デアツタ。

1. 人非 5 群ハ發赤第 1 日ニ徑 5~10mm デ、第 6~8 日ニ消失シ硬結ハ第 2 日目ニ現ハレタモノ多ク、大サ 3×3×3mm デ第 10~12 日マデニ消失シタ。
2. 牛腺 (2) 群ハ發赤腫脹ノ程度及ビ消失日數共ニ人非 5 群ニ略同シ。
3. 人非 39 群ハ前 2 群ヨリ稍強キ反應ヲ呈シ、硬結ハ第 4~6 日ニ小膿瘍トナツタガ 18 日マデニ全部瘰癧ヲ以テ治癒シタ。
4. 福女群ハ上記 3 群ヨリ反應強ク、發赤ハ徑 10mm ニ達スルモノアリ、第 10 日マデニ膿瘍ヲ生ズルモノ多ク、硬結ハ第 14 日マデニ全部消失シ、瘰癧治癒ヲ示シタ。
5. 肋膜株群ハ皮膚反應相當強ク現ハレ、發赤ハ徑 5~16mm デ第 8 日ニ消失シ、硬結ハ餘リ大キクナラズ 2~6mm デ第 6~7 日ニ膿瘍トナル。膿瘍ハ次デ潰瘍ヲ生ジタガ第 8~10 日マデニ之等ハ瘰癧治癒ヲ來シタガ、硬結ノ全ク消失シタノハ第 23 日デアツタ。
6. 人痰 80 群ハ福女群ト共ニ反應強ク發赤ハ徑 20mm ニ達スルモノアリ、其ノ持續期間永ク第 6~8 日ニ膿瘍ヲ生ジ小潰瘍トナルモノアリ第 10 日マデニ膿瘍治癒スルモノ多ク硬結ハ第 14 日マデニ全部消失シ瘰癧治癒ヲ來シタ。
7. 犬群ハ反應強ク發赤ハ徑 17~20mm ニ達シタガ第 4 日ニハ消失シタ。硬結ハ徑 4~5mm ニ達シ、第 2~8 日ニ膿瘍ガ出來、第 18~21 日デ消失シタ。硬結モ第 23 日マデニ消失シ瘰癧ヲ以テ治癒シタ。
8. 對照ノ BCG 群ハ、其ノ反應大體犬群ノソレト等シク、發赤徑 12~23mm デ第 4 日ニ消失シ、硬結ハ徑 5~10mm ニ達シ、膿瘍ハ 126 號ハ出來ズ、143 號ハ第 6 日ニ出來、第 21 日ニハ硬結消失シ瘰癧治癒ヲ來シタ。

第 1 表 人系及ビ動物系抗酸菌ニヨルこつほ氏現象

菌株名	菌量	試番 獸號	體 重		經過 日數	1	2	4	6	8	10	12	14	18	21
			初	終		日	日	日	日	日	日	日	日	日	日
人非5		1	360	390	發赤 硬結	5×5 3×3×3	4×4 3×3×3	3×3 3×3×3	0 3×3×3	K 3×2×2	0				
		2	300	300	發赤 硬結	10×10 2×2×2	4×4 3×3×2	3×3 2×2×2	0 2×2×2	0					
		3	340	340	發赤 硬結	10×6 0	4×4 3×3×2	3×3 3×3×3	3×2 3×3×3	0 2×2×2	2×2×2	0			
		4	320	340	發赤 硬結	7×7 0	6×6 3×3×2	4×4 3×3×3	0 3×3×3	2×2×2	2×2×2	0			
牛 腺 (2)		5	300	340	發赤 硬結	3×3 3×3×3	3×3 3×3×3	3×3 2×2×2	0 2×2×2	2×2×2	2×2×2	2×2×2	K 2×2×2	0	
		8	380	400	發赤 硬結	3×3 4×4×2	3×3 2×2×2	3×3 2×2×2	0 2×2×2	0					
		35	430	410	發赤 硬結	6×6 0	4×4 3×3×3	4×4 3×3×3	0 3×3×3	K 0					
人非36		9	330	340	發赤 硬結	7×7 3×3×3	6×6 4×4×3	6×6 4×4×3	0 AK 4×4×3	AK 3×3×3	AK 3×3×3	AK 3×3×3	AK 2×2×1		N
		11	310	320	發赤 硬結	7×7 3×3×3	7×7 4×4×3	7×7 4×4×3	0 A 4×4×3	G 2×2×2	G 2×2×2	G 2×2×1		N	
		43	350	380	發赤 硬結	7×7 2×2×2	7×7 3×3×2	7×6 4×4×3	0 AK 5×4×3	AK 2×2×2	AK 2×2×2	AK 2×2×2	AK 2×2×2		N
福 女	1.0mg	14	300	310	發赤 硬結	20×17 4×4×3	12×12 4×4×3	5×5 7×7×5	5×5 A 12×10×5	0 G 8×8×5	G 5×5×5				
		15	370	390	發赤 硬結	20×15 4×4×3	10×7 4×4×3	6×5 6×6×4	0 A 10×10×5	A 6×6×4	K 4×4×3				
		16	360	340	發赤 硬結	8×8 4×4×3	5×5 3×3×2	4×5 3×3×2	0 A 5×5×3	A 6×6×5	G 6×6×5	G 6×6×3		N	
		24	360	380	發赤 硬結	9×7 3×3×3	7×7 4×4×3	7×6 6×6×3	5×5 A 10×10×3	0 A 6×6×3					
		41	340	360	發赤 硬結	16×22 4×4×4	12×7 4×5×4	12×7 6×6×4	6×5 A 4×4×3	0 G 4×4×3					
人 痰 80		19	290	310	發赤 硬結	12×12 5×5×4	8×8 5×5×4	8×8 6×6×3	0 AG 8×8×3	AG 9×1×3	GK 10×10×3	GK 7×7×3	GK 6×5×3	5×5×2	N 3×3×2
		22	340	360	發赤 硬結	10×10 4×4×3	8×8 4×4×3	8×8 8×8×3	6×6 A 9×9×3	0 AG 9×9×3	GK 9×10×3	N 8×8×3	N 4×4×2	N 4×4×2	N 4×4×2
		23	290	300	發赤 硬結	17×10 6×6×3	10×10 4×4×3	9×9 6×6×3	9×7 A 10×10×4	0 A 10×10×10	G 5×5×3	GK 4×4×3	GK 4×4×2	N 4×4×2	N 4×4×2
肋 膜		28	280	310	發赤 硬結	16×16 5×5×3	12×12 5×5×3	6×6 A 4×3×2	5×5 A 4×3×2	0 G 4×3×2	G 4×3×2				
		36	280	280	發赤 硬結	5×6 3×3×2	5×6 3×3×2	5×5 A 3×3×2	5×5 A 3×3×2	0 G 3×3×2	NK 2×2×2	NK 2×2×2	N 2×2×2	N 2×2×2	N
		40	390	400	發赤 硬結	7×7 0	6×5 4×4×3	6×5 4×4×3	5×5 A 4×4×3	0 A 6×6×3	N 5×5×3	N 3×3×2	N 2×2×2	N 2×2×2	N
犬		104	250	270	發赤 硬結	20×20 5×5×3	7×7 5×5×3	0 6×6×6	A 6×6×6	A 5×5×5	A 5×5×3	A 4×4×3			
		106	320	330	發赤 硬結	15×15 5×5×2	6×6 5×5×3	0 5×5×3	A 4×4×3	A 4×4×2	A 4×3×2				
		127	260	260	發赤 硬結	17×17 4×4×3	5×5 4×4×3	0 4×4×4	A 4×4×4	A 4×4×4	A 4×4×3	A 4×4×3	A 4×4×2	A 3×2×2	N
B C G		126	320	370	發赤 硬結	12×12 5×5×3	8×8 5×5×3	0 6×7×5	A 8×6×5	A 8×7×5	AK 10×5×5	AK 10×5×5	AK 5×3×3	AK 5×3×3	N
		143	360	380	發赤 硬結	23×23 10×10 ×5	10×12 7×7×5	0 7×7×5	A 6×6×3	A 5×5×3	AK 5×5×3	AK 5×5×3	AK 5×8×3	AK 5×3×2	N

第3節 供試菌ノ健康海狸接種實驗(對照)

第2節ノ實驗成績ガ單ニ供試菌ノ毒力ニヨル反應デアルカ、或ハ Allergie 性ノモノ即 Koch 氏現象カラ確メル目的デ第1節ノ實驗ノ對照トシテ健康未處置海狸ニ供試菌ノ皮内接種ヲ試ミタ。

第1項 實驗方法

試獸ハ體重 800g 内外ノ白色海狸デ、ツ反應陰性ナルヲ確メテ用ヒタ。供試菌ハ第1章ノ實驗ニ同ジ。注射方法ハ、供試菌 1mm ヲ豫メ剪毛消毒シタ海狸皮内ニ接種シ、發赤、硬結其他ノ變化ヲ日ヲ追フテ觀察シタ。此ノ實驗デハ動物數ヲ節約シテ2~3株ヲ同一試獸ノ2~3ヶ所ニ接種シタ。

第4節 對照實驗ノ成績

第2表 こつほ氏現象對照

人系及ビ動物系抗發菌ノ健康海狸皮内接種

菌株名	菌量	試番	體重	経過 日數	1 日	2 日	4 日	6 日	8 日	10 日	12 日	14 日
人非5		111g	270g	280g	發赤 3×3 硬結 2×2×2	0 2×2×2	2×2×2	H				
肋膜					發赤 3×3 硬結 2×2×2	0 2×2×2	2×2×2	2×2×2	A 2×2×2	G 2×2×2	G 2×2×2	N
人痰80					發赤 5×5 硬結 4×4×4	4×4 3×3×3	4×4 3×3×3	0 A 2×2×2	0 G 2×2×2	G 2×2×2	G 2×2×2	N
人非39		109	330	340	發赤 4×4 硬結 2×2×2	3×3 2×2×2	3×3 2×2×2	0 2×2×2		A 2×2×2	N	
牛肺(2)	1.0 mg				發赤 7×7 硬結 0	0						
福女					發赤 13×10 硬結 3×3×3	12×10 4×4×4	8×10 5×5×4	8×8 8×8×4	0 8×8×3		N 6×6×6	
犬		113	300	300	發赤 3×3 硬結 ±	3×3 2×2×2	4×3 3×3×3	3×3 3×3×2	0 2×2×2		N 2×2×2	
BCG					發赤 3×3 硬結 2×2×2	3×3 2×2×2	4×4 3×3×3	4×4 4×4×4	2×2 A 3×3×2	0 AK 3×3×2	AK 2×2×2	N

第2表ニ示ス如ク、炎症反應ハ何レモ現ハレタガ、發赤 2~4mm ノモノ多ク、只1株福女株ハ 13mmニ達シ、8日デ消失シタガ他ハ消失モ早ク第2日デ消失シタモノ4株アリ、硬結モ第1章實驗ノソレヨリ遙ニ小サク徑 2~3mm デアル。小膿瘍ヲ作ツクノハ人痰80、肋膜、人非39

ノ3株デ、小潰瘍ハ人痰80、肋膜ノ2株デアル。然シ其ノ消失ハ速カデ14日ニハ全ク治癒シタ。BCGハ發赤徑3mmデ硬結ノ徑ハ最大4mmマデデ14日ニハ消失シタ。

小括並ニ考案

豫メ BCGヲ以テフ反應陽性轉化セシメタ海猿ニ人系及ビ動物系抗酸菌7株ヲ、生菌ト死菌ニ分ケ1mgト0.01mg皮内接種シタ。注射局所ハ多少ニ拘ラズ發赤、硬結ヲ生ジ又膿瘍、潰瘍ガ出來或ハ痂皮ヲ伴ヒ瘡痕ヲ胎シ又殘サズニ治癒シタ。BCGヲ接種シタ試獸モ略同様デアツタ、對稱實驗トシテ未處置海猿ニ生菌1mgヲ皮内接種セルモノハ發赤、硬結共ニ少シク現ハレ又膿瘍ガ出來タノモアツタガ、第1節ノ實驗ニ比シテ其ノ程度遙ニ弱ク、持續期間モ亦短イ。之ニ依リ第1節ノ實驗ハ人系及ビ動物系抗酸菌ニヨル K氏現象ト云フコトガ出來ル。反應ノ程度ハ生菌1mg最モ強ク、死菌1mg之ニ次ギ。死菌0.01mg最モ弱イ。以上ノ實驗ニ於テ福女、人痰80、犬ノ3株ハBCGト殆ンド同様ナ強イ反應ヲ示シタ。Koch氏現象ハ Pirquet⁽¹⁵⁾ノ提唱スル Allergieノ状態ニヨリ惹起セラレ、尙 Allergieノ發現ガ動物體或ハ人體ノ結核感染ニ對スル免疫力ノ一標示トナリ得ルコトモアル故以上ノ如ク K氏現象ヲ強ク現ハス菌株ヲ以テ結核感染免疫試驗ヲ行フコトニシタ。

第2章 人系及ビ動物系抗酸菌ニ依ル結核免疫實驗

1882年 Kochニヨリ結核菌ガ發見セラレテカラ、種々ノ結核免疫實驗ガ企テラレタ。即結核死菌ニヨルモノ、結核菌體抽出物ニヨルモノ、物理化學的ニ變化セラレタ結核菌ニヨルモノ、或ハ弱毒結核菌ニヨルモノ等枚舉ニ暇ナキ程デアル。又冷血動物結核菌ヲ以テ免疫ヲ試ミタモノモアル。即 A. Moeller⁽¹⁶⁾ハ蛇ヨリ分離シタ抗酸菌デ結核免疫ヲ企テ治療及ビ豫防ニ有効ナリト唱ヘタガ一般ノ認ムルトコロトナラズ、Friedmann⁽¹⁷⁾ハ龜ヨリ一種ノ抗酸菌ヲ分離シ、溫血動物ニ無害デ結核ノ豫防及ビ治療ニ有効ナリト宣傳シタガ、Kolle, Schlossberger⁽¹⁸⁾ハ其ノ効果ヲ否定シ、又1923年獨逸ニ開カレタ委員會ノ席上デ Neufeld, Uhlenhuth, Krause, Neisser, Korte, Schittenhelm⁽¹⁹⁾及ビ其他ノ學者ニ依ツテ否定サレタ。其他 Bruno, Lange⁽²⁰⁾モ冷血動物結核菌ノ結核免疫力ヲ否定シタ。今村⁽²¹⁾ハ高橋トノ實驗ノ結果、ちもて菌、めよるれる菌等ハ有毒結核菌ニ對シテハ免疫力ヲ持タナイト云ツタ。

弱毒牛型結核菌ト云ハルル CalmetteノBCG以外ニハ今日一般ニ結核免疫元トシテ認メラレテ居ルモノハナイ。余ハ第1章 Koch氏現象實驗ノ際、比較的強イ該現象ヲ呈シタ人系及ビ動物系抗酸菌3株ヲ撰ビ結核免疫實驗ヲ試ミタ。

第1節 供試菌並ニ供試動物

供試菌ハ人痰80, 福女, 犬ノ3株デ其ノ由來ハ第1章ニ述ベタ。試獸ハ體重200g内外ノ健康海豚ヲ用ヒ, 1群7匹ヅツトシタ。第1回實驗デハ無處置對照群共4群トシ, 第2回及ビ第3回實驗デハBCG群ヲモ加ヘテ5群トシタ。

第2節 實驗方法

第1項 菌液ノ調製法並ニ豫防接種ノ方法

供試菌中人痰80, 福女ノ2株ハ Petraghani 氏培地培養10日ノモノヲ, 犬株ハ同ジク1ヶ月ノモノヲ用フ。

第1回實驗デハ滅菌生理的食鹽水 0.5cc中ニ供試菌1mgヲ含ム如ク調製シタ菌液0.5ccヲ, 試獸大腿部皮下ニ接種ス。

第2回實驗デハ供試菌4mgヲ0.5ccノ食鹽水ニ含ム如ク作ツテ之ヲ全量驗獸皮下ニ接種ス。

第3回實驗デハ5mgノ供試菌ヲ0.5ccノ食鹽水ニ含ム如ク調製シタ菌液ヲ前回ノ如ク全量試獸大腿部皮下ニ接種ス。

第2項 結核菌感染ノ方法

當教室保存ノ人型結核菌 Frankfurt 株(以後ハFト略記ス)ノ Petraghani 氏培地培養1ヶ月ノモノヲ, 戸田氏法⁽²²⁾ニヨリ食鹽水浮游液トナシ其ノ0.5cc中ニ菌量0.1mgヲ含ム如ク調製ス。此ノ菌液0.5ccヲ, 供試抗酸菌接種後3週間ノ試獸左側大腿部皮下ニ接種ス。

第3項 經過並ニ成績ノ判定

ツ反應ノ検査ハ戸田氏規準⁽¹²⁾ニヨリ一定期間毎ニ行ヒ, 體重ハ空腹時ヲ撰ビ豫防接種時, 人F感染時及ビ剖檢時ニ測定シタ。斃死獸ハ當日ニ, 最後マデ生存セルモノハ人F感染後6週間デ撲殺シテ剖檢シ肉眼的ニ觀察シタ。試獸ハ人F感染前或ハ感染後日淺クシテ未ダ結核變化ヲ肉眼的ニ認メラレナイ中ニ, 氣候ノ變化, 鼠害等ノ爲各回トモ數匹ヅツ斃死シタモノヲ除ケバ結局第1回實驗デハ32匹中28匹, 第2回實驗デハ40匹中27匹, 第3回實驗デハ40匹中32匹ガ實驗ノ最後マデ生存シタ。

第3節 第1回實驗ノ成績

供試菌1mgヲ用ヒタ第1回ノ免疫實驗ニ於テハ犬群ハ對照ニ較ベテ相當ノ免疫力ヲ示シタ。人痰80群ハ僅カニ感染防禦力ガアル様デアツタガ福女群ハ對照ト太差ナク, 唯體重ノミハ各群共對照ヨリモ増加シタ。ツ反應ハ實驗ノ初メ陰性ノモノガ抗酸菌接種2週間デ人痰80群ハ疑陽性トナリ2例ハ弱陽性デアツタ。福女群ハ多ク疑陽性デ陰性ノモノモアツタガ犬群ハ全

例弱陽性トナツタ。表ハ略ス。

第 4 節 第2回實驗ノ成績

供試菌 4mg ヲ用ヒタ本回ノ實驗デハ3群トモ對照ニ較ベテ結核性變化少ク、明ラカニ供試抗酸菌ニハ結核感染防禦力ガアル様ナ成績ヲ示シタ。説明ヲ簡單ニスル爲ニ第3表ヲ掲ゲル。

第 3 表 人系及び動物系抗酸菌ニヨル免疫實驗(第2回)

群別	動物番號	内 臟 所 見				淋 巴 腺 所 見								體 重 ノ 變 化				
		肝	肺	脾	腎	腺 腋 腹		鼠 蹊		氣 管	腸 間 膜	肝 門	後 腹 膜	第 1 感 染 時	第 2 感 染 時	剖 検 時	(甲)ノ増減	増減平均
		變 化	變 化	重 サ	重 サ 平均	左	右	左	右	支	膜	膜	膜				(乙)ノ増減	
對 照 群	137	++	++	主	0.8	+	+++ _k	+	+++ _k	++	++	++	++	190	210	240	30	26
	138	++	++	++	0.8	+	+++ _k	+	+++ _k	++	++	++	++	220	230	230	0	
	139	++	++	+	0.7	0.7	++	+	+++ _k	++	++	+	++	200	220	250	30	
	141	++	++	++	0.9	+	+++ _k	+	+++ _k	++	++	++	++	200	250	280	30	
	143	++	+	+	0.4	+	+++ _k	-	+++ _k	++	++	++	++	220	230	270	40	
人 疫 80 群	121	+	+	++	0.6	+	+++ _k	+	+++ _k	++	++	++	++	230	220	250	30	52
	122	-	-	+	0.6	+	+++ _k	+	+++ _k	+	++	+	++	240	220	280	60	
	124	+	+	-	0.4	0.6	++	+	++	++	++	++	++	200	200	220	20	
	125	+	-	+	0.7	+	+++ _k	+	+++ _k	++	++	+	++	210	210	280	70	
	126	-	-	-	0.5	+	+++ _k	+	+++ _k	+	++	+	++	200	200	280	80	
福 女 群	115	+	-	++	1.0	+	+++ _k	-	+++ _k	++	++	++	++	200	220	280	60	47
	116	-	+	+	0.7	+	+++ _k	+	+++ _k	++	++	++	++	210	220	250	30	
	111	-	-	-	0.5	0.8	++	+	+++ _k	++	++	++	++	210	230	310	80	
	118	++	++	++	1.0	+	+++ _k	+	+++ _k	++	++	++	++	240	240	280	40	
	119	++	+	++	1.0	+	+++ _k	+	+++ _k	++	++	++	++	220	220	260	40	
犬 群	113	-	+	-	0.6	+	+++ _k	+	+++ _k	++	++	++	++	240	250	280	30	51
	128	+	+	+	0.5	+	+++ _k	+	+++ _k	+	+	+	++	230	240	270	30	
	131	-	-	-	0.3	+	+++ _k	+	+++ _k	+	+	+	+	200	190	240	50	
	132	-	-	+	0.4	0.5	++	+	++	+	++	++	++	200	210	280	70	
	133	-	-	+	0.6	-	+++ _k	+	+++ _k	++	++	++	++	220	230	260	30	
B C G 群	134	-	-	-	0.4	+	+++ _k	-	+++ _k	+	++	++	++	200	210	260	35	50
	135	-	+	-	0.5	+	+++ _k	+	+++ _k	+	++	++	++	230	240	320	80	
	104	++	++	++	0.5	+	+++ _k	+	+++ _k	++	++	++	++	220	220	240	20	
	105	+	+	+	0.5	+	+++ _k	+	+++ _k	+	++	++	++	220	230	270	40	
	107	-	+	+	0.5	0.5	++	+	++	+	++	++	++	210	230	270	60	
	108	-	-	-	0.6	+	+++ _k	-	+++ _k	+	++	++	++	210	220	230	80	
	109	-	-	-	0.4	+	+++ _k	+	+++ _k	+	-	-	+	200	220	270	50	

淋巴腺ノ記載法ハ變化ナキモノ、米粒大1~2ヶ、米粒大3ヶ又ハ小豆大1~2ヶハ、小豆大3ヶ又ハ大豆大1ヶハ、蠶豆大ハ、乾酪化シタモノハKトスル。内臓ハ肉眼的ニ變化ナキモノハ、粟粒大結節1ヶノモノハ、結節2~3ヶノモノハ、結節數ヶノモノハ、結節多數ノモノハ、結節ヲ以テ滿サレタモノハトシタ。

先ヅ對照群ノ内臓所見ヲ見ルト5例共肺、肝、脾ニ粟粒大ノ結節多數出來、近接淋巴腺ハ大豆大ニ腫脹シ且乾酪化シ、他ノ淋巴腺モ表ノ如ク腫脹シタ。人痰群ハ内臓ニ結節ヲ全く認メナイモノ1例アリ。他ハ多少之ヲ見タモノモアルガ、對照ニ較ベ明ラカニ輕度デアル。淋巴腺ノ變化ハ對照ト大差ハナイガ幾分輕度デアル。福女群ハ人痰群ト對照群トノ中間ノ成績デアツタ。犬群ハ内臓ニ全く變化ナイモノ2例デ、他ノ4例ハ肺又ハ脾ニ1~2ヶノ結節ヲ見タガ上記3群ヨリ變化一般ニ輕度デアツタ。

BCG群ハ5例中2例ハ内臓ニ變化ヲ見ズ、他ハ大體犬群ト同様デアル。但1例ハ對照ト同様ノ結核變化ヲ見タ。體重ノ變化ハ人F感染ヨリ剖檢マデノ42日間ニ於テハ平均對照群24g、福女群47g、人痰群52g、犬群51g、BCG群50gト各群トモソレゾレ増加シタ。

第5節 第3回ノ實驗成績

供試菌5mgヲ以テ免疫シタ本回ノ實驗ハ第4表及ビ附圖第1表ノ示ス如ク3群トモ無處置對照ニ比ベテ結核變化明カニ少ク供試菌ハ結核免疫力ガアルト思ハレル。

對照群ハ肺、肝、脾共ニ多數ノ粟粒大ノ結節ヲ見ルモノ多ク、近接腺ハ大豆大以上ニ腫脹シ且乾酪化シタ。其他ノ淋巴腺モ表ノ如ク多ク腫脹シ左側ノ鼠蹊腺モ多ク乾酪化ヲ見タ。脾ハ腫脹強ク結節著明デ表面凹凸不正デ其ノ平均重量ハ1.4gデアル。

人痰群ハ、肝ニ結節其他ノ變化ヲ見ズ、肺ノ4例ハ結節其他ノ變化ナク只2例ニ粟粒大結節2~3ヶヲ見タ。脾ハ結節ナキモノ3例、1~2ヶノモノ1例、數ヶノモノ2例デ平均重量ハ0.8gデアル。淋巴腺ノ變化ハ對照群ト大差ヲ認メナイ。

福女群ハ、肝ニ變化ナキモノ4例デ他ノ2例ハ1~2ヶノ結節ヲ見タ。肺ニ結節ヲ見ナイモノ1例、1ヶノモノ1例、2~3ヶノ結節アルモノ及ビ數ヶノ結節アルモノ各々2例デアル。脾ハ結節ナキモノ1例、2~3ヶアルモノ3例、數ヶアルモノ1例、結節ヲ以テ滿サレタモノ1例アリ、其ノ平均重量ハ0.9gデアル。

犬群ハ、肝ニ結節其他ノ變化ヲ見ズ、肺ハ變化ナキモノ2例、1ヶノモノ2例、2~3ヶノモノ1例、數ヶノモノ1例アリ。脾ハ結節ナキモノ5例、數ヶノ結節アルモノ1例デ、其ノ平均重量ハ0.9gデアル。

BCG群ハ、肝ニ變化ナキモノ7例、結節1ヶヲ見ルモノ1例デアル。肺ニハ全例ニ結節其他ノ變化ヲ見ズ。脾モ亦全例ニ結節其他ノ異狀ナク平均重量ハ0.5gデアル。淋巴腺ノ腫脹ハ

第 4 表 人系及び動物系抗酸菌ノ免疫實驗(第3回)

群別	內臟所見				淋巴腺所見						つ反應		體重ノ變化									
	動物番號	肝臟	肺臟	脾臟	變化		重サ	平均	膝蓋	鼠蹊	腋窩		氣管支	腸間膜	肝門	後腹膜	未感染時	第1回14日感染後	第2回1日感染後	刮檢時(乙)	刮檢時(甲)	増減ノ平均
					變	化					左	右										
對照群	174	+	+	++	++	1.0			++	++	+	+	+	+	+	++	+	+	260	290	270	-20
	175	+	+	++	++	1.1	1.4		++ _k	++ _k	+	+	+	+	+	++	+	+	260	290	210	-80
	176	+	+	+++	+++	2.6			++ _k	++ _k	+	+	+	+	+	++	+	+	280	310	280	-30
	178	+	+	+++	+++	1.2			++ _k	++ _k	+	+	+	+	+	++	+	+	270	290	260	-30
	180	+	+	+++	+++	1.1			++ _k	++ _k	+	+	+	+	+	++	+	+	250	270	290	+20
	181	+	+	+++	+++	1.2			++ _k	++ _k	+	+	+	+	+	++	+	+	250	260	270	+10
人痰80群	142	-	-	-	++ _k	0.6			++ _k	++ _k	-	+	+	+	+	++	+	+	260	300	340	+40
	143	-	+	-	++ _k	0.7	0.8		++ _k	++ _k	-	+	+	+	+	++ _k	+	+	290	310	340	+30
	145	-	-	+	++	0.7			++	++	+	+	+	+	+	++	+	+	240	270	290	+20
	146	-	-	+	++	0.8			++	++	-	+	+	+	+	++ _k	+	+	260	300	300	0
	152	-	-	+	++ _k	0.7			++ _k	++ _k	-	+	+	+	+	++	+	+	310	350	390	+40
	153	-	-	-	++	0.6			++	++	-	+	+	+	+	++	+	+	260	300	340	+40
	155	-	-	-	++	0.6			++	++	-	+	+	+	+	++	+	+	280	240	290	+50
屬女群	157	-	+	+	++ _k	0.7	0.7		++	++	+	+	+	+	+	++	+	+	260	290	300	+10
	160	-	+	+	++	0.6	0.7		++	++	-	+	+	+	+	++	+	+	300	330	360	+60
	162	-	+	+	++	0.6			++	++	-	+	+	+	+	++	+	+	270	270	360	+90
	163	-	+	+	+++	1.1			++	++	-	+	+	+	+	++	+	+	250	280	320	+40
	159	-	-	+	++	0.7			++	++	-	+	+	+	+	++	+	+	300	320	360	+40

群別	動物番號	内臓所見				淋巴腺所見				つ反腫				體重ノ變化			
		肝	肺	脾	平均	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	平均	増減ノ平均
犬群	166	+	+	+	0.6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	167	+	+	+	0.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	168	+	+	+	0.9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	169	+	+	+	0.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	170	+	+	+	0.7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	171	+	+	+	0.8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
BCG群	185	+	+	+	0.4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	184	+	+	+	0.4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	187	+	+	+	0.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	189	+	+	+	0.8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	191	+	+	+	0.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	192	+	+	+	0.6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	193	+	+	+	0.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	194	+	+	+	0.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	195	+	+	+	0.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	196	+	+	+	0.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

BCG群一般ニ輕度デ、他群間ニハ大差ナシ。つ反應ハ、人痰群、福女群共2免疫後2週間デ大部分疑陽性トナリ、犬群トBCG群ハ共ニ至例弱乃至中等度陽性トナツタ。體重ノ變化ハ、人F感染ヨリ剖檢マデノ42日間ニ於テ對照群ハ平均21g減少シタガ、人痰群ハ平均28g、福女群ハ48g、犬群ハ57g、BCG群ハ63gトソレゾレ増加ヲ示シタ。

小 括

人系及ビ動物系抗酸菌3株ヲ用ヒ海眞ニ對スル結核免疫實驗ヲ行ツタ。供試菌1mgヲ用ヒタ第1回實驗デハ、人痰80株ハ多少ノ免疫力ヲ示スニ過ギナイガ、菌量4mgヲ使ツタ第2回ノ實驗デハ、對照ニ較ベ相當ノ感染防禦力ヲ現シ、菌量5mgヲ使用シタ第3回實驗デハ顯著ナル免疫力ヲ示シタ。福女株ハ、1mgデハ認めベキ免疫力ナク、4mgヲ用ヒタ第2回實驗デハ僅

カニ感染防禦力ヲ示シ、5mgヲ使用シタ第3回ノ實驗デハ相當ノ免疫力ヲ認メタ。犬株ハ1mgデモ相當ノ結核感染防止力ガアツタガ4mg、5mgト大量ヲ用ヒタ實驗デハBCGニ近キ免疫力ヲ示シタ。つべるくりん反應ハ人痰80株及ビ福女株ハ接種後2週間デ多ク疑陽性ニ轉化シ、犬群ハ大部分弱陽性ニ轉化シ時ニ中等度陽性ヲ示スモノモアツタ。

第3章 人系及ビ動物系抗酸菌ニヨル沈降反應

結核菌ノ特異沈降元ノ研究ハ、Zinsser u. Tamiya⁽²¹⁾等ノ研究以來可成多クノ學者ニ依ッテ研究セラレテ居ルガ、自然界抗酸菌ノ沈降反應ヲ試ミタモノハ少イ。内藤⁽²²⁾ハ數種ノ抗酸菌ニ就キ稀鹽酸、あせとん、あるこーるヲ用ヒ複雑ナ操作ニヨリ沈降元ヲ得、沈降元ガ同ジ程度ニ陽性ナ菌株ハ生物學的性狀モ同様デアルト稱シタ。

草場⁽²³⁾ハ蒸溜水浸出液ヲ以テ抗原ヲ作り、多數ノ抗酸菌ニ就キ沈降反應ヲ試ミ7群11系ニ分類シ、分類菌群間ニハ何レモ類似ノ生物學的性狀ヲ有スルガ、全般ヲ通ジテハ特異トスルベキ性狀ハ見出シ得ナイト云ツタ。余ハLancefield⁽²⁴⁾ガ溶血性連鎖狀球菌ヨリ沈降元ヲ作ツタ方法ヲ應用シ、稀鹽酸浸出液ヲ用ヒ抗酸菌ノ沈降元ヲ得タ。即チ前章ニ於テ免疫實驗ニ供シタ3菌株ノ家兔免疫血清ト、各種抗酸菌61株ヨリ得タ抗原トヲ以テ沈降反應實驗ヲ行ヒ、以上3供試菌ノ歸屬ヲ知ラントシタ。

第1節 供試菌並ニ實驗方法

第1項 供試菌及ビ其ノ由來

1, 免疫血清ヲ得ル爲ニ用ヒタ菌株ハ人痰80, 福女, 犬ノ8株デ之等ノ菌ノ由來ハ第2章ヲ述ベタ。

2, 抗原ニ用ヒタ菌株名。

人系； 人痰80, 福女, 人非5, 人非89, 肋膜, 松木, 大曲

動物系； 犬, 牛膿(2)

所謂恥垢系； SMXⅢ, XⅦR, 33S

恥垢系； のいふえんど1型

土壤系； 土178, 土176, 土121, 土140, B100

昆蟲系； 蚊

植物系； ぐらす, ちもて

穀物系； 粳, H粟, 麥, 豆252, B+C

上水系； S54, S50A, S50B

糞便系； 牛糞66, K161, K162, K155A, 牛糞56

人類系；竹内K, くれつぐ, ちゆばー, 田中, 西

鼠類系；920, 内田A, 内田D, 2140, 長崎65

人型結核菌；人F, T24, 佐竹, 石田, 永前

牛型結核菌；牛三輪, 牛I, 牛II, 牛北, 牛Ri, BCG

鳥型結核菌；A62, A71, Tb13

3, 菌ノ由來=就イテハ人痰80, 福女, 犬, 牛腺(2), 人非5, 肋膜, 大曲ハ第1章=述ベク。松木ハ外科的結核患者ヨリ分離サレタモノデアル。SMⅠⅢ, ⅠⅣR, 33S, のいふえろトⅠ型ハ當教室玉重ガ青年及婦人恥垢カラ分離シタモノデアル。T24ハ外科的結核材料カラ余ノ分離シタ結核菌デアルガ, 其他ノ菌株ハ當教室保存ノモノデ其ノ由來=就イテハ占部⁽²⁷⁾ノ論文参照スベシ。

第2項 抗元ノ製法

余ハ *Lancefield*⁽²⁸⁾ガ溶血性連鎖狀菌ノ特異沈降元ヲ作ツタ鹽酸法ヲ少シク改メテ抗酸菌ノ沈降元ヲ得タ。即チ1;20定規鹽酸2cc=供試菌ノ *Petragnani* 氏培地培用10日ノモノ4mgヲ, 結核菌デハ80日ノモノノ同量ヲ溶解セシメル。乾硬ナ菌ハ乳鉢デ法ノ如ク磨碎溶解ス。之ヲ試験管=入レ重湯煎中=15~20分煎湯シタ後すびつつぐらす=採リ1分間3000廻轉ノ遠心器=20~30分間遠心沈澱サセタ後其ノ上清液ヲびべつとデ吸上ゲ, 他ノういだーる試験管=採リ定規苛性曹達液ヲ滴下シテ中性トナシタ。之ガ余ノ沈降元デアル。本抗元ハ微量ノ蛋白質含ム含水炭素物質ヨリナルモノデアル。色彩反應ハ第6表參照。

第6表 沈降元ノ色彩反應比較

反 應 名	沈降元名	内藤	草 場				池 田		
			Nr.1	Nr.2	Nr.3	Nr.4	A	B	C
Biuret	±	+	+	±	±	±	±	+	+
Molisch	+	++	++	++	++	++	++	++	++
Millon	±	+	+	±	++	+	+	+	+
Xanthoprotein	-	±		-	+	+	±		+
坂口氏反應	+								
Ninhydrin	±	±	-	-	±				
醋酸鉛		-		-	-		-	-	-
Tetrabrom Pheulphthalen							++	+	++

備考：内藤氏抗元：0.2%中性水溶液
 草場氏抗元：Nr.1±140 2斜面, 20cc水溶液2cc
 Nr.2竹内K3斜面, 20cc水溶液2cc
 Nr.3森 2.5斜面, 20cc水溶液2cc
 Nr.4泉 WF3斜面, 20cc水溶液2cc
 池田氏抗元：A：人痰80 4mg, 2cc中性水溶液
 B：牛 md 4mg, 2cc中性水溶液
 C：牛 l 4mg, 2cc中性水溶液

第3項 免疫血清ノ製法

體重2kg前後ノつ反應陰性ナ健康家兎ヲ撰ビ1菌株ニ2匹ツツヲ用ヒタ。菌液ハ食鹽水1cc中ニ供試菌5mgノ割ニ含ム様ニ調製スル。菌量ハ初メ5mgヨリ漸次増加シテ3~4日ノ間隔デ同量又ハ倍量ヲ家兎耳靜脈内ニ接種スル。時々沈降價ヲ検査スルコトトシ、生菌ト死菌ヲ交互ニ接種シ1回最高30mgニ達シタガ最後ノ注射後3~7日ノ後全採血シテ血清ヲ分離シタ。

第4項 沈降反應實施法

ういだー試験管7本、毛細試験管7本ヲ用意スル。

余ノ抗原ヲ2倍ヨリ倍數稀釋シテ32倍迄トシテ置ク。先ツ毛細びべつトヲ用ヒ、6本ノ試験管ニ豫メ食鹽水デ2倍ニ稀釋シタ非動性免疫血清ヲ入レ、最後ノ1本ハ非動性健康家兎血清ヲ入レル。次ニ抗原ノ倍數稀釋液ヲ2倍ヨリ32倍迄毛細管壁ニ沿ヒ順次ニ入レ、第6本目ハ食鹽水ヲ入レ、第7本目ハ抗原2倍稀釋液ヲ入レテ操作ヲ終ル。之ヲ室溫ニ放置シテ觀察スルト早キハ1~2時間デ反應現ハレタガ2時間マデニ現ハレタモノヲ陽性トシタ。

第5表 沈降反應成績

抗原稀釋度		2×	4×	8×	16×	32×	KI	KI	抗原名
血清名									
人痰 福女 犬	80	+	+	+	+	+	-	-	人痰 80
		-	-	-	-	-	-	-	
		+	+	+	-	-	-	-	
人痰 福女 犬	80	+	+	-	-	-	-	-	B C G
		-	-	-	-	-	-	-	
		+	+	+	-	-	-	-	
人痰 福女 犬	80	+	-	-	-	-	-	-	牛 北
		-	-	-	-	-	-	-	
		+	+	+	+	-	-	-	
人痰 福女 犬	80	+	+	-	-	-	-	-	麥
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
人痰 福女 犬	80	-	-	-	-	-	-	-	±178
		-	-	-	-	-	-	-	
		+	+	-	-	-	-	-	

備考 KI……生理的食鹽水+免疫血清
 KI……抗元2倍液+健康血清
 血清ハ何レモ非動性家兎血清ナリ

第 7 表 沈 降 反 應 試 驗 成 績

菌 系	抗 元	人 系			動物系		上水系		下水系		土 壤 系				穀 物 系		
		人 漿 80	福 女 肋 膜 39	人 非 5	大 曲 松 木 (2)	牛 豚 犬	W4 S50 A	S50 S50 A	S54 B	土 140	土 178	土 176	土 121	土 100	粗 粳	H 粟 麥	豆 252
人 系	人 漿 80 女	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊
動物系	犬	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊

菌 系	抗 元	穀物系		昆蟲系		養 便 系		人 類 系		鼠 類 系		所 謂 恥 垢 系		
		B + C	ち も て	蚊 152	K 151	牛 糞 56	牛 糞 56	く れ 竹 内 づ ぐ	田 中 西	920 D	2140 95	長 崎 内 田 A	33s XN	SM X
人 系	人 漿 80 女	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊
動物系	犬	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊

菌 系	抗 元	恥 垢 系		人 型 結 核		牛 型 結 核		鳥 型 結 核	
		の い ち ら ぎ	元 1	佐 竹 石 田 T 24 永 前 人 F	牛 三 輪	牛 R 牛 I md	牛 牛 I	BC A 71	TB A 62 13
人 系	人 漿 80 女	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊
動物系	犬	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊

第2節 實驗ノ成績

沈降反應ノ個々ノ結果ハ第5表ノ如キ記載法ヲ取ツタガ之ヲ簡單ニ一括シテ第7表ヲ得タ。

人痰80ノ免疫血清ハ、同株ノ沈降元トヨク反應スル外、他ノ人系抗酸菌、人型、牛型ノ結核菌、犬株、人癩系、糞便系、上水、下水系ニ反應シ、鳥型結核菌トモ少シク反應シタガ、鼠癩系、植物系、昆蟲系、土壤系トハ殆ンド或ハ全ク反應ヲ起サナカツタ。

福女株ノ免疫血清ハ、人系抗酸菌、人型、牛型、鳥型ノ結核菌ニ反應シ、糞便系ニ僅カニ反應シタガ1~2ノ例外ヲ除ケバ他ノ自然界抗酸菌ニハ反應ヲ示サナイ。

犬株ノ免疫血清ハ、人型、牛型ノ結核菌ニヨク反應シ、鳥型結核菌、人系、動物系、人癩系ニモ可成リヨク反應シタガ、鼠癩系、上水系、下水系、植物系、昆蟲系、土壤系ノ抗酸菌ニハ殆ンド或ハ全ク反應ヲ示サナイ。

小括及ビ考案

人系2株、動物系1株ノ抗酸菌ノ家兔免疫血清ト、各種抗酸菌61株ヲ用ヒ *Lancefield*⁽²⁸⁾ 法ニ余ノ考案ヲ加ヘテ得タ抗原トノ沈降反應試驗ヲ試ミタ。

人痰80株ハ人系及ビ牛、犬ノ如キ比較的高等動物系ノ抗酸菌及ビ人型、牛型ノ結核菌、人癩系、糞便系ト反應シ鳥型結核菌トモ少シク反應スルガ、比較的下等動物ノ鼠癩系、昆蟲系ノ抗酸菌ヤ植物系ノモノトハ殆ンド或ハ全ク反應シナイ。

福女株ハ人系抗酸菌、人型、牛型、鳥型結核菌ニ反應シ糞便系ノ一部ニ少シク反應シタガ他種ノ抗酸菌ニハ殆ンド或ハ全ク反應シナカツタ。

犬株ハ各種結核菌ニヨク反應シ、人系、比較的高等動物系ノ抗酸菌及ビ人癩系トモ反應シタガ、比較的下等動物ノ鼠癩系、昆蟲系其他一般自然界抗酸菌トハ殆ンド反應ヲ起サナイ。以上ノ成績ヨリ案ズルニ、人系及ビ高等動物系ノ免疫血清ハ、結核菌ニヨリ反應スル様デ兩菌系ノ間ニ何等カノ近親關係ガアル様ニ思ハレル。又人系抗酸菌ハ人系及ビ高等動物系ノ抗酸菌ト反應シ、比較的下等動物系抗酸菌ヤ植物系等ト反應シナイノハ興味深イコトデアール。犬株ハ此ノ沈降反應ノミヨリ推斷シテモ結核菌ノ一種デアラウ。尙沈降元ノ絶對の特異性ハ認めラレナカツタ。

第4章 人系及ビ動物系抗酸菌ノ動物接種實驗

並ニ他ノ2~3生物學の性狀(附)

自然界ノ抗酸菌ガ或種ノ動物ニ對シテ何程迄ノ組織反應ヲ起シ得ルコトハ、既 本菌發見當初ニ *Ralinowitch*⁽²⁸⁾、*Müller*⁽²²⁾、*Petri*⁽³⁰⁾ 等ニヨリ證明セラレタ。其後本菌ノ動物ニ對ス

ル病原性ノ研究ハ多數ノ學者ニヨリ行ハレタ。或者ハ本菌ニヨル變化ガ結核菌ニヨルモノト
ヨク近似スルカ、全ク一致スルモノデアルト報告シ、他ハ之ニ反シテ本菌ハ動物ニ對シテ全
ク病原性ナキモノトシタ。本菌ニ依ツテ起ル變化ガ結核菌ニ依ルモノト全ク一致スルカ又ハ
甚ダ近似スルモノト主張スル學者ハ Möller⁽³¹⁾, Lubarsch⁽³²⁾, Rodet u. Galavielle⁽³³⁾, Galli-
gaerio⁽³⁴⁾, Lunge⁽³⁵⁾等デ、全然異ツタモノトナスカ、又ハ似テ非ナルモノト云フ學者ハ、
Rabinowitsch⁽³⁶⁾, Hormann u. Morgenroth⁽³⁸⁾, Hoescher⁽³⁷⁾, Alexa⁽³⁸⁾, Telin⁽³⁹⁾, 末吉⁽⁴⁰⁾,
Pianet⁽⁴¹⁾, 戸田, 占部⁽⁴²⁾草場⁽⁴³⁾等デアル。又戸田, 占部ハ人癩, 鼠癩カラ得タ菌モ自然界
抗酸菌ノ迷入セルモノニ過ギナイト云ツタ。余ハ前3章ニ人系及ビ動物系抗酸菌ノ免疫學的
實驗ヲ述ベタガ、之ニ用ヒタ3菌株ニ就キ動物接種試驗ヲ行ヒ其ノ病原性ノ有無ヲ知ラント
シタ。

第1節 供試菌ノ動物接種試験

甲、供試菌ノ海狸皮内接種實驗

第1項 供試動物並ニ實驗方法

供試菌ハ前章ニ用ヒタ人痰80, 福女, 犬ノ3株トスル。

1, 供試菌ノ Petraghani 氏増地培養10日ノモノヲ, 但犬株ハ30日ノモノヲ用ヒ, 之ヲ乳鉢
中ニ採リ食鹽水ヲ滴下シツツヨク研磨シ其ノ0.1cc中ニ2mg菌量ヲ含ム如キ平等菌浮游液ヲ使
用直前ニ作ル。

2, 體重200g内外ノ白色健康海狸ヲ撰ビ各株毎ニ5匹ヅツトシ, 右上腿部皮内ニ前記菌液ヲ
0.1cc接種シ42日間觀察シタ。

第2項 成績ノ判定

實驗ノ前後ニ體重ヲ測定シ, 注射局所ノ變化ヲ觀察シ1~2週間置キニツ反應ヲ檢ベタ。剖
檢後ハ各淋巴腺ノ腫脹ノ有無, 諸内臓ノ狀況ヲ觀察シ, 其ノ一部ヨリ塗抹標本ヲ作り染色鏡
檢シ又材料ノ一部ヲ硫酸處置ノ後ベトラニヤーニ氏増地ニ培養シタ。尙臓器ノ一部ヨリ組織
標本ヲ作りパラフィン包埋法ヲ用ヒヒソおじんへまときしりん及ビチーるねるぜん兩染色標本
トナシ之ヲ觀察シタ。

第3項 實驗ノ成績

本實驗ニ用ヒタ海狸15匹ハ42日ノ實驗期間全例生存シタ。ツ反應ノ變化ハ人痰80群ハ第1
週, 第2週, 第3週共ニ疑陽性ヲ示スモノ多ク, 第6週ニハ弱陽性ニ轉化スルモノ多カツタ。
福女群ハ陰性又ハ疑陰性ニ始終シタ。犬群ハ第2週ヨリ中等度陽性ヲ示シタ。

第 8 表 供驗抗酸菌海狸皮內接種成績

群別	試獸番號	體重ノ變化			生存日數及死因	塗抹標本中ノ菌(上) 組織標本中ノ菌(中) 組織學的變化(下)							培養成績	剖檢時ニ於ケル肉眼的所見
		感染時	剖檢時	増減		内 臟				淋 巴 腺				
						肺	肝	脾	腎	膝蓋囊	鼠蹊	其他淋巴腺		
人疾80群	201	250	380	+130	42日目ニ全例撲殺	++ +	- -	- -	- -	+	-	肺 門	+	肺ニ薄墨色ノ部アリ、塗抹標本ニ抗酸菌ナシ、他ニ異狀ヲ見ズ
	202	250	350	+100		- -	- -	- -	- -				-	所見ナシ
	203	230	380	+150		- -	- -	- -	- -				-	所見ナシ
	204	220	370	+150		- -	- -	- -	- -				-	肺ニ一部薄墨色ノ部アリ此ノ部ノ塗抹標本ニ菌ヲ見ズ、他ニ異狀ナシ
	205	230	400	+170		- +	- -	- +	- -	+		腸間膜	+	所見ナシ
福女群	206	200	300	+100		++ -	- -	- -	- -	+		後腹膜	+	所見ナシ
	207	250	280	+ 30		- -	- -	- -	- -				-	所見ナシ
	208	210	380	+120		++ -	- -	- -	- -	-			+	所見ナシ
	209	230	280	+ 50		- -	- -	- -	- -	-			-	所見ナシ
	210	220	350	+130		- -	- -	- -	- -	-			-	所見ナシ
犬群	211	300	430	+130		++ +	++ +	++ +	- +	+	-		+	脾臓々脈膜スル外他ニ所見ナシ
	212	210	380	+170		++ -	- -	- -	- +	+		後腹膜	+	所見ナシ
	213	200	220	+ 20		++ -	++ -	- -	- +	+	-		+	所見ナシ
	214	230	350	+120		- -	- -	- -	- -	-			+	所見ナシ
	215	230	360	+130		- -	- -	- -	- -	-			+	所見ナシ

體重ハ各群共著明ニ増加シ、1例モ減少セルモノヲ見ナカツタ。注射局所ノ變ハ、各群トモ接種翌日又ハ2日目ニ發赤、腫脹ヲ呈スルモノ多ク、5日目頃小膿瘍、潰瘍ヲ作ルモノガアルガ2週間後ハ全例治癒シ、僅カナ脱毛部ヲ殘スモノ及ビ何等變化ヲ胎シズ治癒スルモ

ノガアツタ。3菌群間ニハ大差ヲ認メナカツタ。近接淋巴腺ハ接種1週間後ハ半米粒大乃至米粒大ノ腫脹ヲナスモノ1群中2~3例アツタガ、何等之ヲ觸レナイモノモ多カツタ。接種後42日デ撲殺シ剖檢スルニ1例モ結節ヲ認メズ一般ニ殆ンド變化ヲ認メナイ。即チ人痰80群ハ5例中3例ハ肺ニ異狀ナク、肺葉ノ一部ニ薄墨色半透明ノモノヲ見タ2例ガアツタガ此部ノ塗沫標本ニ菌ヲ見ナカツタ。此群5例中塗沫標本ニ抗酸菌ヲ見タノハ1例ノ肺ト膝皺襞淋巴腺トデアツタ。淋巴腺ノ所見ハ5例中2例ニ米粒大ニ腫脹シタ膝皺襞腺ト腸間膜腺ヲ見タニ過ギナイ。内臓及ビ淋巴腺ヨリノ培養成績ハ5例中2例ニ抗酸菌ノ發生ヲ見タ。組織學的檢査所見モ肉學的ノソレト同ジク僅少デ只肺ニ輕度ノ充血ヲ見タモノ2例アルガ、浸潤ヲ認メズ。肝ハ肝細胞ノ輕度ノ實質性變化ヲ認メルモノ1例アツタ。脾ニ異狀ナキモノ多ク只2例ニ靜脈竇僅カニ擴大セルモノヲ見タ。腎ニ異狀ヲ認メナイ。

福女群ノ所見モ人痰群ト略同様デ只肺ニ薄墨色ノ部ヲ認メナカツタ。

犬群ハ上記兩群ト同ジク肉眼的剖檢所見ニ殆ンド變化ヲ見ナカツタ。組織學的ニ肺ハ2例ニ於テ輕度ノ圓形細胞ノ浸潤ヲ見、肝ニ變化ヲ見ズ。脾ハ1例ニ網狀織内皮細胞ノ輕度ノ増殖アリ。隨質ノ一部ニ圓形細胞ノ浸潤アリ輕度ノ傳染脾ノ像ヲ呈シタ。腎ニ輕度ノまるびきマ氏小體ノ充血ヲ見タモノモアツタ。細菌學的ニハ塗沫標本ニ抗酸菌ヲ見タモノ3例デ、又2例ノ肺、肝、脾カラ組織標本中ニ抗酸菌少許ヲ見タ。本群ノ培養成績ハ全例抗酸菌ノ發育ヲ見タ。

乙、供試菌ノ家兎ニ對スル接種試驗成績

第1項 供試動物、供試菌並ニ實驗方法

供試動物ハ體重2kg内外ノ健康白色家兎デ、豫メツ反應陰性ナルコトヲ確メ1群2匹ツツヲ使用シタ。供試菌ハ甲ノ實驗ト同一ノ3菌株デ該實驗ト同様ノ條件ノモノヲ使用シタ。食鹽水1ccニ供試菌0.5mgヲ含ム如キ菌液ヲ作り、第1回ハ生菌ノママヲ次回ハ100°C1時間煮湯シタ死菌ノ同量或ハ倍量ヲ用ヒ、生菌ト死菌ヲ交互ニ3~4日ノ間隔ヲ置キ家兎耳靜脈内ニ接種シタ。

第2項 成績ノ判定

實驗ノ前後ニ體重ヲ測定シ、1~2週間置キニツ反應ヲ檢ベタ。尙該反應ニハ傳研舊ツベクくりンヲ用ヒル外ニ鳥型ツベクくりンモ併用シ其間屢沈降價ヲ測定シ且一般狀態ヲ監視シタ。剖檢後ノ觀察ハ海狸接種試驗ニ於ケルモノト同様ニシタ。

第3項 實驗ノ成績

第 9 表 供試抗酸菌家兎靜脈内接種試験成績

群別	家兎番號	體重ノ變化	生存日數及ヒ死因	接種菌量 (mg)	塗抹標本中ノ菌(上) 組織標本中ノ菌(中) 組織學的變化(下)									培養成績	剖檢時ニ於ケル肉眼的變化
					淋 巴 腺					内 臟					
					頸剖	胸骨	腋窩	鼠蹊	腸間膜	肺	肝	脾	腎		
人痰80群	11	-280	30殺	50	+	+	-	+	-	++	++	++	-	+	脾ハ2倍大ナル 膀胱ニ内容滿溜ス。脾3倍大。胃擴大シ内容充滿ス。
	12	+ 50	26死	52	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	
福女群	13	-170	15死	50	+	-	-	-	-	++	++	-	-	+	胃無力狀態トナリ内容充滿ス 胸腔ニ中等度ノ漿液滿溜ス
	14	-150	17殺	40	-	-	-	-	-	++	++	++	-	+	
犬群	15	-320	14死	30	++	++	+	++	++	++	++	++	-	+	胃擴大シ、内容充滿シ、膀胱ハ内容充滿ス
	16	-230	25殺	111	-	-	++	+	-	++	++	++	++	+	

試験6匹ノ中3匹ハ所要ノ沈降價ヲ得ルニ至ラナイ前ニ斃死シタ。接種菌量ハ斃死家兎デハ30~50mg, 全採血家兎デハ40~111mgデアツタ。生存日數ハ斃死家兎デハ14~16日, 全採血家兎デハ17~30日デアル。體重ノ變化ハ斃死獸, 全採血獸共ニ多クハ減少シタガ, 後者ノ中1例ニ僅カナ増加ヲ見タモノガアツタ。ツ反應ハ人痰, 犬ノ兩系ハ2週間後ヨリ舊つべるくりンニ中等度陽性ヲ示シ福女群モ3週間後ヨリ弱陽性トナツタガ, 鳥型つべるくりンニハ反應セズ陰性デアツタ。試験ハ靜脈注射2~3回マデハ何等異狀ヲ呈シナイガ, 4~5回ニ及ベバ接種後數時間ヲ舉動不安トナリ, 呼吸速迫シ, 食欲消失シ翌日斃死スルモノガアツタ。剖檢的所見ハ3群トモ大差ナク臟器ニ結節其他ノ著變ヲ見ナイ。肺, 肝ハ共ニ肉眼的ニ變化少ク, 脾ハ少シク肥大セルモノガアツタ。腎ノ所見モ少ク只周圍ニ脂肪ヲ沈着ヲ見タモノガアツタ。尙斃死獸ハ各群共胃ガ無力狀ニナリ内容ヲ停滯シ, 膀胱モ擴大シ内容ヲ瀦溜セルヲ見タガ福女群ニハ胸腔ニ中等度ノ漿液ヲ入レタモノガアツタ。細菌學的檢查ニヨレバ, 肺, 肝, 脾ヨリハ塗抹標本ニ抗酸菌ヲ證明シタモノ多ク, 又法ノ如ク内臟ノ一部ヲ採リ硫酸處理ニヨリ培養シタガ2~3週間デ多クハ抗酸菌聚落ノ發生ヲ見タ。淋巴腺ハ變化少ク只僅カニ腫大セルモノヲ見タ。組織學的檢查ニヨレバ, 人痰, 福女兩群ハ所見略同ジク, 肺ニ輕度ノ圓形細胞ノ浸潤ヲ見ルモノアリ, 又氣管枝内皮細胞ノ剝離アルヲ見タ。肝ハぐりそん氏囊ニ圓形細胞ノ浸潤アリ, 脾ハ靜脈竇ノ擴張著明デ一般ニ充血スルヲ認メタ。

犬群ハ肺ニ主トシテ圓形細胞ヨリナル浸潤アリ、血管内皮細胞ノ増殖ヲ見、脾ハ實少シク擴張シ内皮細胞ノ増殖著明デ、圓形細胞ノ浸潤アリ巨態細胞ヲ認メタ。腎ハ間質ニ輕度ノ細胞浸潤アリ、肝ニハ又類上皮細胞ヨリナル小結節ヲ認ムルモノモアツタガ乾酪變性ヲ伴フモノハ見ナカツタ。即犬群ノ組織學的所見ハ輕度ノ結核性變化デ、BCGニヨリテ起ルモノニ略々似タモノガアル。人痰、福女兩群ノ變化ハ異物注入ニヨリ起ル組織變化ト見ルベキデアル。

第2節 聚落所見

供試菌ノ Petragani 氏培地ニ於ケル聚落所見ハ、人痰80株ハ色調橙黃色、光澤アリ濕潤デ粘稠性アリ形狀ハ不正デ周邊鈍、表面クリーム狀デ永イ培養ノ後ニ皺襞ガ出來ル。福女株ハ色調黃色デ前者ヨリ稍固イ感ジノ聚落ガ出來ル外皺襞ヲ作ラナイ、其他ノ性狀ハ人痰株ト略同様デアル。犬株ハ色調灰白色ノ聚落ヲ作り光澤ナク乾燥シ少シク硬ク且粘稠性ヲ缺ク、形狀ハ不正且周邊銳デ表面不正球狀隆起ヲナス。但人痰80、福女兩株トモ浮游液ヨリ固形培地ニ培養スレバ初メ邊緣銳デ正圓形ノ聚落ヲ作り又人痰80株ハ永ク培養スルト皺襞ノ一部ガ球狀隆起スルヲ見ル。

第3節 供試菌ノ硫酸ニ對スル抵抗力

第1項 硫酸ニ對スル抗脫色性

供試菌ノ10%及ビ50%硫酸ニ對スル抗脫色性ヲ試驗シタ。試驗方法ハ占部⁽⁴⁴⁾ニ倣ヒ、供試菌ノ Petragani 氏培地培養10日乃至1ヶ月ノモノデ、發育相似スルヲ待ツテ使用シタ。其ノ成績ハ下記ノ如ク可成強イ抗脫色性アリ。

人痰80ハ	10%硫酸=180分, 50%硫酸=2分
福女ハ	10%硫酸=120分, 50%硫酸=1分
犬ハ	10%硫酸=180分, 50%硫酸=4分

第2項 硫酸ニ對スル抵抗力試験

試驗方法ハ占部⁽⁴⁴⁾ニ倣ヒ、硝子棒ニ附着乾燥セシメタ菌ヲ一定時間10%硫酸ニ浸シタ後硫酸ヲ流ヒ落シ、此ノ硝子棒ノ菌附着部ヲ Petragani 氏培地ニ塗布シ、37°Cニ4週間保チ聚落發生ノ有無ヲ觀察シタ。第10表參照。

表中(一)ハ4週間後聚落發生ナキヲ示シ、聚落ノ多少ノ程度ニヨリ(+)ヲ増減シタ。對照ハ硫酸ニ浸サナイモノデアル。

第 10 表 供抗酸菌ノ硫酸ニ對スル抵抗力檢査成績

菌系	濃度		10% H ₂ SO ₄									對照
	作用時間	菌株名	10'	20'	30'	1'	1'30'	2'	3'	4'	5'	
人系	人痰 80 福女		+++	+++	++	++	++	++	+	+	+	+++
			+++	+++	++	++	++	+	+	+	-	+++
動物系	犬		+++	+++	++	++	+++	++	+	+	+	+++

第 4 節 供試菌ノ抗煮沸性

Preis⁽⁴⁵⁾ 原法ヲ參酌シ、戸田⁽⁴⁶⁾、占部⁽⁴⁷⁾ 等ノ法ヲ倣ヒ、供試菌ノ Petragiani 氏培地上發育10日乃至30日ノモノヲ用ヒ、供試抗酸菌株ノ抗煮沸性ヲ檢シ次ノ結果ヲ得タ。即人痰80株ハ1分30秒。福女株ハ30秒。犬株ハ2分。

第 5 節 供試菌ノカタラーゼ試験

第 1 項 カタラーゼ定性試験

供試菌ノ Petragiani 氏培地培養10日乃至1ヶ月ノ菌塊ヲ、培地ヲ傷ケヌ様注意シテ清淨ナ載物硝子上ニトリ、新ラシキ三共おきしふるヲ其上ニ滴下シ、泡沫發生ノ時間ト狀態ヲ觀察スル。其ノ成績ハ、人痰80株及ヒ福女株ハおきしふる滴下直後泡沫盛ニ發生シタガ、犬株ハ滴下後10秒デ泡沫ノ發生ヲ見タガ其ノ量少ナイ。即前2株ハカタラーゼ作用強ク犬株ハ弱イ。

第 2 項 カタラーゼ定量試験

實驗方法ハ大坪⁽⁴⁸⁾、井上⁽⁴⁹⁾、戸田⁽⁵⁰⁾、ノ過マンガン酸加理法ヲ用フ。試験ノ結果ハ人痰80株ハ7本マデ、福女株ハ8本マデ、犬株ハ5本マデ反應シタ。即定量法ニ依ツテモ人痰80、福女兩株ハカタラーゼ作用強ク、犬株ハ弱イ。

第 6 節 供試菌ノ發育速度

供試菌ヲ Petragiani 氏培地ニ培養シ37°Cニ保チ、12時間ヨリ始メテ1ヶ月間其ノ發育狀態ヲ觀察シタ。

人痰80株ハ1日ヨリ發育ヲ初メ1週間デ可成リ發育スルガ2週間デ最高ニ達シ、3週間デハ表面ニ皺襞ヲ作り着色度濃厚トナルヲ認メタ。

福女株ハ1日ヨリ發育ヲ初メ1週間デ可成リ良ク發育スルガ其ノ最高ニ達スルハ10日デアツタ。

犬株ハ發育速度遅ク僅カニ發育ヲ認メルノハ1週間後デ1ヶ月デ最高ニ達スル。要スルニ人痰80株ハ普通ノ非病原性菌ヨリ發育稍遅ク結核菌ヨリハ早イ。福女株モ普通ノ非病原性抗酸菌ヨリ發育僅カニ遅イガ人痰80株ヨリハ稍早イ。犬株ノ發育速度ハ結核菌ノソレト同ジク、余ノ分譲ヲ受ケタ當時ノ犬株ハ稍舊キ培地デ當初固形培地ヘノ移殖ニ困難ヲ感ジタ。尙果代培養シテモ他ノ各種抗酸菌ヨリ發育良好デナク且一般結核菌ヨリモ發育ノ程度不良デアツタ。

小括並ニ考案

本章デハ主トシテ供試抗酸菌3株ノ海狸及ビ家兎ニ對スル接種試験ヲナシ、併セテ該3菌株ノ2~3生物學的性狀ヲ試験シタ。海狸ニ對スル皮内接種試験デハ菌量少キニ過ギタ爲ト本來病原性少キ爲カ殆ンド病變ヲ呈シナカツタ。即試験ハ實驗當時氣候及ビ飼料ニ惠マレタ爲モアリ42日ノ實驗期間中15匹全例生存シ體重モ各群何レモ増加シタ。此點ヨリ觀察シテモ供試菌ハ毒力強キモノトハ思ハレナイ。尙剖檢所見ニ於テハ異物注入ニヨル輕度ノ組織變化ニ相當スル所見以外ニ殆ンド病變ヲ見ズ、培養ニ依ツテ内臓カラ抗酸菌ヲ證明シタノハ人痰80群ト福女群ニ各々2例ツツアツタガ犬群ヨリハ全例ニ聚落ノ發生ヲ見タ。家兎ニ對スル耳靜脈内接種試験デハ、供試菌ノ使用量多量デアツタ爲ト注射回数ガ多カツタ爲カ試験ノ半数ハ實驗ノ途中斃死シタ。斃死獸ノ肉眼の所見ハ臟器ニ著變ヲ見ナイガ、福女群ノ1例ニ胸腔ニ中等度ノ漿液滯溜スルヲ見タ。其他斃死獸ハ胃ガ無力狀態ニナリ内容停滯シ膀胱モ擴大シ尿デ滿タサレテ居タ。淋巴腺ハ僅ニ腫大スルモノモアツタガ變化少ク、細菌學的ニ之等ノ臟器及ビ株巴腺ヨリ塗抹標本ニ抗酸菌ヲ見ルモノ多ク、硫酸處置ニヨル培養ノ結果ハ多ク該菌ノ發育ヲ見タ。

家兎ニ於ケル組織學的變化ハ、人痰群、福女群共ニ所見略同様デ肺ニハ圓形細胞ノ浸潤ヲ見タモノアリ且肝ニモぐりそん氏囊ニ同様ノ細胞浸潤ヲ認メタガ之等ハ異物注文ニヨル變化ニ相似スル様デアル。犬群デハ肺ニ圓形細胞ノ浸潤ト血管内皮細胞ノ増殖ヲ見タ。脾臓ハ擴大シ且内皮細胞増殖シ、圓形細胞ノ浸潤及ビ巨態細胞ヲ認メタ。肝ニハ類上皮細胞ノ小結節ガアツタガ乾酪化シタモノハナカツタ。犬群ノ組織變化所見ハ BCG ノ如キ弱毒結核菌ヲ多量靜脈注射シタ際ニ初期ノ結核變化ニ一致スル。尙生物學的性狀ニ關スル小括ハ之ヲ略シテ總括ニ讓ルコトトシタ。

總括並ニ考案

人系及ビ動物系抗酸菌數株ヲ用ヒテ Koch 氏現象ノ實驗ヲ行ツタガ、供試菌7株ハ多少ニ拘ラズ該現象ヲ呈シタ。其中人痰80、福女、犬ノ3菌株ハ、牛型弱毒結核菌ト稱セラルル BCG 株ト同程度ノ強イ反應ヲ示シタ。K 氏現象ハ Pirquet⁽¹⁵⁾ ノ提唱スル Allergie ノ狀態ヨ

リ惹起セラレ尙 Allergie ノ發現ガ動物體ノ結核感染ニ對スル免疫力ノ一標示トナリ得ルコトモアル故K現象ヲ強ク呈スル以上ノ3菌株ヲ以テ海狸ヲ試獸トシテ結核免疫實驗ヲ行ツタ。Imgヲ用フレバ、人痰80群ハ對照ニ比シテ僅カニ免疫力ヲ示シ、福女群ハ對照群ト大差ナク只體重ノ増加セルノミデアツタ。犬群ハ相當ノ免疫力ヲ示シタ。次ニ4mg及ビ5mgヲ用ヒタ第2回及ビ第3回實驗デハ、人痰80群ハ對照ニ較ベ著明ナ感染防禦力ヲ示シ、福女株ハ人痰80株ニハ稍劣ルガ尙相當ノ免疫力ヲ示シタ。犬株ハ最も強イ感染防禦力ガアツタガBCGニハ僅カニ劣ル様デアツタ。

次ニ以上ノ3菌株ノ歸屬ヲ知ラントシテ之等3菌株ノ家兎免疫血清ト各種抗酸菌60餘株ヨリLancefield 法ヲ應用シテ得タ沈抗元トヲ用ヒテ沈降反應實驗ヲ行ツタ。人痰80株ハ人系及ビ比較的高等デ且大キナ動物デアル牛、犬系ノ抗酸菌並ニ人型、牛型結核菌、人癩系、糞便系ト反應シ鳥型結核菌トモ反應スルガ、比較的下等デ小動物ノ鼠癩系、昆蟲系ノ抗酸菌ヤ植物系ノモノトハ殆ンド或ハ全ク反應シナイ。福女株ハ人系抗酸菌、人型、牛型、鳥型結核菌ニ反應シ、糞便系ノ一部ニ少シ反應シタガ他種ノ抗酸菌ニハ反應シナイ。

犬株ハ各種結核菌ニヨク反應シ、人系及ビ比較的高等ナ大動物系即牛、犬系及ビ人癩系トモ反應シタガ、比較的下等デ小動物系ノ鼠癩系、昆蟲系トハ殆ンド或ハ全ク反應ヲ起サナイ。以上ノ實驗成績ヨリ案ズルニ人系抗酸菌及ビ高等動物系ノ抗酸菌ノ免疫血清ハ、結核菌ニヨク反應スル様デ兩菌系ノ間ニ何等カノ近親關係ガアル様ニ思ハレル。又人系及ビ高等動物系抗酸菌ハ比較的下等ナ小動物系抗酸菌ト反應シナイノハ興味アルコトデアル。

犬株ハ沈降反應ノミヨリ推斷スルモ結核菌ノ一種ト思ハレル。尙沈降元ノ絶對的特異性ハ認メラレナカツタ。

次ニ以上3菌株ノ動物接種實驗ヲ行ツタガ、海狸皮内接種試驗デハ菌系少キニ過ギタル爲カ2mgノ皮内接種デハ殆ンド病變ヲ起サズ、試獸ハ全例42日ノ觀察期間生存シ體重著シク増加シタ。剖檢ノ結果ハ肉眼的ニ變化ナク、組織學的ニモ僅カニ異物注入ニヨル變化ヲ見ルニ過ギナカツタ。家兎靜脈内大量接種實驗デハ、試獸ノ半數ハ實驗中途デ斃死シタ。此ノ斃死獸ノ剖檢所見ハ胃ハ無力狀トナリ、膀胱モ擴大シ共ニ内容ヲ以テ滿サレルヲ見タガ其外ニ著變ヲ認メナイ。只福女株ヲ接種セルモノニハ胸腔内ニ中等度ノ漿液ノ滯溜スルヲ見タ。組織學的檢査ノ結果ハ人痰群、福女群ハ共ニ異物注入ニヨル組織變化ヲ見ルノミデアルガ、犬群ノ家兎ハ肺ニ主シテ圓形細胞ヨリナル浸潤アリ且血管内皮細胞ノ増殖ヲ見ル。脾ノ實ハ少シク擴張シ内皮細胞ノ増殖著明デ、圓形細胞ノ浸潤アリ且巨態細胞ヲ認メタ。肝ニハ類上皮細胞ヨリナル小結節アルモ乾酪變性ヲ伴フモノハナイ。要スルニ犬群ノ組織學的變化ハ輕度ノ結核變化デBCGヲ多量ニ靜脈注射シタ際ノ初期ノ所見ニ一致スル様デアル。其他ノ生物學的性状ヲ述ブレバ、人痰80群ノ聚落所見ハPetragnani氏培地ニ於テ色調橙黃色デくりー

む状ヲ呈シ、發育ハ1日ヨリ初メテ2週間デ最高ニ達シ3週間デ皺襞ヲ生ズ。かたらーゼ作用及ビ抗煮沸性モ強ク、後者ハ1分30秒デ一般自然界抗酸菌ヨリ強イ。硫酸ニ對スル抵抗力モ亦強イ。福女株ハ聚落ノ色調黃色デ前者ヨリ稍固イガ皺襞ヲ作ラズ其他ノ性状ハ人痰群ニ似テ居ルガ、抗酸性、抗脫色性、抗煮沸性共ニ之ヨリ稍弱イ。犬株ハ聚落ノ色調灰白色デ、光澤ナク乾燥シ且硬ク粘稠性ナク、表面不正球狀隆起ヲナス。發育速度ハ遅クシテ1週間デ發育ヲ認メラレ1ヶ月デ最高ニ達ス。かたらーゼ作用ハ弱ク、抗煮沸性、抗酸性ハ共ニ強イ。即犬株ハ聚落ノ性状ヨリモ、又沈降反應ヨリ見テモ、他ノ生物學的性状ヨリ見テモ弱毒結核菌ノ一種ト思ハレル。人痰80株、福女株ハフ反應ノ陽轉性ヤ結核免疫力ノアルコト及ビ沈降反應ノ成績ヲ考慮スレバ結核菌ト或程度ノ近縁關係ニアルノデハナイカト示唆ヲ受ケタ。但鳥型つべるくりんニ反應シナイ故鳥型結核菌デナイコトハ明ラカデアル。

結 語

1. 人系5株、動物系2株ノ生菌及ビ死菌ヲ以テ、海溟ヲ用ヒ Koch 氏現象ノ實驗ヲ行ツタ。
2. 供試菌ハ多少ニ拘ラズ Koch 氏現象ヲ呈シタガ、生菌ハ死菌ヨリ、1mg 接種セルハ 0.01mg ノソレヨリ強ク反應シタ。
3. Koch 氏現象ヲ最モ強ク現ハシタ人痰80、福女、犬ノ8菌株ヲ以テ、海溟ヲ用ヒ結核免疫實驗ヲ行ツタ。
4. 豫防接種ニ供試菌量1mgヲ用ヒタ第1回ノ免疫實驗デハ、人痰80株ハ僅カナ免疫力ヲ示シ、福女株ハ殆ンド之ヲ見ズ、犬株ハ相當ノ感染防禦力ガアツタ。
5. 供試菌4mgヲ用ヒタ第1回實驗デハ各群トモ對照ニ比シテ可成リ免疫力ガアツタガ、犬株最モ強ク、人痰80株ニハ亞ギ、福女ハ一番弱イ成績ヲ得タ。
6. 供試菌5mgヲ用ヒタ第3回ノ免疫實驗デハ、人痰80ハ著明ナ免疫力ヲ示シ、福女株モ相當ニ感染防禦力ガアツタ。然シ犬株ハ一層強イ免疫力ガアツタガ BCG ニハ稍劣ル様デアツタ。
7. 此ノ8菌株ヲ靜脈接種シテ得ク家兔免疫血清ト60餘株ノ各種抗酸菌ヨリ Lancefield 法ヲ應用シテ得ク抗原トヲ以テ沈降反應試驗ヲ行ツタ。
8. 人痰80、福女兩群ハ各種結核菌及ビ人系ヤ牛、犬ノ様ナ大動物系ノ抗酸菌並ニ糞便系、人癩系抗酸菌ニ反應シタガ、比較的下等デ小動物ノ鼠癩、昆蟲系其他一般自然界抗酸菌トハ殆ンド或ハ全ク反應シナカツタ。
9. 犬群ハ各種結核菌ニ特ニヨク反應シ、其他人系、牛系ノ如ク高等動物系ノ抗酸菌ニ反應シテ鼠癩系、昆蟲系ノ如ク小動物系ニハ反應シナカツタ。
10. 沈降元ノ絶對の特異性ハ認メラレナカツタ。

11. 供試菌ノ動物接種試験ヲ行ツタガ、菌量2mgヲ海猿皮内接種セル實驗デハ、肉眼的ニモ組織學的ニモ殆ンド病變ヲ見ズ試獸ハ體重増加モ順調デアツタガ、臓器ヨリノ塗沫標本ニハ抗酸菌ヲ認メタルモノアリ且培養ニ依ツテ菌聚落ノ發生ヲ見タモノガアツタ。

12. 家兎靜脈内ニ供試菌多量ヲ數回ニワタツテ接種シタ實驗デハ、人痰80、福女兩群共異物ニヨル組織變化ヲ見タ以外殆ンド病變ヲ見ナカツタガ、犬群ノ所見ハ肉眼的ニ變化少ナカツタガ組織學的ニハ輕度ノ結核變化ヲ認メタ。尙此ノ變化ハ BCG ヲ靜脈内ニ多量注射セル際初期ニ起ル病變ニ相似シタモノデアツタ。

13. 細菌學的ニハ臓器ノ塗沫標本ニ抗酸菌ヲ證明スルモノ多ク、培養ニヨリ人痰80群、福女群ハ各々2例ニ、犬群ハ全例ニ抗酸菌ノ發生ヲ見タ。

14. 供試菌ノ其他ノ生物學的性狀ヲ述ブレバ、人痰80株ハ發育速度稍遅ク2週間デ最高ニ達シ、聚落ノ色調橙黃色デ少シク粘稠デアル。かたラーゼ作用、抗酸性共ニ強ク、抗煮沸性モ可成り強ク1分30秒デアル。

15. 福女株ハ發育速度稍早ク10日デ最高ニ達シ、聚落ノ色調黃色デ光澤アリ且粘稠デアルガ、日ヲ經レバ割合ニ早く硬クナル性質アリ、かたラーゼ作用強ク抗酸性抗煮沸性ハ人痰80株ヨリ弱イ。

16. 犬株ハ發育速度遅ク1ヶ月デ最高ニ達シ、聚落ノ色調灰白色デ乾燥シ、表面不正球狀隆起ヲナス。かたラーゼ作用弱ク、抗酸性、抗煮沸性ハ共ニ強イ。

17. 犬株ハ沈降反應ノ成績、ツ反應、動物接種試験及ビ其他ノ生物學的性狀ヨリ弱毒結核菌ノ一種ト思ハレル。尙其ノ免疫力ハ強クBCGニ稍近イモノガアル。

18. 人痰80株ハツ反應、沈降反應、結核免疫試験其他ノ生物學的性狀ヨリ結核菌ト近縁關係ニヨルモノト思ハレル。

19. 福女株モ略人痰80株ニ近イガ總テノ點デ之ヨリ弱イ。

20. 供試菌3株ハ鳥型つべるくりんニハ反應シナカツタ故鳥型結核菌デハナイト思ハレル。

21. 人系着色抗酸菌中ニハ結核免疫力ガアリ且結核菌ト近縁關係ノアル菌株ガアルコトヲ知ツタ。

稿ヲ終ルニ臨ミ終始御懇篤ナル御指導ヲ賜リ且稿成ルニ及ビ御校閲ヲ忝フシタ恩師戸田教授ニ滿腔ノ謝意ヲ捧ゲ、不斷ノ御鞭撻ト御校閱ヲ賜ツタ恩師楠教授ニ衷心ヨリ感謝ス。尙日常種々ノ御便宜ト御教示ヲ賜ツタ前助教授占部博士、現助教授貝原博士並ニ教室員各位ニ深謝ス。

文 献

- 1) Alvarez u. Tausel : Arch. de Phys. Norm. et Path. 3, 302, 1885. (Zit. n. Frey and Hagen ; J. Inf. Dis. Vol. 49, 1931.)
- 2) Sönnagen N. L. : Zbl. f. Bakt. Bd. 37, 595,

1913. 3) Cobbet L : Brit. M. J. 2 ; 158, 1918. 4) Beaven P. W. : J. of Infections Diseases, Vol. 62, P. 92, 1938. 5) Freeman G. : Am. Rev. of Tbc. Vol. XXX VIII, P. 612, 1938. 6) 占部, 權本 : 結核, 第19卷, 第10號, 昭和16年10月.
- 7) 三宅, 大神 : 日本醫學及健康保險, 昭和17年2月. 8) 泰川, 岸川 : 海軍軍醫圖雜誌, 昭和17年3月. 9) Römer : Keitr. Z. Kl. d. Tbk. Bd. 11, S. 79, 1908 ; Bd. 12, S. 185, 1909. 10) Hamburgien : Beitr. Z. Kl. d. Tbk. Bd. 12, 1908, Bd. 24, 1919, W. Kl. W. Nr. 29, 1908. 11) Weissfeiler : Zsitschr. f. Immunitätsforsch, Bd. 83, S. 203, 1930.
- 12) Pagel : Journ. of Path. and Bact., Vol. 61, No. I, P. 89, 1935. 13) 戸田忠雄 : 戸田細菌學, 380頁, 戸田, 占部 ; 學生ノ細菌學海疫學實習. 14) 渡邊, 水口, 阿部 : 結核, 第17卷, 449頁, 昭和14年 ; 細菌學雜誌, 第523號, 523頁, 昭和14年9月, 日本臨床結核, 第3卷, 第9號, 595頁, 昭和17年. 15) Pirquet : W. Kl. W. 1908. 16) Maeller A : Lehrbuch d. Lungentbk. Verlag J. F. Bergmann. Wiesbaden, S. 213, 1910. 17) Friedmann : Dtsch. med. Wochenschr. 29, S. 953 ; 1903 ; 30, S. 166, u. S. 1673, 1904.
- 18) Kollo, Schlossberger : Dtsch. med. Wochenschr. 16, Dez. 1920. 19) Neufeld, Uhlenhuth, Krauss, Neisser, Korte, Schittenhelm : Dtsch. med. Wochenschr. 49, S. 483, 1923. 20) Burno. Lange : Dtsch. Med. Wochenschr. S. 528, 1921. 21) 今村 : 結核, 6卷, 第7號, 第8號, 昭和3年7—8月號. 22) 戸田忠雄 : 滿洲醫學雜誌, 第15卷, 昭和5年. 23) Zinsser u. Tamiya : J. of exp. Med. Vol. 42, 1925. 24) 内藤誠一 : 實驗醫學雜誌, 21卷, 昭和12年. 25) 草場幹人 : レブラ, 第6卷, 第9號, 昭和13年. 26) Lancefield : J. of exp. Med. Vol. 47, 1928. 27) 占部薫 : 日本微生物學雜誌, 第27卷, 第3號, 昭和8年 ; 滿洲醫學雜誌, 第22卷, 第6號, 昭和10年, 福岡醫科大學雜誌, 第29卷, 第12號, 昭和11年. 28) Rabinowitsch : Zschr. f. Hyg. Bd. 26, 1897. 29) Möller : Deutsche Med. Wschr. S. 376, 1898. 30) Petri : Arb. d. Kaiserl. gesundheit Amt Bd. 14, 1898. 31) Möller : Zbl. f. Bakt. Bd. 25Abt. I, 1899. 32) Lubarsch : Zschr. f. Hyg. Bd. 31, 1899. 33) Rodet u. Galavielle : Cbl. f. Bakt. I, Ref. Bd. 39, 1907. 34) Gallivalerio : Schweiz. Med. Wschr. Nr. 8, 1908. 35) Lange B. : Deutsch. Med. Wschr. 1920. 36) Hermann u. Morgenroth : Hyg. Rundschau. P. 1081, 15, Nov. 1898. 37) Heelscher : Münch. Med. Wschr. 1438, 1901. 38) Alexa : Arin. Inst. Pasteur. Bd. 42, 1928. 39) Jelin : Cbl. f. Bakt. I, Orig. Bd. 111, 1928. 40) 末吉彌吉 : 衛生學傳染病學雜誌, 31卷, 昭和10年. 41) Pinner : America. Rev. Tbc. Vol. 32, 1935. 42) 戸田, 占部 : 東京醫事新誌, No. 2983, 昭和11年. 43) 草場幹人 : レブラ, 第9卷, 第6號, 昭和13年. 44) 占部薫 : 福岡醫科大學雜誌, 第29卷, 第12號. 45) K. Preis : W. Kl. Wschr. Bd. 43, 1922. 46) 戸田忠雄 : 日本微生物學雜誌, 第20卷, 第12號, 大正15年. 47) 戸田, 占部, 東京醫事新誌, No. 2984, 昭和11年. 占部薫 : 福岡醫科大學雜誌, 第29卷, 第12號, 昭和11年. 48) 大坪五也 : 細菌學雜誌, 第329號, 大正12年. 49) 井上文蔵 : 東京醫學會雜誌, 第32卷, 1293, 大正7年. 50) 戸田忠雄 :

日本微生物學雜誌，第22卷，1877，昭和3年；同誌，第20卷，第9號，1857，大正15年；東京醫事新誌，No. 2981，昭和11年。

其ノ他参考文献

- 1) Calmette A : Schutzimpfung gegen Tbk. Mit "BCG".
- 2) 中村豊 : 細菌學血清學検査法.
- 3) Eichbaum F : Ergebnisse d. Hyg. Bakt. Imm. u. Exp. Therap. Bd. 14, 1933.
- 4) 渡邊義政 : 結核細菌及び免疫學.

池田論文附圖