子宮囊腫發生ノ病理

其三 卵胞ほるもんト家兎子宮内移植悪性 腫瘍トノ關係ヲ基礎トシテノ考察

熊本醫科大學病理學教室 (主任 鈴江 懷教授)

熊本醫科大學産婦人科教室 (主任 池上五郎教授)

助手 醫學士 武 岡 克 明

Katuaki Takeoka

(昭和18年11月4日受付)

【内 容 抄 録】

家兎子宮壁内ニ加藤系家兎肉腫ヲ移植シ、之ニ卵胞ほるもん投與ヲ複合シ、同ほるもんニ依ル
卵巢機能亢進ヲ惹起セシメタルニ、腫瘍發育ニ對スル影響ハ左程著シカラザリシモ、其ノ轉移ハ
著明ニ促進サレ、從テ其ヨリ誘發サルル事アルベキ子宮溜囊腫ノ形成ニ與ツテ力アルヲ見出セ
リ。且其際腦下垂體並ニ甲状腺ノ組織所見ヲ精檢シ、之等ノ機能異常特ニ其ノ亢進ガ亦、必ズシ
モ其ノ主因タラズトモ補助的要約トシテ、子宮溜囊腫形成ニ參與スベキヲ論ジ、以テ第1編ニ論
述セン人類ニ於ケル腫瘍ノ自潰ニヨル二次的子宫囊腫形成ノ成因の考察ニ資セントシタリ。

目 次

緒 言	3 高單位おぼほるもん注射群
I 實驗材料並ニ方法	4 各群ニ於ケル腫瘍轉移
II 實驗成績	II 總括並ニ考按
1 對照群	III 結 論
2 低單位おぼほるもん注射群	附 主要文献

緒 言

腫瘍特ニ惡性腫瘍ノ發生乃至發育ト内分泌機能トノ關係ハ、夙ニ内外諸家ノ着目セン所チ
リシモ、實驗腫瘍學ノ興隆ニ伴ヒテ、夫等ノ因果關係ノ探究ガ盛ニ試ミラレ幾多ノ輝カシキ
業績ヲ生ミタリ。我が教室ニ於テモ此ノ方面ノ研究ハ十數ト以前ヨリ極メテ廣範圍ニ亘リ遂
行サレ來リシモノニシテ、夫等ハ孰レモ教室同人ノ多數ノ業績ニシテ公表サレ、又腫瘍ト内
分泌・實驗腫瘍學等ノ單行本中ニ收録サレ、更ニ前教室主任森教授⁽¹⁾ノ昭和10年金澤ニ於ケ
ル病理學會宿題報告中ニモ述ベラレ斯界ノ注目ヲ惹キタル所ナリ。近年造癌性化學物質ノ化
學的攻究ガ深ク施行サレ、内分泌特ニ卵巢ほるもん中ノ卵胞ほるもんト造癌性物質ノ化學的

近似性が Cook, Dodd, Kennaway⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾等ニヨリ闡明サレ、一方1983年 Lacassagne⁽⁵⁾ガ廿日鼠ノ乳癌ヲ卵胞ほるもん投與ニヨリ催起セシメ、Cramer u. Horning⁽⁶⁾亦同様實驗ニ成功シ、Pierson⁽⁷⁾⁽⁸⁾ガ去勢家兎ニ Follikulin ノ長期投與ニ依リ子宮癌ノ發生ヲ見タル如キ一聯ノ業績ハ、愈々性ほるもんト發癌性物質トノ關係カ諸家ノ興味ノ焦點トナレルガ如キ様相ヲ呈スルニ至レリ。斯テ此ノ方面ニ於ケル探究・追試ノ報告ハ枚舉ニ追ナク出現シ、更ニ可移植性腫瘍ノ發育ト發情ほるもんノ相關ニ就テノ檢索モ亦、極メテ多數ノ成果ヲ舉グルニ至レルハ周知ノ事實ナリ。然レ共之等汗牛充棟モ管ナラザル膨大ナル業績ニ於テ、必ズシモ諸家ノ見解ヲ齊シクセズ、例ヘバ腫瘍ノ發育ト卵胞ほるもんノ關係ニ就テ見ルニ、或ハ該ほるもんノ發育促進ヲ説キ或ハ逆ニ抑制作用ヲ認メ、或ハ又影響無キヲ述ブル等未ダ之等ノ關聯ニ劃一的解決ヲ見出シ難キ現状ナリト思ハザルヲ得ズ。然リト雖モ余ガ今回本編ニ於テ家兎子宮內移植腫瘍ト卵胞ほるもんトノ關係ニ就テノ實驗ヲ試ミタル所以ハ、上記ノ如ク其ノ見解ノ未ダ完全ニハ一致シ居ラザル兩者間ノ聯繫ヲ比較検討センガ爲ニ非ズ。曩ニ余ガ第2編ニ於テ述ベタルガ如ク、家兎子宮ノ囊腫性變化ガ卵胞ほるもんトノ關係緊密ナリシニ鑑ミ、斯ノ如キハ本ほるもん本來ノ作用トシテ臟器組織殊ニ雌性々器ノ夫ニ對スル發育促進作用、乃至増殖ノ刺激附與等ノ特殊生物學的影響ニ依ルモノ多カル可キハ勿論ナラ、彼ノ人類子宮ニ於ケル Adenomyom 乃至 Adenomyosis 或ハ更ニ筋腫其物ノ囊腫様變化ガ屢々認メラルル事實ニ想到シ、本編ニ於テ述ベントスルガ如キ研究モ亦子宮囊腫發生ノ病理ヲ解決スベキ、有力且重要ナル鍵タルベキヲ思ヒ敢テ本實驗ヲ試ミルニ至レルナリ。其ノ結果果然余ガ第1及ビ第2編ニ於テ陳述セシ所論ヲ、又異リタル方面ヨリ裏書スル如ト知見ヲ獲タルヲ以テ、此處ニ章ヲ分テテ順次其ノ成績ヲ述ベウカントス。先進諸家ノ叱正ヲ得バ余ノ幸甚之ニ過グルモノナシ。

I 實驗材料並ニ方法

實驗動物トシテハ體重2Kg前後ノ白色雌性家兎ヲ用ヒタリ。子宮壁ニ腫瘍ヲ移植ヲ行フニ先立チ、細薄ナル子宮壁ヘノ移植ヲ確實且便ナラシムル爲、約2ヶ月前ヨリ連日卵胞ほるもん劑タルおぼほるもん(100i.u.)0.3cc宛背部ニ皮下注射ヲ行ヒ、子宮ノ肥大セルヲ待チテ之ヲ施行セリ。

移植材料ニハ加藤系家兎肉腫ヲ用ヒ、該肉腫片ヲ剔出後直チニ壞死部ヲ除去シ、其ノ周邊部タル増殖旺盛ナル個所ヲ可及的ニ細切シ、輕ク磨碎シタル後更ニ生理的食鹽水ヲ以テ略2~3倍ニ稀釋粥狀タラシメ、之ヲ更ニガーゼニテ濾過壓出セシメタルモノヲ以テ移植ニ供ス。被移植家兎ハ背位ニ固定シ下腹部ヲ脱毛消毒シ、正中線上恥骨縫合上數cmノ部ニ約3cmノ縱切開ヲ加ヘ膀胱ヲ排シテ子宮ヲ牽引露出セシム。然ル後兩側子宮ノ略上 $\frac{1}{4}$ 部並ニ下 $\frac{1}{4}$ 部ニ

於テ、上記ノ調製セル肉腫粥ヲ0.1~0.2cc宛小注射針ニテ血管ヘノ刺入ヲ避ケツツ子宮筋層内ニ注入シ、刺入口ヨリ注入粥ノ漏出ヲ防グ爲鉗子ヲ以テ強く壓迫ヲ加ヘタリ。次デ手術創ノ縫合ヲ行ヒ移植ヲ完了ス。尙肉腫粥ノ調製並ニ手術ニ際シテ要スル諸器具及ビ術者ノ手指等ノ消毒滅菌ハ何レモ嚴重ニ施行セリ。

之等ノ肉腫移植家兎ヲ3群ニ分チ、第1群ハ對照トシテ其儘放置觀察シ、第2群ハ手術施行ト同時ニおばほるもん(100i.u.) 0.3cc宛ヲ連日背部皮下ニ注射シ、第3群ハおばほるもんベンツアール(1000i.u.) 0.3cc宛ヲ、同様連日背部ニ皮下注射シ共ニ實驗終了日迄續行シタリ。而シテ斃死又ハ實驗終了ニ際シテハ直チニ解剖シ、主要臟器ノ肉眼的所見・轉移形成部位並ニ程度等ヲ精檢シ、必要ニ應ジテ臟器ノ重量・大サ等ヲ計測セリ。子宮・卵巢・腦下垂體・甲状腺等ハ夫々ほるまりん(10%)ニ固定シ、糖原染色施行ノ臟器ハ別ニ木下氏液ニ固定ヲ施シ、各臟器ニ就キ Haematoxylin-Eosin 染色・Weigert 氏染色・Van Gieson 染色・脂肪染色及ビ糖原染色等ヲ夫々施行セリ。體重ハ手術前及ビ屠殺時ニ於テ秤量シ其ノ前後ノ増減ヲ比較觀察セリ。又本研究ニ於テハ腫瘍轉移ノ模様ヲ詳細ニ觀察シタルガ、其ノ多寡ノ度合ヲ各臟器ニ就キテ、±(顯微鏡的ニ見出し得ル程度ノモノ、0.5ト算ス)、+ (肉眼的ニ認め得ルモノ小且ツ稀ナルモノ、1.0トス)、++ (中程度ノモノ、2.0トス)、+++ (大ナルモノ又ハ極メテ多キモノ、3.0トス)等ノ符號ヲ以テ表示シタリ。

I 實驗成績

1 對照群

本群ニ使用セン家兎ハ10頭ナリシモ、手術結果ノ不良ナリシモノ及ビ早期ニ斃死シ腫瘍形成ニ至ラザリシモノヲ除キ5頭ヲ得タリ。其等ノ實驗日數・體重ノ手術前並ニ屠殺時ノ變動・主要內分泌臟器ノ重量等ニ關シテハ第1表ニ示ス如クニシテ、實驗日數ハ最短21日ヨリ最長39日平均31日ニ及ビ、體重ハ多少ノ差ハアレ何レモ減少ヲ示シ平均178gナリ。腦下垂體・卵巢・甲状腺ノ重量ハ夫々平均27.2g, 91g, 71.1gヲ算セリ。今其ノ各例ノ子宮・卵巢・腦下垂體・甲状腺ニ就キ肉眼的若クハ檢鏡的所見ヲ記載シユカントス。

第1號家兎：實驗日數22日

イ) 子宮：一般ニ壁肥厚シ粘膜面稍瘀血ヲ呈ス。移植部ハ左右共略小豆大乃至小指頭大ノ腫瘍ヲ形成セリ。檢鏡スルニ腔ノ大サ略正常ナルモ粘膜面ハ皺襞ニ乏シク、1側ノ腫瘍組織ガ腔内ニ隆起突出シ來リ殊ニ腫瘍發育側ニ於テハ腺窩ノ像貧ナリ。腫瘍ハ主トシテ粘膜下ニ増殖セルモ、筋層及ビ漿膜下組織ニモ侵入シ其ノ中央部ハ壞死ニ傾ケリ。尙腫瘍組織中ノ淋巴管稍擴張ノ微著明ニ、又壞死部ハ小囊胞ヲ作レルモノアリ。腫瘍外側ヨリ漿膜面ニ至ル間血管腫度ニ充盈セルヲ見ル。糖原ハ微量ナルモ血管外膜細胞中ニハ稍々多量ニ其ノ出現ヲ

第 1 表 對照群各種計測値

動物 番號	實驗 日數	體重變化(g)			腦下 垂體 (mg)	子宮一次腫瘍			卵巢 (mg)	甲狀腺 (mg)
		手術前	屠殺時	増減		部位	下方移植部	上方移植部		
1	22	2050	1830	-250	28	左 右	小豆大 豌豆大	豌豆大 小指頭大	75 70	60 57
2	21	1850	1760	-90	25	左 右	小指豆大 大豆大	豌豆大 扁豆大	65 65	100 85
3	39	1900	1730	-170	26	左 右	蠶豆大 扁豆大	榛實大 小豆大	70 79	48 53
4	37	2180	1930	-250	30	左 右	蠶豆大 超指頭大	? 米粒大	110 100	82 90
5	37	2100	1970	-130	27	左 右	鳩卵大 雀卵大	米粒大 豌豆大	130 145	65 72
平均	31	2016	1838	-178	27.2				91	71.1

認ム。筋層ハ概シテ良ク發達シ結締織亦増殖傾向強シ。

ロ) 卵巢：周邊部ニ於ケル原始卵胞著明ニ認メラレ、各種ノ發育段階ニアル濾胞ヲ認ムルモ成熟濾胞ヲ見ズ黃體化セルモノ1個存在ス。間質腺ノ發育稍可良ナリ。

ハ) 腦下垂體：一般ニ鬱血著シク特ニ前葉ニ強シ。鹽基嗜好性細胞ノ前葉後端ニ於テ幾分竈狀ニ増殖セル個所アリ。間葉部ニ稍大ナル膠質濾胞2個ヲ認ム。

ニ) 甲狀腺：概シテ鬱血ニ傾キ濾胞ハ小ナルモノ多ク、えおじんニ好染セル膠樣質ヲ滿セリ。濾胞甚ダ多ク上皮細胞ハ小圓形ニシテ増殖ヲ呈セル個所アリ。

第2號家兎：實驗日數21日

イ) 子宮：概シテ細小ナル感アルモ移植部ハ左右共夫々大豆大乃至小指頭大ノ腫瘍ヲ形成シ、其中上方ノモノハ孰レモ子宮腔内ニ隆起セリ。檢鏡スルニ腔ノ大サ・粘膜面並腺管ノ狀態正常ニ近ク、粘膜下層ニ幾分鬱血ノ狀ヲ示シ稍鬆阻ナリ。筋層ニ於ケル細血管ノ充盈可成リ強ク漿膜面ニ小ナル肉腫結節1個ヲ認ムルモ壞死ノ傾向ヲ殆ド見ズ。

ロ) 卵巢：表面ハ相等凹凸不平ヲ示シ濾胞ノ發育甚ダ不良ニシテ、萎縮乃至小囊胞化セルモノ極メテ多數ナル外白體2個ヲ認ム。髓質部ニ膠質結締増加ノ傾向アリ。

ハ) 腦下垂體：極メテ鬱血像著シク特ニ前葉ニ於テ然リ。主細胞ノ形態小ナルモノ多ク鹽基嗜好性細胞稍増加セリ。

ニ) 甲狀腺：形態稍大ニ檢鏡的ニハえおじんニ一様ニ染着セル膠樣質ヲ充セル大小ノ濾胞ヲ以テ構成セラレ、上皮細胞ハ一般ニ扁平ナルモノ多キモ所々ヨリ1部圓形ニ近ク、増殖ヲ示

セル部アリ。

第3號家兎：實驗日數39日

イ) 子宮：左右相互並ニ腹壁腹膜ト相等強ク癒着シ居レリ。兩側共特ニ上方移植部ハ蠶豆大乃至榛實大ノ腫瘍ヲ形成シ、該部内腔ハ強ク充血シ暗赤色ヲ呈セリ。檢鏡的ニ内腔ハ腫瘍増殖ノ爲狹小トナリ、且粘膜面ハ腫瘍侵蝕ノ爲破壊セラレタル個所多ク殆ド腺組織ヲ認メズ、粘膜層ヨリ漿膜下層ニ及ブ迄殆ド腫瘍組織ノミヨリナリ該部ハ強度ナル出血及ビ壊死ヲ見ル。筋層亦腫瘍侵蝕ノ爲殆ド破壊サレ正常ナル構造ヲ示サズ。糖原ハ腫瘍組織ノ所々ニ於テ認ムル事アルモ概シテ多カラズ。Sudan Ⅲ染色標本ニ於テハ所々殊ニ壊死部附近ニ脂質顆粒ノ出現アルモ左程著明ナラズ。

ロ) 卵巢：表面稍凹凸不平等ニシテ蒼白、檢鏡上濾胞ハ小ナルモノ多數ナルモ成熟型又ハ夫ニ近キモノニ乏シク、黃體2個ヲ認メ又小囊胞化セルモノ若干存在ス。間質腺小許ヲ認メシメ結締組織多少増加セリ。

ハ) 腦下垂體：概シテ鬱血強度ニシテ主細胞小ナルモノ多ク、嗜色素細胞ノ増加セル個所アリ。

ニ) 甲狀腺：大小ノ濾胞混在シ膠樣質多量ニシテ濃淡不同ニ染着シ、所々ヨリ圓形ニ近キ上皮細胞ヲ認ムルモ扁平ナルモノ多シ。

第4號家兎：實驗日數37日

イ) 子宮：左右共下方ノ移植部耳強ク増殖シ、殆ド子宮全周ニ亘リテ塊狀ヲナシ特ニ膀胱トノ癒着強シ。左側ノ上方ハ腫瘍ガ腔ヲ壓迫ヒル爲閉鎖サレ、其ノ上方ハ壁極メテ菲薄化シ水樣液ヲ容レタル囊腫狀トナレリ。右側ノ上方ハ反之萎縮シ内容空虚ナリ。檢鏡スルニ1側ニ於テハ殆ド粘膜上皮下迄腫瘍ノ侵蝕ヲ被リ斯ル部ニ於テハ上皮ハ扁平化セリ。全周ニ亘リテ腫瘍組織ノ増殖アリテ壊死ニ陷レル個所多ク、所々鬱血乃至出血ノ像ヲ呈ス。筋層モ概シテ腫瘍増殖ノ爲其ノ蠶蝕ヲ被リ正常ノ造構ヲ止メズ。壊死部ニハ糖原ヲ證明シ難キモ増殖旺盛ナル部ニハ若干存在ス。Sudan Ⅲ染色標本ニ於テハ、壊死部及ビ腫瘍間介在ノ筋組織・結締組織等ニ稍著明ナル脂質ノ沈着ヲ認メシム。

ロ) 卵巢：形態扁平ニシテ檢鏡的ニ濾胞ノ發育概シテ良好ナルモ成熟セルモノハ認メズ。髓質部ニ近ク若干ノ小囊胞變性アリ。中等濾胞大ノ腫瘍轉移竈1個ヲ認ム。

ハ) 腦下垂體：細血管稍々充盈シ主細胞ニ富ミ其ノ形大ナルモノ多シ。

ニ) 甲狀腺：極メテ小ナル濾胞ノ集團ニシテ膠樣質ヲ充ヒルモノ多ク、上皮細胞ハ一般ニ扁平又ハ骰子形ヲ呈シ1部増殖旺盛ナル部アリ。

第5號家兎：實驗日數37日

イ) 子宮：殆ど一塊トナリ小腸・膀胱並ニ腹壁ト密ニ癒着セリ。左側下方ノ移植部ハ子宮腔部ニ亙リ略鳩卵大ノ腫瘤ヲ形成シ、上方ハ概シテ壁菲薄ニシテ萎縮状態ニ在リ。腔稍大ナル感アリ粘膜面ハ赤色ヲ呈セリ。右側ハ大凡全長ニ亙リテ腫瘍化シ腔ハ腫瘍ノ爲1側ニ壓平サレシ貌トナレリ。檢鏡ト腔ノ大サ稍大ニシテ幾分萎縮扁平ニ傾キ腺組織小許存在ス。粘膜下層及ビ筋層血管ハ極メテ鬱血ノ度強ク、1側筋層内ニ發育ヒシ腫瘍ニ壓迫サレ他側ノ筋層ハ退縮ノ像アリ。腫瘍ニ壞死瘻ハ殆ド認メラズ、糖原ハ僅少ナリ。粘膜下層ハ結締組織ニ富ム。

ロ) 卵巢：濾胞ノ發育稍不良ニシテ小囊胞變性ヲ認メシムルモノ多ク、石灰沈着2~3存在シ間質腺ニ富ム。

ハ) 腦下垂體：可成リ肥大セリ。檢鏡上1部鬱血シ主細胞ハ大小ノモノ混在セルモ、嗜色素性細胞ハ兩者共腫狀ニ著明ニ増殖セル個所アリ。

ニ) 甲狀腺：膠樣質ヲ充セル小ナル濾胞多キモ時ニ大ナルモノモ混ズ。概シテ上皮細胞ハ扁平ナリ。

1 ノ 小 括

本群家兔5頭ノ中子宮ニ就テハ、檢鏡上第2號ヲ除キ何レモ腫瘍發育ニ依リ壓迫或ハ侵潤等ノ爲、粘膜層ハ萎縮扁平化シ腺組織ニ乏シク、腫瘍ノ増殖旺盛ナリシモノニ於テハ中央部ハ壞死ニ陥リ(第1・3・4號)、筋層亦概シテ蠶蝕サレ本來ノ造構ヲ失ヒシモノ多シ。糖原ハ一般ニ少量ナリ。尙肉眼の所見ニ於テ第4號ノ左側子宮ノミハ、子宮腔部ヨリ上方約 $\frac{1}{4}$ 部ニ及ベル腫瘍ニヨリ腔閉塞サレ、其ヨリ上方ハ壁極メテ菲薄ニシテ水樣液ヲ容レタル所謂溜囊腫化ヲ呈セリ。然レ共其ノ右側及ビ第5號ノ左側子宮ハ、同様ニ略子宮腔部ヲ中心トシテ發育セル腫瘤アレ共上方ハ單ニ萎縮ノ状態ニ止マレリ。卵巢ハ濾胞ノ發育不良ナルモノト稍可ナルモノト有ルモ、成熟濾胞ハ1例モ之ヲ認メズ、孰レモ多少ノ差コソアレ小囊胞ヲ有シ白體ニ乏シ。腦下垂體ハ概シテ鬱血ノ像ヲ示シ、主細胞ノ小ナルモノヲ認メ嗜色素細胞ノ出現左程多カラザルモ、1~2之ニ反スルモノアリ。甲狀腺ハ概シテ膠樣質ヲ充セル濾胞ノミヨリ成ルガ如ク、一般ニ上皮細胞ハ扁平ナルモノ多シ。即チ子宮ハ概シテ機能低下ノ像ヲ示シ、卵巢所見ハ不定ナルモ機能低下像ヲ示スモノ多ク、腦下垂體及ビ甲狀腺ハ1~2ノ例外ハアルモ之亦概シテ機能低下ニ低ク。尙腫瘍轉移ニ關ジテハ各節ヲ通ジ一括シテ後述スベシ。

2 低單位おばほるもん注射群

本群ニ使用セン家兔モ最初對照群ト略同數ナリシモ、早期斃死・手術結果ノ不良等ノ爲下記スベキ6頭ヲ其ノ實驗目的ニ叶フモノトシテ採擇セリ。實驗日數ハ表ニ示セル如ク最低21

日より最高50日平均33日ニ達シタリ。體重ハ各例共多少ノ減少ヲ示シ平均-155gニシテ、腦下垂體・卵巣・甲状腺等ノ重量ハ夫々表示ノ如シ。以下前群同様之等家兎ノ子宮・卵巣・腦下垂體並ニ甲状腺ニ就キ、夫々肉眼的或ハ組織的所見ヲ記載シ行カントス。

第6號家兎：實驗日數33日

イ) 子宮：左右共移植部ハ大豆大乃至小指頭大ニ腫大シ何レモ内腔ニ向ヒ隆起セルモ内膜ハ概シテ色蒼白ナリ。檢鏡スルニ1側ニ於ケル腫瘍ニヨリ他側ニ壓平サレタル粘膜面ハ皺襞ノ像ニ乏シク腺組織ヲ缺キ、腫瘍側ハ殆ド粘膜組織ヲ缺如シ扁平重層上皮ヲ以テ被ハレタリ。腫瘍中心部ニ於テハ少許ノ壊死ヲ認ム。筋層内細血管ハ概シテ高度ニ充盈シ、筋層ハ腫瘍ノ侵潤及ビ壓迫ノ爲1部消失シ殘部ハ萎縮傾向アリ。尙腫瘍中ニ於ケル淋巴管ノ稍著ク擴張セルモノアリ。

第2表 低單位おばほるもん注射群各種計測値

動物 番號	實驗 日數	體重變化(g)			腦下 垂體 (mg)	子宮一次腫瘍			卵巣 (mg)	甲状腺 (mg)
		手術前	屠殺時	増減		部位	下方移植部	上方移植部		
6	33	1800	1700	-100	31	左 右	小指頭大	大豆大	61	55
							豌豆大	小指頭大	57	51
7	35	2080	1870	210	23	左 右	拇指頭大	大豆大	68	70
							拇指頭大	?	70	76
8	21	1940	1800	-140	24	左 右	大豆大	大豆大	105	92
							小豆大	大豆大	120	85
9	50	2330	2050	-250	30	左 右	拇指頭大	?	128	85
							拇指頭大	?	120	96
10	25	1800	1730	-70	25	左 右	超拇指頭大	小指頭大	88	54
							拇指頭大	?	80	47
11	32	1970	1810	-160	26	左 右	大豆大	?	72	63
							小指頭大	?	81	60
平均	33	1982	1827	-155	26.5				87.5	69.5

ロ) 卵巣：表面凹凸不平ヲ示シ檢鏡的ニハ濾胞ノ發育可成リ不良ニシテ、萎縮消退ノ傾向著シク小濾胞極メテ多數在リ。結締組織幾分増加セリ。

ハ) 腦下垂體：鬱血像アリ、主細胞ノ形態小ナルモノ多キモ鹽基嗜好性細胞ノ増加ヲ認ムル個所アリ。

ニ) 甲状腺：小濾胞ニ富ミ膠樣質ニ乏シク内容殆ド空虛ナルモノ多シ。上皮細胞ハ形扁平ナルモノ多キモ骰子形ノモノ亦乏シカラズ。

第7號家兎：實驗日數35日

イ) 子宮：腔・膀胱ト共ニ癒着シ1塊ヲナス。左右共下方移植部ハ拇指頭大ナリ左上方ノモノハ大豆大ニ腫大ス。腔ノ内面ハ稍血管ノ充盈著シ。檢鏡的ニ腔ノ大ニ略尋常ナルモ粘膜層ハ著シク縮シ腺組織亦極メ乏シ。腫瘍ハ殆ド全層ヲ占メ所々壞死及ビ鬱血像ヲ認ム。筋層ハ腫瘍増殖ノ爲メ不規則トナリ。所々ニ鬱血乃至出血像アリ。

ロ) 卵巢：卵胞ノ發育概シテ可良ニシテ各種ノ發育過程ノモノヲ存シ。白體3~4個黃體1~2個ヲ認メシム。尙小囊胞變性ヲ遂ゲタルモノ相等多數ニ存在ス。

ハ) 腦下垂體：鬱血頗ル強盛ニシテ主細胞ハ一般ニ大ニシテ増殖ノ傾向アリ。所々嗜色素細胞ノ稍多クノ出現アリ。

ニ) 甲狀腺：略平等ニえおじんニ淡染セル膠樣質ヲ充セル小濾胞ノ集團ニシテ。上皮細胞ハ一般ニ扁平ナル感アリ。

第8號家兎：實驗日數21日

イ) 子宮：左右共移植部ハ小豆大乃至大豆大ノ腫瘍ヲ認ムルモ、他部子宮ハ小ナル感アリテ腔ノ大サ・粘膜面等ニ異常ナシ。檢鏡的ニ腔並ニ腺組織ハ略正常ニ近ク。筋層ノ1部ニ腫瘍ヲ認ムルモ壞死部ヲ缺キ。粘膜下層並ニ筋層内血管ハ甚ダ強ク擴張充盈ス。瘍増筋層ハ概シテ發育良好ニシテ結締組織可成リ増殖セリ。Sudan III染色標本ニ於テ腫瘍浸潤ヲ來セル筋組織ノ個所ニ小許ノ脂質出現アリ。

ロ) 卵巢：相等肥大ヲ示シ檢鏡的ニ成熟卵胞以下諸種段階ノ卵胞ヲ認ムルモ、1部閉鎖卵胞乃至小囊變性ヲ散見ス。結締組織幾分増加シ居レリ。

ハ) 腦下垂體：鬱血略中等度。主細胞ハ大ニ且増殖ノ傾向アリ又嗜色素細胞ニ富ム。

ニ) 甲狀腺：多少染色不同アル膠樣質ヲ容レタル小濾胞無數ニ在リ。上皮細胞ハ扁平乃至骰子形ニシテ増殖ヲ示セル個所アリ。鬱血ノ像ヲ認ム。

第9號家兎：實驗日數50日

イ) 子宮：左右共下方移植部ハ略拇指頭大トナリ。夫ヨリ上方ハ腫瘍ニヨル内腔閉鎖ノ爲壁菲薄ニシテ水樣液ヲ容レタル溜囊腫狀ト化セリ。檢鏡スルニ腔ハ可成リ擴大セルモ粘膜層・腺組織ハ略常態ニ近ク。唯粘膜下ノ鬱血極メテ高度ニシテ水腫ヲ認メ。筋層ノ血管亦著明ニ充盈ス。腫瘍ハ筋層ノ1部ヲ侵蝕破壞シテ占居シ。其他ノ全周ニ亙リテモ大ニ散在性ニ腫瘍ヲ認メシムルモ、却テ之ニ附隨シテ現レタル炎性浸潤極メテ強ク廣範ニ亙リテ認メラル。脂質ハ上皮直下ノ1部及ビ筋層ノ1部ニ極メテ少許出現セリ。

ロ) 卵巢：形態大ナルモ表面ノ凹凸稍著明ナリ。檢鏡上濾胞ノ發育概シテ不良ニシテ。所々ニ萎縮乃至囊胞化或ハ閉鎖セル卵胞ヲ認ム。其他白體2個アリ。髓質結締組織多少増加セル

如シ。

ハ) 腦下垂體：嚢血像稍著明ニシテ主細胞ノ犬ナルモノ密在シ、鹽基嗜好性細胞著シク増加セリ。

ニ) 甲狀腺：濾胞ハ極メテ小ニシテ一様ニスルモノニ染着セル膠樣質ヲ含ミ、上皮細胞ハ扁平ナルモノモアレ共所ニヨリ骰子形ヲ示シ、其ノ増殖特ニ旺盛ナルモノアル個所多シ。

第10號家兎：實驗日數25日

イ) 子宮：膀胱並ニ腸管ノ1部ト可成リ密ニ癒着セリ。左側ハ殆ド全長ニ亘リテ腫瘍ヲ形成シ略中央部ハ壁幾分菲薄ニシテ腔ヲ擴大シ、右側ハ略中央部迄腫瘍化シ夫ヨリ上方ハ腫瘍ヲ認メ難キニ細血管充盈強シ。檢鏡スルニ腔ノ大リ稍大、粘膜層ハ幾分萎縮傾向アリ。1部上皮ノ剝離ヲ認ム。又腺窩ニ乏シキモ粘膜下組織ハ所ニヨリ全ク腫瘍ノ浸潤ヲ受ケ、殘部ハ稍著明ニ浮腫狀ヲ呈シテ厚ク極メテ著明ナル細血管ノ充盈ヲ示シ、恰モ單純血管腫ヲ思ハシムル如キ感アリ。腫瘍組織ハ筋層ヲ中心ニ全周ニ及ビ爲ニ筋層ハ甚ダ不規則ノ走行ヲ示シ、尙腫瘍部ニ於テハ僅ニ糖原顆粒ヲ認ム。

ロ) 卵巢：濾胞ノ發育良好ニシテ Graaf 氏濾胞以下各種階梯ノモノヲ見ル。然レ共所ニ依リ萎縮乃至ハ囊胞化セルモノモアリ尙白體1個ヲ認ム。

ハ) 腦下垂體：嚢血像可成リ高度ニシテ各細胞成分共増殖ノ傾向顯著ナリ。

ニ) 甲狀腺：濃淡稍不同ナル膠樣質ヲ容レタル小濾胞極メテ多ク、部分的ニ濾胞内容ニ乏シキモノアリ、上皮ハ骰子形ニシテ増殖ノ傾向著シキモノアリ。

第11號家兎：實驗日數31日

イ) 子宮：下方移植部ハ左右夫々大豆大乃至小指頭大ノ腫瘍ヲ形成セルモ、上方移植部ハ腫瘍ヲ認メズ内腔稍大ナル感アリテ細血管充盈セリ。檢鏡スルニ粘膜層腺組織ハ常ニ比シ増殖ノ傾向強ク、粘膜下ニ於ケル嚢血可成リ著明ニ其他各層細血管亦高度ニ充盈セリ。筋層内ノ1部ニ腫瘍組織アリ中心部ハ壊死ニ陥レリ。其他ノ筋層ノ發育尋常ニシテ結締組織ニ富ム。

ロ) 卵巢：概シテ形態小ニシテ表面ノ凹凸著シク、檢鏡上濾胞ノ發育一般ニ不良ナリ。

ハ) 腦下垂體：各細胞成分ノ所々結節狀乃至竈狀ニ特ニ増殖ノ傾向強キ個所アリ、嚢血ノ像亦認メラル。

ニ) 甲狀腺：膠樣質ニ乏シキ濾胞ニ富ミ、上皮細胞ハ圓形ニ近ク且ツ増殖ヲ呈セル個所多シ。

2. ノ 小 括

本群ニ於ケル家兎6頭ニ就キテ見ルニ、先ヅ子宮ニ於テハ對照群ニ比シ腺組織並ニ粘膜ノ

萎縮程度弱ク、第8, 9, 11號ノ如キハ殆ド常態ニ近キ所見ヲ呈シ、腫瘍ハ子宮ノ全周ニ及ブモノ半數ヲ占ムルモ(第7, 9, 10號)概シテ壞死ニ乏シク、唯第7號ニ於テ稍夫ノ著シキヲ見ルノミナリ。而シテ粘膜下乃至ハ腫瘍部ニ鬱血ヲ呈セルモノ多ク且高度ニシテ、時ニ單純血管腫ニ擬フモノスラアリ(第10號)其他各層一般ニ血管ノ充盈強度ナリ(第6, 8, 9, 11號)。筋層ハ腫瘍ノ浸潤壓迫ノ爲萎縮消失セルモノ多ク且其ノ配列不規則トナレリ。少本群ニ於テモ1例第9號家兎子宮ニ於テ、左右共下方移植腫瘍ガ子宮腔部ニ亙リテ増殖シ、爲ニ該部ハ内腔殆ド消失シ其ノ上方ハ壁菲薄ニシテ水様液ヲ容レタル囊腫化セリ。卵巢ニ於テハ濾胞ノ發育不良ニシテ萎縮・囊胞化又ハ閉鎖卵胞ヲ見ルモノアレ共、又機能亢進ノ像ヲ示シ夫ノ發育可良ナルモノ尠カラズ(第7, 8, 10號)。腦下垂體ハ鬱血ノ著明ナルモノ入大多數ニシテ各種細胞成分ノ明カナル増殖傾向ヲ認ム。甲状腺亦概シテ機能良好ナルモノ多ク上皮ノ増殖傾向ノ見ラルモノ乏シカラズ(第8, 9, 10, 11號)。對照群ニ於テハ腫瘍發育著シキ場合、子宮粘膜ニ機能低下ノ傾アリタルモ、本群ニ於テハ寧ろ斯ル場合ニ於テモ子宮粘膜ハ正常ナルカ、又ハ機能亢進ノ像スラアリタルハ卵胞はるもんノ影響ト斷ジテ誤ナカルベシ。尙轉移ニ就テハ追テ後記スベシ。

3 高單位おばほるもん注射群

本節ニ於ケル家兎モ實驗當初ハ10頭餘ヲ使用シタルガ早期斃死例等ヲ除キ下記スベキ8頭ヲ得タリ。實驗日數ハ最短23日(第18號家兎)ヨリ最長60日(第14號家兎)ニ達シ平均36日ヲ算セリ。體重ハ表ニ見ル如ク孰レモ減少ヲ示シ、特ニ第14號ノ440g, 第17號ノ360g等ハ著シク平均ハ185gナリ。腦下垂體・卵巢・甲状腺ノ重量ハ夫々表掲ノ如クナルモ、其中卵巢ニ於テハ肉眼的ニ腫瘍轉移ヲ認メタルモノアリテ其ノ重量正鵠ヲ失セルモ、第1, 第2表ニ倣ヒテ記載シタリ。以下之等各家兎ニ就キ前2群同様各所見ヲ順次述ベ行カントス。

第12號家兎：實驗日數28日

イ) 子宮：左右殆ド全長ニ亙リテ腫瘍ヲ形成シ特ニ右側ニ強度ナリ。内面ハ稍細血管ノ充盈ヲ呈セル外著變ヲ認メズ、膀胱トノ癒着概シテ強シ、檢鏡的ニ腔ノ大リ稍大ニシテ粘膜層腺組織ハ多少退縮ノ傾アリ。腫瘍ハ1側筋層内ニ増殖セルモ一般ニ粘膜下層並ニ筋層ノ發育著シク良好ニシテ、粘膜下層ハ幾分鬱血像アリ。腫瘍ノ中心部ハ僅カニ壞死傾向アリ其周圍ノ増殖旺盛ナル部ニ於テハ糖原顆粒ヲ散見ス。尙漿膜面ノ1部ニ於テモ腫瘍ノ増殖アリ、之ニ接スル部分ハ結締織ノ増殖アリ且炎症浸潤稍強度ナルモノアリ。

ロ) 卵巢：頗ル肥大シ居ルモ檢鏡ト濾胞ノ發育ハ概シテ良好ナラズシテ殆ド其ノ成熟形ニ近キモノヲ認メズ。萎縮乃至ハ小囊胞變性ヲ呈セルモノアリ。且偏側ニ全切片ノ凡ソ $\frac{1}{4}$ ヲ占ムル一大出血濾胞體アリ。

第 8 表 高單位卵胞ホルモン注射群各ノ計測値

動物 番號	實驗 日數	體(變化%)			腦 手 體 (mg)	子宮一次腫瘍			卵巢 (mg)	状態 (mg)
		手術前	屠殺時	増減		部位	下方移植部	上方移植部		
12	28	2070	1930	-140	23	左 右	雀卵大 超拇指頭大	拇指頭大 蠶豆大	167 143	78 70
13	35	1900	1880	-20	31	左 右	拇指頭大 拇指頭大	小指頭大 ?	107 97	95 96
14	60	2140	1730	-440	32	左 右	小指頭大 拇指頭大	小指頭大 小豆大	160 153	110 120
15	54	1810	1630	-180	30	左 右	鳩卵大 拇指頭大	小指頭大 大豆大	120 110	55 48
16	24	1700	1610	-90	22	左 右	小豆大 ? /	大豆大 大豆大	55 67	51 43
17	26	2090	1730	-360	28	左 右	超拇指頭大 雀卵大	小指頭大 蠶豆大	115 103	73 68
18	23	1830	1650	-180	23	左 右	小指頭大 鳩卵大	扁頭大 小指頭大	89 100	64 59
19	34	2070	2000	-70	24	左 右	拇指豆大 蠶豆大	小指頭大 小指頭大	93 108	77 68
平均	36	1951	1776	-185	26.6				111.5	73.4

ハ) 腦下垂體：鬱血稍高度ニシテ酸嗜好性細胞ノ著明ナル増殖ヲ認ム。

ニ) 甲状腺：染色ニ幾分濃淡ノ差アル膠樣質ヲ以テ充サレタル大小ノ濾胞ニ富ミ、上皮細胞ハ概シテ扁平ナルモノ多シ。

第18號家兎：實驗日數35日

イ) 子宮：左側子宮腔部後上方ニ大豆大及ビ蠶豆大ノ腫瘍ガ粘膜炎ニ在リ、右ノ同様部ニ於テモ粘膜炎ニ大豆大ノ腫瘍存在シ、下方移植部ハ共ニ拇指頭大ノ腫瘍ヲ形成シ、左上方移植部亦小指頭大ニ達ス。檢鏡上腔ノ大サ稍大ニ粘膜炎ハ腺組織減少シ、其1側ハ腫瘍組織ヨリ形成サレシ形トナリ該部粘膜炎上皮ハ剝離セル個所アリ。殆ド全層ニ亘リ鬱血極メテ高度ニシテ所ニヨリ出血像ヲ示ス。腫瘍部中心ハ可成リ大ナル壊死竈ヲ形成ス。筋層ノ發育可良ナルモ殆ド全周ニ亘リ多少其腫瘍ノ浸潤ヲ被リイ規則ナル配列ヲ示セリ。粘膜炎下結締組織增加ノ傾アリ。

ロ) 卵巢：濾胞ノ正常ナル發育極メテ不良ニシテ殆ド萎縮消退シ、4-5個ノ成熟型ニ近キモノアレ共之等ハ總テ閉鎖卵胞ヲ形成セリ。

ハ) 腦下垂體：鬱血ノ像強ク1部出血像ヲ認メシム。尙部分的ニ嗜色素細胞幾分増加セルアリ。

ニ) 甲状腺：可成リ濃淡ノ差著シキ膠樣質ヲ容レタル大小各種ノ濾胞並ニ内容ニ乏シキ濾胞ヨリ成リ、上皮細胞ハ一般ニ扁平ナリ。

第14號家兎：實驗日數60日

イ) 子宮：腫瘍ハ主トシテ左上方並ニ右下方ノ移植部ニ於テ、夫々小指頭大乃至拇指頭大ノモノヲ認メ右側子宮腔部ノ筋層内ニ小指頭大ノ腫瘍アリテ内腔ヲ壓迫閉塞セル貌ヲ呈シ、爲ニ該部上方ハ小量ノ水溶液ヲ容レ腔可成リ擴大セリ。尙左側子宮腔部ニ於テモ粘膜下ニ大豆大ノ腫瘍結節ヲ認ム。檢鏡スルニ腔ハ相等擴張シ粘膜層極度ニ退縮シ、所々痕蹟的ニ腺窩殘存ス。腫瘍ハ偏側筋層ヲ中心トシテ強ク増殖シテ他側ヲ壓迫セル狀ヲ呈シ、其ノ中心部ハ所ニヨリ壞死瀝アリ。殆ド全層ヲ通ジ鬱血強度ニシテ、筋層ハ腫瘍側ニ於テハ不規則ニ走レリ。糖原ハ所々僅小乍ラ之ヲ認ム。脂質ハ極メテ稀ニ筋層ニ近キ粘膜下組織中ノ遊走細胞中ニ之ヲ認ム。

ロ) 卵巢：表面凹凸不平ノ度稍強ク右側ノ夫ニ於テハ米粒大ノ腫瘍轉移ヲ見ル。檢鏡上濾胞ノ發育不良ニシテ閉鎖卵胞・囊胞變性乃至ハ菱縮像ヲ認メシメ、尙2個所ニ大ナル腫瘍轉移結節ヲ見ル。

ハ) 腦下垂體：前葉ニ於テハ多數細血管内ニ腫瘍細胞ノ栓塞ヲ認メ、又後葉ニ於テモ小ナル多數ノ轉移竈アリ。前葉細胞ハ空胞形成ヲ認ムルモノ多ク酸嗜好性細胞ノ増加セルヲ見ル。

ニ) 甲状腺：一般ニえおじんニ淡染セル膠樣質ヲ充セル大濾胞ノ集合ナルモ、所ニヨリ比較的小ナル濾胞ノ集團存在シ、上皮ハ扁平ナルモノト圓形ニ近キモノアリテ時ニ増殖ヲ認ム。

第15號家兎：實驗日數54日

イ) 子宮：移植部ハ左右共上下ヲ通ジ小指頭大乃至鳩卵大ノ腫瘍ヲ形成シ、又兩側共子宮腔部ニ夫々大豆大乃至小指頭大ノ腫瘍ヲ認メ、爲ニ左側ハ該部ニ於テ内腔殆ド閉鎖サレ、上方ハ腔可成リ擴大シ小量ノ水樣液ヲ容レ第14號ノ右側子宮ト共ニ所謂輕度ノ溜囊腫ヲ形成セリ。檢鏡スルニ腔強ク擴張圓形ヲ呈シ、粘膜面ハ極度ニ萎縮シ上皮細胞缺落セル個所多ク腺組織ヲ見出シ難シ。全層ニ亙リ鬱血甚ダ高度ニシテ特ニ粘膜下層ニ著明ナリ。筋層ハ腫瘍ノ増殖セル部ヲ除キ概シテ發育尋常ナルガ如シ。粘膜下結締織ノ1部及ビ筋層ノ1部ニ稀著明ナル脂質ノ沈着ヲ認ム。

ロ) 卵巢：其ノ略 $\frac{1}{2}$ ハ腫瘍轉移ヲ形成シ、比較的健康ナル部ニ於テモ濾胞ハ發育極メテ惡シク成熟形ヲ見ズ萎縮消退セリ。髓質ハ血管充盈ノ度強ク彈力組織ニ富ム。間質腺稍著明ニ發育セリ。

ハ) 腦下垂體：輕度ニ鬱血ノ像ヲ呈シ、前葉ノ一部ニ小ナル膠質濾胞若干ヲ認ム。一部鹽基嗜好性細胞ノ竈狀増殖ヲ示セルモ、一般ニ細胞成分ハ萎縮傾向アリ。

ニ) 甲状腺：概シテ一樣ニ淡染ヒル膠樣質ヲ充セル小濾胞ノ集團ナルモ、所々極メテ大ナル濾胞ヲ混在セシム。上皮細胞ハ扁平乃至骰子形ナリ。

第16號家兎：實驗日數24日

イ) 子宮：兩側共移植部ハ大豆大ノ腫瘍ヲ形成セルモ其他ハ正常ニ近ク粘膜面概シテ暗赤色ヲ呈ス。檢鏡上粘膜面ハ大ナル4~5ノ皺襞ヲ有スルモ萎縮像強ク、腺組織亦退縮セリ。粘膜下層・漿膜下層ハ鬱血相等高度ニシテ、筋層ハ一般ニ發育良好ナルモ其一部ニ規則ナル走行ヲ示シ且幾分肥厚セリ。尙漿膜ハ4~5ノ個所ニ於テ小ナル腫瘍竈ノ存在セルヲ認ム。

ロ) 卵巢：濾胞ノ發育略可良ナルモ完熟卵胞ヲ缺キ、小囊胞若干並ニ萎縮セルモノ存在シ、髓質血管可成リ充盈ヲ示セリ。

ハ) 腦下垂體：鬱血中等度、細胞成分ニ富ミ嗜色素細胞竈狀ニ増殖セル個所アリ。

ニ) 甲状腺：濾胞一般ニ小ニシテ濃淡種々ニ染着セル膠樣質ヲ充シ、上皮細胞ハ概シテ扁平乃至骰子形ナリ。

第17號家兎：實驗日數26日

イ) 子宮：左右並ニ膀胱ト癒着シ1塊ヲナセリ。殆ト全長ニ亘リ腫瘍ヲ形成シ内腔ハ稍擴大シ充血ヲ呈ス。粘膜面亦稍充血ヲ示ス。檢鏡スルニ腔ノ大リ稍大ニ粘膜層皺襞ニ乏シカラザルモ、腺組織ハ幾分萎縮シタリ。筋層ハ著シク肥厚シ其一部腫瘍ノ浸潤ヲ被レリ。腫瘍ハ漿膜下ニ向ヒ發育増殖セリ。漿膜下組織ハ鬱血稍著明ニ上記以外ニ2~3小腫瘍組織ヲ認ム。小血管周圍ニハ糖原稍多ク出現ヒリ。尙彈性纖維並ニ結締組織幾分増加ヲ示ス。

ロ) 卵巢：濾胞ノ發育稍不良ニシテ大ナルモノヲ認メズ、萎縮乃至閉鎖卵胞及小囊胞變性若干ヲ存シ中心部血管ノ充盈ハ強度ナリ。間質腺ノ發育可良ナリ。

ハ) 腦下垂體：鬱血像左程著シカラズ、主細胞ハ形態概シテ小ナルモ著明ニ増殖シテ索狀配列ヲ示シ、嗜色素細胞亦稍増加セリ。

ニ) 甲状腺：扁平乃至骰子形ノ上皮ヲ有スル小濾胞ノ集團ニシテ、概シテ一樣ニ染着セル膠樣質ヲ充滿セシム。時ニ著大ナル濾胞1~2散見ス。

第18號家兎：實驗日數23日

イ) 子宮：左右共殆ト全長ニ亘リ腫瘍化シ特ニ子宮腔部ハ増殖著シク、腫瘍ハ内腔ニ向ヒテ突達ス。右側ノ腔部擴大ヒル如シ。檢鏡的ニ子宮腔ハ1側ノ腫瘍ニ壓迫扁平化サレ、腺組織ハ腫瘍侵害ノ爲消失退化ス。腫瘍部ハ鬱血像著明ニシテ所々ニ壞死竈ヲ認メシム。

ロ) 卵巢：概シテ濾胞ノ發育良好ナルモ閉鎖卵胞・小囊胞等ヲ認メ、中心部ハ略中等度ニ

血管充盈ス。

ハ) 腦下垂體：鬱血像稍著明ニシテ主細胞ハ形態大且密在シ、鹽基嗜好性細胞ノ増殖セル個所アリ。

ニ) 甲状腺：極小ナル濾胞密在、膠樣質ハ濃淡種々ニシテ、上皮ハ扁平ナルモノアルモ一般ニ圓形ニ近ク増殖旺盛ナル部アリ。

第19號家兎：實驗日數74日

イ) 子宮：移植部ハ蠶豆大乃至拇指頭大ノ腫瘍ヲ形成シ、其他所々ニ小豆大ノモノアリ。内膜一般ニ充血暗赤色ヲ呈シ腔幾分擴大セリ。檢鏡スルニ偏側腫瘍ノ爲他側ニ壓平サレシ側ハ多少腺胞組織淺存セルモ、一般ニ粘膜面退縮シタリ。腫瘍部ハ所々壊死竈アリ又出血ヲ認メシメ、筋層ハ其走行甚ダ不規則ナリ。

ロ) 卵巣：濾胞ハ著シク萎縮消退シ小囊泡變性ニ陥レルモノ極メテ多數ニシテ、概シテ結締組織ニ富ム。

ハ) 腦下垂體：鬱血可成リ強度ニシテ主細胞ニ富ム。

ニ) 甲状腺：中等大ノ略均等ナル濾胞ノニヨリ成リ、膠樣質ハえおじんニ一樣ニ染着シ上支細胞一般ニ扁平ナリ。

3 ノ 小 括

本群ニ於ケル家兎8頭ニ關シテ先ヅ其ノ子宮ヲ通覽スルニ、概シテ粘膜層ノ萎縮高度ナルモノ多ク(第14, 15, 16, 18, 19號)。前2群特ニ低單位おばほるもん群ニ比シ其ノ度強ク、腫瘍部壊死竈ハ略中等度ニシテ前群ニ比シ強度ナリ。鬱血亦一般ニ高度ニシテ特ニ粘膜下並ニ筋層ニ強ク(第13, 14, 15, 16, 17號)。筋層ハ腫瘍ノ増殖浸潤ノ爲不規則化セル部ヲ除キ概シテ常態ニ近キカ或ハ發育良好ナリ(第12, 18, 15, 16, 17號)。結締組織亦一般ニ増加傾向ヲ示シ、糖原ハ概シテ小量ニ證明セラル。尙本群ニ於テモ第14號家兎右側子宮並ニ第16號家兎左側子宮ニ、共ニ腫瘍發育ニ依ル管腔ノ閉鎖ニヨリ、該部上方ノ腔擴張シ水様液ヲ容レタレ所謂輕度ノ溜囊腫ノ傾向ヲ認メタリ。卵巣ニ關シテハ殆ト全例ヲ通ジ濾胞ノ發育不良ニシテ成熟型ヲ認メ難ク、組織内ニ腫瘍轉多アリタルモノハ特ニ良ナルガ如シ(第14, 15號)。而シテ孰レモ閉鎖卵胞或ハ小囊泡變性ヲ認メザルナク、第12號家兎ニハ大ナル出血濾胞ヲ形成シタリ。即チ卵巣機能ハ低下傾向乃至ハ高度ノ低下ヲ示セルモノ多シ。腦下垂體ハ鬱血強盛ナルモノ多ク(第12, 13, 16, 19號) 概シテ機能亢進ノ所見アリテ主細胞ニ富ミタルモノ多クナリ。甲状腺ニ於テハ機能的ニ著シヲ示サザルカ或ハ低下傾向ヲ現ハシ、濾胞概シテ小ニシテ多クハ膠樣質ヲ充滿センメ、上皮ノ扁平ナルモノ多キモ時ニ數子形ヲ呈シ、稀ニ増殖セル個所アリタリ。

4 各群ニ於ケル腫瘍轉移

上記各群家兎ニ於ケル腫瘍ノ轉移臓器並ニ其ノ多寡ノ程度ハ第4表ニ揭示ノ如クニシテ、尙之等轉移形成ノ數値ト子宮ニ於ケル第一次腫瘍形成ノ度合ヲ比較シ易カラシムル爲、第一次腫瘍ノ増殖程度ニ應ジテ別ニ夫々+(小指頭ハ迄ノモノ、1ト算ス)、+(拇指頭大以下ノモノ、2トス)、+(拇指頭大以上ノモノ、3トス)ノ符號ノ設テ表示セリ。先ヅ對照群ニ就テ見ルニ、5頭ノ中數値ノ最大ナルハ第4號(18.0)最小ナルハ第1、2號(各6.0)ニシテ、其ノ平均

第4表 加藤系家兎肉腫子宮内移植ニ於ケル轉移形成

處置 類別	動物 番號	實驗 日數	一 次 腫 瘍	轉 移 形 成 臟 器										計						
				子 宮	腔	廣 經 帶	膀 胱 輸 卵 管	肝	膽 囊	脾	腎	副 腎	胃		腸	膀 胱	大 網 膜	腹 壁	橫 膈 膜	肺
對 照 群	1	22	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6.0
	2	21	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6.0
	3	9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10.5
	4	37	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18.0
	5	37	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9.0
	平均	31	2.0	0.9	0.7	0.7	0.7	0	1.6	0.6	0.1	0.7	0.2	0	0.3	0.8	0.2	0.8	0.1	9.9
低 單 位 注 射 群	6	33	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	14.5
	7	35	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	14.0
	8	21	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6.5
	9	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	17.5
	10	25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20.0
	11	32	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7.0
	平均	33	1.7	1.5	0.8	1.5	1.0	0	2.0	0.7	0	0.5	0.1	0	0.3	0.8	0.5	0.8	0.2	13.3
	12	28	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	17.5
	13	35	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	13.0
	14	60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	32.5
高 單 位 注 射 群	15	54	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	28.0
	16	24	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6.5
	17	26	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18.5
	18	23	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	22.0
	19	34	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	14.5
	平均	36	2.4	2.1	1.0	1.9	1.9	0.3	2.3	1.1	0.1	0.9	0.2	0.1	0.7	1.2	1.4	0.9	1.2	0.4

値ハ9.9ヲ示シ、實驗口數ノ多寡ト腫瘍轉多度乃至ハ一次腫瘍發育度トハ必ズシモ比例セザル如シ。轉多臓器ノ平均値ニ於テハ、淋巴腺最高位ヲ占メ(1.6)且全例ニ之ヲ見、腹壁(1.3)・子宮及ビ大網(各0.9)・肺(0.8)之ニ次ギ、腔・廣腹帶・膀胱・腎ハ同値ニアリ。第一次腫瘍ノ平均ハ2.0ニシテ其ノ發育程度・轉多形成ノ多少トハ略ニ比例ナル傾向アリ。次ニ低單位おぼはるもん群ニ於テハ、全數ノ頭中最高ハ第10號(2.0)ニシテ第9號(1.7)トニ次ギ、最低ハ第8號(0.5)ナルモ其ノ平均値ハ13.3ノ示シ對照群ノ夫ニ比シ3.4多シ。本群ニ於テモ前群同様必シモ實驗口數ト一次腫瘍増殖度並ニ轉多形成度トハ相一致セズ。轉多形成臓器ノ平均値亦首位ヲ占ムルハ淋巴腺(2.0)ニシテ、子宮・廣腹帶・大網・腹壁孰レモ同値(1.5)ヲ示シ、膀胱(1.0)・腔・横隔膜・肺(各0.8)・肝更ニ之等ニ亞グ。一次腫瘍ノ平均1.7ハ對照群ニ劣リタルモ、轉多ハ各臓器共概シテ高度ナルガ如シ。尙本群ニ於テモ亦腫瘍轉多度ト一次腫瘍ノ増殖度ト凡ソ一致セル成績ヲ示ヒリ。最後ニ高單位おぼはるもん群ヲ通覽スルニ、轉多形成ノ最も貧ナルハ第16號(0.5)最も旺盛ナルハ第14號(32.5)ニシテ、其ノ平均値ハ19.1ヲ算セリ。即チ前記兩群ニ比シ壓倒的高變ヲ示シ、更ニ長期生存シ轉多形成時ニ強盛ナリシ第14、15號ヲ除キタルノ6頭ノ平均値ヲ探レモ、尙且15.3ヲ算シ明クニ前2群孰ノヨリモ大ナリ。臓器別轉多形成度ニ於テハ淋巴腺ノ首位ヲ占メ(2.3)子宮・大網(各2.1)トニ續キ更ニ廣腹帶・膀胱(各1.9)・腹壁・肝・腔等ノ順立ヲ示シ、之等ハ勿論其他各臓器ニ於テモ概ニ轉多形成度ハ前記各群ニ比シ高度ナル事表ニ見ル如シ。又第一次腫瘍ニ於テモ其ノ平均値ハ2.4ニシテ明カニ前兩群ヲ凌駕セリ。而シテ本群ニ於テモ亦實驗口數・轉多形成頻度トハ必ズシモ一致セズ、一次腫瘍ノ増殖度大ナル程轉多度強ト傾向ガ觀察サルルナリ。

以上ノ成績ヲ要約スルニ、一次腫瘍ニ於テハ高單位群最も發育旺盛ニシテ低單位群ハ寧ロ對照群ニ劣レル値ヲ示セルモ、轉多形成度ノ側ヨリ見レバ明カニ對照群・低單位群・高單位群ノ順ニ強盛トナレルハ少ク共轉多形成ニ對シテハ卵胞ほるもんガ促進の影響ヲ與フルニ非ザルヤ思考セザルヲ得ズ。而シテ轉多形成ノ多寡ハ實驗口數ノ多少ト必ズシモ平行セズ、寧ロ一次腫瘍ノ育度ト比例セル傾向ヲ觀察サル。尙轉多形成ガ全群ヲ通ジ概シテ子宮並ニ其ノ周圍臓器ニ大ナルハ、移植部位ノ關係ヲ顧慮スルモ注目ニ値スベキカ。

Ⅱ 總括並ニ考按

本實驗ニ於ケル前章所述ノ成績ヲ此處ニ總括記載セバ凡ソ次ノ如シ。

1) 對照群ニ於テハ子宮ハ一般ニ機能低下ノ像ヲ示シ、腫瘍發育ノ旺盛ナルニ應ジテ粘膜層ノ機能低下著シキ傾向アリ。卵巢ハ機能低下ヲ示セルモノ多ク、即チ腫瘍家鬼ニ於テハ概ネ斯ル傾向アル事明カナルモ、其ノ腫瘍發育度トノ關聯ハ必ズシモ明確ナラズ。甲状腺並ニ腦下垂體ハ概シテ機能低下像ヲ示セルモノ多シ。尙本群中1例ノ1側子宮ニ於テ、子宮腔部ニ

近ク腫瘍増殖ヲ呈セルモノニ所謂子宮溜囊腫ヲ認メ、其ノ卵巢及ビ腦下垂體ガ共ニ機能亢進像ヲ呈セルハ注目ニ値スベシ。

2) 低單位おばほるもん注射群ニ於テハ、子宮ハ對照群ニ比シ概シテ機能低下ノ像少ク、其ノ約半數ニ於テハ殆ド正常ノ夫ニ近キカ又ハ寧ろ機能亢進ヲ思ハシムル所見ス。認メラル。腫瘍部ハ壊死ニ乏シク、更ニ腫瘍發育ノ旺盛ナル場合ト雖モ其ノ粘膜炎ノ組織像ニ於テ、對照群ト異リ必シモ機能低下ノ所見ナキハ、卵巢ハるもん注射ノ影響ニ依ル所ノモノ多カルベシト思考ス。卵巢ハ機能低下ヲ示セルモノモアレド概シテ機能亢進ニ傾キタルモノ多シ。腦下垂體及ビ甲状腺ノ機能ニ亦組織的ニ亢進ノ像ヲ呈セルモノ大多數ナリ、尙本群ニ於テモ其ノ中1例ニ兩側子宮ニ於テ溜囊腫ヲ認メタリ。而シテ其ノ卵巢機能ハ低下ノ組織像ヲ示シ、腦下垂體又ビ甲状腺殊ニ後者ニ於テ著明ナル機能亢進ノ像ヲ認ム。但シ本例ハ卵胞ハるもん注射群ナルヲ以テ、卵巢ノ組織像ハ機能低下ヲ示セリト雖モ、個體的ニハ機能亢進ノ状態ニアリシモノト考フベク、即チ檢鏡セシ内分泌臓器ノ全部ニ於テ機能亢進アリタリト思考シ得ベシ。

3) 高單位おばほるもん注射群ニ於テハ、子宮ニ就テ上記各群ト稍趣ヲ異ニシ、一般ニ移植腫瘍ノ發育増殖極メテ旺盛ニシテ、粘膜炎ハ其ノ侵害ヲ被リテ破壊サレ上皮ノ剝離消失ヲ來セルモノ多シ。子宮各層ニ於ケル細血管ノ充盈ハ第2群ニ劣ルモノアリト雖モ、時ニ血管殊ニ靜脈ノ極メテ著明ナル擴張ヲ示シ小囊泡ノ如キ感ヲ抱カシムルモノアリ。卵巢ハ特ニ本群ニ於テノミ肉眼的轉多ヲ認メタルアリ。而シテ其ノ機能ハ概シテ低下ノ像ヲ示セリ。腦下垂體並ニ甲状腺ハ其ノ機能各例ニヨリ一定セザルモ、前者ハ亢進ノ像ヲ示セルモノ多ク後者ハ之ニ反ス。尙本群ニ於テモ亦其中ノ2頭ノ扁側子宮ニ、輕度乍ラ所謂溜囊腫様所見アリタリ。但シ此ノ2例共ニ檢鏡セル範圍ニ於テハ各内分泌臓器ハ著明ナル機能亢進像ヲ示サザルモ、孰レモ高單位卵胞ハるもん注射家兔ナル故、個體的ニハ卵巢機能ノ高度ナル亢進ノ下ニ在リタリト思惟シ得ベシ。

4) 上記各群ニ於テ子宮ニ於ケル一次腫瘍ノ發育度ハ低單位卵胞ハるもん群・對照群・高單位卵胞ハるもん群ノ順ニ昇騰セル傾向アルモ、各群ヲ通ジ其ノ發育度ハ實驗日數ノ多寡トハ必ズシモ平行セザルガ如シ。然ルニ腫瘍轉多度ハ明カニ對照群・低單位群・高單位群ノ順ニ強盛トナリ、且ツ全群ヲ通ジテ一次腫瘍ノ發育度ト轉多形成度ト略比例セル事ガ觀取サル。尙各轉多臓器別ヲ見ルニ各群共ニ巴腺ニ最も高キハ當然首肯サルルモ、子宮並ニ其ノ周圍臓器タル廣韌帶・膀胱・陰等ニ相等高度ニ之ヲ見タルハ、移植ノ部位的關係ヲ顧慮スルモ注目スルニ足ル點ニシテ、又肺・肝ノ如ク比較的遠隔臓器ニ於テ可成リ旺盛ナリシハ興味アル次第ナリ。

以上凡ソ余ノ本回ノ實驗成績ノ總括的記載ヲナセルモ、次ニ從來ノ諸家ニ依ル此方面ニ關

スル業績ヲ斟酌シツツ些カ考案ヲ試ミントス。先ヅ第1=本回ノ余ノ夫ト最モ直接的ナル關聯ノ存スルハ、性ほるもん殊=卵胞ほるもんト腫瘍ノ發育増殖=就テノ研究業績ナルベシ。元來腫瘍ノ發生=ハ、其ノ年齡的素因ノ關與スル事大ナル可キハ諸家=依リ認メラルル所=シテ、例ヘバ肉腫ノ如キハ若年者=癌腫ノ如キハ高年者=發シ易キハ既=成書=モ記載サレ、今更余ノ言=俟ツ迄モナキ所ナリ。而シテ年齡素因ト緊密ナル聯繫ヲ有スル性ほるもんガ、腫瘍ノ發育増殖ト如何ナル關係ノ存スルヤ=就テハ、多數諸家=依リ夙=着目研究サレ其ノ文献ノ如キモ枚舉=遑アラスト云フモ敢テ過言=非ズ。曩=余ハ第2編=於テ、腫瘍ノ發生ト性ほるもん特=卵胞ほるもんトノ關係=就キ、子宮腫瘍ノ實驗的成形ヲ觀察ノ中心點トシテ些カ論述シタルモ、本回ハ本編實驗ト關聯セシメ、可移植性腫瘍ノ發育増殖ト性ほるもん殊=卵胞ほるもんトノ關係=就キ、文献の回顧ヲ試ミ以テ考案ノ資トスベシ。

抑々卵胞ほるもんト腫瘍ノ發育増殖トノ關係=就テハ、或ハ抑制作用アリト云ハレ或ハ促進作用ヲ有スト云ヒ或ハ無影響ヲ唱フルモノアリ。其ノ中抑制的影響ヲ與フトナスモノニ、我國=於テハ姬野⁽⁹⁾、新田⁽¹⁰⁾、角田⁽¹¹⁾、所澤⁽¹²⁾等ノ諸氏アリ。姬野ハ我教室=於テ家兎肉腫ヲ用ヒ卵巢ト腫瘍發育トノ關係=就テ研究シ、ぎなんどーノ注射ハ腫瘍ノ發育増殖ヲ抑制シ、黃體えきす注射ハ導=促進スト述ベタリ。新田ハ *Flexner-Jobling* 系白鼠癌腫及ビ藤繩系白鼠肉腫ヲ用ヒタル實驗=於テ、卵巢ほるもん注射=ヨリ何レモ抑制的影響ヲ受ケ、殊=藤繩系ノ夫=於テヨリ著明ナリシヲ以テ、卵胞ほるもんノ抑制作用ハ腫瘍ノ種類=依リテ異ルベキヲ論ジタリ。角田ハ家兎子宮頸内=加藤系家兎肉腫ヲ移植シ之=ぎなんどーヲ注射シタルニ、腫瘍ノ發育並=轉移ハ抑制サルル事ヲ認メ、又所澤ハ *Bashford* 系廿日鼠腺癌=就テ實驗シ、おばほるもんべんつあートハ去勢幼若動物=於テハ腫瘍發育ヘノ影響著シカラザルモ、成熟雌性廿日鼠=アリテハ著明ナル抑制作用ヲ發揮スト云ヘリ。外國=於テモ *Carranza*⁽¹³⁾ ; *Brüda*⁽¹⁴⁾ 等ノ如ク同似ノ見解ヲ持セルモノアレ共、之=對シ其ノ促進作用ヲ主張スルモノ= *Fornero*⁽¹⁵⁾ ; *Schockaert*⁽¹⁶⁾ ; 矢野⁽¹⁷⁾ 等ヲ算ヘ得ベシ。即チ *Fornero* ハ廿日鼠ノ移植腫瘍=於テ豫メ仔牛ノ濾胞内容物ヲ反覆注射シ置ク時ハ、腫瘍組織ノ發育力及ビ増殖力ハ高揚サレ、腫瘍組織ノ壞死ノ出現等ハ大ニ遲延サルルヲ認メ、尙婦人ノ濾胞内容物ハヨリ以上強力=作用スト述ベタリ。又 *Schockaert* ハ廿日鼠ノ可移植性腺癌=就テ研究シ、*Follikulin* ヲ以テ處置スル時ハ其ノ發育ヲ著明ニ促進セシメ、又其ノ移植率ヲ著シク良好ナラシムル事ヲ認メ、斯ル事實ヨリシテ癌腫患者ハ其ノ再發防止ノ意味=於テ去勢セラルベク、又卵胞ほるもんヲ以テ癌腫患者ヲ處置スベカラザル事=迄言及セリ。矢野ハ本田系白鼠肉腫ノ發育ガ、卵巢内分泌タルベキ濾胞黃體及ビ間質物質ノ各々ノ處置=ヨリ、如何ナル影響ヲ受クルヤノ實驗ヲ試ミ、其ノ中濾胞製劑トシテハ市販ノぎなんどー・おばほるもん・べら

にん及び自製ノ濾胞えきすヲ用ヒテ検索ニ努メ、卵巢濾胞内分泌ハ該腫瘍ノ發育ニ促進の影響アリト主張セリ。更ニ以上卵胞ほるもんノ抑制作用若クハ促進作用ヲ唱フル諸家ノ間ニ伍シテ、其ノ無影響ナルヲ論ジタルモノ亦尠シトセズ。我國ニ於テハ佐藤⁽¹⁸⁾ノ如キハ之ニ屬シ、外國ニ在リテハ *Bischoff a. Maxwell*⁽¹⁹⁾⁽²⁰⁾ ; *Gross u. Wajda*⁽²¹⁾ ; *Harde et Henri*⁽²²⁾ ; *Molnar*⁽²³⁾ ; *Foder, Gedeon u. Kunos*⁽²⁴⁾ ; *Sugiura a. Benedict*⁽²⁵⁾ ; *Gilmour*⁽²⁶⁾ 等極メテ多數アリ。佐藤ハ *Bashford* 系廿日鼠癌ニ就テべらにんノ連續注射ハ成熟動物ニ於テ、腫瘍ノ發育増殖ニ著シキ影響ヲ及サズト爲シ、其他ノ諸家モ夫々各種卵胞ほるもんノ適用ガ腫瘍ニ無影響ナル事ヲ述ベタルモノナリ。

以上卵胞ほるもんノ腫瘍ニ對スル影響トシテ、多數研究者ガ各種各様ノ見解ヲ發表セル事ニ就キ述ベタルモ、此ノ卵胞ほるもんニ就テ腫瘍ノ人工的形或實驗トモ關聯シテ夥シキ探究ガ行ハレタル事ハ勿論ニシテ、先ニ余ガ第2編ニ於テ言及セル如ク本ほるもんトてーる中ノ癌原性物質トノ物理化學的性質ノ近似等ノ點ヨリ、特ニ精細ナル研究ガ遂行サレ本ほるもんノミニヨル癌腫發生實驗ガ企圖サレ、1部其ノ成功ヲ報ゼラレタルモノアリ。斯ノ如ク卵胞ほるもんノ腫瘍ニ對スル關係ハ極メテ緊密且ツ樞要ナルモノアルニモ拘ラズ、未ダ劃一的知見ニ達シ居ラザルハ甚ダ遺憾トスル所ナリ。次ニ同ジク卵巢ほるもん中ノ一タル黃體ほるもんニ就テモ、卵胞ほるもんト同様ノ關係ガ認メラルモノニシテ、即テ或ハ抑制(矢野⁽¹⁷⁾)或ハ促進(姫野；新田⁽²⁷⁾)或ハ無影響(*Flaks*⁽²⁸⁾ ; *Bischoff a. Maxwell* ; *Foder, Gedeon u. Kunos*)等ノ諸說混在シ、更ニ又去勢ニ於テモ夫々抑制(本田⁽²⁹⁾ ; 國井⁽³⁰⁾ ; 室原・姫野⁽³¹⁾ ; 中川⁽³²⁾ ; 新田⁽³³⁾ ; 佐藤 ; 所澤 ; *Joannovics*⁽³⁴⁾ ; *Murphy a. Strum*⁽³⁵⁾ ; *Strong*⁽³⁶⁾ ; *Fichera*⁽³⁷⁾)促進(淺田⁽³⁸⁾ ; 矢野⁽³⁹⁾ ; 鄭⁽⁴⁰⁾ ; *Korentschewsky*⁽⁴¹⁾ ; *Wagner*⁽⁴²⁾ ; *Baatz*⁽⁴³⁾)無影響(*Graf*⁽⁴⁴⁾ ; *Goldzieher u. Rosenthal*⁽⁴⁵⁾ ; *Pribram*⁽⁴⁶⁾)等ノ諸說アリテ、其ノ何レニ左祖スベキヤ甚ダ釋然タラザルモノト云ハザルヲ得ズ。

事情以上ノ如キガ故ニ、余ハ今回ノ實驗ニ於テ索リ得タル所見ヲ基礎トシテ、此處ニ些カ余ノ考按ヲ述ベント欲ス。先ツ腫瘍ノ發育ハ余ノ場合低單位群ニ最モ劣リ、對照群ハ其ノ中間ニ位シ、高單位群ニ於テ最モ優レタル所ノモノアリタリ。由是觀之、卵胞ほるもんハ低單位群ニ於テハ抑制的ニ高單位群ニ於テハ促進的ニ働キタルモノト云フヲ得ベケンモ、腫瘍移植部位ガ其ノ計測ニ困難ナリシ子宮タリシヲ以テ、無影響トハ斷ジ難キモ果シテ抑制促進其ノ孰レニ與スベキヤ一概ニ斷定シ難キヲ遺憾トス。事實余ト同ジク家兎肉腫ヲ以テ實驗シタル普通背部皮下移植實驗ニ於テスラ、其ノ見解ノ必シモ一致ヒザルヲ思ヘバ(姫野 ; 室原・姫野 ; 鄭等)或ハ當然ノ事ナランカ。遮莫余ハ斯ル卵胞ほるもんノ腫瘍發育ニ對スル作用以外ニ、從來ノ諸家ニ依リテ敢テ觸レラレザリシ興味アル1ノ事實ヲ此處ニ提示セントス。ソハ

余ノ今回ノ實驗ガ特ニ子宮ニ就テ試ラレ且ツ性ハるもんヲ複合シテナサレタル事ニ大ニ關係ス。即チ斯ル子宮腫瘍ヲ基礎トシテ發現シ來レル子宮囊腫乃至囊腫様變化ニ就テノ知見ナリ。先ニ實驗成績ノ項ニ於テ記セシ如ク、子宮壁内腫瘍移植ノ結果其處ニ囊胞乃至囊腫様變化ヲ認メタルモノ各群夫々1~2例宛ヲ數ヘタリ。今其ノ組織發生ニ關スル事項ヲ檢討スルニ、今回ノ實驗ニ於テハ凡ソ次ノ如キ3種ノ場合アリ。(1)ハ腫瘍増殖ノ爲子宮腔ノ1部閉鎖ヲ來シ、其ノ上位ニ於テ溜囊腫ヲ形成セルモノニシテ最モ普通ニ見ラレシ所ノモノナリ。(2)ハ腫瘍ノ自潰ニ依リ組織間隙ヲ生ジ、其處ニ囊胞乃至囊腫様變化ヲ認メタルモノ、(3)ハ腫瘍附近ニ於ケル淋巴管乃至血管ノ著シキ内腔ノ開大ニヨリ、同似ノ變化ヲ來セルモノニシテ、後2者ハ總テ檢鏡ノニミ認メラレ、第1ノ場合ノ如ク肉眼ノニ認メ得ル程ノ大サニハ到達セザリシモノノミナリキ。サレド此處ニ特ニ述ベ置カントスルハ、之等ノ場合ニ於テ囊胞乃至囊腫様變化ノ組織的所見ニ於テ、眞性囊腫トハ著シク其ノ趣ヲ異ニセル點ナリ。即チ其ノ囊胞乃至囊腫様變化ノ未ダ著シク小ナル時ニ於テ、既ニ其ノ囊胞壁ニ稍著明ナル炎症性變化ヲ認メ、殊ニ其ノ粘膜上皮ハ殆ド全ク破壊セラレ且ツ剝離消失セルモノ多キナリ。抑々腫瘍學上囊腫ナルモノハ、其ノ内腔ヲ圍ム上皮組織ト更ニ其ノ外圍ニ存スル結締組織成分トガ兩々相伴ヒテ伸展發育シ、時ニハ上皮ノ乳嘴様増殖スヲ認ムルヲ以テ其ノ本質トスルモノナリ。此ノ定義ヲ以テセバ、余ノ今回ノ腫瘍移植ノ結果生ジタル子宮囊腫ハ決シテ眞正囊腫ニ非ズシテ假性囊腫ナリト云ハザル可ラズ。然レ共余ハ此ノ點ニ於テ寧ロ大ナル興味ヲ覺ユルナリ。其ノ故如何トナレバ、曩ニ余ガ第1編ニ於テ詳論セシ如ク、子宮囊腫發生ノ病理トシテ論議セラルルモノノ中ニ腫瘍殊ニ筋腫ノ自潰ニ由ルモノヲ舉ゲラルルモ、コハ勿論假性囊腫ニシテ、余ノ今回腫瘍移植ニ依ル實驗ノ子宮囊腫ガ恰モ之ニ髣髴タルモノアルヲ以テナリ。元ヨリ彼ハ腫瘍中心部ノ自潰ニ依ル囊腫デアリ、我ハ腫瘍ノ管腔閉鎖ニ基ク溜囊腫ニシテ、其ノ發生ノ態様必ズシモ同一ナラザルハ勿論ナラ、共ニ腫瘍ヲ其ノ原因トシ、結果ニ於テ齊シク假性囊腫タル點ニ於テ甚ダ示唆ニ富メルモノアリト思考スル次第ナリ。

思フニ上記ノ如キ腫瘍ヲ基礎トスル實驗ノ子宮囊腫ノ發生ハ、其ノ組織發生ガ上來述ベタル如クモノナル以上、腫瘍發育ノ旺盛ナルモノニ於テヨリ多ク認メラルベキハ些ノ議論ヲ要セザルベシ。サレド余ガ今回施行シタル範圍ニ於テハ、卵胞ハるもん注射ハ敢テ其ノ子宮ニ於ケル一次腫瘍ノ發育増殖ニハ確定的影響ヲ與ヘザル結果トナレルモ、其ノ腫瘍轉移ニ關シテハ既述ノ如ク相等明瞭ナル差異アリテ、卵胞ハるもん注射ハ明カニ之ヲ増強セシムルガ如シ。腫瘍ノ轉移ニ就テハ實驗的研究ハ其ノ數寡少ナラズ、種々興味アルモノアリ！雖モ、之ヲ性ハるもん特ニ卵胞ハるもんトノ關係ニ於テ考察シタル業績ハ甚ダ尠シ。鄭⁽⁴⁰⁾ハ卵巢去勢ノ加藤系家兔肉腫ニ及ボス影響ヲ實驗的ニ研究シ、臟器轉移形成ヲ増大セシムル事ヲ認

メタルモ、角田⁽⁴⁷⁾ハ之ニ反シ同ジク加藤系家兎肉腫ヲ以テスル實驗ニ於テ、移植前85日ニ卵巣ヲ完全ニ剔出スル時ハ、子宮内移植肉腫ノ發育並ニ其ノ轉移ガ稍強ク抑壓サルヲ見、更ニ卵胞ほるもん皮下注射ニ依リテモ同様ノ現象アル事ヲ述ベタリ。Baatz⁽⁴⁸⁾ハ雌性成熟廿日鼠ニ就キ兩側卵巣剔出後 Ehrlich 腺癌ヲ移植セシ場合、卵巣剔出後腫瘍移植迄ノ期間ヲ夫々8日、14日、30日及ビ90日トシタル場合、移植後7日及ビ16日目ニ去勢スル場合、癌腫ノ自然發生群ヲ去勢シタル場合ノ各々ニ於テ、孰レモ轉移形成率ハ對照ノ著差ヲ認メズト報ジタリ。余ノ場合ニ於テハ角田ノ成績トハ全ク反對ニシテ、卵胞ほるもんハ其ノ轉移形成ヲ旺盛ナラシムルモノナル事上述ノ如シ。事實余ノ詳細ナル病理組織學的檢索ニ依レバ、卵胞ほるもん注射ノ場合子宮壁血管ノ著シク充盈ノ狀態ニアルモノ多ク、更ニスル血管内ニ於テ腫瘍形成ノ營マレツツアルモノスラ認メタルモノニシテ、該ほるもん注射ノ場合轉移形成ノ多カル可キハ、少ク共子宮腫瘍ヲ第1次瘻トスル場合ハ、理論的ニモ充分首肯シ得ベキモノナルヲ信ズ。斯テ卵胞ほるもん注射ガ、假令一次腫瘍ノ發育増殖ヲ著明ニ促進セザル迄モ、夫ノ轉移形成ヲ強盛ナラシムベキ事ハ肯定サル所ニシテ、從テ該ほるもんハ斯ル意味ニ於テ亦子宮囊腫ノ形成ヲ助長セシムル事アルベキナリ。

諸余ハ茲ニ於テ性ほるもんト特ニ緊密ナル關係アルベク首肯サルル腦下垂體及ビ甲状腺ニ就キ若干ノ考察ヲ遂ゲ置カントス。蓋シ余ハ斯ル意圖ヲ以テ本實驗ハ勿論囊ノ第2編ニ於テ述ベタル夫ニ於テモ、特ニ各例家兎ノ腦下垂體及ビ甲状腺ノ病理組織學的檢索ヲ試ミタルヲ以テ、夫等所見ト對比考察シツツ諸家業績ヲ検討シ行クベシ。

抑々内分泌腺ノ相互關係ハ極メテ複雑多岐ナルモノニシテ、簡單ニ促進又ハ抑制的影響ヲ確定シ能ハザルハ云フ迄モナク、内分泌腺相互關係ノ模型圖トシテ何レノ内分泌學書ニモ記載サレアル Falta 及ビ Aschner ニ依テ提示サレタルモノニ就テ觀ルニ、卵巣ハ甲状腺及ビ腦下垂體(前葉)ト拮抗的ナルガ如ク論ゼラレ居レドモ、コハ單ニ之等内分泌腺ガ糖代謝ニ及ボス影響ヲ顧慮シテ作製サレタルモノニシテ、之ノミヲ以テ他ノ場合ヲ律スル能ハザルハ勿論ナリ。囊ニ余ハ本回並ニ前第2編ノ實驗ニ於テ、卵胞ほるもんノ注射ヲ以テ卵巣機能亢進ト見做シテ論述シ來リタルモ、斯ル場合ニ於テモ其ノ個々ノ卵巣所見ハ決シテ機能亢進像ノミトハ認メ難ク、寧ろ逆ニ機能低下ノ病像ヲ示セシモノ乏シカラザリキ。勿論卵胞ほるもん注射ガ施行サレ居ル以上、個體的ニハ卵巣機能亢進ト見做スベキモノナラ、斯ノ如キ場合其ノ組織像ニ於テ機能低下ノ所見ヲ呈スルコトアルハ Grumbrecht⁽⁴⁹⁾ ; Hauptstein⁽⁵⁰⁾ ; Loquér-Ernst, Eva Borchardt, u. de Fongh⁽⁵⁰⁾ ; Biale-Laprida, Zulema⁽⁵¹⁾ ; Halpern, d'Amour⁽⁵²⁾ ; Zondek⁽⁵³⁾ ; 井倉⁽⁵⁴⁾ ; 金本・宮田⁽⁵⁵⁾等ノ諸家ニ依リテ既ニ論ゼラレタル所ニシテ、斯ノ如キハ孰レノ内分泌臟器ニモ略共通の現象ナリ。サレバ余ノ場合ニ於テモ腦下垂體及ビ甲状腺

腺ノ組織像ヲ以テ、直チニ其ノ機能ヲ判定スルハ必ズシモ容易ナラザルハ勿論ナリ。但シ夫ノ大體ノ傾向トシテハ、腦下垂體ニ於テハ細胞成分ニ富ミ嗜色素細胞ノ増加ヲ認ムルモノ多ク、概シテ機能亢進ノ狀ニ在ルヲ思ハシメラレ、之ニ反シ甲状腺ハ膠様質ニ富ミ上皮扁平ナルモノ多ク、寧ロ機能低下ノ像多キヲ思ハシメラレタリ。元來卵巢機能ト是者兩内分泌臓器トハ上記 Falta 及ビ Aschner ノ論ゼシ如ク、其ノ拮抗的ナルヲ主張スルモノモ少カラザレ共(Reiss u. Pereny⁽⁵⁶⁾; Bialek, Laprida, Zulema; Heyl, Jongh, Kooy⁽⁵⁷⁾; 角田⁽⁵⁸⁾; 大西⁽⁵⁹⁾; 山尾⁽⁶⁰⁾; 爲我井・吉原⁽⁶¹⁾等)又其ノ然ラザルヲ説クモノモナシトセズ(Candela, Nicolo⁽⁶²⁾; Zain⁽⁶³⁾; Clauberg u. Brepohl⁽⁶⁴⁾; Siegert⁽⁶⁵⁾; Wichester⁽⁶⁶⁾; Weil u. Zondek⁽⁶⁷⁾; 井倉; 小林⁽⁶⁸⁾; 井藤⁽⁶⁹⁾等)。余ノ場合卵胞はるもんノ注射ニ依リ腦下垂體ハ機能亢進像ヲ示シ、甲状腺ハ之ニ反スル所見アリタルガ、斯ノ如キハ上記諸家ノ所説ト或ハ相一致シ或ハ相反シ甚ダ複雑ナルモノアレ共、余ノ實驗ハ更ニ腫瘍移植乃至其ノ發生的刺激ヲ之ニ加味シ居レルヲ以テ、夫等ノ影響ヲモ考慮セザル可カラザルモノニシテ更ニ一層複雑ナルヲ免レズ。事實余ノ實驗ニ於ケル卵胞はるもん非注射群タル對照家兎ニ於テハ、其ノ多クノ場合ニ於テ各内分泌腺ノ組織像ハ機能低下傾向ヲ示シタリ。而シテ斯ル所見ガ卵胞はるもんノ連續乃至間歇注射ニ依リ上記ノ如キ變化ヲ示セシモノニシテ、概シテ機能低下像ヲ現ハス事多カリシ甲状腺ニ於テスラ、或場合ニハ極メテ著明ナル機能亢進像ヲ呈セルモノアリタリ。茲ニ於テ余ハ言ハント欲ス、余ノ本編並ニ前第2編ノ實驗ニ於テ子宮囊腫ノ形成サルルハ、兎ニ角卵胞はるもんノ連續乃至間歇長期注射ニ依リ卵巢機能亢進ガ、其ノ主役ヲ演ズ可キモノタルハ勿論ナラ、時ニ腦下垂體ノ時ニ甲状腺ノ機能亢進ガアリテ、其ノ主因タラズトスルモ補助的要約タル事アルベシト。サレバ余ハ第1編ニ於テ人體ニ於ケル自然發生子宮囊腫ノ卵巢所見ニ就キ、大卵胞ノ數個ノ出現・黄体ノ缺如等ノ所見ヨリ、斯ル意味ニ於ケル卵巢ノ機能亢進ガ、子宮囊腫形成ノ要因タルベキヲ論定シタルモ、或場合ニハ性成熟・月經・妊娠・分娩等ノ女性ニ於ケル諸性的現象ト、密接ナル關聯ヲ有スル腦下垂體・甲状腺等ノ機能異常殊ニ其ノ亢進ガ、之ニ關與スル事アル可キハ又首肯シ得ベキモノナリト考ヘザルヲ得ズ。事實卵巢機能異常ニ依リ腫瘍發生乃至發育促進作用ガ、卵巢其ノモノヨリ寧ロ腦下垂體等他内分泌臓器ノ機能異常ヲ介シテ行ハルト論ジタル研究者モ亦乏シカラズ(Migliavacca⁽⁷⁰⁾; Mohs⁽⁷¹⁾; 所澤; 秦⁽⁷²⁾等)。此ノ意味ニ於テ余ノ上述ノ如キ考按モ亦許容サルルモノナルベキヲ信ズ。

Ⅲ 結 論

1) 家兎子宮壁ニ加藤系家兎肉腫ヲ移植シ、之ニ卵胞はるもんノ注射ヲ施行スル時、當該移植個所ニ於ケル第一次腫瘍ノ發育増殖ハ、或ハ抑制サレ或ハ促進サレ影響明カナラザルモ、腫瘍轉移竈ハ明瞭ニはるもん注射群特ニ其ノ高單位群ニ於テ旺盛ナルヲ認ム。而シテ斯ノ

キハ特ニ其ノ轉移竈ガ該ハるもん注射ニ由リ、子宮壁ニ於ケル血管ノ怒張著シク、血行旺盛ナル事ニ其ノ多クノ因由ヲ存スルモノナルベシト思考ス。

2) 上記ノ如キ子宮壁腫瘍移植ニ依リ其ノ内腔閉鎖ノ爲、溜囊腫ヲ形成セルモノ4例ヲ算シタリ。斯ノ如キハ人類ニ於ケル筋腫ノ自潰ニヨル囊腫形成ヲ模センガ爲ニ試ミタル本回ノ實驗ニ徴スレバ、稍其ノ組織發生ノ態様ニ於テ異レルモノアリト雖モ、上記ノ溜囊腫ハ前回第2編ノ夫ト全ク異リ、其ノ粘膜層ニ強キ炎症性浸潤アリテ上皮全ク剝脱シ、所謂假性囊腫ノ夫ナリシ點ニ於テ、人類子宮ノ筋腫ヲ基トシテ發來セル囊腫ト組織的ニ極メテヨク類似シ此點甚ダ興味深ク感ズル次第ナリ。而シテ斯ノ如キハ前回第2編ノ夫ノ如ク、てーる・しやーるらつは赤・ばらふいん棒ノ如キ上皮増殖の刺戟ヲ與ヘザリシニ依ルモノナルベク、同ジク子宮囊腫ノ實驗的形成ト云フモ、斯ル差異ヲ生ズルハ甚ダ注目スベキ點ナリ。

3) 各實驗家兎ノ卵巢ハ組織的ニ機能低下像ヲ示セルモノ多シ。コハ腫瘍其モノノ影響アルハ勿論ナルベキモ、卵胞ハるもんノ連續注射ガ施行サレ居ル以上、個體的ニハ卵巢ノ機能亢進ノ條件下ニ置カレツツアルモノト思考スベク、斯ノ如キガ子宮囊腫形成ノ要約タルベキハ考察シ得ベキ所ナリ。更ニ腦下垂體及ビ甲状腺腫瘍移植ニ依リ機能低下ニ傾カシメラルモ、卵胞ハるもんノ注射複合ニ依リ著シキ機能亢進像ヲ示ス事ヨリ、ステ卵巢以外ニ是等内分泌腺ノ機能異常殊ニ其ノ機能亢進ガ、又子宮囊腫形成ニ關與スル事アルベキハ想察サル所ナリ。

脱稿ニ臨ミテ絶エズ懇篤ナル指導並ニ鞭撻ヲ賜リ、且拙稿校閲ノ勞ヲ辱クシタル恩師鈴江教授並ニ池上教授ニ衷心ヨリ感謝ノ意ヲ捧グ。尙本研究ニ當リテ其ノ資ヲ文部省交付ノ科學研究費ニ仰グモノ多カリシヲ併記シテ謝意ヲ表ス。

主 要 文 献

- 1) 森：日病理會誌，25卷，2頁，昭和10年。
- 2) Cook, J. W. a. E. C. Dodd : Nature, Vol. 131, P. 205, 1933.
- 3) Dodd, E. C. : Lancet, Vol. 235, P. 205, 1938.
- 4) Kenraway, E. L. : J. Path. a. Bacter., Vol. 27, P. 233, 1924. Biochem. J., Vol. 24, P. 497, 1930.
- 5) Lacassagne, A. : C. r. Acad. Sci. Paris, Tom. 195, P. 630, 1933. Ref. Zbl. Path., Bd. 60, S. 214, 1934.
- 6) Cramer, W. a. E. S, Horning : Lancet, Vol. 230, P. 247, 1936.
- 7) Piersón, H. : Z. Krebsforsch., Bd. 41, S. 103, 1934.
- 8) Derselbe : Z. Krebsforsch., Bd. 46, S. 106, 1937.
- 9) 姫野：癌，24卷，446頁，昭和5年。
- 10) 新田：近畿婦誌，18卷，1665頁，昭和10年。
- 11) 角田：日婦會誌，35卷，146頁，昭和15年。
- 12) 所澤：日内會誌，27卷，1077頁，昭和15年。
- 13) Carranza, F. : Ref. Z. Krebsforsch., Bd. 31, S. 34, 1930.
- 14) Brüda, B. E. : Klin. Wschr., Jg. 10, S. 1543, 1931.
- 15) Fornero, A. : Ref. Z. Krebsforsch. Bd. 26, 79, 1928.
- 16) Schockaert, J. A. : Ref. Z. Krebsforsch., Bd. 44, S. 144, 1935.
- 17) 矢野：皮膚紀

- 要, 23卷, 95頁, 昭和9年. 18) 佐藤 : 産婦紀要, 21卷, 1682頁, 昭和13年. 19) Bischoff, F. a. L. C. : Maxwell : J. Pharmacol., Vol. 40, P. 97, 1930. 20) Désolbe, : Amer. J. Cancer, Vol. 27, P. 87, 1936. 21) Gross, L. u. S. Wajda : Z. Krebsforsch., Bd. 37, S. 416, 1932. 22) Hard, E. et P. Henri : C. r. Soc. Biol., Tom. 100, P. 542, 1929. 23) Molnar, K. : Z. Krebsforsch., Bd. 38, S. 188, 1933. 24) Feder, E., E. Gedeon u. St. Kunos : Z. Krebsforsch., Bd. 38, S. 1, 1933. 25) Sughura, K. a. S. R. Benedict : J. Cancer Res., Vol. 13, P. 180, 1929. 26) Gilmour, M. D. : J. Path. & Bact., Vol. 45, P. 179, 1937. 27) 新田 : 近畿婦誌, 19卷, 797頁, 昭和11年. 28) Flaks, J. : Z. Krebsforsch., Bd. 30, S. 145, 1920. 29) 本田 : 日病理會誌, 12卷, 576頁, 大正11年. 30) 國井 : 治療及處方, 56號, 1620頁, 大正13年. 31) 壹原・姫野 : 腫瘍と内分泌, 上卷, 昭和6年. 32) 中川 : 病理紀要, 8卷, 381頁, 昭和7年. 33) 新田 : 近畿婦誌, 18卷, 1094頁, 昭和10年. 34) Joannovics, G. : Ziegler's Beitr., Bd. 62, S. 194, 1916. 35) Murphy, P. a. E. Strum : J. exper. Med., Vol. 42, P. 155, 1925. 36) Strong, L. C. : J. exper. Med., Vol. 39, P. 447, 1924. 37) Flehera, G. : Z. Krebsforsch., Bd. 14, S. 566, 1914. 38) 淺田 : 癌, 16年, 266頁, 昭和8年. 39) 天野 : 皮膚紀要, 22卷, 405頁, 昭和8年. 40) 鄭 : 朝鮮醫會誌, 32卷, 205頁, 昭和17年. 41) Korotšchewsky, W. G. : Z. exper. Path. u. Ther., Bd. 16, S. 69, 1914. 42) Wagner, A. : Ref. Z. Krebsforsch., Bd. 38, S. 55, 1933. 43) Baatz, H. : Zbl. Gynäk., Jg. 65, S. 472, 1941. 44) Graf, R. : Zbl. Path., Bd. 20, S. 783, 1909. 45) Goldzieher, M. u. E. Rosenthal : Z. Krebsforsch., Bd. 13, S. 321, 1913. 46) Pribram, E. : Z. Krebsforsch., Bd. 34, S. 545, 1931. 47) 角田 : 日婦會誌, 35卷, 201頁, 昭和15年. 48) Grumbrecht, P. : Arch. Gynäk., Bd. 170, S. 1, 1940. 49) Hauptstein, P. : Endokrinol., Bd. 8, S. 169, 1931. 50) Laquer-Ernest, Eva Borchardt, u. de Jongh : Zit. n. Matsūura (滿洲醫誌, 28卷, 79頁, 昭和13年. 51) Bialek-Laprida, Zulema : Ref. Ber. Gynäk., Bd. 26, S. 452, 1934. 52) Halpern S. R., a. F. E. d' Amour : Ber. Physiol. usw., Bd. 86, S. 153, 1935. 53) Zondek, B. : J. amer. med. Assoc., Vol. 114, P. 1850, 1940. 54) 井倉 : 日内分泌誌, 3卷, 1243頁, 昭和2年. 55) 金本・宮田 : 朝鮮醫會誌, 32卷, 341頁, 昭和17年. 56) Reiss, M. u. S. Peřény : Endokrinol., Bd. 2, S. 181, 1928. 57) Heyl, J. G., S. E. de Jongh, u. R. Kooy : Ref. Ber. Gynäk., Bd. 28, S. 469, 1935. 58) 角田 : 日病理會誌, 24卷, 405頁, 昭和9年. 59) 大西 : 日内分泌誌, 7卷, 842頁, 昭和6年. 60) 山尾 : 日内分泌誌, 15卷, 286頁, 昭和14年. 61) 爲我井・吉原 : 第37回日婦目錄, 25頁, 昭和14年. 62) Candela, Nicoló : Arch. Ostetr., 37, 97, 1930. Ref. Ber. Gynäk., Bd. 18, S. 103, 1930. 63) Zain, H. : Klin. Wschr., Jg. 16, S. 1351, 1937. 64) Clauberg, C. u. W. Breipohl : Klin. Wschr., Jg. 14, S. 119, 1935. 65) Siegert, F. : Zbl. Gynäk., Bd. 63, S. 1938, 1939. 66) Wichester, C. E. : Endocrinol., Vol. 24, P. 697, 1939. 67) Weil, W. a. Zondek, B. : Endocrinol. Vol. 25, P. 114, 1939. 68) 小林 : 東京醫誌, 3124號, 579頁, 昭和14年. 69) 井藤 : 日婦會誌, 32卷, 1417頁, 昭和12年. 70) Migliavacca, A. : Ref. Zbl. Path., Bd. 68, S. 188, 1937. 71) Mehs, F. L. : Amer. J. Cancer, Vol. 38, S. 212, 1940. 72) 壽 : 日婦會誌, 35

卷, 962頁, 昭和15年,

附 圖 說 明

第1圖: 肉腫移植家兎子宮肉眼標本. 第2第4號ハ對照群, 第9號ハ低單位おばはるもん注射群, 第14第15號ハ高單位おばはるもん注射群ニ屬ス. 上記ノ中第2號以外ハ總テ腫瘍發育ノ爲, 所謂子宮溜囊腫ヲ形成シ居タルモノニシテ, 本圖ニ於テモ略其ノ子宮腔擴張ノ狀ヲ窺ヒ得ベシ.

第2圖: 家兎子宮壁顯微鏡標本. 弱擴大. 普通染色. 本例ハ第1圖ニ示セル第14號家兎子宮囊腫壁ノ1部ニシテ, 極メテ著明ナル細血管ノ充盈ト, 粘膜面腺樣構造ノ喪失ヲ示ス. 即チ腫瘍發育ノ爲形成サルル所謂溜囊腫ハ, 竝ニ余ガ第2編ニ於テ述ベタル子宮囊腫ノ組織的造像ト異ル事, 恰モ人類ニ於ケル眞性子宮囊腫ト腫瘍自潰ニヨル囊腫形成トノ間ニ於ケル差異ニ髣髴タルモノアルナリ.

第3圖: 家兎子宮溜囊腫壁顯微鏡標本. 弱擴大. 普通標本. 本例ハ第1圖ニ示セル家兎第15號子宮壁ノ組織標本ニシテ, 前第14號ノ夫ト類似セル所見アルヲ見ルベシ. 但シ本例ニ於テハ細血管ノ充盈稍弱キモ, 筋層ニ近キモノニ於テハ內腔ノ極メテ強ク擴張セルモノアリ.

第4圖: 家兎卵巢顯微鏡標本. 弱擴大. 普通染色. 本例ハ第3圖ニ示セル家兎第15號ノ卵巢ニシテ, 稍大ナル肉腫ノ轉移竈存シ, 原始卵胞少ク濾胞ノ發育極メテ不其ニシテ, 退縮ニ陥レルモノ數個ヲ認ムルノミ. サレド本例ハ高單位卵胞はるもん注射群ニ屬シ, 斯ル卵巢ノ組織的變化ハアレドモ, 常住ノ Follikulinämieヲ存セシモノト見做シ得可ク, 即チ斯ノ如キガ腫瘍ノ發育増殖ヲ促進シ, 囊腫形成ニ與リテ力アリシモノト云フ可キナリ.

武岡論文附圖

第 1 圖

第 2 圖

第 3 圖

第 4 圖