結核菌青山B株と *Corynebacterium equi* Ko-85 株との間の免疫学的交差反応性について

山本 恵申 林 譲 芳賀 邦夫

名古屋保健衛生大学 衛生学部 免疫学教室

豊明市荻掛町田楽ヶ窪 1-98 〒470-11

〔受付：6月11日，1979年〕

結核菌青山B株と非病原性好気性の *Corynebacterium equi* Ko-85 株との間の共通抗原性について、旧ツベルクリンより抽出した粗タンパク分画 TA₂ と PPD および *C. equi* Ko-85 株より抽出した粗タンパク分画 CP を用いて、血清反応、ゲル内沈降反応、皮内反応により両抗原の間の交差反応を検討して次の結果を得た。

1) 結核菌青山B株加熱死菌免疫ウサギ抗血清と *C. equi* Ko-85 株乾燥死菌免疫ウサギ抗血清をもちいて上記抗原による交差試験を行い、陽性の成績を得た。

2) 両免疫血清を用いて TA₂ および CP タンパク抗原感作赤血球による吸収試験を行った結果、抗体価の減少が見られた。

3) ゲル内沈降反応(Ouchterlony 法)では、両免疫血清と TA₂ および CP タンパク抗原との間に融合する沈降線が認められた。

4) 結核菌青山B株加熱死菌免疫モルモットと *C. equi* Ko-85 株乾燥死菌免疫モルモットでの PPD、および CP タンパク抗原を用いて皮内反応交差試験を行った結果、陽性の成績を得た。以上の結果から、結核菌青山B株と *C. equi* Ko-85 株の間には共通抗原性のあることが認められた。

Cummins²⁾ は *Corynebacterium* と *Mycobacterium* および *Nocardia* 間の cell wall の化学的構成を比較したところ、その主要構成糖として、いずれもアラビノースおよびガラクトースを共通にもっており、また cell wall を抗原とした凝集反応によつて、それらの抗原構造を比較したところ、*Corynebacterium* の一部および cell wall の構成を異にする *Nocardia pelletier* 513, *Nocardia pelletier* 514, *Nocardia pelletier* 778, の3株を除いて上記菌種間に共通抗原のあることを見出した。小林⁷⁾ は結核患者血清、結核死菌免疫ウサギ抗血清およびジフテリア死菌免疫ウサギ抗血清に対して、ツベルクリン多糖体とジフテリア菌体分画を血球感作抗原として、感作赤血球凝集反応と、溶血反応による交差反応および吸収試験を行い、結核菌(青山B株)とジフテリア菌(PW 8株)との間に共通抗原性の存在することを報告している、又近年山村らは *Mycobacterium* と分類上類縁関係にある *Nocardia*, *Corynebacterium* 菌体から精製したCWS(Cell-Wall Skelton)画分は、BCG-CWS

と同様の生物学的活性のあることを報告している^{1,4,5,6)}。

著者らは非病原性好気性 *Corynebacterium equi* Ko-85 株を用い、結核菌青山B株との間に共通抗原性の有無を旧ツベルクリンより抽出したタンパク分画の TA₂ と *Corynebacterium equi* Ko-85 株から抽出したタンパク分画 CP を用いて、感作赤血球凝集反応、溶血反応での交差試験において陽性反応を認めた。また結核菌青山B株と *C. equi* Ko-85株を用いて結核菌青山B株免疫ウサギ抗血清および *C. equi* Ko-85 株免疫ウサギ抗血清を吸収したところ吸収可能であることを認めた。ゲル内沈降反応では、TA₂, CP の両抗原間に融合する沈降線を認め、また PPD, CP を用いての皮内反応においても共通抗原性を示す反応が現われたので報告する。

材料および方法

1) 実験動物：健康な体重 3.0~4.5kg の雄ウサギおよび体重 250~300g の純白雄モルモット(いずれも PPD

0.4 μ g/0.1 ml による皮内反応と Middlebrook and Dubos の赤血球凝集反応, 溶血反応, 5 倍以下を示したものを抗血清作製と皮内反応に使用した, モルモットは使用に際して背部の毛を脱毛剤にて脱毛して使用した。

2) 抗血清および免疫方法

i) ウサギの結核菌免疫抗原の作製方法: 結核菌青山 B 株加熱 (100 C, 30 分) 死菌 (以下結核菌と略記する) 10mg に対し 0.5% 石炭酸加生理食塩水 0.5ml で浮遊液とし, 等量の Freund's incomplete adjuvant (FIA) を加えエマルジョンとした。

ii) ウサギの *Corynebacterium equi* Ko-85 株免疫抗原の作製方法: 東京大学医科学研究所, 微生物保存施設より分与された *Corynebacterium equi* Ko-85 株を普通ブイオン培地を用いてタンク培養してえられた菌体をアセトンにて脱水処理し乾燥菌体 (以下コリネ菌と略記する) を結核菌と同量の菌体 10mg を使用し, 同様の方法で作製した。

iii) ウサギの免疫方法: 上記の方法で作製した免疫抗原をウサギの両足蹠に全量 1ml 注射し, 10 週間後再び同量の菌体生食浮遊液 1ml を左右の大腿部の筋肉内に注射し, 1 週間後に全採血を行い, 血清を分離し, 結核菌免疫ウサギ抗血清およびコリネ菌免疫ウサギ抗血清を得た。

iv) モルモットの免疫方法: 厚生省, 生物学的製剤基準にしたがつて結核菌を流動パラフィンに浮遊して 0.1 mg/ml 浮遊液として両側大腿筋肉内に 0.25ml ずつ注射し, 6 週間後に PPD (日本 BCG) の 2 μ g/ml および 0.5 μ g/ml の各 0.1ml を皮内注射し, 24 時間後の硬結の直径が 2 μ g/ml で 14~19mm で, かつ 0.5 μ g/ml による反応の直径がそれよりも 4mm 以上小さい時免疫モルモットとした。コリネ菌においても同様の方法で行った。

3) Middlebrook and Dubos 反応: 感作赤血球凝集反応, 溶血反応は芳賀ら³⁾の手技に従って行つた。血球感作抗原としては東京大学医科学研究所より分与された, 旧ツベルクリンをメタノールおよび三塩化酢酸によつて分画したツベルクリン粗タンパク分画 TA₂⁸⁾ と, 進藤ら⁹⁾の方法に準じて作製した *Corynebacterium equi* Ko-85 株菌体から希アルカリ抽出, 酸沈殿によつてえられた粗タンパク分画 CP を用いた, 感作赤血球は TA₂ と CP の 1mg/ml の溶液に洗浄ヒツジ赤血球 0.1ml を混じり 37 C 水浴中で 2 時間感作を行つた。免疫血清は 56 C, 30 分非動化後, ヒツジ赤血球に対する正常抗体を吸収する目的で, 血清の 5 倍量の 20% ヒツジ赤血球浮遊液を加

え, よく混合して室温に 30 分放置後遠心し, 上清を分離して 5 倍血清希釈液とし, その血清を 5 倍より 2 倍倍数希釈し, その 0.25ml に同量の 0.5% 抗原感作赤血球浮遊液を加え, 37 C の水浴中に 1 時間保つた後, 一夜氷室に置き翌日室温に 30 分放置後, 結果を判定した。赤血球凝集反応判定後, 各試験管に 4 単位の補体を含むモルモット血清 0.05ml ずつ分注し, 37 C の水浴中に 30 分保つた後, 溶血の程度を判定した。

4) 吸収試験

i) 菌体による吸収: 結核菌免疫ウサギ抗血清およびコリネ菌免疫ウサギ抗血清は, 5 倍量の 20% 洗浄ヒツジ赤血球で正常抗体を吸収し, 5 倍血清希釈液を作り, 2 本の小試験管に 1ml ずつ分注し, それぞれに結核菌およびコリネ菌 50mg を加え 4 C の氷室に時々振盪しながら 5 昼夜放置後, 10,000 回転, 10 分遠心上清を結核菌およびコリネ菌 1 回吸収血清とした, この 1 回吸収血清と, 同様の操作を 3 回反復した血清および 5 回反復した血清を実験にもちいた。

ii) 抗原感作赤血球による吸収: TA₂ と CP の感作赤血球の作製は前記の方法と同様に行つた。免疫血清 0.2 ml に 20% TA₂ 抗原感作赤血球浮遊液あるいは, 20% CP 抗原感作赤血球浮遊液を 1ml 加え, 37 C の水浴中で時々振盪しながら 1 時間吸収操作を行つた。のち 4 C の氷室に一夜放置して翌日 3,000 回転 10 分間遠心分離した上清を 1 回吸収血清としさらに同様の操作を反復し, 実験には 1 回, 3 回および 5 回吸収血清を使用した。

5) ゲル内沈降反応 (Ouchterlony 法)

抗原としては TA₂ と CP を用い, 抗原濃度はあらかじめ予備試験で定めた, CP 20mg/ml と 25mg/ml 溶液および TA₂ 10mg/ml と 30mg/ml を使用した, 抗体としては上記の結核菌免疫ウサギ抗血清およびコリネ菌免疫ウサギ抗血清を使用した。

6) 皮内反応

i) 抗原: PPD (日本 BCG) あるいは CP を 0.1ml 中に 0.125 μ g, 0.05 μ g, 0.025 μ g, 0.0125 μ g を含む生理食塩溶液を作成し用いた。PPD のみは, さらに 2 μ g, 0.5 μ g, 0.25 μ g/0.1ml の溶液も使用した。

ii) 判定: 皮内反応は抗原注射後, 24 時間, 48 時間に判定した。判定の基準は硬結の大きさが縦径と横径の算術平均値により 4mm 以下は (-), 5~9mm は ($\pm$), 10mm 以上を (+) とした。

成 績

1) ツベルクリンタンパク抗原 TA₂ とコリネ菌タン

Table 1. Passive hemagglutination and hemolysis reaction of anti-*M. tuberculosis* serum and anti-*C. equi* rabbit serum

	Erythrocytes sensitized with antigens (passive hemagglutination and hemolysis)			
	TA ₂		CP	
	HG	HL	HG	HL
Anti- <i>M. tuberculosis</i> rabbit serum.	620	1280	10	320
Anti- <i>C. equi</i> rabbit serum.	20	160	10	80

HG: Hemagglutination

HL: Hemolysis

バク抗原 CP 間の感作赤血球凝集反応, および溶血反応における交差反応

結核菌免疫ウサギ抗血清に対し CP 感作赤血球凝集反応では10倍, 溶血反応では 320 倍の抗体価を示した(表 1)。またコリネ菌免疫ウサギ抗血清に対し TA₂ 抗原感作赤血球凝集反応では20倍, 溶血反応では 160 倍の抗体価を示した(表 1)。これらの結果は両抗原間の交差反応を示すと思われるので, 結核菌体, コリネ菌体, TA₂ 抗原感作赤血球および CP 抗原感作赤血球による吸収, 交差試験を行った。

2) 結核菌体およびコリネ菌体による吸収試験

結核菌免疫ウサギ抗血清を結核菌体 (50mg) で吸収し TA₂抗原感作赤血球を用いて凝集反応, 溶血反応を行う

たが陰性であつた。しかし CP 抗原感作赤血球の凝集反応においては, 5 回吸収で完全に吸収できたが, 溶血反応では 20 倍の抗体価を示し, 完全には吸収できなかった。このことは CP 抗原と反応する結核菌免疫ウサギ抗血清中の交差反応性抗体が TA₂ と反応する抗体とは異質のものであり, 結核菌菌体吸収により, TA₂ に対する抗体は完全に吸収されたが, CP に対する抗体は吸収試験を繰り返すことにより抗体価の減少は見られたが, 5 回吸収だけでは溶血反応で20倍の抗体価が残つたものと思われる。次に結核菌免疫ウサギ抗血清を コリネ菌体 (50mg) で吸収し, TA₂ 抗原感作赤血球での凝集反応では, 5 回吸収血清では40倍の抗体価を示した。溶血反応では 160 倍を示し完全には吸収できなかった。しかし, CP 抗原感作赤血球による凝集反応および溶血反応は吸収により完全に陰性となつた(表 2)。またコリネ菌免疫ウサギ抗血清を結核菌体 (50mg) で吸収し, TA₂ 抗原感作赤血球を用いての凝集反応, 溶血反応を行ったが, 完全に吸収され, 陰性であつた。しかし CP 抗原感作赤血球での凝集反応では, 5 回吸収血清で陰性であつたが, 溶血反応では完全に吸収できず, 40倍の抗体価を示した。次にコリネ菌体 (50mg) で吸収し, TA₂ と CP 抗原感作赤血球による凝集反応, 溶血反応は完全に菌体で吸収されて陰性であつた(表 2)。

3) TA₂ および CP 抗原による吸収試験

菌体表面抗原による吸収で完全に吸収できなかった組合せ, すなわち結核菌免疫ウサギ抗血清をコリネ菌で吸収して, TA₂ 抗原感作赤血球に対して陽性を示した組

Table 2. Absorption test of anti-*M. tuberculosis* rabbit serum and anti-*C. equi* rabbit serum with both organism

Anti-serum	Absorption time	Absorption with bacterial cells							
		<i>M. tuberculosis</i> (50mg/ml)				<i>C. equi</i> (50mg/ml)			
		Erythrocytes sensitized with antigen (passive hemagglutination and hemolysis)							
		TA ₂		CP		TA ₂		CP	
		HG	HL	HG	HL	HG	HL	HG	HL
Anti- <i>M. tuberculosis</i> rabbit serum	First	0	0	5	40	160	160	0	0
	Third	0	0	5	20	40	160	0	0
	Fifth	0	0	0	20	40	160	0	0
Anti- <i>C. equi</i> rabbit serum	First	0	0	5	40	0	0	0	0
	Third	0	0	5	40	0	0	0	0
	Fifth	0	0	0	40	0	0	0	0

HG: Hemagglutination

HL: Hemolysis

Table 3. Absorption test of anti-*M. tuberculosis* rabbit serum and anti-*C. equi* rabbit serum with erythrocytes sensitized both antigens

Anti-serum	Absorption time	Absorption with TA ₂ or CP sensitized erythrocyte							
		Erythrocyte sensitized with TA ₂ antigen				Erythrocyte sensitized with CP antigen			
		Erythrocytes sensitized with antigens (passive hemagglutination and hemolysis)							
		TA ₂		CP		TA ₂		CP	
		HG	HL	HG	HL	HG	HL	HG	HL
Anti- <i>M. tuberculosis</i> rabbit serum	First	-	-	-	-	320	640	0	0
	Third	-	-	-	-	160	640	0	0
	Fifth	-	-	-	-	160	320	0	0
Anti- <i>C. equi</i> rabbit serum	First	5	5	5	40	-	-	-	-
	Third	0	0	5	40	-	-	-	-
	Fifth	0	0	5	40	-	-	-	-

HG: Hemagglutination

HL: Hemolysis

合せと、コリネ菌免疫ウサギ抗血清を結核菌で吸収して、CP 抗原感作赤血球に対して陽性を示した組合せについて、菌体未吸収血清を用いて、CP と TA₂ 抗原感作赤血球での吸収試験を行った。しかし結核菌免疫ウサギ抗血清を CP 抗原感作赤血球で吸収し TA₂ 抗原感作赤血球による凝集反応は、菌体吸収と同様に完全に吸収できず、5 回吸収血清で 160 倍の抗体価を示し、溶血反応では 320 倍の抗体価を示した。コリネ菌免疫ウサギ抗血清を TA₂ 抗原感作赤血球で吸収し、CP 抗原感作赤血球による凝集反応も菌体吸収と同様に完全に吸収できず、5 回吸収血清で 5 倍の抗体価を示し、溶血反応においても 40 倍の抗体価を示した(表 3)。

4) ゲル内沈降反応による TA₂ と CP の共通抗原性の検討

結核菌免疫ウサギ抗血清に対し TA₂ 抗原 (10mg/ml) と CP 抗原 (25mg/ml) 2 種のタンパク抗原間に融合する沈降線を認めた。またコリネ菌免疫ウサギ抗血清に対し、TA₂ 抗原 (30mg/ml) と CP 抗原 (20mg/ml) の間に融合する沈降線を認めたことは、共通抗原の存在を示唆するものと思われる(図 1)。

5) 皮内反応による交差反応

i) CP 抗原の非特異反応：通常最少発赤量 (M, R, D)¹⁰⁾ の測定は動物の背部に、0.1~0.2ml 皮内注射後 48 時間後に発赤が 1cm 以上を陽生とするが、われわれは非特異反応において 5mm 以上を陽性とし、陽性を示す CP 溶液の最少量は 1μg/0.1ml であった。〔ii) 項以下においては発赤が 1cm を陽性とした。〕

Fig. 1. Double diffusion gel precipitin reaction of CP and TA₂ against anti-*C. equi* rabbit serum (left) and anti-*M. tuberculosis* rabbit serum (right)

ii) 結核菌免疫モルモットに対する PPD, CP 両抗原による交差皮内反応：結核菌免疫モルモットに PPD, CP 両抗原とも前述 [6] の i) の種々の濃度の希釈液を 0.1

Table 4. The skin cross-reaction between PPD and CP in guinea pigs sensitized with cells of *M. tuberculosis*

Antigens examined	Concent ($\mu\text{g}/0.1\text{ml}$)	Number of guinea pigs							
		No. 1		No. 2		No. 3		No. 4	
		24 hr (mm)	48 hr (mm)	24 hr (mm)	48 hr (mm)	24 hr (mm)	48 hr (mm)	24 hr (mm)	48 hr (mm)
CP	0.125	20×20	11×10	13×15	5×5	21×23	8×8	18×18	9×8
	0.05	14×13	9×7	9×10	4×4	16×13	9×5	12×10	7×6
	0.025	13×12	7×4	8×10	5×3	12×12	6×5	9×11	7×4
	0.0125	11×9	5×6	8×7	2×2	16×20	6×5	11×13	7×4
PPD	0.125	11×12	6×7	10×9	7×8	12×10	8×7	10×10	4×6
	0.05	9×10	6×5	7×10	6×6	11×9	6×5	10×8	6×3
	0.025	8×8	3×3	6×7	4×4	8×8	4×6	6×7	3×3
	0.0125	10×7	5×6	7×6	2×2	7×8	4×6	7×8	3×3

Table 5. The skin cross-reaction between PPD and CP in guinea pigs sensitized with cells of *C. equi* Ko-85

Antigens examined	Concent ($\mu\text{g}/0.1\text{ml}$)	Number of guinea pigs							
		No. 1		No. 2		No. 3		No. 4	
		24 hr (mm)	48 hr (mm)	24 hr (mm)	48 hr (mm)	24 hr (mm)	48 hr (mm)	24 hr (mm)	48 hr (mm)
CP	0.125	(3×5)* 18×21	(6×7)* 19×18	17×14	13×14	13×13	13×10	17×16	10×12
	0.05	12×13	12×12	14×12	12×18	13×12	7×6	14×12	10×7
	0.025	9×8	9×10	10×11	9×9	12×12	6×5	13×13	9×7
	0.0125	13×13	11×12	10×11	10×10	11×9	6×3	10×11	6×5
PPD	2.0	11×9	4×4	13×12	3×3	10×10	7×7	9×9	2×3
	0.5	11×8	5×7	11×8	2×2	8×7	5×5	2×3	2×3
	0.25	2×2	2×2	4×4	2×2	2×2	2×2	4×6	2×2
	0.125	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2	3×3	2×2

*: $\frac{\text{(Induration)}}{\text{Erythema}}$

ml 皮内に注射し、径時的に判定を行つた。PPD 抗原は 24 時間の判定で $0.125\mu\text{g}/0.1\text{ml}$ で陽性を示し、CP 抗原は 24 時間の判定で $0.0125\mu\text{g}/0.1\text{ml}$ で陽性を示した (表 4)。

iii) コリネ菌免疫モルモットに対する PPD, CP 両抗原による交差皮内反応: PPD, CP 両抗原ともに前述〔6)の i)〕の種々の濃度希釈液を皮内注射し、径時的に判定した。PPD 抗原では 24 時間後 $2\mu\text{g}/0.1\text{ml}$ で陽性を示し、cp 抗原では $0.0125\mu\text{g}/0.1\text{ml}$ で陽性を示した。抗原濃度の差はあるが、PPD, CP 抗原との間に共通抗原性の存在することが認められた。

考 察

先に述べた Cummins²⁾の報告では *M. smegmatis* に対する抗血清を *Nocardia asteroides*, BCG, トリ型結核菌の cell-wall で吸収を行つた血清を *M. smegmatis* 8156, *M. phlei* 8151, *C. fascians* 156, *N. asteroides* 398, *C. diphtheriae* 2764 のそれぞれの cell wall を抗原として凝集反応を行つた結果、いずれの場合もこれらの cell wall に対する凝集素は完全に吸収されるという結果が得られている。小林⁷⁾は結核菌青山 B 株免疫ウサギ抗血清の感作赤血球凝集反応による抗体価は *Coryne-*

bacterium diphtheriae 菌による吸収によつて減少がみられ、また、*C. diphtheriae* 菌免疫ウサギ抗血清は、結核菌抗原感作赤血球に対して交差反応を示し、結核菌による吸収によつてその交差反応は消失したが、*C. diphtheriae* 菌抗原感作赤血球に対する抗体価はまったく変動がみられなかつたと報告し、結核菌と *Corynebacterium diphtheriae* 菌との間に検討の余地はあるが共通抗原の存在が推定できたと報告している。山村らは *Mycobacterium bovis* BCG と分類上類縁関係にある *Nocardia asteroides*, *Corynebacterium diphtheriae* PW 8 から精製した CWS を用いて、化学構造を調べた結果、ミコール酸の炭素数が BCG-CWS では $C_{70}\sim C_{84}$ で、*Nocardia* では $C_{48}\sim C_{60}$ 、*Corynebacterium* では $C_{28}\sim C_{32}$ で、 α 分岐の長さも BCG-CWS では C_{24} であるが *Nocardia*, *Corynebacterium* では $C_{10}\sim C_{14}$ と短い。このように部分的には差がみとめられるが、基本的には同じ化学構造をもっていると報告している^{1,4,5,6)}。著者らは、結核菌青山 B 株と *Corynebacterium equi* Ko-85 株との共通抗原性について感作赤血球凝集反応、溶血反応、ゲル内沈降反応および皮内反応により検討した。結核菌免疫ウサギ抗血清に対して、CP 抗原感作赤血球凝集反応、溶血反応による交差反応、またコリネ菌免疫ウサギ抗血清に対して TA_2 抗原感作赤血球凝集反応、溶血反応による交差反応はともに陽性であつた。次に、両免疫血清を結核菌およびコリネ菌体によつて吸収した両免疫抗血清を、 TA_2 、CP 感作赤血球凝集反応、溶血反応を行つた結果、抗体価の減少を認めたので、共通抗原性の存在することがわかつた。次に結核菌免疫ウサギ抗血清をコリネ菌で吸収して TA_2 感作赤血球による凝集反応、溶血反応を行う組合せと、コリネ菌免疫ウサギ抗血清を結核菌で吸収して CP 感作赤血球による凝集反応、溶血反応を行う組合せ、すなわち抗体を完全に吸収できなかった組合せについて、 TA_2 および CP 抗原感作赤血球で吸収を行つたが、菌体吸収と同様に抗体価の減少は認めたが、抗体を完全に吸収できなかった。またゲル内沈降反応において結核菌免疫ウサギ抗血清とコリネ菌免疫ウサギ抗血清に対して TA_2 、CP との間に 1 本の融合する沈降線が見られ、共通抗原性のあることを認めた。また TA_2 および CP 間には共通抗原とは別にもう 1 本の沈降線が見られた。このことは菌体による吸収試験において抗体を完全

に吸収できず、陽性反応が残存した事実と符合し、共通抗原のほかには菌種特異抗原による抗原抗体反応によるものと考えられる。われわれはコリネ菌免疫モルモットに対して、PPD 抗原による皮内反応は CP 抗原による反応よりも弱い陽性反応を認めた。また結核菌免疫モルモットに対しても CP 抗原を用いての皮内反応は PPD とほとんど同程度の反応を認めた。以上の血清反応による交差反応、吸収試験、ゲル内沈降反応および皮内交差反応のすべての結果より結核菌青山 B 株と *C. equi* Ko-85 菌との間には共通抗原性のあることを確認した。

本論文の要旨は第33回日本細菌学会関東支部総会（東京、昭和50年6月）で発表した。

稿を終るに際し、ご指導ご校閲をいただいた前名古屋保健衛生大学、衛生学部、免疫学教室、進藤宙二教授、ならびにご校閲と TA_2 抗原を分与して下さつた東京大学医科学研究所アレルギー学研究部、渡辺貞助教授に謝意を表するとともに、*Corynebacterium equi* Ko-85 株を分与して下さつた同研究所微生物株保存施設、帖佐治技官および菌体培養でご助力いただいた同研究所培地室、内田元清講師および菌体破壊にご助力いただいた名古屋大学医学部附属医真菌研究施設、阿多実茂前教授、近藤譲助手各位に謝意を表します。

文 献

- 1) 東 市郎, 山村雄一 (1978): 蛋白質, 核酸, 酵素, **23**, (6), 625-640.
- 2) Cummins, C. S. (1962): J. Gen. Microbiol., **28**, 35-50.
- 3) 芳賀邦夫 (1964): 臨床検査, **8**, (2), 132-136.
- 4) Azuma, I., Kanetsuna, F., Taniyama, T., and Yamamura, Y. (1975): Biken J., **18**, 1-13.
- 5) Azuma, I., Taniyama, T., Hirao, F., and Yamamura, Y. (1974): Gann, **65**, 493.
- 6) Azuma, I., Ribí, E. E., Meyer, T. J., and Zbar, B. (1974): J. Nat. Cancer inst., **52**, (1), 95-101.
- 7) 小林重国 (1967): アレルギー, **16**, (11), 734-740.
- 8) 武田徳晴, 河西信彦, 青木良雄 (1951): 日細菌誌, **6**, (5), 43.
- 9) Shindo, T., Meguro, T., and Soejima, M. (1949): Jap. J. Exp. Med., **20**, 301-312.
- 10) 東京大学伝染病研究所学友会 (1958): 細菌学実習提要, **316**, 東京丸善

**Studies on Cross-Reactivity between *M. tuberculosis*
AOYAMA B and *C. equi* Ko-85**

Yoshinobu YAMAMOTO, Yuzuru HAYASHI and Kunio HAGA

Department of Immunology, School of Health Sciences,
Fujita Gakuen University, Nagoya

Previously, it was reported that a definite cross-reaction was observed in the serological reaction between *M. tuberculosis* (AOYAMA) and *C. diphtheriae* (P.W. 8).

In order to obtain further evidence for the existence of cross-reacting antigen between *M. tuberculosis* (AOYAMA B) and *C. equi* (Ko-85), experiments were carried out by means of passive hemagglutination, conditioned hemolysis, Ouchterlony technique, and skin test with fractions TA₂ and CP, which were presumed to be protein in nature, as antigens. Fraction TA₂ was prepared from old tuberculin, and fraction CP from *C. equi* (Ko-85) by a similar technique.

The absorption test was performed with anti-*M. tuberculosis* and anti-*C. equi* rabbit sera with results similar to those reported previously.

The Ouchterlony double diffusion technique was carried out with anti-*M. tuberculosis* and anti-*C. equi* rabbit sera and with fractions TA₂ and CP as antigens. It gave rise to a clear reaction of identity in each case. Guinea pigs immunized with cells of *M. tuberculosis* or *C. equi* showed a clear cross-reaction in the Arthus reaction induced by bacterial antigen. These results may indicate the presence of antigens causing a cross-reaction between fractions TA₂ and CP.