●みにれびゆう

研 究 回 顧

林 喬 義

君津市松丘郵便局私書箱 2 号 〒292-05

(受付: 11月11日, 1983年)

私は1983年3月に札幌医大を停年で辞め、研究、教育の仕事から退きました。そのときに私の今までの研究の道程を“Thirty-seven years of research on streptococcus pyogenes”と題する小冊子にまとめ、いろいろご指導、ご協力をいただいた方々に対する感謝の意をこめて、関係の各位に贈りました。そして今後は専門領域のことに關しては筆を執りたくないと私なりに心に決めておりましたが、その後、日細菌誌の編集委員の方から“みにれびゆう”欄に投稿を依頼されました。この欄は本来は名誉会員の先生方の原稿が載るところですから、私としては少しおこがましい次第ですが、ご好意を無にするわけにはいかず、さきの小冊子の内容の一部を回想的に抜粋してその責を塞ぐことにしました。

1. 溶血レンサ球菌の研究に入るきっかけ

私は1941年12月太平洋戦争勃発と時を同じくして北大医学部を卒業し、直ちに翌年1月東大伝染病研究所(現在の医科学研究所)の細谷省吾教授の研究室にいらしていただいたのですが、その月のうちに海軍軍医科士官として戦場に赴き、終戦後再び同じ研究所に戻って初めて本格的に研究生活に入ったわけです。

敗戦の疲弊のどん底の日本では、伝研でさえも都市ガスが止められ、ガスバーナーが使えず、アルコールランプで、しかもマッチが自由に入手できず、隣のランプから紙片で「貰い火」して点火する仕末で研究は困難をきわめていました。そのような状態ですから当時細谷研究室では1日でも実験を休んだら損をするというのが常識になっていて、私は戦争中潜水艦の中で約3年半「月月火水木金金」の生活をしてきて、生き残って帰ってきて細谷研究室で再び「月月火水木金金」の生活を続ける結果となりましたが、このことがむしろ私に幸したといえます。

その頃細谷教授は、金沢大学薬理学の岡本肇教授の発見された「リボ核酸による溶血レンサ球菌溶血毒素増強効果^{1,2)}」に非常に関心をもっておられ、製造行程の異なるいろいろなリボ核酸試料を用いて、その効果を試しておられ、その仕事を同室の仲間のひとりの研究者が受持たされていましたが、データの再現性の問題で苦労しているようでした。たまたまその人が数日研究所を休んだのですが、細谷先生はその実験結果が出てくるのが待遠しくて堪らないわけです。そのとき私はジフテリア抗毒素血清の単位の低いのをプールして、精製濃縮して使用に堪えるような抗毒素を得る作業を受持つていたのですが、同室の仲間の欠席のお蔭で前述の核酸の仕事代わってやる破目に陥り、そのとき使用したりボ核酸試料が偶然にも効果の強いものであつたらしく、非常によい結果がでたため何とはなしにその後はこの実験が私の手に移つてしまつて、私の研究生活の中でもっとも大きな部分を占めているところの「RNA と Streptolysin S の関係」の研究に発展していったわけです。

2. 研究進展の端緒

溶血レンサ球菌溶血毒素は培地中に血清を加えて培養すると著しく増強されることが知られており、またこれに関連して、培養菌体と血清を混じて緩やかに振盪するだけで得られる“Weld の hemotoxin”と称する溶血毒素があることも古くから知られていました。

この2つの事実から当時細谷教授と協同研究をしておられた江上不二夫教授が、「血清の代りにリボ核酸を用いたら Weld の toxin と同じように強い溶血毒素が得られるのではないか?」という予想を葉書に走り書で細谷教授にしたためられたのがその予想が適中して、培養によらないで核酸の溶血毒素増強活性を調べられるようになったことは、核酸の化学構造と活性との関係を追究

するために非常に有利になり、この研究の急速な進展をもたらす端緒となりました。

3. 公表時期の差 6 ヶ月

私どもはこの研究成果を1949年初めに Japan. J. Exp. Med. に発表しました^{3,4)}。ところが約6ヵ月後の同じ年にニューヨーク大学の Dr. A. W. Bernheimer がまったく同じような実験をして J. Exp. Med. に発表し⁵⁾、その論文の中で、discussion の項に、自分がこの実験を完了してから私どもの報文に遭遇したと書いております。Japan. J. Exp. Med. は伝研の外国語雑誌で、米国の J. Exp. Med. とは交換雑誌になっておりますので私どもの論文が比較的早く見付けられたのが幸でした。いずれにしても細谷教授に急がされて書いた論文が彼に一步先んじたことになりました。

余談になりますが、当時から細谷教授は細菌学会としての外国語雑誌がないことを非常に憂慮され、先生の強い意見で刊行されるようになったのが Japan. J. Microbiol. で、それが現在の Microbiol. & Immunol. になつていことはよくご存じの通りであります。

4. 偶然の結果の一致

a. RNA の構造の中の有効因子の追究⁶⁻¹²⁾

私どもの研究の焦点はその後、RNA の構造のポリヌクレオチドの如何なる部分に溶血毒素誘導という生物活性に関与する因子が存在するのかを究明することに絞られました。

そのために有効な RNA を種々な時間アルカリ分解、酵素分解 (RNase I, RNase T₁, 数種のホスフォジエステラーゼ、ホスフォモノエステラーゼなど) して、分解産物をアセトン分画、さらに ECTEOLA-セルロースのカラムクロマトによる分画を行なつて、莫大な数の試料を作つてそれぞれの試料について溶レン菌生菌と反応させて、できた溶血毒素の活性を測定して RNA 試料の毒素誘導効果を比較し、化学構造との関連を追いかけていたのですが、この研究は当時江上研究室の大学院博士課程におられた塩野義研の田中兼太郎氏との緊密な協同研究によつてできたものです。私はそのときは北大低温科学研究所に移つていましたので、札幌と名古屋の間を毎日のように凍結乾燥して密封した試料やデータの航空便の往復が続いて、約2カ年の歳月を要した研究でした。その結果得られた結論は分子の末端の構造に特異的に活性につながるものではなく、各試料の塩基組成の測定から、グアニン含量の高いものが活性が強く、その量と

活性とに平行関係があることがほぼ確実になりました。

この協同研究は大きな労力を要した研究でしたが私の長い研究生生活の中でもっとも印象深い効果的な協力関係で成ってきた研究でした。

b. 生重合 RNA による実験^{13,14)}

これらの研究と平行して私どもは生重合の RNA の溶血毒素誘導活性について調べる機会が得られました。それは後にノーベル賞を受賞されたニューヨーク大学の Severo Ochoa 教授が *Azotobacter vinelandii* の酵素を用いて生重合させる方法で作られたポリヌクレオチドの生物学的活性を私どもの方法で調べて欲しいと江上教授のもとに試料を送つてこられ、それが早速札幌に送られてきて私どものところでテストした結果溶血毒素誘導の活性が証明できました。このことは Ochoa 教授にとつても非常な朗報であつたわけで、すなわち生合成ポリヌクレオチドが天然の RNA とまったく同じ生物活性を示した最初のデータであつたからで、江上教授宛その喜びの手紙を寄せられていました。

ところがこの裏に偶然の出来事がありました。それは Ochoa 教授の研究室のあるニューヨーク大学の同じ建物の中のほかの階に前にお話しした Bernheimer 教授の研究室があるので、当然のことながら Ochoa 教授は私どものところに試料を送つてこられる以前に Bernheimer 教授に生重合ポリヌクレオチドの溶血毒素誘導効果のテストを依頼されていましたが、その結果は陰性であつたそうで、そのために私どもの陽性の結果に Ochoa 教授が事のほか喜ばれたわけです。しかしこの原因は後に判明したことですが、偶然にも Bernheimer 教授のところへいつた試料は A:G:U:C の比が 1:1/2:1:1 のもので、私どものところへ送つてこられたものはその比が 1:1:1:1 のものであつたという次第でした。この思わぬ出来事がさきの私どもの莫大な数の試料のテストから得られた結論を綺麗に裏付けてくれたことになりました。それ故、生重合ポリヌクレオチドの成績については1957年の Biochim. Biophys. Acta¹³⁾ に関係した4研究室協同で発表してあります。私どもはこの結果からさらに押し進めて、江上教授のところで RNase T₁ を用いて生重合させたオリゴグアニル酸にも活性があることを証明しております¹⁵⁾。

5. Streptolysin S と S' について

Weld の hemotoxin は血清成分によつて誘導される溶血毒素であることから Serum の S をとつて Streptolysin S と名付けられ、その性状が酸素の存在下でも

安定であることから、溶レン菌の酸素存在下で速かに不活化されるもうひとつの溶血毒素である Streptolysin O と区別されていますが、RNA によって誘導される溶血毒素も性状は Weld の toxin に類似しているので Streptolysin S の中に入れられています。

私どもは血清成分によって誘導された毒素と RNA によって誘導された毒素を混じて澱粉を支持体とするゾーン電気泳動にかけてみると紫外線吸収の 280 nm の山のタンパクの部分と、260 nm の山の核酸の部分に溶血活性がはっきりと分離されることから、この二つは物質的に異なるものとして RNA の毒素の方を Streptolysin S' と名付けました¹⁶⁾。

しかしその後1963年にイスラエルの Dr. I. Ginsburg は Tween 40 や Triton X などを用いて同じような溶血毒素が誘導されることを証明して、これを Streptolysin D と名付けました¹⁷⁾。(D は Detergent の D と思います) そして彼はこれらの溶血毒素は血清成分、RNA、Triton などが担体となつて、菌体から遊離された状態では溶血活性を保持することのできない不安定な毒性成分と結合して安定な活性を維持させているものと考え、その毒性成分と担体との結合の強さは Triton がもつとも強く、RNA がこれに次ぎ、血清成分がもつとも弱い。したがってこれらの溶血毒素を混合すると結合の弱い方から強い方へと毒性成分が移行するという興味ある成績を報告しています¹⁸⁾。

私どもの実験で同じ溶血単位の Streptolysin S と S' を混じてから電気泳動で分離させると、常に S より S' の方が高単位のものが回収されるという現象を見ていたのですが、そのときは S の方が S' より熱安定性が低いので泳動中の失活の程度が高いのだとのみ考えていて、Dr. Ginsburg のいう毒性基の移行ということに考え及ばなかったことは返すがえすも残念でした。実験データの読み方の慎重さが欠けていて先を越された失敗例です。

6. Streptolysin S' のその後の研究

私自身はその後この溶血毒素の研究から離れて、線維素溶解酵素系に関係するストレプトキナーゼ、スタフィロキナーゼの研究に移ってしまいましたが、江上研究室の研究グループの方々によって私どもの研究のあと、毒素の精製、毒性成分の化学組成、生合成オリゴヌクレオチドの有効因子の精製、生菌を用いないで、プロトプラストやゴーストと有効因子を用いての毒素産生など純粋な生化学的研究がなされました¹⁹⁻²²⁾。

7. 想い出

Lancefield 先生のこと：私は溶血レンサ球菌感染症の臨床的研究も手がけてきましたので、この菌の群別、型別などの仕事にも携わっていました。この研究領域での先駆者は何といつても Dr. Rebecca Lancefield です。ご承知の通り、レンサ球菌は Lancefield の群別で A→O までの 13 群（現在は追加されて V までの 20 群）があるのですが、A→O のアルファベットならば 15 群になる筈です。それが I と J を除いてあるので 13 群になります。

Lancefield 先生はつい先年亡くなりましたが、先生がまだお元気で研究室にでておられた頃私が Rockefeller 大学の先生の研究室を訪ねて、種々ご教示を受けたり、菌株や型別血清を分けていただいたりしていましたが、その際このことに触れられて「I と J は文字が似ていて間違いをおこすおそれがあるから群別の記号から初めから除いて置いたのです」と話されたことを想い出します。きわめて単純なことなのですが誤りをおこさない注意ということは研究者の心構えとしてもつとも大切なことで、誠に貴い教訓として私の研究者としての生涯を通じて一時も忘れ得ませんでした。

江上不二夫先生のこと：私は前述のように細谷研究室にいて、居ながらにして細谷教授の研究協力者である生化学の江上教授の指導を受けるという誠に恵まれた環境に置かれました。ときには江上研究室へ泊りがけで実験に行つて教室の研究者の方々と親しく接する機会がありました。そのとき研究室の方から聞いたことですが、江上先生は手紙を受取られると決して机の上に置かないで、その場ですぐに返事を書かれる習慣だということです。すなわち、それ程お忙しくて暇がない方であつたということだと思います。確かに私が何か実験のことで手紙を差上げると必ず一両日中に、先生の特徴のある筆跡で走り書きで重要な意見や忠告が返ってくるのが常でした。私もせめてこのことだけでも見倣つて実行したいと思つて努力しましたが非常にむずかしいことでした。

想い出すままに拙文を綴りましたが、何らかの形で若い研究者の方々に少しでもお役に立つようなことがありましたら望外の幸です。

参考文献

- 1) Okamoto, H.: Über die hochgradige Steigerung des Hämolyse bildungsvermögens des Streptococcus haemolyticus durch Nukleinsäure. I. Mitteilung. Japan. J. Med. Sci. IV. Pharmacology 12, 167-208 (1939)

- 2) Okamoto, H., Miura, K., Ito, R. und Kyoda, S.: Versuche zur Isolierung von Streptolysin aus 1% Nukleinsäure-Bouillonkultur des Streptococcus haemolyticus. III. Mitteilung. Japan. J. Med. Sci. IV. Pharmacology **13**, 23-34 (1940)
- 3) Hosoya, S., Hayashi, T., Mori, Y., Egami, F., Shimomura, M., Yagi, Y. and Suzuki, Y.: Studies on the hemolysin of hemolytic streptococci. Part I. The hemolysin obtained from the nucleic acid-added broth culture of hemolytic streptococci. Japan. J. Exp. Med. **20**, 25-26 (1949)
- 4) Hosoya, S., Hayashi, T., Homma, Y., Egami, F., Shimomura, M. and Yagi, Y.: Studies on the hemolysin of hemolytic streptococci. Part II. The hemolysin obtained by shaking a mixture of hemolytic streptococci with nucleic acid solution. Japan. J. Exp. Med. **20**, 27-36 (1949)
- 5) Bernheimer, A. W.: Formation of a bacterial toxin (streptolysin S) by resting cells. J. Exp. Med. **90**, 373-392 (1949)
- 6) Egami, F., Shimomura, M., Yagi, Y., Hayashi, T., Mase, T. and Hosoya, S.: Studies on the hemolysin of hemolytic streptococci. Part III. The hemolysin obtained by incubating a mixture of hemolytic streptococci with nucleic acid solution. Japan. J. Exp. Med. **20**, 527-539 (1950)
- 7) Tanaka, K., Maekawa, S., Hayashi, T. and Kuroiwa, Y.: Biochemical studies on streptolysin S. I. Effects of alkali-treated ribonucleic acid in the hemolysin formation. J. Biochem. **43**, 827-832 (1956)
- 8) Tanaka, K., Maekawa, S. and Hayashi, T.: Biochemical studies on streptolysin S. II. Effects of ribonuclease digestion of ribonucleic acid on the hemolysin formation. J. Biochem. **43**, 833-840 (1956)
- 9) Hayashi, T., Maekawa, S. and Tanaka, K.: Studies on the hemolysin of hemolytic streptococci. IV. Antagonistic action of ribonucleic acid on the hemolysis of hemolysin formed with ribonucleic acid. Japan. J. Exp. Med. **26**, 113-123 (1956)
- 10) Tanaka, K., Egami, F., Maekawa, S. et Hayashi, T.: Formation induite de la streptolysine S par la fraction résistante à la ribonucléase de l'acide ribonucléique. C. R. Soc. Biol. (Paris) **151**, 1796-1798 (1957)
- 11) Tanaka, K., Hayashi, T. and Maekawa, S.: Biochemical studies on streptolysin S. III. Effects of enzyme digested ribonucleic acid on the hemolysin formation. J. Biochem. **45**, 97-107 (1958)
- 12) Tanaka, K.: Biochemical studies on streptolysin S. IV. Fractionation of active substance for streptolysin formation and its properties. J. Biochem. **45**, 109-121 (1958)
- 13) Tanaka, T., Egami, F., Hayashi, T., Winter, J. E., Bernheimer, A. W., Mii, S., Ortiz, P. J. and Ochoa, S.: Induction of streptolysin formation by biosynthetic polyribonucleotides. Biochim. Biophys. Acta **25**, 663-665 (1957)
- 14) Tanaka, K., Egami, F., Hayashi, T. and Maekawa, S.: Streptolysin-forming activity of enzymatically synthesized polynucleotides and of ribonucleic acids prepared from Azotobacter vinelandii and tobacco mosaic virus. J. Biochem. **45**, 593-597 (1958)
- 15) Sato-Asano, K., Hayashi, T. and Egami, F.: Induction of streptolysin S' formation by oligoguanylic acids. J. Biochem. **48**, 292-294 (1960)
- 16) Hayashi, T., Tanaka, K. and Nitta, M.: Difference between streptolysin-S and -S'. (in Japanese) 33th Annual Meeting of Japanese Biochemical Society, 1960. Seikagaku **32**, 657 (1960)
- 17) Ginsburg, I., Harris, T. N. and Grossowicz, N.: Oxygen-stable hemolysins of group A streptococci. I. The role of various agents in the production on the hemolysins. J. Exp. Med. **118**, 905-917 (1963)
- 18) Ginsburg, I. and Harris, T. N.: Oxygen-stable hemolysins of group A streptococci. II. Chromatographic and electrophoretic studies. J. Exp. Med. **118**, 919-934 (1963)
- 19) Koyama, J. and Egami, F.: Biochemical studies on streptolysin S' formed in the presence of yeast ribonucleic acid. I. The purification and some properties of toxin. J. Biochem. **53**, 147-154 (1963)
- 20) Koyama, J.: Biochemical studies on streptolysin S'. II. Properties of a polypeptide component and its role in the toxin activity. J. Biochem. **54**, 146-151 (1963)
- 21) Itagaki, K., Kuriyama, Y., Shiobara, Y., Hayashi, H., Yamagata, T. and Egami, F.: Oligoribonucleotides effective on the streptolysin S'. (in Japanese) Seikagaku **37**, 217-225 (1965)
- 22) Sokawa, Y. and Egami, F.: Release of the hemolytic component of streptolysin S by ATP and magnesium ion from a protoplast membrane fraction of streptococci. J. Biochem. **57**, 64-74 (1965)