神経・筋伝達を阻害する新しい クロストリジウム属菌の毒素

杉 本 央

大阪大学微生物病研究所 感染症研究部門 細菌毒素学分野
吹田市山田丘 3-1 〒565

〔受付: 1994年7月8日〕

1. はじめに

嫌気性有芽胞菌に分類されるクロストリジウム属の細菌は、また多種の毒素を産生することでも知られている。とりわけ神経毒素として広く知られているボツリヌス毒素と破傷風毒素はこれまで知られている天然および人工の毒性物質の中で最も致死毒性の強いものであり、致死量は分子数にしてわずか数億と計算されている。これらの毒素の標的とされている神経細胞の数が数億から数十億と推定されていることを考えあわせると、これらの毒素が如何に効率良く動物を殺しているか、言い換えれば毒素の作用部位が生命維持に如何に重要な役割を果たしているのかが推測される。一般にボツリヌス毒素は末梢での神経と筋線維との間の興奮伝達を¹⁾、また破傷風毒素は中枢での神経細胞と神経細胞との間の抑制性の伝達を遮断するとされているが、破傷風毒素は中枢での神経細胞間の興奮性伝達、さらに末梢での神経と筋線維間での興奮伝達をも遮断する作用をもつ^{2,3)}。これらの毒素が作用する生体側の組織は、神経細胞の興奮を他の神経細胞あるいは筋線維にミリ秒単位で伝えるためのシナプスと呼ばれる特殊な構造である。中でも神経と筋線維との間のシナプス

(神経・筋接合部とよぶ)は高速な細胞間情報伝達機構のモデルとして生理学や薬理学の分野で精力的に研究されてきた。最近ボツリヌス毒素および破傷風毒素作用の生化学的背景についての研究が急速な進展をみせており、これらの毒素によって神経終末からの興奮伝達物質放出機構の最終段階であるシナプス顆粒膜と細胞膜との融合の分子機構が明らかにされつつある。しかし神経伝達物質の放出機構はシナプス顆粒膜と神経終末部の細胞膜との融合以外のさまざまな過程を含んでおり、その全貌を解明するためにはボツリヌス毒素や破傷風毒素とその作用部位が異なる新たな毒素の登場が期待されている。筆者らはボツリヌス菌や破傷風菌と同属のウエルシュ菌が産生するエンテロトキシンが神経・筋伝達を阻害することを偶然みだし、その神経・筋伝達機構における作用段階を解析した。本稿では筆者らが経験したウエルシュ菌エンテロトキシンの例をボツリヌス毒素・破傷風毒素・蛇毒ホスホリパーゼA2などと比較しながら神経・筋接合部における興奮伝達機構の全体像について概説する。

2. 神経・筋接合部の構造

図1に運動神経と筋肉の模式図を示す。脊髄前角の α 運動神経細胞から発した軸索は筋肉組織に至って先端が枝分かれし、数本から数百本の筋線維と神経・筋接合部を形成して活動単位 (motor

A novel clostridial toxin which inhibits
neuromuscular transmission

Nakaba SUGIMOTO

図1. 脊髄運動系の模式図。αおよびγ運動神経線維系とIa, Ib, II感覚神経系の相互関係を示す。α運動神経細胞(α motoneuron)に対するシナプス連絡網については、Ia感覚神経線維(Ia)からなどの興奮性のものを黒塗で、Ibからや拮抗筋のIa(antag. Ia)から介在ニューロン(Interneuron)を経ておよび反回神経と呼ばれる軸索の枝分かれからレンショウ細胞(Renshaw cell)を経ての抑制性シナプス連絡を白抜きで示した。運動単位(Motor unit)は一本の神経線維から枝分かれしてできた神経終板(End-plate)とそれらが連絡している筋線維(Muscle fiber)より構成される。破傷風毒素とボツリヌス毒素の作用部位を矢印で示した。

図2. 破傷風中毒マウスからえられた筋電図。致死量の半分に当たる0.5MLDの破傷風毒素(5μl)を一側の後肢の腓腹筋(gastrocnemius)に注射した。注射した側の筋電図活動の充進が認められるが、伸筋である前脛骨筋に比べ屈筋である腓腹筋(gastrocnemius)と大腿内転筋(adductor femoris)で特にNMU活動が著しく増加している。さらに adductor femolis に比べ注射部位である gastrocnemius の活動増加が少ないのに注目されたい。

図3. マウス横隔膜の神経・筋接合部の電子顕微鏡写真像。中央のミトコンドリアと小さな顆粒を多数含んでいるのが神経終末部。下方の入り組んだ構造が筋線維の後シナプス部である。

unit) を構成し、筋電図上では神経筋単位 (NMU) とよばれる。図2に筋電図の例を示す。破傷風毒素を筋肉内に注射すると患側の筋電図活動は著しく増加し、運動神経の活動が亢進しているのが解る。枝分かれした軸索は個々の筋線維上に運動終板 (motor end-plate) を形成し、筋細胞表面に溝状の神経・筋接合部 (neuromuscular junction) を形作る。図3に神経・筋接合部の超薄切片の電子顕微鏡写真を示す。神経・筋接合部は顆粒の詰まった神経終末部 (前シナプス部) と電子密度が高く入り組んだ構造をとる筋線維膜 (後シナプス部) およびそれらのあいだ (シナプス間隙) より構成される。神経の興奮を筋線維に伝える (神経伝達物質) 役割を担うアセチルコリン (ACh) は前シナプス部の顆粒に貯蔵されており顆粒と神経終末部の細胞膜が融合することによってシナプス間隙に放出されるというのが通説であるが異論もある。後シナプス部は本質的には筋線維の細胞膜であるが、二つの ACh 結合部位を持つ ACh 受容体と不要になった ACh を分解するためのアセチルコリンエステラーゼ (AChE) が高密度に分布している。

3. 神経・筋興奮伝達機構とウエルシュ菌エンテロトキシン作用

動物の胸腔と腹腔を境する横隔膜を単離半切し、

付随する横隔神経を電氣的に刺激すると横隔膜の筋線維が収縮し張力が生じる。横隔膜は比較的薄い筋肉組織であるため拡散による酸素などの供給が容易で、長時間比較的安定した張力が得られることや薬物などの浸透が早くかつ均一であるなどの利点を持つことから単離摘出組織による神経・筋伝達の実験によく用いられる。図4はこの単離摘出した横隔膜標本にウエルシュ菌エンテロトキシン (ENTX) を作用させたときの結果を示す⁴⁾。ENTX は食中毒の下痢を引き起こす毒素として知られているが、動物に静脈注射すると強い致死作用をも示す⁵⁾。筆者らはこの毒素の動物に対する致死作用機構を研究している途上で偶然、図4に示した結果を得た。ENTX は、図5に示したボツリヌス毒素や破傷風毒素また蛇毒ホスホリパーゼ A2 と異なり、組織外液中の Ca 濃度が低いときにのみ横隔膜の収縮張力を低下させる。またボツリヌス毒素・破傷風毒素・蛇毒ホスホリパーゼ A2 はいずれも神経を刺激して筋肉の収縮を誘発してやらないと収縮張力の低下が始まらないが、ENTX は図4に示したように神経刺激に関係なく収縮張力の低下をもたらしした。そこでこの ENTX による横隔膜の収縮張力の低下がどのような機構によって生じるのかについて検討した。

図6に示したように、神経細胞の興奮が Na チャンネルを介して軸索を下降して神経・筋接合部に到達すると、神経終末部における細胞内の負の電位が失われ (depolarization, 脱分極)、ついで膜電位依存性の Ca チャンネルが開くことによって細胞外液の Ca イオンが濃度勾配にしたがって神経終末部の細胞質に流れ込む。これによって生じた神経終末部での細胞質 Ca イオン濃度の上昇が引き金となって ACh のシナプス間隙への放出がおこる。放出された ACh は後シナプス部の ACh 受容体に結合して興奮を筋線維に伝達した後、AChE によって分解されその作用を失う。ACh 受容体は、ACh が結合していない状態ではイオン透過性がないが、ACh が結合すると Na および K イオンに対して透過性となる。そこで ACh が結合した ACh 受容体のところに筋肉細胞の膜の脱分極が生じ、それが Na チャンネルを介して筋線維全体に広がることによって筋肉の収縮が始まる。神経の興奮から筋肉の収縮に至るこれら一連の反応から、神

図4. マウスの単離横隔膜標本の横隔神経に対する電気刺激によって誘発される筋肉の張力に対するウエルシュ菌エンテロトキシンの作用。Aは組織外液に2.4mMのCaが存在するとき、B, C, Dは組織外液のCaを0.5mMに減らしたときの筋肉の収縮張力に対するエンテロトキシン(ENTX)の影響を示す。Cでは洗浄の効果を、またDでは神経に対する電気刺激の停止の効果を示す。

図5. マウスの単離横隔膜標本の神経刺激による張力に対するボツリヌス毒素と破傷風毒素および蛇毒ホスホリパーゼA2の影響。蛇毒ホスホリパーゼA2では神経・筋伝達が増強される前に張力が一過性に増強する点に注目されたい。

経・筋伝達を増強あるいは減弱する機構としては以下のものが推測される。まず神経・筋伝達を増強する機構としては、1) 神経終末部の脱分極を増強延長する、2) Caチャンネルを開いた状態に

するあるいはその閾値を下げる、3) AChEの活性を抑える。また神経・筋伝達を減弱する機構としては、a) 神経軸索の興奮伝導を抑制する、b) 神経終末部の脱分極とCaチャンネル開口との連動

図6. 神経・筋興奮伝達機構と毒性物質の作用部位を表わす模式図。詳しくは本文を参照されたい。

を阻害する, c) 神経終末部へのCaの流入量を減少させる, d) AChの放出を抑える, e) AChEの活性を高める, f) ACh受容体のAChとの結合を阻害する, g) ACh受容体の新たなAChに対する応答性を低下させる(減感作, desensitization), などが考えられる。

ウエルシュ菌エンテロトキシンの場合には横隔膜筋肉の収縮張力を減弱させるわけであるから上記のa) からg)のいずれかに当たるはずである。そこでこれらの可能性について薬理的に検討した結果が図7である。a)の神経軸索の興奮伝導を抑制する毒の代表的なものがフグ毒テトロドトキシンである。図7Dは神経刺激による収縮張力に加えて筋肉自体に対する電気刺激によって生じた収縮張力の変化をも示しているが、筋肉自体を電気刺激することによって生じる収縮張力はENTXによって影響されなかった。筋細胞膜上で興奮を伝えるNaチャンネルと神経軸索のNaチャンネルとは本質的に同じものであるから、a)の可能性は低いと考えられた。図5の蛇毒ホスホリパーゼA2作用の初期に見られる収縮張力の増大は蛇毒の結合部分が神経終末部のKチャンネルを遮断するために1)の神経終末部の脱分極を増強延長するためと考えられている。同じようにKチャンネルを遮断して筋肉の収縮張力を増大する物質として

図7. ウエルシュ菌エンテロトキシン(ENTX)による神経・筋伝達阻害作用の薬理的解析。アセチルコリンエステラーゼ阻害剤(A), 脱分極性神経筋伝達遮断剤(B), カリウムチャンネル阻害剤(C)および筋肉の直接電気刺激(D)についてENTX作用との相互関係を示す。

図8. ウエルシュ菌エンテロトキシンを作用させる前後の微小終板電位。電位活動の形状に変化が見られない。

図9. ウエルシュ菌エンテロトキシンによる神経・筋伝達阻害の前後における微小終板電位の電位分布。

グアニジンと4-アミノピリジンが知られている⁶⁾。図7CはENTXによる収縮張力の減弱が生じた後にグアニジンを加えると収縮張力が増大する結果を示している。つまりENTXによって神経・筋伝達が阻害された神経・筋標本でも神経終末部の脱分極を増大延長すると神経終末部へのCaの流入量は増大すること、言い換えればENTXが神経終末部の脱分極とCaチャンネルとの連動を遮断するb)の可能性は考えにくいと結論づけられる。南米のインディオが狩りのとき矢毒として用いるクラレや蛇毒 α ブングロトキシンはACh受容体と強固に結合することによってAChの受容体との結合を阻害する。またデカメトニウム(C10)やサクシニルコリンはそれらの構造がAChと類似しておりACh受容体に結合して筋細胞膜の脱分極を引き起こすが、その作用の持続時間が長いためACh受容体のAChに対する応答性が失われ

る。したがってこれらはいずれもACh受容体と結合することによって神経・筋伝達を遮断するので相互間にはACh受容体を取りあうことによる競合抑制が生まれる。図7BはENTXとデカメトニウムとの間の競合抑制を検討したものであるが、これらの間には競合抑制が見られない。つまりENTXはACh受容体と結合することによって神経・筋伝達を阻害しているのではないと結論された。フィズスチグミン(Eserine)や殺虫剤などに用いられる有機リン系化合物はAChEを阻害して有効なACh量を増やすことによって神経刺激による筋肉の収縮張力を増大させる作用を持つが、図7Aに示したようにENTXによる収縮張力の低下はAChE阻害剤によって回復することができる。すなわち後シナプス部のACh受容体は充分量のAChがあれば筋線維の収縮を誘発するための脱分極を引き起こすことができることを示している。神経終末部のAChは神経の興奮によってシナプス間隙に放出されるが、ごく微量のAChは刺激がなくても一定量が単位をなしてランダムに漏れ出ており⁷⁾、後シナプス部に弱い脱分極性の膜電位変化を生じる(微小終板電位, mepps)。またこの漏出するAChの量は神経興奮によって放出されるACh量の単位を構成していると考えられている(伝達物質の量子的放出)⁸⁾。このmeppsの形状および電位分布に対するENTXの影響をそれぞれ図8と図9に示した。meppsはその形状および電位分布ともにENTXによって変化を受けないことが解った。これらの結果は、後シナプス部のACh受容体がENTX作用後もシナプス間隙に放出されたAChに対して正常に反応していることを示しているばかりでなく、前シナプス部から放出されるAChの構成単位そのものもENTX

図10. ウエルシュ菌エンテロトキシン (ENTX) による神経・筋伝達阻害を受けたマウス横隔膜標本を二重蛍光抗体法で染色した。a, b, c は抗 ENTX 抗体で、また d, e, f は前シナプス部に特異的に存在する蛋白質シナプトフィジンに対する抗体で染色した。a と d, b と e, c と f はそれぞれ同一部位から得られた蛍光。いずれも形状が一致している。

によって変化しないことを示している。以上の実験結果から ENTX による神経・筋伝達阻害機構としては、神経終末部への Ca の流入から ACh の放出に至るまでの過程、すなわち c) または d) の可能性が高いとの結論がえられた。図10に ENTX によって神経・筋伝達が阻害された横隔膜標本における ENTX と前シナプス部に特異的に存在する蛋白質であるシナプトフィジンの分布を同一視野で免疫二重染色法で調べた結果を示す。毒素蛋白質とシナプトフィジンはまったく同じ位置かつ同じ形で染め出されているのが判る。この結果は ENTX 毒素分子が前シナプス部に特異的に存在することを示しており、ENTX の作用部位が前シナプス部であることが形態学的にも支持された。

4. おわりに

以上に述べてきたようにウエルシュ菌エンテロトキシンは前シナプス部に働いて ACh の放出を抑制することによって神経・筋伝達を阻害する作用を持つが、これまで知られているボツリヌス毒素や破傷風毒素また蛇毒ホスホリパーゼ A2 とはその作用機構が異なると考えられる。神経・筋興奮伝達は骨格筋の随意運動のみならず、呼吸運動

や反射運動による危険回避など個体の生命維持に不可欠の機能である。またミリ秒単位で行われる神経系の細胞間情報伝達の代表としてこれまでも数多くの研究がなされてきた。しかし現在でもなお、神経終末部の脱分極によって生じる Ca の流入から ACh の放出までの機構については、前シナプス部の顆粒がシナプス前膜と融合することによって顆粒の中の ACh が放出されるというベジクル説や前シナプス部の顆粒は単なる ACh の保存場所で放出はシナプス前膜の閥門を通じて行われるというゲート説など諸説があり互いに自己の正しさを主張しあっている。最近ボツリヌス毒素と破傷風毒素が前シナプス部に存在する膜融合蛋白質複合体の構成ペプチドを切断するとの報告がなされ、ベジクル説を支持する有力な根拠となりつつある。蛇毒ホスホリパーゼ A2 やウエルシュ菌エンテロトキシンによる神経・筋興奮伝達阻害の生化学的作用機構はなお不明であるが、これらの前シナプス部に作用する一群の毒素は神経・筋興奮伝達の分子機構の全貌を明らかにするための突破口を開く役割を果たすことが大いに期待される。

稿を終わるに当たって、共同研究者の大阪府立大学農学部小崎俊司博士、名城大学薬学部小森由美子博士、名古屋大学医学部千田隆夫博士に御礼申し上げます。

文 献

- 1) Brooks, V.B. (1956) : An intracellular study of the action of repetitive nerve volleys and of botulinum toxin on miniature end-plate potentials. *J. Physiol. (Lond.)*, **134**, 264-277.
- 2) Duchen, L.W. and Tonge, D.A. (1973) : The effects of tetanus toxin on neuromuscular transmission and on the morphology of motor end-plates in slow and fast skeletal muscle of the mouse. *J. Physiol. (Lond.)*, **228**, 157-172.
- 3) Sugimoto, N., Matsuda, M., Ohnuki, Y., Nakayama, T., and Imai, K. (1982) : Neuromuscular blocking in acutely tetanus intoxicated mice. *Biken J.*, **25**, 21-28.
- 4) Sugimoto, N., Miyamoto, A., Horiguchi, Y., Okabe, T., and Matsuda, M. (1992) : Inhibition of neuromuscular transmission in isolated mouse phrenic nerve-diaphragm by the enterotoxin of *Clostridium perfringens* type A. *Toxicon*, **30**, 825-834.
- 5) Sugimoto, N., Chen, Y-M., Lee, S-Y., Matsuda, M., and Lee, C-Y. (1991) : Pathodynamics of intoxication in rats and mice by enterotoxin of *Clostridium perfringens* type A. *Toxicon*, **29**, 751-759.
- 6) Lundh, H. and Thesleff, S. (1977) : The mode of action of 4-aminopyridine and guanidine on transmitter release from motor nerve terminals. *Eur. J. Pharmacol.*, **42**, 411-412.
- 7) Fatt, P. and Katz, B. (1952) : Spontaneous subthreshold activity at motor nerve endings. *J. Physiol. (Lond.)*, **117**, 109-128.
- 8) del Castillo, J. and Katz, B. (1954) : Quantal components of the end-plate potential. *J. Physiol. (Lond.)*, **124**, 560-573.