Yutaka, HIRATA: Graft-Induced Changes in Eggplant (*Solanum melongena* L.) I. Changes of the Hypocotyl Color in the Grafted Scions and in the Progenies from the Grafted Scions. (English summary no p.323)

ナスの接木変異

I. 接木当代および接穂に由来する後代の胚軸色変異

平 田 豊

(岩手大学教育学部, 盛岡市)

接木変異の存在を明らかにする目的で、ナス2品種を用い、実生および果実のメントール接木実験を行った。その結果、接木当代および接穂に由来する自殖後代に胚軸色の変異が認められた。その変異の内容は *dd* (緑色胚軸) から *Dd* (紫色胚軸) および *DD* (濃紫色胚軸) から *Dd* への変異が大部分であった。しかし、*dd* から *DD* と *Dd* への同時変異 ($G_1S_2SH/SK(S)-7$) や *DD* から *dd* への変異 ($G_2S_2SK/SH(S)-4-22$) も認められた。また交雑の F_2 に対応する接木後代 (分離世代) では F_2 と同様、紫~濃紫色胚軸: 緑色胚軸 = 3:1 の分離比に適合する系統だけではなく、それに適合しない系統も存在した。なお、現在まで調査を行った胚軸色の変異率は 1.44% (93/6469) と高かった。

以上の結果は、これまでにナスで得られた接木変異と一致しているだけでなく、高等植物の DNA 処理後代に認められている変異の内容とも類似していた。

緒 言

近年接木変異のメカニズムとして高等植物の形質転換や形質導入の可能性が論じられている (PANDEY 1976, OHTA 1977, 太田 1977)。しかし、接木変異自体の遺伝的解明は未だ十分ではない。

本研究はまず接木変異の存在の有無を明らかにするために、ナスを材料として接木実験を進めてきた。すでに著者はトマトおよびナスの接木実験で接木当代および接穂に由来する自殖後代に果色変異を得ている。本報ではナスの接木当代および接穂に由来する自殖後代で得られた胚軸色の変異について述べる。

材料および方法

材料としては、すでに実験材料として用いられていたものを、さらに3世代自殖させた真黒ナス (*Solanum melongena* L. var. *depressum*) およびタマゴ白ナス (*S. melongena* L. var. *pumilio*, 以下白ナスと記す) を供試した。前者は濃紫色胚軸であり、後者は緑色胚軸 (低温条件下では淡紫色) であった。

接木の方法は実生の割接および果実の癒合による接木 (以下果接と記す) を行ったが、従来よりこの分野で行われているメントール法を適用した。実生接木は以下の様に行った。発芽後 7~10 日の実生胚軸を楔形に切り、それを播種後 2~3 か月の植物に割接した (Fig. 1)。接木後活着した植物の管理は台木の影響を穂木に強く及ぼすために、台木の方ではできるだけ繁茂させ、穂木の方は先端の展開葉 2~3 葉残し、他はすべて切除した。

一方、果接は RAJKI and PÁL (1966) および細田・小林 (1972) の方法を修正して行った。すなわち、果実長が 0.5~1 cm になった時、穂木に相当する果実は果実の先端より 1/2~2/3 を切り離

Fig. 1. Seedling grafting. The arrow shows the scion seedling which was grafted onto the stock at two to three months after sowing.

Fig. 2. Fruit grafting. a : Shinkuronasu was grafted onto Shironasu, b : Shironasu was grafted onto Shinkuronasu.

した部分を用い、台木に相当する果実は果梗に付着している果実の $1/2 \sim 1/3$ の部分を用いた。果接は穂木および台木双方の切り口の大きさの合ったもの同士を密着させ、ピンで両果実を留め、接木面をワセリンペーストで封じた。さらに、乾燥を防ぐため果接果実全体にパラフィン紙とビニールの二重袋を掛けた。この状態で7~10日すると接合部にカルスが形成され、癒合するので除袋し、ピンを抜いた (Fig. 2-a, b)。穂木果実はそのまま台木果実上で完熟するまで生育させた。

実生接木および果接のいずれの場合にも接木後代は穂木のみ由来している。また穂木および穂木果実には自然交雑を防ぐために、開花前にパラフィン紙の袋掛けを行った。

世代の表わし方は G_n で接木の回数を、 S_n で接穂からの自殖の回数を示し、接木の組合せは穂木/台木で表わした。また接木の方法は実生接木をS、果接をFと略記した。

結果および考察

Table 1 は真黒ナスと白ナスとの交雑結果を胚軸色に関して示したものである。 F_1 では真黒ナスの濃紫色胚軸は白ナスの緑色胚軸に対して優性であった。また F_2 では相反交雑とも紫~濃紫色胚軸：緑色胚軸=3:1 の分離比を示し、(真黒ナス×白ナス)×白ナスの B_1 は1:1 の分離比を示した。一方、(真黒ナス×白ナス)×真黒ナスおよび(白ナス×真黒ナス)×真黒ナスの B_1 はともに紫~濃紫色胚軸のみであった。以上の交雑結果より両品種の胚軸色は一对の遺伝子によって支配されていることが明らかである。建部 (1939, '44) に従えば、本研究で用いた両品種、交雑の F_1 ,

Table 1. Hypocotyl color in the crossings between Shinkuronasu and Shironasu

Crossing combination	Hypocotyl color		Expected ratio	Fitness	
	Purple to Dark purple	Green		χ^2	Probability
SK	335	0	1 : 0		0.99—
SH	0	335	0 : 1		0.99—
SH×SK F_1	174	0	1 : 0		0.99—
SK×SH F_1	125	0	1 : 0		0.99—
SH×SK F_2	706	237	3 : 1	0.009	0.90—0.95
SK×SH F_2	266	90	3 : 1	0.015	0.90—0.95
(SH×SK)×SK	44	0	1 : 0		0.99—
(SH×SK)×SH	0	1	1 : 1		
(SK×SH)×SK	50	0	1 : 0		0.99—
(SK×SH)×SH	54	59	1 : 1	0.224	0.50—0.70

SK : Shinkuronasu, SH : Shironasu

Table 2. Changes in hypocotyl color in the progenies from the grafted scions

Hypocotyl color in the previous generation	Graft progeny	Hypocotyl color		Genotypic change inferred
		Purple to Dark purple	Green	
	G ₁ S ₁ SK/SK (S)	154	0	
	G ₁ S ₁ SK/SK (F)	315	0	
	G ₁ S ₁ SH/SH (S)	0	219	
	G ₁ S ₁ SH/SH (F)	0	261	
	G ₁ S ₂ SK/SK (S)	56	0	
	G ₁ S ₂ SK/SK (F)	56	0	
	G ₁ S ₂ SH/SH (S)	0	58	
	G ₁ S ₂ SH/SH (F)	0	51	
<i>dd</i>	G ₁ S ₁ SH/SK (S)	9*	38	<i>dd</i> to <i>Dd</i>
<i>dd</i>	G ₁ S ₁ SH/SK (F)	12*	32	<i>dd</i> to <i>Dd</i>
<i>DD</i>	G ₁ S ₁ SK/SH (S)	31+3*	0	<i>DD</i> to <i>Dd</i>
<i>dd</i>	G ₁ S ₂ SH/SK (S)-7	40*	11	<i>dd</i> to <i>DD</i> , <i>dd</i> to <i>Dd</i>
<i>dd</i>	-10	1*	71	<i>dd</i> to <i>D-</i>
<i>dd</i>	G ₁ S ₂ SH/SK (F)-6	1*	112	<i>dd</i> to <i>D-</i>
<i>dd</i>	G ₁ S ₃ SK/SH (S)-18-21	1*	60	<i>dd</i> to <i>D-</i>
<i>dd</i>	-18-25	1*	40	<i>dd</i> to <i>D-</i>
<i>dd</i>	G ₂ S ₁ SH/SK (F)-3	1*	52	<i>dd</i> to <i>D-</i>
<i>dd</i>	G ₂ S ₂ SK/SH (S)-2-2	17*	42	<i>dd</i> to <i>D-</i>
<i>dd</i>	G ₂ S ₂ SK/SH (S)-4-19	1*	59	<i>dd</i> to <i>D-</i>
<i>DD</i>	-4-22	15	1*	<i>DD</i> to <i>dd</i>
<i>dd</i>	-4-25	1*	72	<i>dd</i> to <i>D-</i>
<i>dd</i>	G ₃ S ₁ SH/SK (F)-1	4*	56	<i>dd</i> to <i>D-</i>

G_n: number of successive graftings, S_n: number of successive progenies from the grafted scion, S: seedling grafting, F: fruit grafting. The genotypes *DD*, *dd*, *Dd* and *D-* show dark purple, green, purple and purple to dark purple hypocotyls, respectively. Variants are marked with an asterisk.

F₂, B₁ および接木後代のすべての植物の花冠にはアントシアニンの発現が認められたので、*P* 遺伝子はこれらすべての個体が有していたと考えられる。また胚軸にアントシアニンを発現する個体は果皮にもアントシアニンを発現したので、両品種の胚軸色は果皮のアントシアニンの発現を支配する *D-d* 遺伝子によって支配されていると考えられる。このことは TIGCHELAAR ら (1968) の結果とも一致している。従って、真黒ナスおよび白ナスの胚軸色はそれぞれ *DD* (濃紫色), *dd* (緑色) と表わすことができる。

Table 2 は接木後代における胚軸色変異の出現状態およびその遺伝子変異を推定した結果を示したものである。1回接木後自殖第1世代 (G₁S₁) では真黒ナスに接木した白ナスの実生接木区および果接区ともに緑色胚軸から紫色胚軸への変異が生じ、それらの自殖次代 (G₁S₂) では F₂ と同様紫～濃紫色胚軸と緑色胚軸とに分離した。また、白ナスに接木した真黒ナスの G₁S₁ 幼植物では真黒ナスの濃紫色胚軸と紫色胚軸変異個体との区別が明瞭でなかったが、それらの自殖次代 G₁S₂ で F₂ と同様に分離する系統が3系統存在したので、G₁S₁ での3変異個体の出現が確認された。これらの変異個体は茎葉および果皮のアントシアニンの発現が真黒ナスよりも少ないことから真黒ナスと区別できた。以上のような濃紫色胚軸および緑色軸から紫色胚軸への変異は G₁S₂, G₁S₃, G₂S₁, G₂S₂ および G₃S₁ でも認められた。それらの胚軸色の変異は *DD* ないしは *dd* より *Dd* への変異であり、一度出現した *Dd* 変異個体は自殖次代で F₂ と同様 *D-*と *dd* とに分離したとみなさ

Table 3. Genotypic changes inferred for hypocotyl color in the progenies from the grafted scions

Graft combination	Genotype of hypocotyl color in the graft progenies		
SH/SK(S) (dd/DD)	G ₁ S ₁ Dd*	G ₁ S ₂ D- + dd	
	G ₁ S ₁ dd	G ₁ S ₂ DD* + Dd* + dd	G ₁ S ₃ DD
			G ₁ S ₃ D-* + dd
SH/SK(F) (dd/DD)	G ₁ S ₁ Dd*	G ₁ S ₂ D- + dd	
	G ₂ S ₀ Dd*	G ₂ S ₁ D- + dd	
	G ₁ S ₁ dd	G ₁ S ₂ Dd*	G ₁ S ₃ D- + dd
	G ₂ S ₀ dd	G ₂ S ₁ dd	G ₂ S ₃ Dd*
SK/SH(S) (DD/dd)	G ₁ S ₁ Dd*	G ₁ S ₂ D- + dd	G ₁ S ₃ Dd*
	G ₂ S ₀ Dd*	G ₂ S ₁ D- + dd	
		G ₂ S ₁ DD + Dd + dd	G ₂ S ₂ dd*
	G ₁ S ₁ DD	G ₁ S ₂ Dd*	G ₁ S ₃ D- + dd
	G ₂ S ₀ DD	G ₂ S ₁ Dd*	G ₂ S ₂ D- + dd
		G ₂ S ₁ Dd*	G ₂ S ₃ D- + dd
SK/SH(F) (DD/dd)	G ₁ S ₁ DD	G ₁ S ₂ Dd*	G ₁ S ₃ D- + dd

Abbreviations are the same as in Tables 1 and 2.

じており、それらの大部分がホモ (DD および dd) よりヘテロ (Dd) への変異であった。しかし、前述したように劣性ホモ dd から優性ホモ DD およびその逆の変異も認められており、これらの結果を突然変異や自然交雑で考えることは困難であろう。

現在までに調査した 6469 個体のうちこのような変異個体は 93 個体も得られており、変異率は 1.44% とかなり高かった。

Table 4 は出現した接木変異個体の自殖次代における胚軸色の分離状態を示したものである。な

Table 4. Non-Mendelian segregations for hypocotyl color in the progenies from the grafted scions

Graft progeny	Hypocotyl color		Expected ratio	Fitness	
	Purple to Dark purple	Green		χ^2	Probability
G ₁ S ₂ SH/SK(S)-43	100	21	3 : 1	3.771	0.05-0.10
G ₁ S ₂ SH/SK(F)-18	296	76	3 : 1	4.918	-0.05
G ₁ S ₂ SK/SH(S)-18	113	16	3 : 1	10.917	-0.001
G ₁ S ₃ SH/SK(S)-43-31	49	6	3 : 1	5.824	-0.05
G ₁ S ₃ SH/SK(F)-1-2	53	5	3 : 1	8.300	-0.01
-1-3	2	26	3 : 1	68.762	-0.001
G ₁ S ₃ SH/SK(F)-6-4	24	35	3 : 1	37.068	-0.001
G ₁ S ₃ SK/SH(S)-18-4	7	62	3 : 1	154.787	-0.001
-18-24	47	5	3 : 1	6.564	-0.05
G ₂ S ₁ SH/SK(F)-1	6	46	3 : 1	111.692	-0.001
-2	6	53	3 : 1	132.250	-0.001

Abbreviations are the same as in Tables 1 and 2.

れた。しかし、G₁S₂SH/SK(S)-7 ではその自殖次代G₁S₃(S)-7 ではその自殖次代G₁S₃で F₂ と同様に分離した系統と濃紫色胚軸のみの系統とが存在したので、劣性ホモ dd より優性ホモ DD とヘテロ Dd への変異が同時に生じたものと推定された。さらに、G₂S₂SK/SH(S)-4-22 では濃紫色胚軸 DD より緑色胚軸 dd への変異も認められた。

Table 3 は交雑結果にもとづいて推定した接木当代および接木後代の胚軸色に関する遺伝子型を示したものである。実生接木および果接のいずれの場合も、異品種接木組合せの接木当代ないしは接木後代において胚軸色変異が生

おここには交雑 F_2 の分離比である紫～濃紫色：緑色＝3：1 に適合しなかった系統のみを取り上げたが、それらの系統は調査 83 系統のうち 11 系統を占めていた。この結果は、接木によって誘起された変異形質（遺伝子）が後代へ伝達される時に安定した伝達のされ方と不安定な伝達のされ方とを示している。

上述のような変異は接木をしない対照植物および同品種接木植物の後代には全く認められなかった。

これまでにナスを材料として接木当代ないし接木後代に変異を認めた例は篠遠（1955）をはじめ間（1956, '58）, STROUN ら（1963）によって報告されている。それらの結果はいずれも接木変異が交雑と同様な遺伝様式を示す場合だけでなく、交雑とは異なる遺伝様式の存在をも示している。本研究結果も基本的にこれまでの知見と一致している。

また果接による接木当代および接木後代の変異の出現については RAJKI and PÁL（1966）, 細田（1971）および細田・小林（1972）によって報告されているが、詳細な遺伝的解析はなく、いずれも変異出現の報告に止まっている。本研究では果接の接木当代および接木後代に得られた変異が実生接木で得られたものと同様であることを明らかにした。このことから、接木に用いる植物の部位が異っても、同一の変異の生ずることが示された。さらに、実生接木と果接による変異誘起のメカニズムが基本的には同一であることが示唆される。

近年、トウガラシを材料に OHTA and CHUONG（1975 a, b）は接木変異の詳細な遺伝的解明を行い、接木（ウイルス接種接木も含む）変異の内容として、ホモからヘテロへの変異だけではなく、優性ホモから劣性ホモおよびその逆の変異の存在をも明らかにした。この点に関しても本研究結果は彼らの結果と極めて一致している。しかし、接木変異や形質転換で度々出現するモザイク状変異は本研究では全く認められなかった。OHTA（1977）および太田（1977）は接木変異の内容、例えばモザイク変異や優性ホモから劣性ホモへの変異およびその逆の変異の存在が高等植物の DNA 処理当代および後代の変異の例（HESS 1969 a, b ; LEDOUX ら 1971, '74）と類似していることを認めた。さらに、接木部位の組織学的観察により、台木維管束細胞の退化核クロマチン断片が穂木部へ移行することを認めたことやウイルス接種接木により変異率の向上する結果を得たことから、接木変異のメカニズムとして形質転換や形質導入の可能性を推論した。現在未だ高等植物の形質転換は確証されていないが、接木変異のメカニズムとして形質転換（形質導入）の可能性が本実験からもうかがえる。

謝 辞

本研究を進めるに際し、有益な助言を賜った名古屋大学農学部蓬原雄三博士に厚く感謝の意を表します。

引 用 文 献

- 間 和夫 1956. 茄子の接木に関する生理学的並びに遺伝学的研究 第1報 品種間に行なわれた接木と色素の分析について. 育雑. 6 : 96~100.
 ——— 1958. 茄子の栄養雑種をめぐる問題. 生物科学 10 : 172~177.
 HESS, D. 1969a. Versuche zur Transformation an höheren Pflanzen; Induktion und konstante Weitergabe der Anthocyan-synthese bei *Petunia hybrida*. Z. Pflanzenphysiol. 60 : 348~358.
 ——— 1969b. Versuche zur Transformation an höheren Pflanzen; Weiterholung der Anthocyan-Induktion bei *Petunia* und erste Charakterisierung des transformierenden Prinzips. Z. Pflanzenphysiol. 61 : 286~298.
 細田友雄 1971. 接木雑種. 遺伝25(9) : 7~12.
 ———・小林幸弘 1972. ナスの果色の遺伝に及ぼす接木の影響. 育雑. 22 (別冊 2) : 174~175.
 LEDOUX, L., R. HUART and M. JACOBS 1971. Fate of exogenous DNA in *Arabidopsis thaliana*. In Infor-

- mative Molecules in Biological Systems (Ed. L. Ledoux) pp. 159~175. North-Holland Publishing Co., Amsterdam.
- , ——— and ——— 1974. DNA-mediated genetic correction of thiamineless *Arabidopsis thaliana*. *Nature* **249**: 17~21.
- OHTA, Y. and PHAN VAN CHUONG 1975 a. Hereditary changes in *Capsicum annuum* L. I. Induced by ordinary grafting. *Euphytica* **24**: 355~368.
- and ——— 1975 b. Hereditary changes in *Capsicum annuum* L. II. Induced by virus-inoculated grafting. *Euphytica* **24**: 605~611.
- 1977. Hereditary changes induced by grafting and by DNA application and their implication in *Capsicum* breeding. *Capsicum 77*: report of the third Eucarpia congress on genetics and breeding of red pepper (Ed. E. Pochard) pp. 147~153. Avignon-Montfavet.
- 太田泰雄 1977. 接木で変わる遺伝形質. サイエンス **7**: 100~113.
- PANDEY, K. K. 1976. Genetic transformation and "graft-hybridization" in flowering plants. *Theore. Appl. Genet.* **47**: 299~302.
- RAJKI, E. and GY PÁL 1966. Transplantation of a part of the berry fruit of *Solanum melongena* L. *Acta Agronomica Academiae Scientiarum Hungaricae* **15**: 301~309.
- 篠遠喜人 1955. ナスの接木実験. 科学. **25**: 602~607.
- STROUN, M., C. CH. MATHON and J. STROUN 1963. Modifications transmitted to the offspring, provoked by heterograft *Solanum melongena*. *Archives des Sciences, Geneve* **16**: 225~245.
- 建部民雄 1939. ナスの色の遺伝研究. 遺雑. **15**: 261~271.
- 1944. ナスの色の遺伝研究 (続報). 遺雑. **20**: 1~7.
- TIGCHELAAR, E. C., J. JANICK and H. T. ERICKSON 1968. The genetics of anthocyanin coloration in eggplant (*Solanum melongena* L.). *Genetics* **60**: 475~491.

Summary

In order to make it clear whether graft-induced changes could be identified, two eggplant cultivars, Shinkuronasu and Shironasu, were grafted in reciprocal combinations. The seedling and fruit graftings were performed, applying the so-called "Mentor method".

The changes in hypocotyl color observed both in the grafted scions and in the progenies derived from them, were either from *DD* (dark purple, Shinkuronasu type) or from *dd* (green, Shironasu type) to *Dd* (purple) in many cases. In addition, the unexpected changes from *dd* to *DD* and *Dd* in $G_1S_1SH/SK(S)-7$ and from *DD* to *dd* in $G_2S_2SK/SH(S)-4-22$ were also found.

The ratio of the changes in hypocotyl color was 1.44% (93/6469) in total, which was very high.

Furthermore, non-Mendelian segregation ratios for the hypocotyl color were found in the progenies from the grafted scions.

The phenomena observed in the present experiment were similar to those of transformation in higher plants such as *Petunia* and *Arabidopsis*.

Y. HIRATA

Faculty of Education, Iwate University, Morioka 020