ユスリカを指標とした 底質改善材（貝殻）の生態影響評価

村上 和仁¹・吾妻 咲季²・小浜 暁子³

¹ 正会員 千葉工業大学 先進工学部生命科学科 (〒275-0016 千葉県習志野市津田沼 2-17-1)
E-mail: kazuhito.murakami@p.chibakoudai.jp

² 日本ミクニヤ株式会社 (〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口 3-25-10)
E-mail: agatsuma@mikuniya.co.jp

³ 東北工業大学 工学部環境エネルギー学科 (〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町 35-1)
E-mail: hamaki@tohtech.ac.jp

好汚濁性種であるアカムシユスリカ幼虫 (*Propilocerus akamusi*) を用いて地域未利用資源としての貝殻散布に伴う生態系影響を評価し、最適散布量および底質改善材としての貝殻の有効性について検討を行った。アカムシユスリカの生存率は、未焼成の貝殻散布では徐々に減少するものの生存率は50%以上であったが、焼成系では100g/m²以上散布系から生存率が50%以下になった。LC₅₀ (半数致死濃度) は、未焼成系; 199g/m², 焼成系; 97g/m²となり、焼成処理系は未焼成系の0.5倍の散布量で同等の効果を示すことが示された。生態系保全と水質改善の両立が可能である地域未利用資源としての貝殻の最適散布量は、焼成処理100g/m²散布系と評価された。

Key Word; ecological influence assessment, eutrophicated lake, *Propilocerus akamusi*, regional unused resources, sediment improvement

1. 緒言

千葉県九十九里海岸沿いに位置する蓮沼海浜公園ボート池 (千葉県山武市) では、毎年夏季にアオコが発生し悪臭や景観の悪化などの問題が生じている。本池におけるアオコの優占種である藍藻類 *Anabaena* 属は、空中窒素固定能を有するため¹⁾、水中に十分なリンさえあれば増殖が可能であり、アオコ抑制のためにはリンの吸着除去を講じる必要がある。

リンの吸着除去に着目して、各種底泥改善材が検討され実用化されてきているが、散布先の生態系、とりわけ生物相に及ぼす影響については検証事例が少ない²⁾。

本研究では、底質改善材として地域未利用資源である貝殻に着目し、その散布に伴う生態系影響評価として、有機汚濁指標種であるアカムシユスリカ幼虫 (*Propilocerus akamusi*) を用いて、最適散布量および底質改善材としての貝殻の有効性について検討した。

2. 実験方法

(1) 蓮沼海浜公園ボート池

千葉県山武市の蓮沼海浜公園ボート池 (写真-1) は、九十九里海岸から350m内陸に位置しており、池の表面積: 10,000m², 水深平均: 0.7m, 容積: 7,000m³である。本池は流入河川がなく、流入は降雨もしくは地下水 (海水) の浸透であり、強閉鎖的環境の汽水湖となっている。蓮沼海浜公園ボート池では夏季に藍藻類によるアオコが発生し、悪臭や景観の悪化などの問題が起きており、富栄養化対策として過去に水抜きによる底泥の天日干しや一部底泥の浚渫などを施工したが、現在も夏季のアオコ発生を抑制できていない。底泥中のペントスの優占種は好汚濁性種のユスリカ属が大半を占めており、生物相の観点からも富栄養化状態であることが示されている^{3,4)}。

(2) 影響評価試験

供試地域未利用資源として、隣接する九十九里海岸に多量に存在するアカガイ (*Anadara broughtonii*) の貝殻に着目し、この貝殻を1~3 mmの大きさに粉碎して供試した (写真-2)。

下水試験方法⁵⁾における生態系影響評価試験では目的

に応じて300~1,000mL容量程度の容器を用いることとなっていることから、本研究では、高さ:14cm、直径:7cm、容量:480mLのガラス容器を使用し、ボート池の底泥厚・量および水深から比率を算出し、底泥100g(湿重)と池水380mLを充填した系(写真-3)を模擬生態系(マイクロコズム)として底泥処理効果を評価解析した。

培養条件は、温度25℃、照度2,400 lx ($140.3 \mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)、明暗周期 (Light/Dark = 12/12 hr)、静置培養、培養期間は10日間とし、培養系は、未処理系(非散布系)、10g/m²、50g/m²、100g/m²、150g/m²、200g/m²散布系とした。なお、マイクロコズムへの散布量が微量となるため、散布に際しては可能な限り散布ムラが生じないように留意した。

影響評価種(指標生物種)としてのアカムシユスリカ幼虫(*Prosilocerus akamusi*)は、蓮沼海浜公園ボート池の底泥中から採取した。培養器の大きさを考慮して、各容器に10個体ずつ投入し、培養終了後に底泥から回収し、未処理系と比較して、散布系の生存率s・死亡率d・羽化率eを算出した。なお、アカムシユスリカは湖沼性ユスリカの一種で、富栄養化の進行した琵琶湖や諏訪湖や霞ヶ浦などでは、大量発生が問題となっている。幼虫は通常二年がかりで成長して終齢幼虫は20mm内外に達し、幼虫期の大半は湖底の泥の中に潜って有機物や細菌類などを摂取して冬期のみ活動し、成虫は秋に出現する⁶⁾。また、幼虫は湖沼生態系においては腐食連鎖の中心に位置しており、生態系全体への影響を評価する有効な指標となり得る。ユスリカ(*Chironomus yoshimatsui*)を用いた底質毒性試験法はOECDテストガイドラインや化審法にも記載されている(OECD TG218/219、化審法TG)⁷⁸⁾。

本研究では、貝殻散布による底生生物への影響を検討するとともに、底泥での栄養塩濃度の変化をみるために底泥間隙水の分析も行った。底泥間隙水は、底泥50~100gを遠沈管に入れ、2,000~3,000rpmで30min遠心分離して抽出した。底泥間隙水の分析項目は、T-N、NH₄-N、NO₂-N、NO₃-N、T-P、PO₄-P、T-S、pHとした。

3. 結果および考察

(1) アカムシユスリカ幼虫の生存に及ぼす影響

図-1、2にアカムシユスリカ幼虫の各散布系における生存率sおよび死亡率dを示した。なお、本実験では、貝殻散布系において羽化がみられなかったため、グラフには記載していない。各散布量における生存率は非散布系で100%、10g/m²散布系で、未焼成系;73.7%、焼成系;68.4%、50g/m²散布系で、未焼成系;61.9%、焼成系;61.9%、100g/m²散布系で、未焼成系;61.9%、焼成系;47.6%、150g/m²散布系で、未焼成系;52.4%、焼成系;38.1%、200g/m²散布系で、未焼成系;52.4%、焼成系;28.6%であった。これらの結果より、貝殻の散布量が多くなるに

写真-1 蓮沼海浜公園ボート池

写真-2 粉砕した貝殻

写真-3 培養系としてのマイクロコズム

つれ、生存率が徐々に低くなっていることが示された。また、未焼成系では200g/m²散布でも半数が生存していたが、焼成処理を施した散布系では、100g/m²散布系から生存率が半数以下となり、貝殻散布によって生態系に影響が生じることが示された。

貝殻の散布量とアカムシユスリカ幼虫の生存率sをプロットし、LC₅₀(50% Lethal Concentration)を図-3に示した。LC₅₀とは、半数致死濃度を意味しており、化学物質の急性毒性の強さを示す代表的指標として利用される⁷⁾。50%値が用いられる理由は、統計学的に最もバラつきが小さいとされるからである⁷⁾。貝殻散布のLC₅₀は、未焼成系;199g/m²、焼成系;96g/m²となり、焼成処理を施すと影響が大きくなり、焼成処理系は未焼成系の0.5倍の散布量で同等の効果を示した。しかし、LC₅₀の値にかかわらず、未焼成系・焼成系のいずれにおいてもアカムシユスリカ幼虫の生存率低下がみられているため、底泥間

隙水中の栄養塩濃度, pH の分析結果から, アカムシユスリカ幼虫の生存に及ぼす影響を検討することとした。

(2) 底泥間隙水に及ぼす影響

各水質項目の抑制率は(1)式より算出した。

$$\text{抑制率 (\%)} = \{(C_0 - C) / C_0\} \times 100 \quad \cdots(1)$$

C_0 : 非散布系における濃度

C : 散布系における濃度

図-4, 5 に底泥間隙水中のリンの抑制率を示した。最大散布量である 200g/m^2 散布系では, T-P において未焼成系: 56.6%, 焼成系: 65.5%, $\text{PO}_4\text{-P}$ においては未焼成系: 50.3%, 焼成系: 66.3%の抑制率となり, 地域未利用資源としての貝殻の散布量が多くなるにつれ, さらに焼成処理を施すことによって抑制率が高くなることが示された。これは(2)式のように, 貝殻の主成分であるカルシウムイオンがリン酸水素イオンと化学結合し, 難溶性のリン酸カルシウムを形成したためと考えられる。

焼成処理を施すことにより, 貝殻の間隙率が上昇し, 化学反応の場である表面積が増加したことにより, 焼成処理を施した系で抑制率が高くなったと考えられる。このことにより, 地域未利用資源としての貝殻は, 富栄養化が進行し, 栄養塩が蓄積した汚泥にも, 底質改善材として高い効果が得られることが期待される。

図-6~9 に底泥間隙水中の窒素 (T-N , $\text{NH}_4\text{-N}$, $\text{NO}_2\text{-N}$, $\text{NO}_3\text{-N}$) の抑制率をそれぞれ示した。最大散布量である 200g/m^2 散布系における窒素の抑制率は, T-N では未焼成系: 19.7%, 焼成系: 34.6%, $\text{NH}_4\text{-N}$ では未焼成系: 36.2%, 焼成系: 81.0%, $\text{NO}_2\text{-N}$ では未焼成系: 56.4%, 焼成系: 62.8%, $\text{NO}_3\text{-N}$ では未焼成系: 11.1%, 焼成系: 11.1%となった。特に $\text{NH}_4\text{-N}$, $\text{NO}_2\text{-N}$ において高い抑制率となった。これは, 地域未利用資源としての貝殻の散布に伴い, Wash Out (洗い出し) 効果⁹⁾が発生し, 底泥中の $\text{NH}_4\text{-N}$ が水中に溶出し, 底泥間隙水中の濃度が減少したためと考えられる。 T-N の抑制率は $\text{NH}_4\text{-N}$ および $\text{NO}_2\text{-N}$ と比較して低い抑制率であるが, これは $\text{NO}_3\text{-N}$ の低い抑制率の影響を受けたためと考えられる。

図-10 に底泥間隙水中の pH を示した。未焼成系では, pH が直上水同様中性で散布量に関係なく一定であった。しかし, 焼成処理を施した系では, 散布量が 50g/m^2 までは pH8~9 で中性~弱アルカリ性であるが, 生存率が半数以下となった 100g/m^2 散布系では pH が 12 まで上昇しアルカリ性を示した。pH の変化については, 以下の化学反応が地域未利用資源としての貝殻を散布することによって起こる。

未焼成系:

焼成系:

さらに, Wash Out 効果が重なり, 特に焼成系において pH が上昇する。焼成系の 50g/m^2 散布系まで, pH の急激な

上昇がみられなかった理由として, *Propsilocerus akamusi* を含めユスリカの多くはデトリタス食・藻類食であり有機物を摂食するが, ユスリカの摂食作用により有機物量が減少したため結果的に有機物から細菌類などにより分

図-1 未焼成系における各散布量の生態影響

図-2 焼成系における各散布量の生態影響

図-3 各散布材における LC_{50}

解生成される無機物量が減少し、Wash Out 効果が緩和されて pH の上昇が抑えられたと考えられる。しかし、散布量が多くなるにつれ、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ の濃度が高くなり、さらに Wash Out 効果が促進されたため、 $100\text{g}/\text{m}^2$ 散布量から pH が上昇したものと考えられる。

図-11 に全硫化物の抑制率を示した。貝殻散布により底泥中の硫化物量が減少し、未処理系と比較すると、焼成処理を施した $200\text{g}/\text{m}^2$ 散布系は 28% の抑制効果を示した。これは、散布した貝殻に硫化水素が吸着したことにより、硫化物の発生が抑制されたためと考えられる。

以上の結果から、地域未利用資源としての貝殻散布における *Propilicoccus akamusi* への生態影響は、栄養塩の貝殻への吸着固定による水・泥中の栄養塩現存量の減少に伴う食物源である細菌類や微細藻類の減少と、pH の急激な上昇が因子として推察された。

(3) 最適散布量の検討

アカムシユスリカ幼虫の生存率と各栄養塩の抑制率を図-12, 13 に示した。未焼成系では、生存率は 50% 以上となり、T-P は散布量に比例して抑制できたが、T-N は 20% 弱の抑制効果しか得られなかった。一方、焼成系では、生存率は散布量に比例して減少したが、T-P の抑制率は散布量の増大に伴って増加し、T-N は 10~40% の抑制効果が得られた。この結果から、生態系保全および水質改善の両立を図ることが可能となる散布量として、本研究における実験系では、指標生物であるアカムシユスリカの 50% が生存し、かつ窒素・リンの同時抑制が可能である焼成系 $100\text{g}/\text{m}^2$ 散布が適切であると評価した。

なお、貝殻の主成分である Ca の水質・底質改善を目的とした散布に係る生態系影響評価については、微生物生態系モデルであるマイクロコズムを用いた試験結果が報告されており¹⁰⁾、マイクロコズム無影響濃度 (m-NOEC) は $\leq 5.0\text{mg}/\text{L}$ と評価されている。また、水質改善においてアオコ・赤潮といった水の華の発生を抑制するに十分な効果を示す散布量として、 $100\text{g}/\text{m}^2$ と報告されている²¹⁾。本研究で得られた最適散布量とこれらの数値との整合性については、今後さらなる検討を進めていく必要がある。また、貝殻散布による栄養塩類の吸着効果は一定量で飽和となることから、その効果は一過性のものと考えられるが、実湖沼における効果の持続性や実施の際のコストについては今後の検討課題である。

貝殻散布により、一次消費者であるアカムシユスリカ幼虫の生存率減少が確認された。これは、地域未利用資源としての貝殻散布によって、水中の栄養塩濃度が減少し、それを栄養とするデトリタスが減少し、そしてデトリタスを食物源とするアカムシユスリカ幼虫が減少したこと、さらに焼成処理を施した系では pH の上昇によって、アカムシユスリカ幼虫に負の影響を及ぼしたことによるものと考えられる。貝殻散布に伴い生態系における食物連鎖の基盤を構成する一次消費者であるアカムシユスリカ幼虫の個体数が減少したことから、食物連鎖におけるより上位の捕食者への影響、さらには生態系構造全体への影響が懸念される。今後、複数生物種が共存する系における食物連鎖を考慮した貝殻散布の影響について検討する必要がある。

図-4 各散布量における T-P の抑制率

図-5 各散布量における $\text{PO}_4\text{-P}$ の抑制率

図-6 各散布量における T-N の抑制率

図-7 各散布量における $\text{NH}_4\text{-N}$ の抑制率

図-8 各散布量における NO₂-N の抑制率 図-9 各散布量における NO₃-N の抑制率

図-10 各散布量における pH

図-11 各散布量における T-S の抑制率

図-12 未焼成系における生存率と栄養塩の抑制率との関係

図-13 焼成系における生存率と栄養塩の抑制率との関係

4. まとめ

地域未利用資源としての貝殻散布に伴うアカムシスリカ幼虫を指標とした生態系影響評価は以下のようにまとめられる。

- ① 地域未利用資源としての貝殻散布に伴うアカムシスリカ幼虫 (*Prosilocerus akamusi*) の生存率は、非散布系で 100%，未焼成系では、10g/m² 散布系；73.7%，50g/m² 散布系；61.9%，100g/m² 散布系；61.9%，150g/m² 散布系；52.4%，200g/m² 散布系；52.4%，焼成系では、10g/m² 散布系；68.4%，50g/m² 散布系；61.9%，100g/m² 散布系；47.6%，150g/m² 散布系；38.1%，200g/m² 散布系；28.6%であった。

- ② 散布量の増加に伴い、未焼成系では徐々に生存率が減少しているが、200g/m² 散布系でも生存率は 50%以上であった。一方、焼成系では 100g/m² 以上の散布量から生存率が 50%以下になった。貝殻散布の生態毒性を評価するために LC₅₀ (50% Lethal Concentration：半数致死濃度) を算出したところ、未焼成系；199g/m²，焼成系；97g/m² となった。これより、焼成処理系は未焼成系の 0.5 倍の散布量でほぼ同等の効果が得られることが示された。

- ③ 各散布量におけるアカムシスリカの生存率と水質 (T-N, T-P) の抑制率を比較すると、生態系保全・水質改善の両立を可能とする地域未利用資源としての貝殻の最適散布量は、本研究の実験系においては焼成

処理 100g/m² 散布と評価された。

- ④ 複数生物種が共存する系における食物連鎖を考慮した貝殻散布の影響について検討する必要がある。

謝辞：本研究を遂行するにあたり、千葉県山武市地域整備センターならびに蓮沼海浜公園管理事務所の関係各位に多大なるご理解とご協力を賜った。ここに記して感謝の意を表する。

参考文献

- 1) 渡邊眞之：日本アオコ大図鑑，誠文堂新光社，2007.
- 2) 村上和仁，天野佳正，瀧 和夫，立本英機，松島 眸，本田善則：環境因子としての底質処理が生態系群集構造に及ぼす影響，環境情報科学論文集，Vol.16, pp.257-262, 2002.
- 3) Murakami, K., Ishii, T., Taki, K. and Matsushima, H. : Seasonal Changes of Phytoplankton in Seaside Park Pond on Kuju-rihama Coastal Line, Japan, *Conference Papers on 7th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment (MEDCOAST05)*, Vol.1, pp.581-590, 2005.
- 4) 村上和仁，吾妻咲季，中村明彦：津波による海浜公園池に
- 5) おける生態系構造の変化，土木学会論文集 B3 (海洋開発)，Vol.69, No.2, pp.I_19-I_24, 2013.
- 6) 公益社団法人日本下水道協会：下水試験方法—2012 年版—，2012.
- 7) 日本ユスリカ研究会：図説日本のユスリカ，文一総合出版，2010.
- 8) 日本環境毒性学会：生態影響評価試験ハンドブック—化学物質の環境リスク評価—，朝倉書店，2003.
- 9) 菅谷芳雄：ユスリカを用いた底質毒性試験法に関する国内での検討，環境毒性学会誌，Vol.8, No.2, pp.49-54, 2005.
- 10) 中原真哉，平岡喜代典，山本民次，上嶋英機：石灰灰造粒物の覆砂による底質改善，水環境学会誌，Vol.35, No.10, pp.159-166, 2012.
- 11) Murakami, M., Hayashi, H. and Shimada, R. : Microcosm for Impact Risk Assessment of Sediment Remediation Materials on Aquatic Ecosystem, *Journal of Water and Environmental Technology*, Vol.9, No.4, pp.401-410, 2011.
- 12) Murakami, K., Agatsuma, S. and Inoue-Kohama, A. : Sediment Improvement Materials Comparison applied to Eutrophicated Seaside Park Pond, *International Journal of GEOMATE*, Vol.10, pp.2058-2064, 2016.

(2017.2.2 受付)

ECOLOGICAL INFLUENCE ASSESSMENT OF SHELL FRAGMENT AS SEDIMENT IMPROVEMENT MATERIAL USING CHIRONOMID LARVA AS BIOTIC INDICATOR

Kazuhito MURAKAMI, Saki AGATSUMA and Akiko INOUE-KOHAMA

In this study, ecological influence assessment, using *Prosilocerus akamusi* as biotic indicator, of shell fragment as sediment improvement material of regional unused resources was conducted. Survival rate of *Prosilocerus akamusi* were 100% in unsprinkled system (control), 73.7% in 10g/m², 61.9% in 50g/m², 52.4% in 100g/m², 52.4% in 150g/m² and 52.4% in 200g/m² in unburnt treatment system, and 68.4% in 10g/m², 61.9% in 50g/m², 47.6% in 100g/m², 38.1% in 150g/m² and 28.6% in 200g/m² in burnt treatment system. LC₅₀ (50% Lethal Concentration: median lethal concentration) were estimated as 199g/m² in unburnt treatment system and 97g/m² in burnt treatment system, respectively. The optimal application rate of shells as regional unused resources for balancing ecosystem conservation and water quality improvement was estimated to be 100g/m² burned system. Influence of shell sprinkling using multi species including system considering of food chain should be investigated in future study.