硫酸抱合型ドパミン (Dopamine-4-O-sulfate) の 陽性変力作用とそれに関わるレセプター

南 勝^{*1} 竹中 加代子^{*1} 川口 知美^{*1}
遠藤 泰^{*1} 大野 孝正^{*2} 竹尾 聡^{*3}
萩原 幸一郎^{*4}

ヒトの循環血中のドパミン (DA) のおよそ90% は硫酸抱合型である。生体内には phenol-sulfotransferase によってカテコールの3位あるいは4位が硫酸抱合した DA-3-O-sulfate と DA-4-O-sulfate が存在する。われわれは、硫酸抱合型ドパミンの生理学的意義を追究するために、DA-4-O-sulfate を合成し、DA-4-O-sulfate が種属特異性なくモルモット心房筋およびウサギ乳頭筋標本において陽性変力作用をもつことを見いだした¹⁾。今回は DA-4-O-sulfate の陽性変力作用に関与するレセプターについて検討したので報告する。

方法: 1) DA-4-O-sulfate は、Harbeson らの方法²⁾によって合成した。2) モルモットおよびウサギ心筋の sulfatase 活性を Roy の方法によって測定した³⁾。蛋白量を Lowry 変法により測定し活性値を補正した。3) ウサギ摘出乳頭筋標本は Locke-Ringer 液中にてパルス幅 5 msec, 1 Hz の電気刺激を加え、等尺性張力を strain gauge transducer を介し記録した。 α , β 遮断薬あるいは D₂ 遮断薬前処置後の DA-4-O-sulfate による収縮力の変化を測定した。4) DA-4-O-sulfate の各種レセプターに対する親和性を検討するため radioligand を用いて binding assay を行った。

結果: 1) DA-4-O-sulfate によって、ウサギ乳

頭筋はモルモット心房筋とはほぼ同じ程度の陽性変力作用を示した。DA-4-O-sulfate 4.3×10^{-4} M で約 20% の等尺性張力の増加がみられた。この陽性変力作用は α 遮断薬 prazosin (10^{-6} M), β 遮断薬 propranolol (10^{-6} M および 10^{-5} M), $\alpha + \beta$ 遮断薬 amosulalol (10^{-7} M および 10^{-5} M) およびドパミン D₂ 遮断薬 haloperidol (2.5×10^{-7} M および 2.5×10^{-6} M) のそれぞれ高濃度を前処置しても抑制されなかった。2) モルモットおよびウサギ心筋における sulfatase 活性はどちらも心室筋よりも心房筋のほうが有意な高値を示した。3) α_1 , α_2 , β , D₁, D₂ レセプターのほか、5-HT₁, 5-HT₂, 5-HT₃, M₁, M₂, M₃, ベンゾジアゼピン, NMDA, GABA_A, ANF, AVP, PAF, AII レセプターならびにカルシウム・チャンネルのリガンドも DA-4-O-sulfate に対し有意な抑制を示さなかった。

考察: DA-4-O-sulfate が陽性変力作用を有することをわれわれは最初に見いだした。種属特異性はなくモルモット心房筋およびウサギ乳頭筋においても陽性変力作用は確認された。この陽性変力作用は α_1 遮断薬, β 遮断薬, $\alpha + \beta$ 遮断薬あるいは D₂ 拮抗薬を前処置しても抑制されなかった。これは、硫酸抱合型 DA は α_1 , α_2 , β_1 , β_2 ならびに D₂ レセプターに親和性をもたないという Kyncl ら⁴⁾の成績に一致した。また、遊離型 DA は α および β 遮断薬の共存下で陽性変力作用が抑制されるという Endoh らの報告⁵⁾がある。 $\alpha + \beta$ 遮断薬の amosulalol によって DA-4-O-sulfate の

*1 東日本学園大学薬学部薬理学
〒061-02 北海道石狩郡当別町字金沢 1757

*2 同 薬品製造化学教室

*3 東京薬科大学第一薬理学講座

*4 日清製粉株式会社医薬研究所

Tab. Affinity of Dopamine-4-O-sulfate for Several Receptors

Receptor	Ligand	Concentration	% Inhibition
α_1 -adrenergic	^3H -Prazosin	10^{-5}M	-5
α_2 -adrenergic	^3H -Rauwolscin	10^{-5}M	15
β -adrenergic	^3H -DHA	10^{-5}M	-2
Dopamine D_1	^3H -SCH 23390	10^{-5}M	-2
Dopamine D_2	^3H -Raclopride	10^{-5}M	23
Angiotensin II	^3H -Angiotensin	10^{-5}M	-3
Atrial Natriuretic Factor	^{125}I -ANF	10^{-5}M	7
Benzodiazepine	^3H -Flunitrazepam	10^{-5}M	14
Calcium Channel	^3H -Nitrendipine	10^{-5}M	1
Excitatory Amino Acid	^3H -Glutamate	10^{-5}M	-15
GABA _A	^3H -Muscimol	10^{-5}M	5
Muscarinic M_1	^3H -Pirenzepine	10^{-5}M	16
Muscarinic M_2	^3H -NMS	10^{-5}M	12
Muscarinic M_3	^3H -NMS	10^{-5}M	2
NMDA	^3H -CGS-19755	10^{-5}M	-1
Platelet Activating Factor	^3H -PAF	10^{-5}M	4
Serotonin 5-HT ₁	^3H -5-HT	10^{-5}M	13
Serotonin 5-HT ₂	^3H -8-OH-DPAT	10^{-5}M	10
Serotonin 5-HT ₃	^3H -GR-65630	10^{-5}M	-13
Vasopressin	^3H -AVP	10^{-5}M	6

IC₅₀, K_i and Hill: not determined.

陽性変力作用が抑制されなかったことより、この陽性変力作用はすべてが遊離型 DA に起因するとはいいがたい。しかしながら心臓、とくに心房に sulfatase が多く存在することから、DA-4-O-sulfate の一部は脱抱合され遊離型 DA となり心臓に直接作用している可能性が示唆された。また、レセプター結合実験で検討したおよそ 20 のレセプターについて、特異的 ligand の 10^{-5}M という濃度で 50% を超える抑制を示すものがみられなかった。陽性変力作用の発現機序については、今後さらなる検討を要する。

結語：DA-4-O-sulfate はモルモット摘出心房標本およびウサギ摘出乳頭筋標本において陽性変力作用を示す生体内生理活性物質であることが示された。現在のところ、関連レセプターを特定するに至っていない。

文 献

- 1) Minami, M., Takenaka, K., Nishikiori, M. et al.: Positive inotropic effect of dopamine-4-O-sulfate; a preliminary study. *Asia Pacific J. Pharmacol.*, **6**: 165-170 (1991).
- 2) Harbeson, S. L., Kerkman, D. J. and DeBernardis, J. F.: A facile synthesis of dopamine-4-sulfate. *Org. Prep. Proc. Int.*, **15**(4): 243-249 (1983).
- 3) Roy, A. B.: The sulphotase of ox liver. *Biochem. J.*, **53**: 12-15 (1953).
- 4) Kyncl, J. J., Bunker, S. A., Brondyk, H. et al.: Adrenergic and dopaminergic properties of dopamine sulfoconjugates. *J. Cardiovascular Pharmacol.*, **7**: 1198-1204 (1985).
- 5) Endoh, M., Schumann, H. J., Krappitz, N. et al.: α -Adrenoceptors mediating positive inotropic effects on the ventricular myocardium: Some aspects of structure-activity relationship of sympathomimetic amines. *Jpn. J. Pharmacol.*, **26**: 179-190 (1976).