症例報告

リファキシミンにより肝性脳症の再発を予防できた 血液透析患者の1例

野田 竜之介 権 杞 映 松 永 典子 吉 川 隆 広
内 田 梨 沙 大 瀬 貴 元
JCHO 東京新宿メディカルセンター腎臓内科

キーワード：肝性脳症，CPSE，血液透析，門脈—大循環シャント，リファキシミン
〈要旨〉

78 歳女性。X-11 年に妊娠高血圧症候群を原因とした慢性腎不全に対して血液透析を導入された。X-1 年 10 月頃から透析中に意識障害を呈し，他院で高アンモニア血症による意識障害と診断され，ラクツロース，分岐鎖アミノ酸製剤を開始された。X 年 3 月末から再び透析終了時に意識障害が出現し，5 月に当科に入院した。血清アンモニア値 190 $\mu\text{g}/\text{dL}$ ，造影 CT で胃腎・脾腎シャントを認め，非アルコール性脂肪肝炎による肝硬変と診断した。透析後に意識障害を呈する経過から，血液透析によって肝外シャント血流が増加することで肝血流が低下し，肝性脳症を発症したと考えられた。IVR や手術などの侵襲的な処置は希望しなかったため，アンモニア産生菌抑制の目的でリファキシミンを開始した。血清アンモニア値は速やかに 100 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 前後まで低下し，意識状態も改善した。退院後 1 年にわたり内服を継続し，再発を認めずに良好な状態を保っている。

Rifaximin prevented the recurrence of hepatic encephalopathy in a hemodialysis patient – A case report

Ryunosuke Noda, Giyoung Kwoun, Noriko Matsunaga, Takahiro Yoshikawa, Lisa Uchida,
Takamoto Ohse
Division of Nephrology, JCHO Tokyo Shinjuku Medical Center

Keywords: hepatic encephalopathy, CPSE, hemodialysis, portosystemic shunts, rifaximin
〈Abstract〉

A 78-year-old female was transferred to our facility with a disturbance of consciousness. She had been undergoing hemodialysis for chronic renal failure caused by pregnancy-induced hypertension for 11 years. One year earlier, she had started to experience disturbances of consciousness during or after dialysis sessions. She was subsequently diagnosed with hyperammonemia at another hospital and was administered lactulose and branched-chain amino acid therapy. Her condition improved; however, her symptoms had recurred two months ago, and she was admitted to our hospital. Laboratory tests showed that her serum ammonia level was 190 $\mu\text{g}/\text{dL}$. Contrast-enhanced computed tomography revealed a portosystemic shunt, and she was diagnosed with cirrhosis and hepatic encephalopathy secondary to non-alcoholic steatohepatitis. The hepatic encephalopathy was attributed to reduced intrahepatic blood flow secondary to the hemodialysis-induced diversion of blood into extrahepatic shunts. The patient and her family refused invasive treatment; therefore, rifaximin was administered to eliminate ammonia-producing gastrointestinal bacteria. Her serum ammonia level rapidly decreased to approximately 100 $\mu\text{g}/\text{dL}$, and her level of consciousness improved and has remained stable for a year.

緒 言

慢性再発性の肝性脳症の原因の一つに門脈―体循環シャントによって肝血流が低下し意識障害をきたす chronic portal-systemic shunt encephalopathy (CPSE) が知られている¹⁾。肝硬変を合併した血液透析患者は、透析による電解質変化や便秘、易感染性などの特徴から肝性脳症を発症しやすいと考えられている。また、血液透析中の除水により大循環圧の低下をきたし、その結果シャント血流が増加し肝血流が低下することによって CPSE を発症する、と報告されている^{2,3)}。CPSE の治療は門脈―体循環シャントに対してバルーン下逆行性経静脈的塞栓術 (balloon occluded retrograde transvenous obliteration: B-RTO) などの画像下治療 (interventional radiology: IVR) が広く行われているが、保存療法で良好な転帰を得たという報告は少ない。近年、リファキシミンが肝性脳症における高アンモニア血症に対する腸管非吸収性抗菌薬として国内ではじめて承認され、その治療効果、再発予防効果が期待されている一方で、透析患者に対するリファキシミン投与の報告は乏しい。今回、血液透析後に意識障害を繰り返した CPSE の症例に対してリファキシミンを導入し、1 年間再発や薬剤による有害事象を認めず良好な転帰を辿った貴重な症例を経験したので報告する。

I. 症 例

症例: 78 歳, 女性。

主訴: 意識障害。

現病歴: X-11 年に妊娠高血圧症候群を原因とした慢性腎不全により血液透析を導入された。X-1 年 10 月頃、血液透析中に意識障害が出現し、他院に入院した。高アンモニア血症による意識障害と診断され、ラクツロース、分岐鎖アミノ酸製剤の内服を開始し、症状は軽快した。X 年 3 月末から 2 回、透析終了時に意識障害が出現したが症状は自然軽快していた。アンモニア値はおおの 190, 132 $\mu\text{g/dL}$ と高値であった。5 月 Y 日に再度意識障害が出現したため精査目的に当院に紹介受診され、同日入院となった。

既往歴: 妊娠高血圧症候群 (X-46 年発症)、臍胸、糖尿病。

家族歴: 特記事項なし。

生活歴: 機会飲酒、喫煙歴なし。アレルギーなし。

内服歴: ラクツロースシロップ 65% 180 mL, 分岐

鎖アミノ酸製剤 40 g, ビルダグリプチン 50 mg, ピタバスタチン 1 mg, クエン酸第二鉄水和物 1,000 mg, シナカルセト塩酸塩 50 mg, アメジニウムメチル硫酸塩 10 mg (透析開始時)。

理学的所見: 身長 140 cm, 体重 71.6 kg, BMI 36.3 kg/m^2 , 体温 36.7°C, 血圧 114/51 mmHg, 脈拍 73 bpm, SpO_2 98% (室内気)。

意識レベル JCS I-2, 肝性脳症昏睡度 (犬山分類) I, 羽ばたき振戦を認めない。眼瞼結膜貧血はない。眼球結膜黄染はない。心音整, 呼吸音清で副雑音を聴取しない。腹部は平坦軟, 腸蠕動音正常で圧痛を認めない。両側下腿浮腫を認める。

血液検査所見: 入院日の血液透析前の血液検査 (表 1) では、アンモニア 150 $\mu\text{g/dL}$, 血小板 11.2 万/ μL , アルブミン 2.9 g/dL, ALP 703 U/L, γ -GTP 131 U/L, AST, ALT, T-Bil, PT-INR の上昇は認めず, Child-Pugh 分類では grade B である。ヒアルロン酸 569 ng/mL, IV 型コラーゲン 505 ng/mL と肝線維化マーカーの上昇を認める。

腹部超音波検査: 肝は表面不整で辺縁は鈍で、実質は不均質かつ粗造である。輝度上昇しており脂肪肝、慢性肝障害の所見に矛盾しない。

腹部造影 CT 検査: 胃噴門部に静脈瘤, および胃体上部～食道周囲に側副血行路の著明な発達を認める。胃腎シャント, 脾腎シャントを認める。腹水や脾腫は認めない (図 1)。

経過: 血清アンモニア値の上昇, および CT 上肝硬変・脾腎シャント・胃腎シャントを認め、その他の意識障害の原因を示唆する所見は認めなかったため、肝性脳症と診断した。透析後に繰り返し発症していたことから、血液透析の除水により下大静脈と門脈との相対的圧格差が拡大し、胃腎シャントや脾腎シャントなどの門脈―体循環シャントの血流が増加したことが発症誘因と推定され、CPSE と診断した。肝硬変の原疾患としては、高度肥満・糖尿病・フェリチン上昇・脂肪肝を認め、その他の所見に乏しいことから非アルコール性脂肪肝炎 (nonalcoholic steatohepatitis: NASH) に伴う肝硬変と診断した。前医ですでに血液濾過透析 (hemodiafiltration: HDF) は施行されており、透析前後の大幅な血圧の変動はなかったため、透析条件の変更は行わなかった。入院同日から分岐鎖アミノ酸製剤, ラクツロースの内服を継続したがアンモニア値, 意識障害の改善を認めなかったため、第 6 病日からリファキシミン 1,200 mg/日を開始した (図 2)。その後アンモニア値は低下し、意識状態も意識清明まで改善した (診療の時点では、2020 年の肝硬変診療ガ

表 1 入院時の血液検査所見

【血算】		T-bil	0.6 mg/dL	フェリチン	261 ng/mL
WBC	6,450 / μ L	ALP	703 U/L	血清銅	120 μ g/dL
RBC	336 万 / μ L	γ -GTP	131 U/L	亜鉛	63 μ g/dL
Hb	11.8 g/dL	AST	37 U/L	ヒアルロン酸	569 ng/mL
Plt	11.6 万 / μ L	ALT	44 U/L	IV型コラーゲン	505 ng/mL
【生化学】		LDH	278 U/L	アンモニア	150 μ g/dL
CRP	1.12 mg/dL	CK	53 U/L	抗核抗体	40倍
TP	7.4 g/dL	随時血糖	217 mg/dL	抗ミトコンドリア抗体	陰性
ALb	2.9 g/dL	HbA1c	6.7%	総カルニチン	30.2 μ mol/L
Na	140 mEq/L	IgG	2,146 mg/dL	遊離カルニチン	18.7 μ mol/L
Cl	104 mEq/L	IgM	283 mg/dL	アシルカルニチン	11.5 μ mol/L
K	3.3 mEq/L	IgA	483 mg/dL	【凝固】	
BUN	20.9 mg/dL	HBs 抗原	(-)	PT-INR	0.99
Cr	5.95 mg/dL	HCV 抗体	(-)	APTT	36.5秒
Ca	8.9 mg/dL	TP 抗体	(-)	D-dimer	1.03 pg/mL
P	5.2 mg/dL				
尿酸	4.1 mg/dL				

図 1 入院時の造影 CT

胃腎シャント, 脾腎シャントを認め, 胃体上部～食道周囲に側副血行路の発達が著明である.

イドライン 2020 の昏睡度分類を使用していない). 第 10 病日にアンモニア値が横ばいで推移したため, 分岐鎖アミノ酸製剤 40 g から 60 g へ増量し, 排便コントロールのためルビプロストン 24 μ g/日を開始し, 第 14 病日に退院となった. 安全性に留意し, リファキシ

ミンの添付文書の記載(国内臨床試験において 12 週間を超える使用経験はないため, 12 週を超えて投与する際はその必要性を慎重に判断) に準じて内服 12 週でリファキシミン内服を中断したが血清アンモニア値が再上昇したため, 速やかに内服再開した. その後, 血清

図2 入院後の血清アンモニア値と治療経過

リファキシミン開始2日後にアンモニア値は低下し意識状態は改善した。

図3 リファキシミン導入後約1年間の経過

リファキシミン中断後に血清アンモニア値が一時的に上昇したが再開とともに低下し、肝性脳症の再発は経過中認めなかった。

アンモニア値は再上昇なく推移し、内服後約1年間、肝性脳症は再発せず、明らかな有害事象も認めず経過した(図3)。

II. 考 察

肝硬変診療ガイドライン2020では肝性脳症は、A) 急性肝不全に起因するもの、B) 主に門脈—大循環シャント・バイパスに起因するもの、C) 肝硬変症に起因するものの3つに分類され¹⁾、CPSEは分類Bに該当する。肝硬変を合併した血液透析患者では、血液透析の除水が原因で大循環の圧が低下することでシャント

血流が増加し、肝血流が低下してCPSEを発症する報告があり^{2,3)}、透析誘発性CPSEと考えられる。本症例でも血清アンモニア値の上昇と門脈—体循環シャントがあったことから透析によって体循環の静脈圧が低下し、門脈血が肝臓を経由せずに直接全身循環に入ることによって透析誘発性CPSEが発症したと考えられた。

本症例では入院時のエピソードを含めると透析中、透析後に8か月間で合計4回意識障害を呈しており、また透析時以外には発症しなかった。特徴的であったのはいずれも前回透析から2日あいた週初めの透析の際に発症していたことであった。ただし、これらの透析時の透析記録を確認しても、血圧の変動はあったも

の著明な血圧低下があったわけではなく、また透析前後採血を行っていた回の結果からは透析前後の血液の濃縮も軽度であった。透析間体重増加は3.5~5.4%とやや多い日が目立ったものの極端に高いわけではなかった。しかしあらかじめ設定されていた除水量の上限を超えていたためにDWに到達していなかった。このため本症例で透析での除水の影響を考えるとすると除水ペースが通常よりも少し早かった、ということ以外に見当たらず、設定DWや総除水量は本症例では危険因子としては考えにくかった。

本邦の肝硬変診療ガイドラインでは、一般的な肝性脳症に対する保存療法として合成二糖類などによる排便コントロールや急性期における低たんぱく食、分岐鎖アミノ酸製剤などが治療の選択肢として示されている¹⁾。本例は前述した治療はすでに入院前から導入されていたが、透析患者であり、便秘となりやすい点、血液透析による血行動態の変化が起きる点など、透析患者特有の肝性脳症の増悪リスクを複数持っており、治療抵抗性を示していた。門脈一体循環シャントを伴う肝性脳症の治療法として、外科的シャント結紮術やB-RTOなどのIVRがある^{4,5)}。近年では侵襲度を勘案してIVRが選択されることも多く、透析患者でも有効であった報告も散見される^{2,6-8)}。一方で、一般の患者と比較し、透析患者特有の問題として心血管疾患の合併、貧血、出血傾向、創傷治癒遅延、免疫能の低下などがあげられ、CPSEに対する外科的処置やIVRにおける合併症を引き起こすリスクは相対的に高いと考えられる。外科的手術よりも侵襲度が低いとされるIVRも肺塞栓などの重篤な合併症を発症させる危険性も指摘されている⁴⁾。

肝性脳症の増悪因子への適切な集学的治療により、それらの侵襲的処置を実施せず、保存療法のみで再発を抑制できた血液透析患者の報告もあり⁹⁾、まずは適切な保存療法を開始することが望ましいと思われる。本症例では患者、家族ともにIVR、外科的手術を希望しなかったため、アンモニア産生菌の抑制を目的としてリファキシミンを導入した。

従来、難吸収性抗菌薬として本邦ではカナマイシン、ポリミキシンB、バンコマイシンが経験的に使用されていたが、保険診療上の制約などから、ラクツロースなどの合成二糖類で改善が得られない難治性の急性期の症例に限定して投与することが一般的であり、長期使用による再発予防の治療に行うことはできなかった。本例で用いたリファキシミンは2016年9月に「肝性脳症における高アンモニア血症の改善」の効能、効果で承認された経口の腸管非吸収性抗菌薬であ

り、顕性肝性脳症を改善させるだけでなく、継続投与により脳症の再燃を抑えたとされている¹⁰⁾。その他の特長として、グラム陽性球菌、グラム陰性桿菌、好気性菌、嫌気性菌に対して広いスペクトラムを持つ一方で耐性菌の出現は低率とされている点^{11,12)}、腸内細菌叢にはほとんど変化を起こさずに、肝性脳症の発症に関与するとされている炎症サイトカインやエンドトキシンを低下させる点¹³⁾などがあげられる。リファキシミンは腸管からほとんど吸収されず、消化管内でアンモニア産生菌を抑制することで高アンモニア血症、肝性脳症を改善するという作用機序であり、腸管吸収が0.4%未満と極めて少なく、血中移行に伴う重篤な副作用がみられず、長期投与における安全性が高いことが特長である¹⁰⁾。

海外では米国肝臓学会、欧州肝臓学会合同で作成された2014年に発表されたガイドラインで使用が推奨されている¹⁴⁾。また日本消化器病学会の肝硬変診療ガイドライン2020でも同様に腸管非吸収性抗菌薬は初発、再発を問わず有効であるため、肝性脳症の基本的な治療として実施することが推奨されている¹⁾。リファキシミンは、本邦での第Ⅲ相試験で非吸収性合成二糖類と同等の血漿アンモニア値、PSE index、NCT-Aなどの肝性脳症パラメーターの改善効果を認め¹⁵⁾、2021年7月現在、国内で肝性脳症に対する保険適応のある唯一の腸管非吸収性抗菌薬となっている。

リファキシミンは本邦では2016年に薬価収載され肝性脳症治療に対する使用が広まってきている一方で、透析患者の肝性脳症に対して使用された報告は国内外でまだ認められず、われわれの調べた限り本症例が初めての報告となる。透析患者では腎機能低下のため、および透析施行によって薬剤の代謝が変わるため、腎機能正常患者と比べて注意する点が多いが、本剤は前述の通り腸管吸収率が0.4%と非常に低いため体内での薬物代謝について注意する必要性は低いと考えられ、本症例でも通常投与量を使用した。有害事象はなく経過した。本薬剤は副作用が軽微であり、忍容性の観点からも透析患者に有用である薬剤と考えられる。腸管吸収率が非常に低いことから他剤との相互作用を考慮する必要性が少ない点も特長である。一方で、耐性菌の検出は低率とされており国内の試験では報告はないものの、海外では*Clostridium difficile* 感染の報告があるためその点は注意する必要がある¹⁶⁾。幸い本症例では*Clostridium difficile* 感染をはじめとするリファキシミンによる有害事象は認めなかったが、透析患者の長期投与の有効性、安全性などの評価には症例の蓄積が待たれる。

今後、透析患者の肝性脳症に対する保存療法の有効性のさらなる検討が必要と考えられるが、リファキシミンは治療の有効な選択肢となる可能性が示された。

結 語

透析患者のCPSEに対してリファキシミンを導入し、良好な経過を辿った1例を経験した。リファキシミンは副作用や他剤との相互作用が少なく、比較的長期にCPSEを管理することができた。

COI 開示: 本報告に関連して、開示すべきCOIはない。

文献

- 1) 日本消化器病学会, 日本肝臓学会. 肝硬変診療ガイドライン 2020 改訂第3版. 東京: 南江堂, 2020.
- 2) 上田美緒, 小島智亜里, 杉浦秀和, 他. Chronic portal-systemic shunt encephalopathy (CPSE) による高アンモニア血症のために意識障害を反復した1例. 透析会誌 2007; 40: 445-50.
- 3) Ubara Y, Hoshino J, Tagami T, et al. Hemodialysis-related portal-systemic encephalopathy. Am J Kidney Dis 2004; 44: e38-42.
- 4) 清水喜徳, 草野満夫. 門脈大循環短絡症. 肝臓 2002; 43: 479-81.
- 5) Watanabe A. Portal-systemic encephalopathy in non-cirrhotic patients: Classification of clinical types, diagnosis and treatment. J Gastroenterol Hepatol 2000; 15: 969-79.
- 6) 吉光隆博, 平方秀樹, 金井英俊, 他. 上腸間膜静脈一下大静脈短絡による chronic portal-systemic shunt encephalopathy を呈した慢性血液透析患者の1例. 透析会誌 1997; 30: 999-1005.
- 7) 田中雅博, 妻谷憲一, 壬生寿一, 他. Chronic portal-shut encephalopathy (CPSE) を呈した慢性血液透析患者の1例. 透析会誌 2003; 36: 223-7.
- 8) 小島史子, 上田美緒, 斎藤まどか, 他. 脾静脈-下大静脈短絡による高アンモニア血症を呈し, balloon-occluded retrograde transvenous obliteration; B-RTO (バルーン下逆行性経静脈的塞栓術) により著明に改善した血液透析患者の1例. 透析会誌 2012; 45: 267-72.
- 9) 西川真那, 島田典明, 永山泉, 他. 血液濾過透析を含めた集学的治療により肝性脳症が管理できた維持血液透析患者の1例. 透析会誌 2015; 48: 199-205.
- 10) Patidar KR, Bajaj JS. Antibiotics for the treatment of hepatic encephalopathy. Metab Brain Dis 2013; 28: 307-12.
- 11) Gerard L, Garey KW, DuPont HL. Rifaximin: A non-absorbable rifamycin antibiotic for use in nonsystemic gastrointestinal infections. Expert Rev Anti Infect Ther 2005; 3: 201-11.
- 12) Debbia EA, Maioli E, Roveta S, Marchese A. Effects of rifaximin on bacterial virulence mechanisms at supra- and sub-inhibitory concentrations. J Chemother 2008; 20: 186-94.
- 13) Kaji K, Takaya H, Saikawa S, et al. Rifaximin ameliorates hepatic encephalopathy and endotoxemia without affecting the gut microbiome diversity. World J Gastroenterol 2017; 23: 8355-66.
- 14) Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 Practice Guideline by the American Association for the Study Of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology 2014; 60: 715-35.
- 15) Suzuki K, Endo R, Takikawa Y, et al. Efficacy and safety of rifaximin in Japanese patients with hepatic encephalopathy: A phase II/III, multicenter, randomized, evaluator-blinded, active-controlled trial and a phase III, multicenter, open trial. Hepatol Res 2018; 48: 411-23.
- 16) Bass NM, Mullen KD, Sanyal A, et al. Rifaximin Treatment in Hepatic Encephalopathy. N Engl J Med 2010; 362: 1071-81.