シンポジウム「VEMP：耳石器機能検査としての位置づけと今後の展開」

—司会の言葉—

肥塚 泉

Izumi Koizuka

Department of Otolaryngology, St. Marianna University

School of Medicine

近年の平衡機能検査の特徴は、温度刺激検査や回転検査のような、外側半規管の機能を評価する検査法に加えて、耳石器機能を評価することを目的とした検査が行われるようになったことである。耳石器は直線加速度の受容器であるため、検査を施行するにあたってはこれまで、直線加速度刺激の付加が必須であった。十分な直線加速度を付加するには大型の装置が必要となる。また、耳石器動眼反射によって生じる眼球運動の利得は、半規管動眼反射によって生じる眼球運動の利得よりも小さく、その解析にも工夫が必要となり、これらが、耳石器機能検査普及のネックとなっていた。近年、Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMP) の出現により、各施設において球形囊およびその伝達経路の評価が正確かつ簡便にできるようになった。VEMP の刺激は音刺激あるいは電気刺激である。出力は胸鎖乳突筋の筋電図である。つまり ABR の測定が可能な装置があれば、検査の実施が基本的には可能なためである。

今回のシンポジウムではこの分野におけるエキスパートの先生方に、耳石器の生理、耳石器機能検査、VEMP の現状と将来展望について、基本的な事項から現時点での最新の知見までを紹介していただいた。奈良県立医科大学第一生理、和田佳郎先生には、耳石器の生理について「耳石器反射の回路と機能」と題して発表していただいた。VEMP 出現以前に行われてきた、耳石器動眼反

射を用いた代表的な耳石器検査法については、肥塚が紹介させていただいた。そして、今回のシンポジウムのメインテーマである VEMP について、国内外のオピニオンリーダーである 3 人の先生方に発表をしていただいた。富山大学、將積日出夫先生には「耳石器機能検査としての VEMP」、大阪中央病院の瀬尾 徹先生には「VEMP の臨床応用」、そして帝京大学溝口病院の室伏利久先生には「新しい VEMP の検査法」と題した発表をしていただき、VEMP の現況ならびに最新の知見、またその将来性についての有益な情報をお聞きすることが出来た。最後に特別発言として、耳石器の生理に関するオーソリティーである東京医科大学名誉教授、内野善生先生には、「耳石研究裏話」というタイトルで発表をしていただいた。先生がこれまでに行ってこられた膨大な研究成果をもとに、これまでの耳石器動眼反射を用いた検査法と VEMP との関係、VEMP で得られた結果を解釈する上で留意すべき点について、生理学者の立場から有益なご意見をいただくことが出来た。

今回のシンポジウムにより耳石器の生理、耳石器機能検査の現状と将来展望について認識を新たにさせていただき、多くの先生方が耳石器機能障害を有する可能性を有す症例の診断ならびに治療に果敢にチャレンジしていただく端緒となれば望外の喜びである。