シンポジウム「下船病とその周辺疾患」

—司会の言葉—

高橋 正紘

Masahiro Takahashi

Center of vertigo and Meniere's Disease

健康者も長く乗船後、地上に降り立つと、地面の揺れる感覚を覚える。通常、数分から数時間、長くても数日で治まる。しかし、揺らぐ感覚だけでなく、肉眼的に上体が左右や前後に揺れ、数週間、数ヶ月、時に数年続くことがある。発症のきっかけは船ばかりでなく、車、飛行機、遊園地の乗り物、エレベータなど、乗り物で誘発される。これらを総称し下船病 (mal de débarquement syndrome) と呼ぶが、厳密な定義はない。典型的には、乗り物体験がきっかけで、常に揺らぐようになり、この状態が長く持続し、日常生活に著しい支障をきたす。2006年5月から2013年12月までの初診患者5,823名中、下船病あるいは疑いの診断は33名 (0.57%) であった。

本疾患との出会いは2006年6月、45日間の実習航海後に揺らぎの続く海洋学部学生の24歳女性の紹介受診であった。経過を追い、本疾患の深刻さが判明し、知見を姿勢と歩行研究会で6回にわたり報告してきた*。多数の下船病患者の診察、経過から、東日本大震災をきっかけに発症した例のあること、症例の一部が脳外科で脳脊髄液減少症を疑われ、blood patch 治療で改善することが判明した (図)。地震酔いは健康な人々が体験し、予後は一般に良好であるが、下船病との境界は曖昧である。脳脊髄液減少症は症状が多彩で、不明な点の多い疾患であるが、症状の一部は下船病と重なり、事実、下船病患者で本疾患と判明する症例数が増加しつつある。

本シンポジウムでは下船病と、関連する疾患と

して地震酔いと脳脊髄液減少症を取り上げた。高橋が司会を担当し、日本大学准教授の野村泰之先生に、東日本大震災後調査してきた「地震後めまい症候群」を、慶應大学准教授の國弘幸伸先生に、耳鼻科医として関わってきた「脳脊髄液減少症」の口演をお願いした。下船病は稀な疾患のため多数例の経験者が少なく、高橋が口演も担当した。本学会の特別企画として下船病が取り上げられるのは初めてであり、山根英雄会長の英断に敬意を表したい。本シンポジウムで下船病および周辺疾患の理解が深まり、難病の進行予防、解決に研究者が関心をもつきっかけになることを切に希望している。

* 2008年第7回「Mal de débarquement (下船病) —症例と発症機構の考察—」

2009年第8回「移動空間曝露症—新しい疾患概念」

2010年第9回「空間不適応現象を考察する」

2012年第10回「下船病 (移動空間曝露症) —最近判明した事実」

「姿勢制御の実験モデルとしての下船病」

2014年第12回「下船病を再考する」