シンポジウムⅠ 食環境における安全性確保

● Secure Safety in Food Environment

司会の言葉

Introduction

金丸 芳

(徳島大学大学院)

Kaori KANEMARU

Graduate School of Bioscience and Bioindustry, Tokushima University,
Minamijosanjima-cho, Tokushima 770-8513

「安全」は、科学が最も不得手とする言葉である。食品においても、危険であると証明することは容易であるが、安全であると証明することは難しい。そのため、食品のみならず、食環境も含めた総合的な衛生管理法が必要とされる。そこで、シンポジウムⅠでは、「食環境における安全性確保」と題し、3名の先生方にご講演をいただいた。

最初に、大阪健康安全基盤研究所・中村寛海先生に、「食品製造環境への定着要因としてのバイオフィーム形成」と題するご講演を頂戴した。微生物の増殖形態の一つであるバイオフィームは、固体表面に付着した微生物が、菌体外に多糖類等の高分子化合物を分泌し、緩やかに増殖しながら物理化学的に極めて強固な構造物となったものである。バイオフィーム内の微生物は、バイオフィーム内に形成された水路を介して供給される僅かな栄養素により、長期的に生存し、より強固なバイオフィームを形成する。バイオフィーム内の微生物の生育速度は極めて遅いものの、水路から継続的に遊離細胞が放出される。食品製造設備に形成されたバイオフィームは物理化学的に除去が困難であり、継続的に食品を汚染する可能性が高い。バイオフィームの除去が困難であるため、バイオフィームを形成させないことが重要と考えられる。バイオフィームの形成は、微生物が付着する素材の種類、食品成分の存在、共存微生物、付着の温度等、さまざまな要因が関与すると考えられ、食品製造現場ではバイオフィーム形成を防ぐことが重要な課題である。中村先生には食品製造環境への応用が期待されるバイオフィームの形成防止および除去技術についてご講演をいただいた。

次に、高知大学農林海洋科学部・芦内 誠先生に、

「ポリγグルタミン酸イオンコンプレックスによる微生物制御」と題するご講演を頂戴した。納豆の糸状粘性物質の主成分は、グルタミン酸がγペプチド結合により重合したポリγグルタミン酸(PGA)である。PGAは、本来納豆菌が薬物から自らを守るために生産する物質と考えられ、難分解性の高分子である。PGAは無味・無臭で、高い吸水性や有することから食品添加物としても利用されている。また、ナイロン様高分子素材としても今後の利用が期待されている。芦内先生にはPGAイオンコンプレックスという最新の研究成果による微生物制御についてご講演をいただいた。

最後に、徳島大学大学院医歯薬学研究部・高橋 章先生に、「LEDによる衛生管理」と題して、LEDによる食の安全性確保に関するご講演を頂戴した。発光ダイオード(Light Emitting Diode: LED) 1962年に発明された半導体素子であり、当初は赤色のみであったが、続いて黄緑色が発明され、徳島大学出身の中村修二先生らによって青色LEDが発明された。したがってLEDは長寿命であり、現在も着実に市場規模が拡大している。また、殺菌用としても320~400 nm領域のLEDが開発され製品化されている。今後、より殺菌効力の高い短波長域のLEDが開発されると考えられ、LEDの市場規模はさらに拡大する予想される。高橋先生には紫外線LEDの殺菌機構や殺菌剤との併用効果、加えて、今後の展望についてご講演をいただいた。

冒頭で述べたように「安全性」は容易に確保できるものではないが、このシンポジウムの研究成果が食環境における安全性確保に貢献することを祈念する次第である。

*1 ☎770-8513 徳島市南常三島町2-1