ニジマス稚魚の IPN に関する基礎的研究

佐 野 徳 夫*

(昭和 46 年 12 月 25 日受理)

著者はこれまで日本産養殖ニジマスの流行病について細菌学的に、寄生虫学的にあるいは病理組織学的に研究し研究初期においてニジマス稚魚に病原体が不明なことから不明病とよばれる高い死亡率をとまう流行病のあること、さらにその流行病が米国におけるマス類稚魚の流行病 IPN に極めて類似していることを指摘した¹⁾。1968 年から 1969 年にかけて米国東部魚病研究所において、我が国の不明病魚をウイルス学的に研究する機会を得、すべての供試魚から IPN ウイルスの分離に成功しさらに分離ウイルスの血清タイプを決定して、不明病を IPN と診断できた。

1970 年には我が国における IPN の地理的分布を調査し、さらに 1970 年から 1971 年にかけて *Oncorhynchus* の 2 種類に対する IPN ウイルスの病原性を確認したので以下にその概要を報告し批判を乞う次第である。

研究材料および研究方法

最初にウイルス分離に使用した材料は静岡県富士宮市柴崎養鱒場（以下 Shibazaki と呼称する）および千代養鱒場（以下 Sendai と呼称する）において流行病期に採集され、直ちに -20°C で凍結され、空輸のために解凍後 50% グリセリン PBS 溶液に浸漬した状態で郵送された病死魚である。

ウイルス分離のための接種液は WOLF *et al* (1968) の方法にしたがって準備した。まず一検体につき約 10 尾を一緒にした複合試料として以下の手順で準備した。pH 7.4 の PBS をもって材料を数回洗ってグリセリンを十分に除去した後、Hanks BSS をもって材料を 10^{-1} に稀釈、無菌乳鉢で十分に磨砕しミリポーフフィルター 450 $\text{m}\mu$ で加圧濾過して得られた。ウイルス分離の接種には同液は 10^{-2} に稀釈され、その 0.1 ml を接種量とした。また、分離ウイルスのタイターを決定するために同液は 10^{-4} から 10^{-8} の間を 10^{-1} 稀釈段階に稀釈されその 0.1 ml を接種量とした。ウイルス分離は由来地の稚魚毎に 2 回行なった。接種に使用した単層培養は WOLF・QUIMBY (1962) によって永久細胞培養化されたニジマス生殖腺繊維芽細胞 RTG-2 で、16 mm $\times$ 125 mm の培養管におよそ 275,000/ml の細胞数に増殖したものである。接種後 RTG-2 は 20°C のふ卵器内で 5 日間培養され、最終的な CPE の判定は 6 日目に行ない、KÄRBER の式にしたがって TCID₅₀ を求めた。

分離ウイルスの血清タイプを決定するために行なったウイルス中和試験のための抗血清は VR #299 IPN ウイルス, Buhl IPN ウイルス, Powder Mill IPN ウイルス, Bonnamy IPN ウイルスおよび d'Honnincthun IPN ウイルスを抗原として得られた家兎血清である。中和試験は以下のようにして行なって結果を得た。それぞれの一連の稀釈抗血清**に対して一定のタイター (200~316 TCID₅₀*** を示すそれぞれの分離 IPN ウイルスを加えて 20~30 分間室温で反応させた後、それより、0.2 ml を採取して RTG-2 に接種し前記と同様な条件で培養して CPE を読み取り、その結果を TCID₅₀ を示す血清の最終稀釈濃度をもって示した。

診断のための簡易中和試験は WOLF *et al* (1968) の方法にしたがって行なわれた。すなわち、 10^{-2} に稀

* 東京水産大学

** 8 倍から 65536 倍の間を 2 倍の稀釈段階で稀釈した。

*** 四つの保存ウイルスの TCID₅₀ を正確に決定した後 (Sendai A $10^{6.8}$, 同 B $10^{6.8}$, 同 C $10^{7.1}$, Shibazaki $10^{5.5}$), それらを LAH (10%) + Hanks BSS (90%) の混合液をもって稀釈して得られた。

積された抗 VR #299 IPN ウイルス血清の 0.3 ml に対して 10^{-3} 稀釈の接種液 0.3 ml を加えて 20~30 分間室温で反応させた後、2 本の RTG-2 にそれぞれ 0.2 ml ずつ接種し、前記同様の条件で培養して CPE の有無と発現状態を観察した。また、同様な手続きを正常血清について行なった。

分離ウイルスの病原性を確めるために二つの感染実験が行なわれた。一つは魚体浸漬による方法であり、他は経口投与による方法である。魚体浸漬による感染は Sendai A, 同 B および同 C の各 IPN ウイルス培養液 3 ml を加えた水 300 ml にニジマスの 8 週稚魚 50 尾、また Shibazaki IPN ウイルスの培養液 2 ml を加えた水 200 ml に同稚魚 25 尾を入れて 1 時間浸漬させて行なった。対照はウイルスを含まない水に前者と同様に処理したものである。経口感染実験は 1 群 20 尾の 10 週稚魚にウイルス培養液を餌にまぜて与えることによって行なわれた。この場合各ウイルスの投与量は Sendai A, 同 B, 同 C が $10^{6.1}$ TCID₅₀/ml, Shibazaki が $10^{5.8}$ TCID₅₀/ml であった。ウイルスを含ませた餌の投与は 1 日に数回、2 日間にわたって行なわれた。死亡が予期された病魚は実験期間中のいかなる時にも Bouin 氏液に固定し、常法にしたがって H-E 被染色標本作製し病理組織学的研究に供した。感染実験中に死亡した病魚で発見時に鮮度の良好だったものは直ちに -20°C で凍結しウイルス回収の分離培養まで保存された。浸漬による感染実験では開始後 10 日目に水槽の底より糞を数個採取し、それを直接 RTG-2 に接種して感染病魚よりウイルスが排泄されるか、どうかを調査した。同様なことを対照魚の糞についても試みた。

実験期間中、毎日死亡魚の記録と病魚の状況観察を行なった。期間中の水温はほとんど一定で平均 12.2°C を示した。

IPN の地理的分布の調査にあたって 1 都 5 県の 27 の養鱒池から材料が得られた。ある材料は直接発病池において採集されたほかは 50% グリセリン PBS 液に固定状態で送られた。ウイルスの分離・培養その他は既述のとおりにしたがった。

アマゴ、ヒメマスに対する IPN ウイルスの感染実験には、1970 年東京都奥多摩分場で自然発病した病魚から分離された $10^{7.0}$ TCID₅₀/ml を示したウイルスで以後 1 年間 -20°C に保存された 1 株が使用された。本研究の供試魚の大きさはアマゴ、ヒメマスともに 0.2~0.3 g、それぞれ 4 週、6 週でニジマスは 8 週令のものであった。飼育期間は約 50 日間ならびに約 30 日間で、その間の水温は $8.4\sim 10.3^{\circ}\text{C}$ 平均 9.1°C ならびに $11.7\sim 14.3^{\circ}\text{C}$ 平均 13.4°C であった。投餌は 1 日に数回稚魚用クランブルをもって行なった。接種後のウイルスの追跡調査は 2 日、5 日、10 日、15 日、1 ヶ月、4 ヶ月に行なわれた。ウイルスに関する研究方法は前述のとおりである。

研 究 結 果

IPN ウイルスの分離と血清タイプの同定

Sendai A, B, C および Shibazaki の各病魚より準備された汙液はすべて RTG-2 に対して強い CPE を発現し、ウイルスの存在を明白に示した (図版 I-1, I-2, 3)。これらウイルスの定量的ならびに簡易中和試験のおおまかな結果は表 1 に示されている。表が示すように分離されたウイルスは $10^{4.8}$ から $10^{5.8}$ TCID₅₀/ml を示し、抗 VR #299 IPN 家兎血清に対してすべて共通な抗原性を示している。これらの事実

表 1. 分離ウイルスの RTG-2 に対する感染性と抗 VR #299 IPN ウイルス血清による簡易中和試験成績。

ウ イ ル ス	TCID ₅₀ /ml	中 和 試 験 結 果	卵 の 由 来 地
Sendai A	$10^{5.5}$	部分中和、局所的 CPE (2 本の培養管のうち 1 本)	静岡県猪之頭養鱒場
B	$10^{4.8}$	完 全 中 和	長野県田沢種卵場
C	$10^{5.8}$	完 全 中 和	静岡県猪之頭養鱒場
Shibazaki	$10^{5.5}$	不完全中和、局所的かつ遅発的 CPE	静岡県猪之頭養鱒場

表 2. Sendai A, B, C および Shibazaki IPN ウイルスの中和試験結果,
括弧内の数値は投与ウイルスの TCID₅₀/0.1 ml を示す。

抗 血 清	Sendai A (316)	Sendai B (200)	Sendai C (200)	Shibazaki (316)
VR #299	18	<96	<96	<8
Buhl, Idaho	1296	1445	1380	200
Powder Mill, N. H.	205	770	430	<64
Bonnamy, France	<32	290	210	<32
d'Honnincthun, France	364	430	360	250

図 1. 8 週稚魚に対する Sendai および Shibazaki ウイルスによる人工感染魚の斃死曲線。
黒点は Shibazaki ウイルス, 白点は Sendai ウイルス。上方の 2 曲線は累積斃死率を示す。

表 3. Sendai A, B, C および Shibazaki IPN ウイルス感染実験魚の斃死率
ならびに同死魚からの回収ウイルスタイトル (TCID₅₀/ml)。

ウ イ ル ス	Sendai A	Sendai B	Sendai C	Shibazaki	対 照
斃 死 率 (%)	58	15	40	25	0
回収ウイルス TCID ₅₀ /ml	10 ^{5.5}	10 ^{5.8}	10 ^{5.8}	10 ^{5.8}	—

は分離ウイルスが IPN ウイルスと同定されるに十分なる根拠をもっている。そこで著者はウイルス中和試験を行なって分離ウイルスの血清タイプを調査した。その結果は表 2 に示されている。Sendai A, 同 B, 同 C ウイルスは抗 Buhl IPN 血清に対して最も高い抗原性を示しており, Shibazaki ウイルスは抗 Buhl IPN 血清と抗 d'Honnincthun IPN 血清に対して高い抗原性をもっている。

分離ウイルスの感染実験

ニジマス稚魚に対する感染実験の結果は図 1 および表 3 が示すように, ウイルス感染区の斃死率はすべて高い値を示しており顕著であった。8 週稚魚に対する Sendai A, B, C ウイルスおよび Shibazaki ウイルスの斃死は 3～6 日にはじまり, 10～12 日には 70% 以上の斃死率に達している。病魚は体色の黒色化,

糸状の糞、水槽の底での静止、旋回遊泳、個体によっては腹部の膨満、突然の死など自然発病魚と変わらない症状、行動を示した。一方、対照区には斃死魚および病魚は全く認められなかった。また、10 週稚魚に対する経口投与による感染実験では、25 日間の斃死率を示した。対照区の斃死率が 0 であるのに対してそれぞれの斃死率が Sendai A で 58%, Sendai B で 15%, Sendai C で 40%, Shibazaki で 25% と大きな差が認められる。

感染実験における投与ウイルスの回収

浸漬による感染実験の斃死魚から $10^{7.8}$ TCID₅₀/ml を示すウイルスが分離回収され、また経口投与による感染斃死魚からは Sendai A $10^{5.5}$, Sendai B $10^{5.5}$, Sendai C $10^{5.8}$, Shibazaki $10^{5.8}$ TCID₅₀/ml のウイルスが回収された。また排泄された糞からもタイターの決定は行なわなかったが、強い CPE を発現するウイルスの存在を確めた。一方、対照区の供試魚および糞からはウイルスの分離回収は陰性であった。

感染実験魚の病理組織学

Sendai A, B, C ウイルスを感染させて得た病魚について一般的な病理組織学的観察を試みた結果、病魚はすべて脾臓の壊死を呈していた(図版 I-4)。壊死は脾臓の実質組織だけにとどまらず、隣近する脂肪組

表 4. ウイルスの分離結果

養 鯉 池 名		ウイルス分離		TCID ₅₀ /ml
穂	高	+		7.2
松	本	+		7.5
武	田	+		—
宇	留 賀		—	
若	月		—	
岳	南		—	
猪	之 頭 No. 1	+		7.5
	2	+		7.5
木	村	+		5.8
前	田	+		—
野	尻	+		7.5
オリエンタル	No. 1	+		7.5
	2	+		7.5
柴	崎 No. 1	+		—
	2	+		6.9
千	代	+		7.2
太	平 洋 No. 1	+		7.2
	2	+		7.2
	3	+		7.2
土	田	+		—
三	幸 No. 1	+		8.2
	2	+		7.3
奥	多 摩 No. 8	+		6.5
	9	+		7.5
徳	島 県	+		6.1
三	瓶 No. 1	+		5.8
	2	+		5.8
出 現 数		24	3	
出 現 率 (%)		88.9	11.1	

表 5. タイターの出現頻度

TCID ₅₀ /ml	頻 度	
	個 体 数	出現率 (%)
$10^5 \sim 10^6$	3	15
$10^6 \sim 10^7$	3	15
$10^7 \sim 10^8$	13	65
$10^8 \sim$	1	5
計	20	100

表 6. 3 月および 7 月～8 月における
ウイルスの分離結果

ウイルス分離数・ タイター (TCID ₅₀ /ml)	分 離 した 月	ウイルス 無分離数
6 (6.9, 7.2, 7.2, 7.5, 7.2, 7.5)	3 月	5
6 (7.5, 7.2, 7.5, 7.5, 7.2?)	7 月～ 8 月	4
12	計	9
57.2	出 現 率 (%)	42.8

表 7. IPN の新発生地および対応する
種卵供給県, 1969～1970

IPN の新発生地場所	種卵供給県名
徳 島 県 水 試	新 潟 県
島 根 県 三 瓶 養 鯉 場	岐 阜 県
東 京 都 奥 多 摩	東 京 都 奥 多 摩

組織にもおよんでいた。また、程度に差はあるが、いずれの個体も前腎のリンパ組織、造血組織、細尿管上皮の崩壊がおきており、後腎においてもリンパ組織、細尿管の消失、その上皮の崩壊（図版 I-5）および腹腔にエオシン嗜好性物質の存在が観察された。また、肝臓も決して健全な状態とはいえず（図版 I-6）、各所に赤血球の充満、部分的に壊死などが認められるほか、消化管では粘膜層の剝離を示すカタル性胃腸炎（図版 I-7）が認められた。個体によって異なるが背側筋肉の一部に硝子変性、筋肉融解およびその近辺の一部に筋隔部結合組織の増殖が散見された（図版 I-8, 9）。

IPN の地理的分布

ウイルスの分離結果は表 4 に示してある。表が示すように 27 養鱒池の稚魚のうち 24 池の稚魚がウイルスポジティブ、他の 3 池の稚魚はウイルス・ネガティブであった。すなわち IPN ウイルスの出現率は 88.9% であった。これらウイルスのタイターは $10^{5.8} \sim 10^{8.2}$ TCID₅₀/ml の範囲にあり、 10^4 TCID₅₀/ml 毎の階級によるウイルスの出現率は表 5 に示すとおりで、 $10^7 \sim 10^8$ TCID₅₀/ml のタイターを持つウイルスが最も高い出現率を示している。表 6 に 3 月および 7 月～8 月の間に採卵した春稚魚と夏稚魚について調査した IPN ウイルスの出現状況を示したが、これらの間に季節的変動はなさそうである。

表 7 に種卵の供給県と需要県における IPN の新発生地名を挙げておいた。それらは東京都、徳島県および島根県である。

アマゴ、ヒメマスに対する感染試験

ニジマス、アマゴおよびヒメマスともに接種後 2 日においては IPN ウイルスは検出されなかった。同 5 日においては TCID₅₀/ml で示すと、ニジマスでは $10^{4.8}$ 、アマゴで $10^{5.2}$ 、ヒメマスで $10^{4.8}$ を示すウイルスが分離された。以後同 15 日まで増加を示し、同日にはヒメマスを除いてニジマスで $10^{7.1}$ 、アマゴで $10^{8.8}$ で最高のタイターを示した。15 日以降ウイルスは分離回収されるが、若干の変動を呈しつつ減少傾向を示し、約 40 日において TCID₅₀/ml はニジマスで $<10^{3.8}$ 、アマゴで $10^{4.8}$ 、ヒメマスで 10 であった。接種後約 4 ヶ月においては 3 種類ともウイルスは回収されなかった。最終的な死亡率はニジマスで 59%、アマゴで 62% およびヒメマスで 49% であった。

以上の実験で回収されたウイルスをさらに新しく設定した同じ 3 魚種に人工感染させ同様な実験を行なった。その結果は以下のとおりである。接種後 2 日においてはウイルスは回収されず、同 6 日においてニジマスからは $10^{3.2}$ TCID₅₀/ml、アマゴからは $10^{3.7}$ TCID₅₀/ml、ヒメマスからは未検出であった。10 日ではニジマスで $10^{4.5}$ 、アマゴで $10^{5.2}$ およびヒメマスで $10^{2.8}$ TCID₅₀/ml のタイターを示すウイルスが回収できた。

論 議

最初の病原体分離にあたって著者は由来池毎に複合サンプルとして磨砕し、分離に供したが、2 回ともすべての材料より RTG-2 細胞に対して強い CPE を発現する病原体を分離できた。この病原体は接種液の調整に 450 mμ の汙膜を使用していることから、汙過性病原体とみなしてまちがいないく、さらに簡易ウイルス中和試験の結果から一応 IPN ウイルスと断定できた。著者が最初に分離した IPN ウイルスのタイターは $10^{4.8}$ から $10^{8.8}$ TCID₅₀/ml であり、WOLF (1966) がグリセリン保存材料について報告している平均値よりも低い。このことについては、著者の材料は採取後、凍結・解凍・グリセリン保存の過程を余儀なくされており、この過程で病原性の低下をおこしたものと考ええる。

ここでウイルス中和試験の結果について述べると、Sendai A, B, C のウイルスに対する抗 IPN 血清の稀釈度は抗 Buhl IPN ウイルス血清において最高値を示しており、したがってこの結果より Sendai A, B, C の各ウイルスは血清タイプとして Buhl IPN ウイルスであると主張できる。一方、Shibazaki IPN ウイルスに対して比較的高い稀釈度を示すものは抗 Buhl IPN 血清と抗 d'Honninethun IPN 血清であり、この結果から Shibazaki IPN ウイルスが血清学的にどちらとも決めがたく、他の血清タイプの可能性が十分に出てくる。しかしいずれの血清タイプのウイルスとしても IPN ウイルスであることにちがいがなく、またそれらが共通の抗原性を有することは明白なことである。したがってわが国には、米国 Idaho 州、Buhl に

由来する、すなわち Buhl IPN ウイルスと他の血清タイプの IPN ウイルスの少なくとも2タイプの IPN ウイルスが存在するといえることができる。

RTG-2 に対して CPE を発現するウイルスには IPN ウイルスのほかに VHS (ウイルス性出血性敗血症) ウイルスがある。IPN ウイルスがグリセリン耐性であるのに対して VHS ウイルス是非耐性であり⁷⁾、著者の本研究材料がグリセリン保存材料であったにもかかわらず RTG-2 に対して CPE を発現したことは VHS ウイルスを否定する根拠となる。この事実はウイルス中和試験の結果とともにわが国には VHS のないことを主張できる有力な手がかりとなる。

感染実験において感染病魚が示した兆候群は不明病とよばれる流行病の自然発病魚のそれと同じであり、また感染実験の死亡率は高い値を示した。しかし、二つの感染実験の死亡率を比較すると両者の間に差が認められる。このことについては病死魚からの回収ウイルスタイターが浸漬による感染病魚では $10^{7.8}$ TCID₅₀/ml であるのに対して経口感染病魚では $10^{5.5} \sim 10^{5.8}$ TCID₅₀/ml であり、前者の方がウイルス感染をより多く受けていること、および供試魚の発育日数の差による生理状態のちがいが影響しているものと考えられる。IPN は8週までの幼稚魚に最も罹病しやすいことが知られている。

感染実験魚の病理組織学的所見として、脾臓の壊死、カタル胃炎、腸炎のほか、細尿管、腎リンパ組織の壊死や類壊死および出血が観察された。これらの所見はすでに著者および他の研究者^{4-6,9,10)} の記載とほぼ同じである。そのほかに著者 (1966) はこれまでに自然発病魚について肝毛細管内の赤血球充満および部分的壊死を観察しており、今回の感染実験魚でも肝臓に類似な所見を認めている。このことから IPN の症例として肝臓における病変をも含めてよいと考える。IPN 罹病魚の筋肉におこる病変は比較の見逃しがちであるが、今回の実験魚の筋肉において SNIESZKO *et al* (1957) が報告している病変と同じ観察結果を得た。

すでに明らかのように、従来、著者によって疑われてきた大量死をとまなうニジマス稚魚の流行病はウイルス性流行病であると正確に診断された。すなわち、本流行病は米国におけるカワマス、ニジマスの IPN と相同のウイルスによる疾病であり、それらは少なくとも二つの血清タイプの IPN ウイルスに起因すると断定できた。本報告はわが国の魚類ウイルス病の最初の報告例であるが、すでに IPN ウイルスは WOLF *et al* (1960) によりカワマス病稚魚より分離され IPN と診断されて以来、米国各地で IPN が蔓延していることが明らかにされた。WOLF の私信によれば、欧州ではフランスのほか、デンマーク、スウェーデンなどの諸国にもみられるという。これらの事実は IPN が世界的な流行病となりつつあることを示している。

著者はこれまで多くの県のニジマス稚魚に外観上で類似、または同じ兆候群を示す流行病を観察し、本流行病は日本の各地に蔓延していると疑ってきたが、現実にはわが国の各地に IPN が広く蔓延していることが明らかにされた。そして、夏卵からも冬卵からもほぼ同率で IPN ウイルスが分離されたことから本病の発生には季節による変動はなく、光処理による早期採卵群にも自然採卵群にも IPN ウイルスを保持した群があれば季節にかかわらず感染・発病がおこると解される。

本流行病の流行・蔓延は生卵、活魚とともに病原体の移動によるところ大であることが表7から理解できる。これは WOLF (1968) の指摘するところと同じである。

ここで防除対策の最も効果的な一端を本研究結果より考察するならば、生卵、活魚の無検疫および法的無規制な移動は国内的にも国際的にも行なわないことであろう。また、感染魚が排泄した糞から IPN ウイルスが分離されたことは下流水域への病原体の伝播、流布のおこる十分な根拠を示しており、下流水域の養魚場に対して環境衛生の見地から防除対策の一部を確立していく必要がある。そして、IPN ウイルスが単にニジマスのみでなく、ヒメマスやアマゴのような在来マスに対しても病原性を呈するとみなされることから、環境衛生の考え方を *Oncorhynchus* の魚種に対しても拡大して持つべきと思われる。

謝 辞

本研究には 1968~1969 年文部省在外研究員として米国東部魚病研究所に滞在中に行なった研究の一部が含まれており、ここに文部省、東京水産大学関係者各位ならびに東部魚病研究所 Dr. S. F. SNIESZKO, Dr. K. WOLF, Mrs. C. QUIMBY に対してお礼申し上げる。

材料の採集および空輸にあたっては静岡県富士宮市富士養鱒組合長渡辺国雄氏ならびに同組合青木駿博士のお手数を煩わした。

本研究の後半においては材料の採集提供などについて静岡県、長野県をはじめ各県水試の方々に大変お世話になった。

感染実験に関する一連の動物飼育にあたっては静岡県富士養鱒場長松浦勝巳氏の快諾を得、同場技師原田雄四郎、牛山宗弘両氏の御協力を願った。

ここに記してお礼申し述べる。

文 献

- 1) 佐野徳夫 (1966): ニジマス稚魚の疾病, 魚病研究 1 (1), 37~46.
- 2) SANO T. (1971): Studies on Viral Diseases of Japanese Fishes—I. Infectious Pancreatic Necrosis of Rainbow Trout: First Isolation from Epizootics in Japan. 日水誌 37 (6), 495~498.
- 3) SANO T. (1971): ditto—II. ditto: Pathogenicity of the Isolants. *ibid.* 37 (6), 499~503.
- 4) SNIESZKO, S. F., E. M. WOOD, and W. T. YASUTAKE (1957): Infectious pancreatic necrosis in trout. *A. M. A. Arch. Pathol.* 63, 229~233.
- 5) WOLF, K., S. F. SNIESZKO, C. E. DUNBAR and E. PYLE (1960): Virus nature of infectious pancreatic necrosis in trout. *Proc. Soc. Exp. Biol. and Med.* 104, 105~108.
- 6) WOLF, K., and M. C. QUIMBY (1962): Established eurythermic line of fish cells in vitro. *Science* 135, 1065.
- 7) WOLF, K. (1966): Advances in virus research, Vol. 12, 35~101. The fish viruses. Academic Press. New York and London.
- 8) WOLF, K., M. C. QUIMBY, C. P. CARLSON, and G. L. BULLOCK (1968): Infectious pancreatic necrosis: Selection of virus-free stock a population of carrier trout. *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 25 (2), 383~391.
- 9) WOLF, K. and M. C. QUIMBY (1969): Infectious pancreatic necrosis: Clinical and immune response of adult trout to inoculation with live virus. *J. Fish. Res. Bd. Canada*, 26, 2511~2516.
- 10) YASUTAKE, W. T., T. J. PARISOT, and G. W. KLONTZ (1965): Virus disease of the Salmonidae in Western United States—II. Aspects of pathogenesis, *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 126, 520~530.

図 版 I 説 明

1. 正常な RTG-2 細胞
2. Sendai ウイルスによって生じた RTG-2 細胞の CPE
3. Shibazaki ウイルスによって生じた RTG-2 細胞の CPE 2, 3 とともに核濃縮と細胞質の崩壊が目立つ
4. 脾臓の壊死。一部に正常と目される組織が認められる。
5. 腎小管上皮の剝離, 崩壊, 一部リンパ組織の崩壊が顕著である。血球の充満, 出血も認められる。腎全体として浮腫を生じている。
6. 赤血球の毛管内充満と局所的な壊死が認められる。
7. カタル性胃腸炎
8. 背側筋肉にみられた硝子変性。その周辺には増殖性炎症はみられない。
9. 背側筋肉にみられた筋肉融解, 筋隔結合組織に一部増殖がみられる。