長野県における優生保護法による人工 妊娠中絶の推移について

第2報 特に出生に及ぼした影響について

長野県衛生部

小島 温 加藤 光徳 高野 武悦

(本稿は昭和26年11月第6回日本公衆衛生学会に於て発表したものである)

我々は既に昨年優生保護法施行後20ヵ月間に実施された人工妊娠中絶(以下中絶と略す)17,987件につき、月別の推移状況、法12条と法13条の関係、適応の号別分類、年令別、職業別、妊娠月数、手術々式、中絶実施の理由の病類別分類等につき発表したが、其後中絶は益々増加の一途をたどり、これに平行して人口の減少が顕著となつた。即中絶は本来の母体保護という面より、人口問題の一解決策としての意義の方に強く働きつつある現状なので、此処に第二報として、昭和25年の長野県の出生に及ぼした影響、並に、法施行以來26年8月迄の中絶増加の推移、及び中絶実施の状況につき、24年後期から25年前期と25年後期から26年前期とを比較し、その結果をここに発表する。

1. 中絶の増加について

長野県における優生保護法による中絶の件数は第1表の如く、昭和24年7,240件、昭和25年17,042件、昭和26年1月から8月迄は15,169件で、26年には月平均約1,900件となり、法施行以來26年8月まで39,451件である。

これを出生率と同様人口1000対をもつて中絶率として、月別の増加の推移をみると、第2表の如く、24年3.40%、25年8.27%となり、更に26年には8月までで11.08%となる。即24年以來増加の一途をたどり未だ減少の徴をみない。

2. 死産率について

戦後死産率の増加は各方面から憂慮されつ

第1表 長野県における人工妊娠中絶実施数

昭和		12条	13条	経済的	計
24年	{ 実施数	3,165	4,075	200	7,240
	{ 比率%	43.7	56.3	(2.7)	100.0
25年	{ 実施数	1,568	15,474	765	17,042
	{ 比率%	9.2	90.8	(4.4)	100.0
26年	{ 実施数	1,114	14,055	612	15,169
1~8月	{ 比率%	7.3	92.7	(4.0)	100.0
計	{ 実施数	5,847	33,604	1,577	39,451
	{ 比率%	14.8	85.2	(4.0)	100.0
全 國	{ 実施数	168,961	320,150	19,024	489,111
25年	{ 比率%	34.5	65.5	(3.9)	100.0

第2表 月別人工妊娠中絶率 (人口1,000につき)

昭和	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
24 {実施数	159	367	481	363	523	680	805	714	814	731	740	863	7,240
率	0.88	2.23	2.66	2.08	2.90	3.89	4.46	3.95	4.67	4.05	4.24	4.78	3.40
25 {実施数	966	1,215	1,429	1,214	1,448	1,437	1,444	1,594	1,677	1,520	1,372	1,726	17,042
率	5.53	7.66	8.18	7.19	8.29	8.51	8.27	9.13	9.93	8.70	8.12	9.88	8.27
26 {実施数	1,444	1,957	2,173	1,665	1,939	1,806	1,928	2,256					15,169
1~8月 率	8.27	12.35	12.44	9.86	11.10	10.69	11.04	12.92					11.08

第3表 月別出生数, 死産数, 死産率

年月	出生数	死産数		死産率	
		自然	人工(A)	A	B
24 1	7,254	276	125	53.4	56.5
2	5,528	251	160	71.2	100.5
3	5,478	260	170	73.8	119.1
4	4,977	265	174	82.0	112.0
5	4,820	217	203	80.3	133.0
6	4,088	251	201	100.5	185.4
7	4,222	201	233	93.9	192.4
8	4,304	201	247	71.4	95.2
9	4,804	226	255	81.4	91.3
10	4,839	224	237	73.1	88.8
11	4,453	186	213	74.0	84.3
12	4,120	216	249	86.3	102.7
計	58,887	2,774	2,467	7,240	82.8
25 1	5,497	232	224	96.6	76.6
2	4,887	224	346	1,215	104.4
3	4,730	262	326	1,429	110.5
4	4,186	179	317	1,214	105.9
5	3,806	218	299	1,448	119.5
6	3,496	150	224	1,437	96.6
7	3,808	187	253	1,444	105.6
8	3,911	202	324	1,594	118.7
9	4,237	197	336	1,677	111.7
10	4,315	188	283	1,520	98.4
11	3,938	180	225	1,372	93.4
12	3,957	206	288	1,726	110.9
計	50,768	2,425	3,365	17,042	103.8
26 1	5,568	241	281	1,444	85.7
2	4,420	217	377	1,957	118.4
3	4,278	222	389	2,173	124.9
4	3,789	181	322	1,665	117.4
5	3,748	205	275	1,939	113.5
6	3,356	163	232	1,806	105.3
7	3,544	131	262	1,928	99.8
8	3,443	141	305	2,256	114.6
計	32,146	1,501	2,443	15,168	112.3

註 死産数の中人工(A)は人口動態統計による届出られた人工妊娠中絶数
 人工(B)は優生保護法による届出られた人工妊娠中絶数
 死産率の中Aは自然+人工(A)の率
 Bは自然+人工(B)の率

つあり、且これが中絶の増加によるものであることは、既に明らかにされた事実であるが、人口動態統計による死産率(出産1000に対する死産)は、妊娠4ヵ月以後の自然死産と中絶実施の中、妊娠4ヵ月以後のもので、且死産届をなしたものに限られている。この月別死産率は第3表の死産率(A)の示すとおりである。しかしこの死産率は中絶を行つたものの極く一部を含むに過ぎず、例えば長野県では4ヵ月以後は全体の3%以下である。

我々は此処に優生保護法にもとづいて届出られた中絶実施件数を、人口動態の中絶数に置換えて、死産率を算定したところ、第3表の死産率(B)の如く、驚異的な値を示した。即24年には207.5%, 25年は242.6%となり、26年は8月までの平均は328.0%となり、8月の如きは410.8%という値を示すに至つた。

即長野県に於ては昭和26年には妊娠した婦人3人の中1人は中絶を行つてゐるということが云いするのである。

3. 昭和25年の出生に及ぼした影響について

昭和24年法施行以来急激に増えつつある中絶が、長野県に於ては24年7月頃から出生に影響していると考えられる。しかし最も明らかになつたのは昭和25年以降である。

我々は各保健所に提出された、法12条並に法13条による中絶の実施報告書にもとづき、その中絶の妊娠月数を握み、これから若し中絶が行われずそのまゝ分娩したとの仮定の下に、出生数を算出し、この値を25年の届出出生数に加えて若し中絶がなく正常に出産した

との仮定の下に出生率を算出した。此値と昭和22, 23, 24年の3年間の月別平均出生率と比較すると, 第4表の如く1月から6月迄は殆んど同率で, 7月より12月まではこれを上廻っている。即昭和24年の長野県の婚姻率は

9.9で22年の11.9, 23年11.2より下廻っているにもかかわらず, 中絶を全く行わなかったと仮定した場合の出生率は, 殆んど22, 23, 24の3カ年の平均値に等しいか, 更にこれを上廻っている状況である。

第4表 長野県における昭和22, 23, 24, 25年の出生数並出生率及び25年の仮定出生数及び率

昭和		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
22	実数	6,881	5,364	5,506	4,883	4,821	4,290	4,656	4,915	5,591	5,676	5,060	4,277	61,920
	率	39.4	33.8	31.5	28.9	27.6	25.4	26.6	28.1	33.1	32.5	29.9	24.5	30.0
23	実数	7,122	5,780	5,705	4,876	4,716	4,163	4,196	4,506	4,823	5,189	4,869	4,169	60,114
	率	40.4	35.0	32.3	28.6	26.7	24.4	23.8	25.5	28.2	29.4	28.5	23.6	28.9
24	実数	7,254	5,528	5,478	4,977	4,820	4,088	4,222	4,304	4,804	4,839	4,453	4,120	58,887
	率	40.1	33.7	30.3	28.4	26.6	23.4	23.3	23.8	27.5	26.7	25.4	22.8	27.6
25	実数	5,497	4,887	4,730	4,186	3,806	3,496	3,808	3,911	4,237	4,315	3,938	3,957	50,768
	率	31.4	30.8	26.1	24.7	21.7	20.6	21.7	22.3	25.0	24.6	23.2	22.6	24.6
25	実数	6,194	5,692	5,548	4,987	4,543	4,316	5,144	5,402	5,993	6,191	5,713	5,468	65,191
	率	35.4	35.8	31.7	29.5	26.0	25.5	29.4	30.9	35.5	35.4	33.8	31.3	31.6
22, 23, 24 平均		率	40.0	34.1	31.4	28.6	27.0	24.4	24.6	25.8	29.6	29.6	28.0	28.8

すなわち昭和25年の長野県における出生の減少は, 中絶による影響が大部分で, 受胎調節によつて減少したと考える数は僅少と云わざるを得ない。25年後半に於て仮定の出生率が真の出生率を遙かに上廻っているのは, 2回以上継続中絶を実施した婦人の急増によると考えられる。すなわち中絶後3乃至7カ月で再妊娠し, 更に中絶を実施している婦人の増えている姿と考えられる。

我々は更に昭和26年以降の出生率の推移を追及し, 出生と中絶, 受胎調節との関係即出生に及ぼす受胎調節, 中絶の影響を明らかにしたいと考えている。

4. そ の 他

(1) 優生保護法第12条, 13条及び経済的理由について

12条と13条とは法施行以来, その適応に種々問題があつたが, 長野県では正しい医学的常識と12条の場合にも届出をするよう医師の協力を求めた結果, 比較的確実に届出が行

われ, 第1表の如く23年には12条が全体の43.7%であつたが, 25年には9.2% (全国34.5%), 26年1月より8月迄の累計では7.3%となつている。

尙昭和24年8月法改正により認められた経済的理由を含む中絶は, 比較的少く, 24年2.7%, 25年4.4%であつた。

(2) 中絶を受けた婦人の年齢

昭和24年1月から25年8月までの17,987件と, 25年9月から26年8月迄の21,464件について, 比較すると, 第5表の如く30才代は殆んど変りないが, 10才代は0.9%が1.8%と約2倍になり, 20才代は32.9%から36.7%に増えた。逆に40才代は15.9%から12%に減じている。しかしこれを25年の全国に比較すると, 若年婦人は低い。即長野県では受胎調節を行つている婦人は20才代30才代に多いと考えられる。

(3) 中絶を受けた当時の妊娠月数

昭和24年8月から25年7月迄の1カ年と,

第 5 表 人工妊娠中絶を受けた婦人の年齢

昭 和		年 齢					計
		19以下	20~29	30~39	40~49	50以上	
24, 1月~25, 8月	実 数	168	5,923	9,029	2,852	15	17,987
	比率%	0.9	32.9	50.2	15.9	0.1	100.0
25, 9月~26, 8月	実 数	390	7,851	10,637	2,578	8	21,464
	比率%	1.8	36.6	49.6	12.0	0	100.0
計	実 数	558	13,774	19,666	5,430	23	39,451
	比率%	1.4	34.9	49.9	13.8	0	100.0
25 年 全 國	実 数	17,022	203,967	215,939	51,026	580	489,111
	比率%	3.5	41.7	44.1	10.4	0.1	100.0

第 6 表 人工妊娠中絶実施当時の妊娠月数

昭 和		2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	計
24年8月~ 25年7月	実施数	2,114	7,591	721	1,108	1,010	462	26	13,032
	比率%	16.8	57.8	5.5	8.4	7.7	3.5	0.3	100.0
25年8月~ 26年7月	実施数	4,571	12,163	1,092	1,366	1,055	512	9	20,768
	比率%	22.0	58.6	5.2	6.6	5.1	2.5	0	100.0
計	実施数	26,439		4,287		3,039		35	33,800
	比率%	78.3		12.7		9.0		0	100.0
25 年 全 國	実施数	377,420		69,602		40,807		不詳1,282	489,111
	比率%	77.2		14.2		8.3		0.3	100.0

第 7 表 人工妊娠中絶実施の手術々式

昭 和	内 容	ブー 挿入法	ラミナ リア挿 入法	薬 剤 に よ るもの	アブレ ル氏法	メトロイ リンテル 挿入法	その他	不明	計
24年8月~ 25年7月	実施数	8,757	1,201	1,225	72	51	1,078	96	13,032
	比率%	67.2	9.3	9.6	0.4	0.3	8.3	0.7	100.0
25年8月~ 26年7月	実施数	15,684	1,800	1,892	90	4	783	396	20,768
	比率%	75.6	8.7	9.2	0.1	0	3.9	1.6	100.0
計	実施数	24,441	3,001	3,117	162	55*	1,861	422	33,800
	比率%	72.3	8.9	9.3	0.5	0.2	5.5	1.2	100.0

25年8月から26年7月までの1カ月と比較すると第6表の如く妊娠2~3カ月で受けた婦人は、前者は74.6%、後者は80.6%で、6%も増えている。即最近は妊娠3カ月以内に手術を受けた婦人は、全体の $\frac{1}{5}$ であり、人口動態統計による中絶は、全体の $\frac{1}{2}$ 以下になっている。24年8月から26年7月迄の33,800件の統計では、3カ月以内に手術を受けた婦人は78.3%で、全国25年の77.2%に較らべやゝ高率である。

(4) 中絶実施の手術々式

第7表の如く内容除去術は67.2%から75.6%に増え、逆に問題のあつたアブレル氏法は

8.3%から3.7%と半減している。

5. 中絶を受けた理由 (病類別)

第8表の如く、結核によるものは11.6%から16.9%と約半減したが、一方妊娠中毒症は39%から57.6%に増えている。これは結核対策の進展に伴い届出の励行が厳格に行はれるようになったため、架空的な結核症が減少したためと推察される。

結 び

1. 長野県では最近人工妊娠中絶は人口1000につき10乃至12で月平均1,900件もあり、妊婦3人に1人の割合で中絶を行つていること

第8表 人工妊娠中絶実施の理由(病類別)

昭和		全結核	ビタミン 缺乏症	血液及 造血器 の疾患	精神病 及神経 系疾患	循環器 系の疾 患	消化器 系の疾 患	尿器 系の疾 患	妊 娠 中毒症	性器及 産道異 常	そ の 他	計
24年8月～	実施数	1,509	1,760	354	90	803	263	1,397	5,078	68	1,710	13,032
25年7月	比率%	11.6	13.5	2.7	0.7	6.2	2.0	10.7	39.0	0.5	13.1	100.0
25年8月～	実施数	1,442	2,425	861	127	264	402	1,558	11,978	397	1,314	20,768
26年7月	比率%	6.9	11.7	4.2	0.6	1.3	1.9	7.5	57.7	1.9	6.3	100.0
計	実施数	2,951	4,185	1,215	217	1,067	665	2,955	17,056	465	3,024	33,800
	比率%	8.7	12.4	3.6	0.6	3.2	1.9	8.7	50.5	1.4	9.0	100.0

となる。

2. 優生保護法による全人工妊娠中絶を含めた死産率は、おどろくべき高率を示し、長野県では24年145.3, 25年277.1, 26年8月の如きは410.4という値を示している。

3. 昭和25年の長野県の出生減少は殆んど中絶によるものと考えられる。

4. 中絶の原因となつた疾患の中では、妊娠中毒症が最も多く、且つ逐年的に増え、結核その他の疾患は減少している。

5. 妊娠2～3カ月の所謂早期に中絶を行う婦人は次第に増えている。

6. 若年婦人の中絶は次第に増えつつあるが全国に較らべると未だ少い。

7. 手術々式は内容除去術が増え75.5%となりアブレル氏法は半減して3.7%となつた。

参考文献

- 1) 優生保護法施行後の人工妊娠中絶の状況に関する研究 第1報 人工問題研究所研究資料第67号, 昭25.11.
- 2) 加藤, 高野, 小島: 民族衛生, 17巻, 6号, 昭26.3.
- 3) 白木: 人口問題と最近における人工妊娠中絶の動き, 治療, 昭26.10.
- 4) 高野, 小島: 長野県における人工妊娠中絶及び受胎調節の実施状況について, 長野県衛生部研究資料1号, 昭26.8.
- 5) 昭和25年年計分優生手術人工妊娠中絶実施数 厚生省, 公衆衛生局庶務課.

Items	Newborn		Adult*		A.N. Ratio		Average of ratio
	male	female	male	female	male	female	
Antero-posterior diameter of chest ..			18.43	16.10			
Transverse diameter of chest			26.85	25.30			
Sitting height	32.39	32.13	89.99	84.47	2.7	2.6	2.6
Breadth of shoulders	12.28	12.17	36.82	34.19	2.9	2.8	2.8
Distance between iliac tubercles	8.81	8.68	25.73	26.19	2.9	3.0	3.0
Girth of waist	28.35	28.11	66.38	66.26	2.3	2.2	2.2
Length of upper limb	20.23	20.17	74.67	67.95	3.5	3.3	3.3
Length of upper arm	7.59	7.49	29.36	28.46	3.8	3.7	3.7
Length of forearm	6.27	6.18	24.14	21.53	3.8	3.4	3.4
Length of hand	6.02	5.99	18.12	17.00	3.0	2.8	2.8
Girth of upper arm	10.38	10.18	23.89	22.11	2.3	2.1	2.1
Girth of forearm	10.38	10.26	23.23	21.87	2.2	2.1	2.1
Leg length	20.67	20.61	93.71	85.74	4.5	4.1	4.1
Length of thigh	10.48	10.38	46.53	44.45	4.4	4.2	4.2
Length of the tibia	8.25	8.23	34.44	32.21	4.1	3.9	3.9
Length of foot	7.69	6.78	25.11	22.56	3.2	2.9	2.9
Girth of thigh	15.23	15.17	46.51	45.91	3.0	3.0	3.0
Girth of calf	11.67	11.33	34.31	33.36	2.9	2.9	2.9

*(Averages of measurement in the 18~50 years old)

4. These results in Koreans were compared with the results in Japanese and European reported by other authors; and the following were pointed out. The difference between Koreans and Japanese in physique and its growth is much smaller than that between Koreans and Europeans.

*(From the Department of Hygiene, Sowel University Medical College,
and from the Department of Physiology, University of Tokyo School of Medicine)*

CURRENT TREND IN THE INCIDENCE IN NAGANO PREFECTURE OF ARTIFICIAL ABORTION BASED ON THE EUGENIC PROTECTION LAW. SECOND REPORT

By

A. Kojima, M. Kato and T. Takano

1. Monthly incidence of Artificial Abortion in Nagano Prefecture amounted 1,900 which figure represents 10~12 cases per month per 1,000 population. This corresponds to every third pregnant woman undergoing the operation.

2. Ratio of still-birth including total cases of artificial abortion based on the Eugenic Protection Law has been strikingly high. In Nagano Prefecture it was 145.3 per 1,000 birth in 1949; 277.1 in 1950; and as high as 410.4 in August 1951.

3. Decrease in 1950 of birth rate in Nagano Prefecture is regarded mostly due to artificial abortion.

4. List of disorders notified as the respective reason of artificial abortion is headed by pregnancy toxicosis with marked annual increase. Tuberculosis and other diseases are on the decrease.

5. So-called early interruption within three months of pregnancy is steadily increasing.

6. Interruption in younger women is also increasing, although still below the national average.

7. Of the applied techniques, curettage increased to preponderance, i. e. 75.5% while the *Aburel's* procedure decreased to 3.7%, a half as compared with the figure of the previous period.

(From the Department of Hygiene, Nagano Prefecture)

BLOOD GROUPS AND PHYSICAL MEASUREMENTS OF THE MONGOLIANS
IN URAN-CHAPP PROVINCE IN INNER MONGOLIA, AND
PHYSICAL MEASUREMENTS OF THE CHINESE
AT TATUNG IN SHANSI

By

Toshiyasu Hirokawa

The blood group in Mongolian soldiers at Pairing-Myao in Uran-Chapp was examined. Of 102 individuals tested, 27 belonged to "O", 24 to "A", 39 to "B", and 12 to "AB".

The biometric findings of the Mongolian soldiers at Pairing-Myao are as follows:

The body length is $166.85\text{cm} \geq m \geq 161.85\text{cm}$, head length is $187.5\text{mm} \geq m \geq 183.1\text{mm}$, head breadth is $156.6\text{mm} \geq m \geq 152.2\text{mm}$, and head span index is $84.6 \geq m \geq 82.2$.

The head span index of the Lama priests (Mongolians) in Uran-Chapp province is $84.4 \geq m \geq 82.0$, and of the Chinese at Tatung is $85.1 \geq m \geq 83.5$.

(From the Medical Clinic of (Prof. K. Omori)

Keio University Medical School)