精神薄弱に於ける智能と身長の関係

京都大学精神医学教室（主任 三浦教授）

大津少年鑑別所 逸 見 武 光

緒 言

精神薄弱なる概念は主として智能を規準としたもので、その診断にも智能検査を用いた智能段階が今日依然として最も重要視されている。これは従来考え方が精神薄弱を正常からの量的変異として理解しており、かゝる観点から正常と比較してその偏倚の程度を問題にしているからに外ならない。周知の通り Binet がバリの異常児を選択する目的から智能検査を考案しその評値を正常児の発育を規準として行つてより精神薄弱の判定には精神年齢なる考え方が大きく支配して來た。また Galton が彼の優生学的立場から人間の能力は General ability の量的差位でその段階別頻度分布曲線は所謂 Ogive Curve を描くとの仮説を立て、これを客観的に測定する手段として各種の精神検査法を考案した事は Binet の精神検査と共に以後の学者に大きな影響を与えた。就中 Stern 及び Terman が精神発達速度の恒常性を把えて I. Q. なる評値を下すに及び智能発育に関する量的差位の考え方は愈々支配的となつて來たように思はれる。而して Thorndike 等も大量観察の場合測定値の分布がテストの方法や被検者の年齢等に関係する事無く常に正常曲線を描くと主張している。

然しながら他方 Sperman 及び Thurstone 等は因子分析の立場から智能なる概念を検討し精神薄弱が単独の因子に制約される智能の量的差位としてのみ理解される可きでない事を示唆している。更にまた現行の智能検査方法に対して、例えば成功点が分散した場合の採

点に関し、或は言語法と動作法の間に差の出ること等からしてこれを精神薄弱、特にその強度なものに施行する際の評価方法に疑問があるとしている学者も少なく、Terman 自身も“数量的方法の Quasi-exactness に陥らぬこと”をその師 S. Hall からの忠告として伝えている。中でも特に興味があるのは Lewis 或いは Roberts 等が集団智能検査より得た智能指数の頻度分布に於て魯鈍級迄は概ね正常曲線を辿つて下降するが痴愚級以下になると頻度分布曲線が正常曲線を上廻つて下降が緩徐になる傾向を指摘している点である。その結果魯鈍級のものは智能指数の頻度分布に於て正常曲線の末尾を占めるものとしてこれに subcultural group なる名称を与え、これに対して痴愚級以下の精神薄弱を pathological group として一括し前者より類別することを提唱した。満田教授も體質と遺伝性疾患の問題に関連して、精神薄弱の遺伝生物学的分類に際しても先ず数量因子型と病的因子型（突然変異型）の二群を前提とす可きことを強調している。即ち正常との間に智能の発育程度に関し連続的移行を示す数量因子型に対し病的因子型は正常智能の単なる量的変異ではなく本来異質的なもので前者とは成因的にも相違するものであると述べている。

吾々もまた精神薄弱の分類は外因性、内因性を問はず先ず量的変異と質的変異の二者に類別する事から出発す可きであるとの観点に立つものであつて、また斯かる類別は言う迄も無く、智能を含む人格全体の発達と共に身体的生物学的な種々の特徴をも併せ考察する事に依つて初めてなし得るものと考えるので

ある。今回は此のような精神薄弱の生物学的分類に対する予備研究の意味に於て、生物学的指標の中、先ず身長を選び、それと智能との間に病因論的に如何なる関係があるかを検討することにした。

調 査 方 法

資料は14才から20才迄の保護少年1010例で智能検査は250例にヴェクスラー・ベルビュー改訂法を、760例に田中B式を用いた。身長に対しては本邦少年の標準身長に対する吾々の症例の身長の百分比を求め、智能指数に対照してこれを仮りに「身長指数」(略称S. I., stature index)と名付ける事にした。標準値としては吉田章信氏の「学徒体力標準表」を用いたが、本研究に於ては数値そのものの意味を求めるのが目的ではなく、かゝる身長指数が智能指数との間に如何なる関係を有するかを追求したのである。

I. Q. の段階別 S. I. の算術平均

先ず I. Q. の各段階別に S. I. の算術平均と標準偏差及び蓋然偏差を求めたところ第I表及び第I図の通りである。

今その結果を要約すると、

1) I. Q. の総べての段階を通じて S. I. は100以下である。これは本研究の資料が保護

第I表 I. Q. 別 S. I. の算術平均

	S. I.		
	M±S.D.	P.E.	例数
I. Q. { 101 以上	97.29±3.46	0.20	146
91~100	96.78±3.74	0.18	200
81~90	96.58±4.11	0.19	208
71~80	95.88±4.13	0.21	172
61~70	95.46±4.48	0.27	129
51~60	94.81±4.14	0.33	66
50 以下	92.34±5.16	0.40	75

M: 算術平均

S.D.: 標準偏差

P.E.: 蓋然偏差

第I図 I. Q. 別, S. I. の算術平均

少年から得たものであることよりして、一応首肯出来よう。社会的劣位と身体發育或いは精神發育の劣位とが平行する事は古く Villerme や Quetelet 以來諸家の認めているところであるが、然しかゝる問題は本研究の目的でもないので此所では深く追求しない。

2) I. Q. 段階別に 観る時第I図の示す如く I. Q. 80 迄は S. I. に顯著な変化は認められないが80以下に於て少々低下し、50以下に於ては著明な下降を示している。

3) 蓋然偏差は I. Q. 70 以下で少々大きくなり、I. Q. 50 以下では可なり著しく大となる。即ち“変異”の幅が広くなるのが見られる。

期待頻数と実頻数の関係

上述の結果を更に推計学的に検討する目的から智能検査をヴェクスラー・ベルビュー改訂法に統一して得た250例に就いて、第II表を作製し詳細に調査してみた。括弧内の数値は I. Q. と S. I. の間に何等の関係も成立しないと仮定した場合にでも予期し得る頻度分布を表の各 battery に就いて求めたものである(期待頻数)(第II表)。今実頻数と期待頻数を比較してみると次の事実を知り得る。

1) I. Q. 81 以上では S. I. 95 以上に於て概ね、期待頻数<実頻数であるのに反し、S. I. 94 以下に於ては、期待頻数>実頻数となる。

2) I. Q. 50 以下では S. I. 95 以上に於て概ね 期待頻数>実頻数であるのに反し S. I.

第Ⅱ表 期待頻数と実頻数の関係

(括弧内は期待頻数)

		S.I.						
		84 以下	85~89	90~94	95~99	100~104	105~109	Ti
I.Q.	21~30	{ (0.09) 0	(0.81) 2(+)	(2.48) 3(+)	(2.70) 1(-)	(0.88) 1	(0.06) 0	7
	31~40	{ (0.21) 1(+)	(2.10) 5(+)	(6.03) 5(-)	(6.40) 6	(2.16) 0(-)	(0.14) 0	17
	41~50	{ (0.39) 1(+)	(4.00) 8(+)	(11.7) 16(+)	(12.5) 6(-)	(4.12) 3(-)	(0.27) 0	34
	51~60	{ (0.42) 0	(4.23) 4	(12.4) 16(+)	(13.3) 13	(4.40) 2(-)	(0.28) 0	35
	61~70	{ (0.51) 1	(4.96) 4(-)	(14.5) 14(-)	(15.5) 17(+)	(5.13) 5	(0.33) 4	41
	71~80	{ (0.54) 0(-)	(5.30) 6(+)	(15.6) 14(-)	(16.7) 19(+)	(5.50) 5(-)	(0.36) 0	44
	81~90	{ (0.30) 0	(3.00) 1(-)	(8.90) 6(-)	(9.40) 10(+)	(3.13) 7(+)	(0.20) 1(+)	25
	91~100	{ (0.33) 0	(3.40) 1(-)	(9.90) 10	(10.5) 13(+)	(3.50) 4	(0.23) 1(+)	29
	101~110	{ (0.15) 0	(1.60) 0(-)	(4.00) 3(-)	(4.30) 8(+)	(1.60) 2	(0.10) 0	13
	111~120	{ (0.06) 0	(0.60) 0(-)	(1.80) 2	(1.90) 1(-)	(0.63) 2(+)	(0.04) 0	5
Tj		3	31	89	94	31	2	250

但し +: 実頻数>期待頻数

-: 実頻数<期待頻数

第Ⅱ図 I.Q. と S.I. の関係による
頻度模型図

94 以下に於ては 期待頻数<実頻数 となる。

3) I.Q. 51~80 の間では S.I. の何れの段階に於ても 実頻数と期待頻数との間に 特定の傾向が認められない。

以上の所見を模型的に表現すると第Ⅱ図のようになる。(第Ⅱ図)

尙本研究の標準値に使用した吉田の資料を S.I. に換算すると吾々の資料の大半を占める 17 才~19 才の男子では S.I. 94 なる値が平均値から $-2d$, 即ち正常偏倚の概ね下限界に当る。従つて S.I. 94 以下は病的に身長發育の阻碍されているものと考えてさしつかえ無からう。斯くて上記の所見は身長發育の正常なものには I.Q. 81 以上が多く、身長發育の著しく阻碍されているものには I.Q. 50 以下が多いことを示唆するものと言える。

検 定

次に上述の所見が偶然に依るものか否かの検討を行う 目的で 種々の推計学的操作を施してみた。

〔I〕検定の便宜上 I.Q. 及び S.I. を共に均等に 4 区分して第Ⅲ表を作製しこれに χ^2

第Ⅲ表 資料の検定〔Ⅰ〕

		S.I.			
		90以下	91~93	94~96	97以上
		Ti			
I.Q.	50以下	21	18	5	14
	51~70	13	15	24	24
	71~90	8	14	17	30
	91以上	2	9	13	23
	Tj	44	56	59	91
		Tj			
		44	56	59	91
		250			

$$\chi^2 = N \left\{ \frac{\sum f_{ij}^2}{T_i T_j} - 1 \right\} = 37.121 \quad df=6 \quad P<0.01$$

検定を施したところ 1% 以下の危険率で有意となり、従つて各カテゴリー間の頻数差は決して偶然に作るものではないことが判る。而して I.Q. と S.I. の間の定性相関係数は

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{N + \chi^2}} = 0.37$$

となり相関としては決して強くない。即ち S.I. を指標とする場合、I.Q. の分布は全体として特定の傾向を示すものではなく、各段階に依つて様相を異にすると言う前述の所見と合致する。

〔Ⅱ〕第Ⅳ表は S.I. 93 以下、即ち身長发育の阻碍されているものと、S.I. 94 以上、即ち身長发育の正常なものと I.Q. 別頻度表である。χ² 検定の結果は共に 1% 以下の危険率で有意であり頻数の信頼限界は

$$f_k - \frac{1}{\sqrt{n-1}} \sqrt{f_k^2 \times 2\alpha} \leq \varphi^k \leq f_k + \frac{1}{\sqrt{n-1}} \sqrt{f_k^2 \times 2\alpha}$$

(但し $\chi^2 \alpha = 98\%$ として計算)

に依つて求めたところ次の如くである。

(a)

$$7.6 \leq \varphi_{1a} \leq 14.4$$

$$17.1 \leq \varphi_{2a} \leq 26.9$$

$$22.6 \leq \varphi_{3a} \leq 33.4$$

$$32.4 \leq \varphi_{4a} \leq 45.6$$

(b)

$$30.6 \leq \varphi_{1b} \leq 43.4$$

$$39.8 \leq \varphi_{2b} \leq 54.2$$

$$40.8 \leq \varphi_{3b} \leq 55.2$$

$$15.4 \leq \varphi_{4b} \leq 22.6$$

即ち S.I. 93 以下では I.Q. 91 以上が I.Q. 90 以下に比して、及び S.I. 94 以上では I.Q. 50 以下が I.Q. 51 以上に比して共に著しく少い事が証明出来た (第Ⅳ表)。

次に同じく第Ⅳ表に依つて I.Q. 別に S.I. 93 以下と S.I. 94 以上の頻度を比較してみる χ² と検定の結果は I.Q. の各段階共有意である。即ち I.Q. 51 以上では身長发育の正常なものが障碍されているものより多く、I.Q. 50 以下では逆に身長发育の阻碍されているものが正常なものに比して多いという吾々の所見は決して偶然によるものではない事が証明出来た。なお危険率は 51~70 の群に於てのみ 2%~5% でその他は何れも 1% 以下である。而して頻数の信頼限界を先の式に依つて求め

第Ⅳ表 資料の検定〔Ⅱ〕

		S.I.		T	
		(a)	(b)		
		93以下	94以上	T	
I.Q.	(1) 91以上	11	36	47	(1) $\chi^2=14.08 \quad df=1 \quad P<0.01$
	(2) 71~90	22	47	69	(2) $\chi^2=9.04 \quad df=1 \quad P<0.01$
	(3) 51~70	28	48	76	(3) $\chi^2=5.264 \quad df=1 \quad 0.05>P>0.02$
	(4) 50以下	39	19	58	(4) $\chi^2=6.896 \quad df=1 \quad P<0.01$
	T	100	150	250	
		(a) $\chi^2=15.465 \quad df=3 \quad P<0.01$			
		(b) $\chi^2=14.093 \quad df=3 \quad P<0.01$			

たところ

- (1) $0.7 \leq \varphi_{a1} \leq 21.3$
 $17.9 \leq \varphi_{b1} \leq 56.1$
- (2) $7.3 \geq \varphi_{a2} \geq 36.7$
 $25.5 \geq \varphi_{b2} \geq 68.5$
- (3) $11.4 \geq \varphi_{a3} \geq 44.6$
 $26.3 \geq \varphi_{b3} \geq 69.5$
- (4) $19.4 \geq \varphi_{a4} \geq 58.6$
 $5.3 \geq \varphi_{b4} \geq 32.7$

となり何れも重り合つて頻度差の比率をその儘信頼する事は出来ない。

考 察

緒言で述べた如く近來心理学的立場からも精神薄弱を単なる量的変異と見做すことに対しては多くの批判が繰返えされているが、更に医学的、生物学的研究を検討してみると諸家の見解はより一そう複雑である。即ち精神發育制止と生物学的異常の間に於ける相関の有無に関し、或は痴呆と精神薄弱の判別の問題を巡つて異論のあることは周知の通りであり、Ziehen の如きは精神發育制止なる概念を Defekt-Psychose と呼ぶのがより適當であるとしている。然しながら此の混沌とした事実を統一的に理解する観方として、例えば杉田教授は特殊な病因又は病的變化に依るものはこれを一病症として考え、一般に見られる智能の低劣はこれを正常智能よりの変異と考ふ可きである、との見解を表明している。また Benda は I.Q. 55 以下は正常智のものと mentality の点に於て質的にも構造的にも異なるが故に精神測定に依つて唯量的に比較することの無意味な点を強調すると共に、從來の内因性精神薄弱なる概念には病的な遺伝因子に依る群と normal variation の範囲内にある intellectually inadequate の群と言う質的に全く異つた2つのものが含まれていると指摘している。なお彼は智能程度の頻度分布が normal curve を描くと仮定した場合

I.Q. 55~70 の間に位するものが期待値よりはるかに多いのは inadequate group に pathological group の加つているためであろうと推論しているが緒言で述べた満田教授の見解を併せ考えると甚だ興味深い。

吾々は先ず I.Q. 段階別 S.I. の算術平均を I.Q. 81 以上、50~80、50 以下の3群に分けて比較した結果、身長發育の著しく阻害されているものには正常智が少く、身長發育の大して阻害されていないもの及び正常なものには魯鈍以下の智能障害が少いと云う傾向を確認した。このことは精神薄弱の中に智能障害を生体全体の發育障碍の部分現象として捉える可き群の存在することを示唆すると共に、精神薄弱の分類に際し身体的基盤に立つて人格全体の發育を考察することの重要性を物語るものと思はれる。

第2に I.Q. 51~80 の間でも身長の算術平均が少々低下する点を考察してみる。I.Q. 段階と S.I. 段階を battey に組んで各 Category 間の実頻数と期待頻数を比較してみると、I.Q. 51~80 の群では S.I. の何れの段階に於ても I.Q. との間に特定の傾向が認められないこと、及び I.Q. 別に S.I. 93 以下と S.I. 94 以上の頻度を比較した結果、危険率が他の I.Q. 段階では 1% 以下であるのに反して I.Q. 51~70 の群のみは 2~5% と上昇することから吾々は次のように考え度い。先述の如く生体全体の發育障碍に伴つて現はれる智能障害は多くの場合魯鈍級以下と思はれるが、魯鈍の上位及び限界級に於てもなおある種類の障碍が可なり存在している。即ち Benda の分類に従えば subnormal group と pathological group とが此の領域に於て交錯していると推測されるのである。換言すれば I.Q. 段階のみに依つて subnormal group と pathological group を類別することは危険であり、かゝる分類に際しては当然生体全体の發育障碍の有無を示唆する身体徴候をも併せ

て指標としなければならない。島崎教授は精神薄弱脳の重量を測定して痴愚級以上の大多数は正常値であるが白痴は一般に著しく値が小さい。然し痴愚に於ても軽量脳を散見し、逆に白痴に於ても正常以上の重量を持つ例を数える、と報告しているが、吾々の得た結果と比較しても興味深い所見である。

結 論

保護少年 1010 例に就き、智能と身長の関係をも I.Q. と S.I. を基として調査し且つ推計学的に種々検討した結果次のような結論に到達した。

1) S.I. 93 以下、即ち身長發育の病的に阻碍されているものでは I.Q. 50 以下が多いのに対し、S.I. 94 以上、即ち身長發育の正常なものでは I.Q. 51 以上が多いことを確認した。斯くして精神薄弱の分類に際し智能のみが正常より劣る **subnormal group** と智能障礙がむしろ生体全体の發育障礙の一表現と見做し得る **pathological group** の二者に先ず類別す可きであるとの吾々の見解は此のような身長を指標とする調査に依つても或る程度裏書きされる。

2) 而してこれ等 **subnormal** と **pathological** の両群は I.Q. で言えば概ね 50~90 の間で交錯するものと推定される。従つて智能指数に関する限り **pathological group** と

subnormal group は一見連続的移行を示すが、斯かる見かけの移行の底に生物学的変種としての不連続性の存在することを無視しては精神薄弱の合理的、自然的な分類は到底望み得ないと言わなければならない。

附記 本研究に際して終始御指導を賜はりました御校閤を戴いた満田教授に深く感謝の意を表し、併せて資料の過半数を御提供下さった京都少年鑑別所林脩三所長、並びに推計学的処理に関して御教示と御援助を得た大津少年鑑別所林勝造氏に敬意を表すものである。なお本論文の要旨は第 53 回精神々経学会に於て報告した。

文 献

- 1) 安藤：心理学講座，第 9 卷，1953.
- 2) Benda, C. E.: *American J. Psychiatr.* 107, 1951.
- 3) 岩原：心理と教育の爲めの推計学，1952.
- 4) 古賀：心理学講座，第 9 卷，1953.
- 5) Lewis, E.O.: *J. Ment. Sci.* 79, 1933.
- 6) 満田：最新医学，5, 1950.
- 7) 島崎：精神経誌，47, 1943.
- 8) 杉田：精神経誌，47, 1943.
- 9) 作田：心理，1949.
- 10) Roberts, J.A.F.: *Ann. Eugen.* 6, 1935; *Ann. Eugen.* 8, 1938.
- 11) ルネ（白石，田多井共譯）：公衆衛生の原理，（1949 訳）.
- 12) ヴィオ（村上譯）：智能，（文庫クセジュ），（1951 訳）.
- 13) 吉田：学徒体力標準表，1949.

STATURE GROWTH IN THE MENTALLY DEFICIENT

By

Takemitsu Hemmi

The concept of "mental deficiency" depends chiefly upon the grades of intelligence, so that their measurement by various intelligence tests is still highly estimated even at present for the diagnosis of the deficiency. Recent studies on the frequency distribution of I. Q.'s in group intelligence tests as well as heredito-clinical investigations in this domain justify the proposal that mental deficiency cases should be classified into two types: the ordinary and the extraordinary.

From this view-point, the stature growth in cases of mental deficiency, both endogenous and exogenous, was chosen as an indicator for the purpose of classification, and the investigation was held as to what sort of relations existed between this biological index and the intelligence.

Cases of the juvenile delinquent, totaling 1010, were our material. As to the stature, each case was compared with the average stature of the Japanese boys or girls, and thus we have obtained the percentage, which was named as Stature Index. The following result was obtained by the statistical management between the above mentioned indices and the I. Q..

1) Among the mentally deficient with pathologically retarded stature growth (S. I. below 93), there were many whose I. Q. was below 50, while I. Q. amounted, in many cases, above 51 among those indicating almost normal stature growth (S. I. above 94).

The author suggested to divide the mentally deficient into two groups, subnormal and pathological ones; the former reveals only the retardation to the degree of the subnormal intelligence, while on the other hand the latter indicates relatively low I. Q. which is rather regarded as a partial phenomenon of general growth disturbances. The investigations thus performed using stature as an index, seems to favor the above-mentioned stand-point.

2) The overlapping of these subnormal and pathological groups was found to fall in the range between 50 and 80 of I. Q..

(Otsu Juvenile Detention Home)