M. NISHIKAWA and S. NISHIKAWA: In Analysis of
Occurrence of Whooping Cough

百日咳の感受性に関する二、三の知見

東京医科歯科大学医学部解剖学教室

西 川 光 彦

東 邦 大 学 医 学 部 衛 生 学 教 室

西 川 幸 子

百日咳の感受性に関しては、従来数知れぬ程の報文がある。欧米の研究者では、Von Sholly¹⁾, Luttingen²⁾等を筆頭に、De Rudd-er³⁾, Culotta, Dominick and Harrison⁴⁾が報告している。そしてLapin⁵⁾が“Whooping Cough”なる論著を刊行する程に、この疾患は、病原菌の検索方法・その種類・人体側の感受性・治療法・合併症等々の多岐に亘る問題を含んでいる。従つて、我が国における報告の数も枚挙にいとまなき程で、感受性に関するもののみでも、高橋⁶⁾、末広⁷⁾、大谷⁸⁾、相沢・久村⁹⁾、吉岡¹⁰⁾、緒方¹¹⁾、額田¹²⁾、高宮¹³⁾等の研究があり、小山¹⁴⁾の著書も刊行されている。

然し乍ら、百日咳の感受性を先天的並に後天的体質との関連において分析した報文は少ない。額田¹²⁾が、長子は百日咳に罹り易く、中子、末子は罹り難いと云い、高宮¹³⁾もこれを承認し、それが母親の感染による次子の免疫に依ると説明している。また J. Douglas & C. Mogford¹⁵⁾は、未熟児と成熟児で百日咳に対する感受性は変わらないという。

著者は、東京都の衛星都市であるK市及びその近隣の11村を対象として、百日咳罹患状況に関して調査を行つたので、その結果に若干の考察を加えて報告する。

調査方法並に対象

昭和28年3月に調査票を、各小学校を通じ

て、夫々の4,5年生に交付し、母親の記憶にある百日咳罹患状況を記入して貰い、これを集計した。調査地区は図1の如くで、K市を中心にして、隣接する農村と、北方に続く農村地帯であり、東京都へは2本の私鉄、1本の国鉄により結ばれ、1時間で都内へ行きうる地区である。K市は附近の農村の農産物集散地であり、工場は少く、秩父台地より関東水田地域へ移行する位置にある人口約50,000の商業都市である。本調査はK市内の5校と、市外11校を対象としたものである。配布した調査票は3,874枚で、有効な回答を得たのは3,510名分であつた。

図1 調査地区略図

I 都市農村別経過率と額田氏法則について

集計結果：

3,874名のうち回答を得たのは3,510名であ

つて、回答率は 93.7% であり、集計に使用し得るものは 49.1% であつた。この種調査としては、極めて良い成績と思われる。調査対象の内訳は表 1 の如くであり、男女による回答の差は認められなかつた。然し K 市と村部では、市部が 54.2%，村部が 47.5% で若干村部

の方が低い回答率であつた。

百日咳経過率を見るに（表 2），10 才以上では 55.9%，全数では 49.0% であつた。K 市は 54.2%，村部 42.5%，10 才以上では市部 64.4%，村部 43.6% であり、年令の上下を問はず市部の方が高い経過率を示している。10 才以

表 1 調 査 対 象

			男			女			計		
			調査数	経過者	経過率	調査数	経過者	経過率	調査数	経過者	経過率
1	K	市	146	78	53.4	172	82	47.6	318	160	50.3
2	"	"	253	125	49.5	234	118	50.5	487	243	49.9
3	"	"	261	171	65.5	306	154	50.4	567	325	57.3
4	"	"	232	144	62.2	239	134	56.1	471	278	59.0
5	"	"	61	20	32.8	56	35	62.6	117	55	47.0
	小	計	953	538	56.5	1,007	523	51.9	1,960	1,061	54.2
6	Ya	村	72	26	36.1	65	32	49.4	137	58	42.3
7	I	村	48	13	27.1	43	13	30.2	91	26	28.6
8	O	村	57	13	22.8	62	27	43.6	119	40	33.6
9	M	村	45	17	37.9	42	14	33.3	87	31	35.6
10	Yo	村	85	42	49.4	89	37	41.6	174	79	45.4
11	Y	村	35	12	34.3	61	27	44.3	96	39	40.6
12	N	村	56	32	57.2	53	23	43.4	109	55	50.5
13	F	村	116	52	44.8	101	47	46.5	217	99	45.6
14	MF	村	83	31	37.3	101	44	43.6	184	75	40.8
15	T	村	84	45	53.6	101	56	55.4	185	101	54.6
16	D	村	78	27	34.6	73	29	39.7	151	56	37.1
	小	計	759	310	40.9	791	349	44.2	1,550	659	47.5
		計	1,712	848	49.5	1,798	872	48.5	3,510	1,720	49.1

表 2 百日咳，都市農村別経過率（百分率）

		K 市			村 部			計		
		調査数	経過者	経過率	調査数	経過者	経過率	調査数	経過者	経過率
全 数	男	953	538	56.4	759	310	40.9	1,712	848	49.5
	女	1,007	523	51.9	791	349	44.1	1,798	872	48.5
	計	1,960	1,061	54.2	1,550	659	42.5	3,510	1,720	49.0
10 才 以 上	男	520	299	57.5	338	149	44.1	858	448	52.2
	女	518	370	71.4	382	165	43.2	900	535	59.4
	計	1,038	669	64.4	720	314	43.6	1,758	983	55.9

上のものは当然高い経過率を示すことは、市部と村部で変わらないが、市では 10% 以上も高くなるのに対し、村部では 1% 強である。

次に児童の家の職業別に経過率を計出した(表 3)。即ち、商業 (56.5%) が最高で、工業 (55.0%)、勤務 (52.9%) の順で、農業 (45.5%) が最も低い。市部、村部に分けて見ると、市部では商業、勤務、工業、その他、農業の順序であり、村部では工業、その他、商業、勤務者、農業の順であつた。

更に、市部・村部に分けて、男女別に同胞順位別経過率を見た(表 4)。兄弟のない場合、長子、末子、その中間の兄弟に分けて経過率を見ると、男・女；市・村の別なく、長子は中間の兄弟より高い経過率を示していた。

次に、百日咳罹患時に医療を受けたか否かを調べた所、男子では 52.3%，女子では 59.2% が受療しており、市では 66.2%，村では 50.5% が受療していた。

表 3 都市農村別、性別、職業別経過率

	自 宅 営 業												勤 務 者		
	農			商			工			そ の 他			全数	経過者	同率
	全数	経過者	同率	全数	経過者	同率	全数	経過者	同率	全数	経過者	同率			
市	130	62	47.7	480	279	58.2	147	80	54.4	315	161	51.2	905	499	55.2
村	1,031	466	45.1	85	40	47.1	33	19	57.6	108	51	47.2	248	112	45.2
計	1,161	528	45.5	565	319	56.5	180	99	55.0	423	212	50.1	1,153	611	52.9

表 4 都市、農村別、性別、長子、末子別経過率

		一 人 子			長 子			末 子			そ の 他		
		全調査数	経過者	経過率	全調査数	経過者	経過率	全調査数	経過者	経過率	全調査数	経過者	経過率
K 市	男	118	62	53.0	244	139	57.0	195	127	65.1	396	210	53.0
	女	112	57	50.9	255	142	55.7	198	90	45.5	442	234	53.8
	小 計	230	119	51.7	499	281	56.3	393	217	55.2	838	444	52.9
村 部	男	62	32	51.6	180	78	43.3	163	58	35.6	354	142	40.1
	女	42	30	71.4	166	84	50.6	174	75	43.1	409	160	39.1
	小 計	104	62	59.6	346	162	46.9	337	133	39.4	763	302	39.5
計		334	181	54.1	845	443	52.4	730	350	47.9	1,601	746	46.5

表 5 都市農村別、性別、受療率

	K 市			村			計		
	経過数	受療者	同率	経過数	受療者	同率	経過数	受療者	同率
男	538	353	65.7	310	140	45.2	848	493	52.3
女	523	349	66.8	349	168	48.2	872	517	59.2
計	1,061	702	66.2	659	308	50.5	1,720	1,010	58.7

考 按;

10才前後迄の百日咳経過率については、De Rudder の70%、Biedert の91%、Von Sholly の71%等があり、最高はHarrison の100%であつた。日本人の場合は、額田の50.6%以下の報告がある。K市の場合は10才以下で54.2% 10~11才では64.4%であり、外国よりむしろ鎌倉市に近い。鎌倉市及びその近隣村との間に、経過率の差が認められたが、K市の場合にも同様であつて、都市の児童は農村の児童より百日咳をより多く経過していることが分つた。これが、家庭の職業の差によるか否かについて試みたところ、市・村両地区を通じて農業が低く、商・工業が高い結果を得ている。これは職業により、外来者に多寡があり、それが百日咳感染に、或る程度の役割を演じているものと思われる。そして農業の家の児童は、市・村両地区共に低いのは外来者が少いことと、額田のいう如く、野外生活による非特異的抵抗力の増大によるのかもしれない。

次に額田氏法則が関東平野の中央であるK市附近で見られるか否かを検するに、本調査の場合には市・村両部で同法則が成立つことが分つた。その理由として考へられるのは、東京都の衛星都市であり、都市との接触が多く、農村の都市化の現れではなからうか。

また、回答数が市部と村部で異なる点であるが、これは村部で低い回答率を示すのは、百日咳への関心の一面を示すものであつて、医家の近隣にないこともあるが、受療率の低いのと併せ考えれば、農村における百日咳の認識を高める必要を感じさせた。

小 括;

東京都の衛星都市K市とその近隣の農村11ヶ村を対象として、11才以下の学童について百日咳経過率を調査した。その結果、次の結論に達した。

1. 経過率は比較的高いが、外国程ではなかつた。

2. 市部の方が村部より経過率が高かつたが、職業的な差にもよると思われる。

3. 額田氏法則はこの調査でも認められた。

4. 村部に対しては、百日咳の小児期疾患としての重要性を更に認識させる必要を感じた。

Ⅱ 出生時体重と百日咳感受性

集計結果:

出生時体重を男子は1.74kg以下、1.75~2.49kg, 2.50~3.24kg, 3.25~3.99kg, 4.00kg以上と分け、女子は1.64kg以下、1.65~2.39kg, 2.40~3.14kg, 3.15~3.89kg, 3.90kg以上と分けて、この5区間につき、市・村別、男・女別に経過率を観ると(表6)、1.74(1.64)kg以下の階級と、4.00(3.90)kg以上のに入るものの10名以下であり、中央の3区間について検討する。都市の男子においては、1.75~2.49kgが最も感受性高く、それ以上は大体同様であり、女子では3.25~3.99kgの階級が最高で、次が1.65~2.39kgのものである。何れも中央の体重のものが経過率が低いことが分つた。然し農村においては男女共に出生時体重の大きい組が経過率最小であり、男子では1.75~2.49kgと2.50~3.24kgとが略々同様であり、女子では大差は認められなかつた。

次に、罹患年令別に出生時体重別経過率を見ると(表7)、男子のうちで百日咳を経過したものでは3.25kg以上の出生時体重のものは、3才迄に45%が罹患して、6才以上に罹患するものは少い。3.24kg以下の出生時体重のものは、3才迄には34~36%が罹患、3~6才未満に41~48%がかかり、その後は少くなる。即ち体重の大きいものは3才迄に百日咳罹患があるといえる。女子に於ては、体重の大なる階級は、3才迄に38%、3~6才未満に38%、その後23%となる。中等度の体重でも、始めは37%、3~6才未満に37%、その後26%と下る。最も小さい体重をもつて生まれた階級は、36、33、30%と経過している。即ち男女の何れでも出生時体重の大きいものは早く百日咳に罹患することがみられた。また、

表 6 出生時体重 (kg) と百日咳経過率

体 重 (kg) () 内は女子		～1.74 (～1.64)		1.75～2.49 (1.65～2.39)		2.50～3.24 (2.40～3.14)		3.25～3.99 (3.15～3.89)		4.00～ (3.90～)	
		調査数	経過率	調査数	経過率	調査数	経過率	調査数	経過率	調査数	経過率
市	男	2	0	36	77.8	350	65.2	148	66.2	1	100
	女	0	0	27	66.7	354	62.7	158	77.9	0	0
	小 計	2	0	63	73.1	704	63.9	306	72.2	1	100
村	男	3	33	37	56.8	235	57.9	101	44.5	3	0
	女	1	0	18	55.5	312	51.9	114	50.0	0	0
	小 計	4	25	55	56.4	547	54.7	215	47.5	3	0
計		6	16.7	118	65.1	1,251	59.5	521	62.0	4	25
体 重 分 布		2	0.2	63	5.8	704	65.4	306	28.5	1	0.1
		4	0.5	55	6.7	547	66.3	215	26.1	3	0.4

表 7 出生時体重と百日咳年齢別経過率

		男						女					
年 令	体 重 kg	～1.74	1.75	2.50	3.25	4.00～	計	～1.64	1.65	2.40	3.15	3.90～	計
		～2.49	～2.49	～3.24	～3.99			～2.39	～2.39	～3.14	～3.89		
3 才 未 満		50.0	34.0	35.9	45.3	18.2	37.9	0	36.4	37.1	38.3	37.5	37.3
3～6 才 未 満		0	48.0	41.6	37.2	54.5	41.2	0	33.3	36.6	38.3	50.0	37.0
6 才 以 上		50.0	18.0	22.5	17.5	27.3	20.9	0	30.3	26.3	23.4	12.5	25.7
計		100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100

百日咳に罹ってから治療する迄の 期間を経過期間とし、それを 1 ヶ月以内、1 ヶ月位、2～3 ヶ月、3 ヶ月以上と大体に分けて、出生時体重 3.06kg 未満と以上とに分けて比較するに、有意の差は認められなかつた (表 8)。次に体重の大小が百日咳経過率に明らかに影響したと思われるのは、男子の 3 才未満であるから 3 才未満で経過したものにつき経過期間を出生時体重 3.06 (2.95) kg を境に上下に分けて

比較した (表 9)。然し統計的に有意の差は認められなかつたが、体重の小さい方が短期間に治療する傾向は認められた。

考 按：

J. Douglas & C. Mogford は、英国に於ける未熟児と成熟児で百日咳感受性がちがわないと報告している。然し、本調査に於て、標準体重を中心として 5 群に分け百日咳経過率を見るに、都市では 10 才前後迄の経過率で

表 8 出生時体重と経過期間

	1 ヶ月 以 内		1 ヶ 月 位		2・3 ヶ 月		3 ヶ月 以 上		計	
	経過者	同 率	経過者	同 率	経過者	同 率	経過者	同 率	経過者	同 率
3.06kg 未満	126	23.2	233	42.8	148	27.2	37	6.8	544	100.0
3.06kg 以上	122	20.8	260	44.4	156	26.6	48	8.2	586	100.0

表 9 出生時体重と経過期間（3才未満について）

	1ヶ月以内		1ヶ月位		2・3ヶ月		3ヶ月以上		計	
	経過者	同率	経過者	同率	経過者	同率	経過者	同率	経過者	同率
男 3.06kg 未満	51	22.5	105	46.3	52	22.9	19	8.3	227	100.0
女 2.95kg										
男 3.06kg 以上	34	14.4	107	45.4	73	30.9	22	9.3	236	100.0
女 2.95kg										

は標準体重を含む区間に属する群の感受性が弱いことが見られた。この傾向は農村とは異なるので、出生時体重による10才前後迄の百日咳感受性に差があるとは考へられない。辻によれば、出生時体重が形態的機能的発育に影響するのは学令期迄であると云う¹⁷⁾。そこで百日咳経過の時期が3才未満のものと、3~6才未満のと学令後の3群に分けて出生時体重別に比較した。その結果、体重の大きい方は3才以前に百日咳に罹患し易く、小さい方は3~6才未満に罹患し易いことが分つた。6才以後は両群とも略々同様である。このことより、出生時体重が小さいものは百日咳感受性が弱く、大きいものは強い。3~6才未満で小さい方が高い経過率を示すのは、未罹患者が累積する為で、出生時体重の影響、即ち胎児の成熟、未熟は百日咳感受性に関する限り、3才迄影響するものと思われる。そして百日咳の経過期間も体重の小さい方が短い傾向が認め

られた。身体的発育が百日咳感受性を高めることの理由は未だ明らかではない。

小 括：

出生時体重別に百日咳経過率を検するに、

1. 比較的体重の大きい方が感受性が強いが、これは大体3才迄であり、その後は差は認められない。

2. 出生時体重の大きいものが百日咳にかかると経過期間が長びき、小さいものは比較的短期間に治る傾向があるが、これは百日咳感受性のみならず抵抗性も強いのではないかと思われる。

Ⅲ 乳児栄養と百日咳感受性

統計結果：

乳児における栄養としては、母乳、人工栄養、母乳と人工栄養との混合したもの及び純粋の牛乳のみの4種類が挙げられる。表10に示す如く、男・女、市部・村部何れでも母乳栄養のものは経過率が低いことが分つた(48.8

表 10 乳 児 期 栄 養 と 百 日 咳 経 過 率

		母 乳			混 合			人 工			牛 乳		
		調査数	経過数	同率	調査数	経過数	同率	調査数	経過数	同率	調査数	経過数	同率
市	男	713	397	55.6	137	87	63.5	45	27	60.0	12	7	58.3
	女	781	401	51.3	154	82	53.2	51	31	60.8	13	11	84.7
	小 計	1,494	798	53.3	291	169	58.0	96	58	60.4	25	18	72.1
村	男	566	241	42.6	78	46	58.9	28	17	60.7	18	4	22.2
	女	642	281	43.8	87	47	54.0	42	26	61.9	5	3	60.0
	小 計	1,208	522	43.2	165	93	55.5	70	43	61.4	23	7	30.2
計		2,702	1,320	48.8	456	262	57.5	166	101	60.8	48	25	52.1

%)。牛乳のみの栄養群は例数が少いので総計に於てのみ比較した。栄養が影響するとすれば、離乳期に最も近い時期において経過率が最低である筈である。表11,12は3才未満, 3~6才未満, 6才以上の3階級に分けて、乳児栄養について経過率を調べた結果である。都市に於ては(表11)著明な差異は見られな

いが、農村に於ては明らかに母乳が最低である(43.2%) (表12)。また百日咳が治癒するまでの経過期間についても、母乳のものが比較的短いことを示している(表13)。

小括並に考按：

従来、百日咳に対しては母体の免疫を胎内において受け、これが乳児の百日咳感受性を

表 11 乳児期栄養と百日咳年令別経過率（都市）

		母 乳			混 合			人 工			牛 乳		
		全数	経過数	同率	全数	経過数	同率	全数	経過数	同率	全数	経過数	同率
男	3才未満	713	158	22.2	137	30	21.9	45	10	22.2	12	2	16.6
	6才未満	555	143	25.4	107	36	33.7	35	9	25.7	10	2	20.0
	6才以上	412	62	15.0	71	20	23.0	26	4	15.4	8	2	25.0
	不明	713	34	4.7	137	1	0.7	45	4	8.9	12	1	8.3
	小 計	713	397	55.6	137	87	63.5	45	27	60.0	12	7	58.3
女	3才未満	781	155	19.8	154	26	16.6	51	10	19.6	13	3	23.1
	6才未満	626	141	22.5	128	22	17.2	41	10	24.4	10	5	50.0
	6才以上	485	89	18.4	106	28	26.4	31	10	32.3	5	2	40.0
	不明	781	16	2.1	154	6	3.9	51	1	2.0	13	1	7.7
	小 計	781	401	51.3	154	82	53.2	51	31	60.8	13	11	84.7
計		1,494	798	53.3	291	169	58.0	96	58	60.4	25	18	72.1

表 12 乳児期栄養と百日咳年令別経過率（農村）

		母 乳			混 合			人 工			牛 乳		
		全数	経過数	同率	全数	経過数	同率	全数	経過数	同率	全数	経過数	同率
男	3才未満	566	80	14.1	78	13	16.7	28	8	28.6	18	2	11.1
	6才未満	486	90	18.5	65	17	26.2	20	5	25.0	16	2	12.5
	6才以上	396	58	14.6	48	16	33.4	15	1	6.7	14	0	0
	不明	566	13	2.3	78	0	0	28	3	10.7	18	0	0
	小 計	566	241	42.6	78	46	58.9	28	17	60.7	18	4	22.2
女	3才未満	642	83	12.9	87	15	17.3	42	6	14.3	5	1	20.0
	6才未満	559	95	17.0	72	16	22.2	36	8	22.2	4	1	25.0
	6才以上	464	65	14.0	56	11	19.7	28	2	9.1	3	0	0
	不明	642	38	5.9	87	5	5.7	42	10	23.8	5	1	20.0
	小 計	642	281	43.8	87	47	54.0	42	26	61.9	5	3	60.0
計		1,208	522	43.2	165	93	55.5	70	43	61.4	23	7	30.4

表 13 栄 養 と 経 過 期 間

			1ヶ月以内		1ヶ月位		2・3ヶ月		3ヶ月以上		不 明		計	
			経過数	同率	経過数	同率	経過数	同率	経過数	同率	経過数	同率	経過数	同率
男	母 乳	混合	141	22.1	257	40.3	145	22.7	33	5.2	62	9.7	638	100
	混 合	人工	23	17.3	57	42.8	40	30.0	10	7.6	3	2.3	133	100
	人 工	牛乳	7	15.9	14	31.8	10	22.7	3	6.8	10	22.8	44	100
	牛 乳		1	9.1	6	54.5	1	9.1	0	0	3	27.3	11	100
	小 計		172	20.8	334	40.4	196	23.7	46	5.6	78	9.5	825	100
女	母 乳	混合	149	21.8	255	37.5	160	23.4	60	8.8	58	8.5	682	100
	混 合	人工	18	13.9	57	44.2	34	26.3	8	6.2	12	9.4	129	100
	人 工	牛乳	13	22.8	23	40.3	18	31.7	3	5.2	0	0	57	100
	牛 乳		2	14.3	6	43.0	1	7.1	3	21.4	2	14.2	14	100
	小 計		182	20.6	241	38.6	213	24.2	74	8.4	72	8.2	882	100

低下せしめると考へられている。然し、麻疹程明瞭ではない。若し母体の免疫が母乳を通じて乳児に与えられるとすれば、乳児栄養もまた、その後の百日咳感受性に影響するであろうことは、小山¹⁶⁾が指摘する如く容易に推察されるところである。そこで市・村別、男・女別に乳児栄養の種類別に百日咳経過率を比較した。母乳、牛乳、混合及び人工の順に経過率が高くなっている。即ち、母乳により栄養されていれば、百日咳に対する感受性は弱い。たとえ母乳と他のものとの混合であつても、全く母乳を用いないものより感受性が低いことが分つた。母乳の次は牛乳である。牛乳のみを以て乳児栄養とするものは極めて少いので、詳細に亘る調査は不可能であるが、麻疹に対して感受性を低くするという報告もあるが、牛乳は百日咳に対する感受性をも低下せしめることが分つた。乳児栄養が百日咳感染に有効に働くとするれば、幼児期の百日咳経過率が低くなければならない。農村においては明らかに母乳が低い傾向が認められた。しかも、6才以上でさえ母乳群が低率を示している。都市では男子の3才以上、女子6才以上でこの傾向があつたが、濃厚感染が多い為か必ずしも全階級には認められなかつた。

経過期間においても母乳群が短い。百日咳に対する感受性が他の種の栄養群より低いことが分る。しかも、若し母乳を通じて百日咳菌に対する抗体を与えるのであつたならば、離乳より最も近い期間が経過率は低い筈である。しかるに都市においては却つて高年令層の母乳群が低い経過率を示した。濃厚感染があることは容易に想像されるが、これは年令層の上下には関係ないのである。従つて、母乳栄養が低百日咳感受性を示すのは、百日咳特異的感受性によるのではなくして、非特異的的感受性低下によるものであろう。そして、一旦百日咳に感染しても、その経過が短いことより、栄養状態の充分な發育を続けているものと推定せられる。

小 括：

乳児栄養を母乳、人工、混合、牛乳に分けて夫々の経過率を調べた。その結果、

1. 乳児栄養では母乳のものが感受性低く、人工栄養が高い。
2. 牛乳のみでも感受性は低い。
3. 乳児栄養による感受性の差は、百日咳特異的のものとは思われない。

結 論

東京都の衛星都市である埼玉県 K 市及びそ

の近隣の農村学童を対象として百日咳経過の状況を調査して次の如き結論を得た。

1. 3,874名の対象につき、解答率は93.7%、完全な解答を寄せたもの49.1%であつた。村部の方が解答率は低かつた。

2. 10才前後迄の経過率は64.4%で、外国のそれより低い。市部の方が高い経過率であつた。

3. 家庭の職業では、商工業の家庭の児童が経過率高く、農村のそれが低い。

4. この地区でも額田氏法則が適用された。

5. 村部に対しては、百日咳が小児期疾患として重要なものであることを更に認識させる必要を感じた。

6. 出生時体重別に経過率を見るに、体重の大きい方が感受性が高い。これは3才迄でその後は差はない。

7. 出生時体重の大きい方は百日咳の経過期間が長びき、小さい方は短い。

8. 乳児栄養では母乳のものが感受性低く、人工栄養が最も高い。

9. 牛乳のみのものも感受性は低い。

10. 乳児栄養による百日咳感受性の差は、百日咳特異的なものとは考えられない。

擧筆するに当り、本調査の遂行に御指導及び御校閲を賜つた京都府立医科大学額田榮教授、並びに本調査遂行に御協力を恭うした各学校当局者に満腔の謝意を表すとともに、東京大学助教授長島長節博士の御好意に深謝する。

文 献

- 1) **Von Sholly:** J.A.M.A. 68, 1451 (1917)
- 2) **Luttingen:** Ibid 68, 1461 (1917)
- 3) **De Rudder:** Die Akuten Zivilizationss-euchen (1934)
- 4) **Culotta, Dominick, & Harrison:** Yale J. Biol. Med. 10, 443 (1938)
- 5) **Lapin:** Whooping Cough (1943)
- 6) 高橋: 臨床小児科雑誌, 11 (1) 1 (1937)
- 7) 末広: 児科雑誌, 46, 1428 (1940)
- 8) 大谷: 児科診療, 9, 461 (1943)
- 9) 相沢, 久村: 日本衛生学雑誌, 1 (1) 1 (1946)
- 10) 吉岡: 衛生統計学 (1948)
- 11) 緒方: 日新医学, 35 (8) 9 (1948)
- 12) 額田: 医学と生物学, 12 (4) 15 (1948)
- 13) 高宮: 民族衛生, 17 (1) 7 (1950)
- 14) 小山: 百日咳の予防, (1950)
- 15) **Mogford:** Brit. Med. J. p.752 (Apr. 1953)
- 16) 小山: 乳児の栄養, (1956)

AN ANALYSIS OF OCCURRENCE OF WHOOPING COUGH

By

Mitsuhiko NISHIKAWA * and Sachiko NISHIKAWA **

Incidence of whooping cough in 3,874 school-children was investigated by questionnaire at Kawagoe city and its adjoining district situated in the northern suburbs of Tokyo. The authors have concluded as follows:

(1) Of them 93.7 percent answered the questionnaire, and that 47.1 percent answered perfectly. The rate of answering from the urban district was higher than that from the rural area. The necessity of health education on whooping cough was recognized.

(2) The children of commercial and industrial people showed higher incidence, and the Nukada's law for whooping cough epidemics was found applicable to the cases.

(3) The higher susceptibility to whooping cough of the pupils who weighed heavier at birth occurred by the time of three years of age, and these children suffered longer period than normally or prematurely born individuals.

(4) On the point of infantile nutrition, the susceptibility to whooping cough in pupils who had been fed on mother's milk or cow's milk was lower than that of those brought up on cow's milk combined with other ways of artificial feeding. These differences of susceptibility due to different infantile nutrition were not regarded specific to the whooping cough.

(* Department of Anatomy, Medico-dental College of Tokyo,

** Department of Public Health, Medical College of Toho.)

METHODODOLOGICAL STUDIES ON THE EPIDEMIOLOGICAL
INVESTIGATION OF CANCER AND THE
ANALYSIS OF THE RESULT

By

Atusi KISI

Considering present state of the anti-cancer combat, especially the absence of effective preventive measures, although much progress has been made toward early detection of the neoplasm, it is at present most important to grasp a real figure of cancer incidence.

So far the cancer statistics of this country have been derived from mortality data. It is, however, desirable to supplement such statistics with morbidity data.