研究室紹介

甲南大学 先端生命工学研究所 高橋研究室（生物関連）

はじめに

甲南大学は神戸市東灘区岡本にメインキャンパスを構え、昨年創立 100 周年を迎えた歴史ある大学です。私たちが所属している先端生命工学研究所（Frontier Institute for Biomolecular Engineering Research：通称 FIBER）は、「生命」・「健康」・「環境」・「材料」の 4 領域を束ねて「ひと」を科学することをテーマに、高度で先端的な研究および教育を実施するために 2003 年に設立されました。2009 年からは神戸ポートアイランド神戸医療産業都市地区に移転し、研究活動を発展させてきております。近隣には理化学研究所や神戸大学をはじめとする研究・教育機関や医薬・健康に関わる様々な企業が進出しており、生命科学分野の共同研究や産学連携が活発に行われております。

研究室とメンバー紹介

現在の FIBER は、所長の杉本 直己 教授を筆頭に、教員が 4 名、その他海外からの博士研究員 3 名と研究補助員および事務職員で構成されています。研究所としては極めて小規模であるため、現在は核酸（DNA や RNA といった遺伝物質）に関する化学に焦点を当てて各教員の研究グループ毎でそれぞれのテーマを持って研究を進めています。海外との共同研究を活発に行っており、海外から訪問する研

究者の公開講演会を定期的に開催したり、短期で訪問する研究者や学生を受け入れたりするなど、とても国際色豊かな研究室でもあります。

研究紹介

私たちの設計図は全て遺伝子である DNA に書き込まれています。すなわち、どのような人間に成長するかということにおいて、受精卵の段階から決まっています。しかし、実際はその後の育った環境によって、その成長が影響を受けることも私たちは知っています。では“環境”がどうやって運命を変えているのか？ ということに対してはまだ分かっていないのが現状です。

私たちのグループでは、“環境”の中でも溶液の環境に着目し、核酸構造の物性と機能について、溶液の環境がどのように影響を与えているのかについて研究を行っています。細胞の中は実験で用いられる生理食塩水などとは溶液環境が大きく異なり、タンパク質などの高分子が高濃度（ $\sim 400 \text{ mg mL}^{-1}$ ）に含まれる濃厚溶液環境です。このような環境のことを分子で混み合っているという意味で分子クラウディングと呼ばれます。分子クラウディング環境では、水の活量低下や排除体積効果といった生理食塩水と

写真1 甲南大ポートアイランドキャンパス。建物右手DNA モニュメントは世界最大としてギネス記録に認定された（高さ 22.54 m）。

写真2 高橋グループのメンバー。ポスドク二人（インド出身）と研究補佐員で構成。右端が高橋。

は全く異なる溶液特性により、対象となる分子の物性は大きく影響を受けます。私たちは分子クラウディングが分子の構造変化の際に生じる体積変化に依存すると考え、圧力を用いた核酸構造の体積変化の解析を行っております。

核酸は二重らせん構造を形成することはご存じの方も多いと思いますが、その一方で最近三重らせんや四重らせんのような構造も形成されることが分かってきました。私たちのDNAへの高圧力研究の結果から、標準的な二重らせん構造は400 MPa程度までの範囲における圧力効果はほとんど見られなかったのに対し、非標準的な四重らせん構造は同程度の圧力範囲で構造が崩れる現象が見出されました。したがって、体積変化が生じるような分子クラウディング環境において、四重らせんのような非標準構造はダイナミックにその構造形成が生じることが示唆されました。実際の機能で考えてみると、二重らせんは遺伝情報を保持する役割があります。そのため、構造が崩れたりすることはDNAに損傷が生じやすくなり、情報保持に不都合があります。高圧力に対して二重らせん構造が堅牢であることは、細胞環境によってもその構造が影響を受けにくいということを示しています。一方で、四重らせん構造は最近の研究から遺伝情報の読み取りのオンオフを司る機能があることが分かってきました。高圧力で四重らせんの構造が崩れることは、細胞環境の変化で遺伝子の機能が制御されることを示唆しています。以上のように、高圧力を用いた核酸構造の研究によって、環境と遺伝子を結びつける生命科学研究の新しい展開が拓かれつつあります。

その他にも、核酸に結合する化合物の開発に高圧力を用いる試みや、細胞レベルでの遺伝子発現の高圧力制御などに取り組んでおり、今後も圧力を用いた核酸化学の新たな展開を示していきたいと思っています。

最近の研究論文

- [1] S. Takahashi, N. Sugimoto: *Angew. Chem. Int. Ed.*, **52**, 13774 (2013), “Effect of pressure on the stability of G-quadruplex DNA: Thermodynamics under crowding conditions”.
- [2] S. Takahashi, J.A. Brazier, N. Sugimoto: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **114**, 9605–9610 (2017), “Topological impact of noncanonical DNA structures on Klenow fragment of DNA polymerase”.
- [3] S. Takahashi, K.T. Kim, P. Podbevěk, J. Plavec, B.H. Kim, N. Sugimoto: *J. Am. Chem. Soc.*, **140**, 5774–5783 (2018), “Recovery of the formation and function of oxidized G-quadruplexes by a pyrene-modified guanine-tract”.
- [4] S. Takahashi, S. Bhowmik, N. Sugimoto: *J. Inorg. Biochem.*, **166**, 199–207 (2017), “Volumetric analysis of formation of the complex of G-quadruplex DNA with hemin using high pressure”.
- [5] S. Bhowmik, S. Takahashi, N. Sugimoto: *ACS Omega*, **4**, 4325–4329 (2019), “Lighting up of thiazole orange on G-quadruplex DNA by high pressure”.

連絡先

〒650-0047

兵庫県神戸市中央区港島南町 7-1-20

甲南大学先端生命工学研究所

高橋 俊太郎

Tel: 078-303-1147 (研究所事務)

E-mail: shtakaha@konan-u.ac.jp

URL: <http://www.konan-fiber.jp/i>

〈高橋 俊太郎 記す〉