グリセリン浣腸による有害事象：溶血を中心として

グリセリン浣腸は、術前の処置や便秘の改善として古くから日常的に行われており、容易な医療技術であるとされている。現在の診療報酬体系においても「点数表にない簡単な処置」とされ、その費用は基本診療料に含まれ、別途、算定することはできない状況となっている。しかし、1990年代前半から、本邦において、グリセリン浣腸によると考えられる溶血や血尿に関する有害事象の臨床報告がみられるようになった^{1)~3)}。当時の論文では、溶血の原因として浣腸液が強く疑われたものの、状況証拠によるもので科学的な裏づけはなく、グリセリン浣腸と溶血の因果関係については検討課題であった。そこで筆者は、実際に臨床で使用されているグリセリン浣腸液と溶血との関連性を明らかにするため、実験動物を用いた実証的研究を実施した。

最初の実験では、臨床で使用されている50%グリセリン浣腸液が何らかの原因で血管内に移行した場合を想定し、ラットの静脈内にこの浣腸液を投与して溶血の程度と乳酸脱水素酵素(lactic acid dehydrogenase, LDH)の値を測定した。投与量は、 $0.025 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1}$ を最少量とし、公比2として $0.05 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1}$, $0.1 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1}$, $0.2 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1}$ の4用量で実験を行った⁴⁾。その結果、対照群と比較して、グリセリン浣腸液を投与した全てのラットに溶血反応とLDH値の上昇が認められた。グリセリン浣腸後の溶血に関する臨床報告^{1)~3)}では、血清LDHが著しく高値を示していたため、本実験においても血中のLDH値を測定した。浣腸液を投与することによるLDH値の変化は、グリセリン浣腸液の投与量に相関して高値を示しており、血管に入った量が多いほど、より重篤な症状が発現することを裏づけている。この実験から、わずかな浣腸液(体重50 kgの成人では1.25 mlに相当)が生体へ移行した場合でも、溶血が認められることが明らかとなった。高浸透圧の注射薬によっても溶血の発生が知られており、生理食塩液を1とした場合、浸透圧15以上では強い溶血が認められている⁵⁾。グリセリン浣腸液の浸透圧は、約20(対生理食塩液)であり⁴⁾、溶血の原因としてこの高い浸透圧も考えられた。

次の実験として、臨床で実施されている方法で直腸内にグリセリン浣腸を施した場合、実際に血中に移行するかどうかについて検討した。その結果、健常なラッ

トにグリセリン浣腸を施しても溶血が認められないことが明らかとなったため、ラットの直腸粘膜に、血液検査では異常値が認められないわずかな限局性の傷害を作製し、実験を行った⁶⁾。傷害を有しない対照ラットと比較し、直腸粘膜にわずかな傷害があるラットでは、溶血の値とLDH値は有意に上昇した。この値について、最初に実施した実験で得られた血液データと比較検討したところ、溶血とLDH値の両者とも投与最低用量の値とほぼ同程度であった。これら二つの実験からグリセリン浣腸液は直腸粘膜の傷害部位から血中に移行し、実際に溶血を引き起こすことが事実となった。

グリセリンは、脳浮腫除去、脳圧亢進の治療薬として、その有効性が示されており^{7),8)}、臨床では通常、10%グリセリン溶液が点滴静注薬として使用されている⁹⁾。この程度の濃度では、多くの場合、臨床で特に問題とはならないものの¹⁰⁾、点滴静注によって、重度の溶血や腎不全例が報告されている^{11),12)}。このように、静注薬としてのグリセリン溶液によって、溶血などの副作用が認められることはすでに知られている。しかし、浣腸薬として使用されているグリセリン溶液による溶血について、予測することは困難であった。グリセリン浣腸液が生体内に移行するためには、直腸の粘膜に傷害があることが前提となるが、その原因については特定されていないのが現状である。これまでに実施した基礎研究と有害事象の報告内容について検討した結果、傷害が発生するためのいくつかの要因が推測できたので以下に記載する。

臨床で使用されている50%グリセリン浣腸液によって直腸の粘膜上皮が剥離することは、48時間の絶食ラットを用いた基礎研究によって明らかとなっている¹³⁾。筆者らもラットとウサギを用いて検討した結果、便が少ない状態でグリセリン浣腸液が直腸粘膜に直接接触(曝露)した場合は、粘膜上皮は剥離するものの、便が貯留した状態では、傷害は軽度であることを示唆する知見が得られている。この傷害は一時的なものであり、24時間後の観察では回復していた。直腸粘膜に認められるこの程度の病変では、溶血は起こらないことは、先に述べた動物実験によって明らかになっている。しかし、無理なカテーテルの挿入により、さ

らに粘膜が傷つき、その部位から浣腸液が血中に移行し、溶血が起こる危険性はあると考えている。

グリセリン浣腸は、術前の処置と共に便秘の改善としても予想以上に使用されていることがアンケート調査によって明らかになっている¹⁴⁾。便秘により硬い便が直腸内に貯留することで粘膜が脆弱化し、そこにグリセリン浣腸液が曝露することによって粘膜損傷の危険性が高まることが推測される。さらに、長期臥床や加齢要因が加わると直腸粘膜の血流低下をきたし、消化管機能の低下、便秘が招来されて直腸潰瘍や炎症が発生しやすくなることが知られている¹⁵⁾。このような便秘では、便による腸管壁の過伸展に伴う循環障害などのために腸管壁が脆弱化していることも明らかとなっているので¹⁶⁾、便秘の患者へのグリセリン浣腸は慎重に行うべきである。また、浣腸後の溶血について報告されている論文を検討した結果、患者の多くには痔核があり、これもリスクファクターの一つとして重要である^{17),18)}。直腸粘膜は、物理的刺激に対して弱い組織形態を有しており¹⁹⁾、浣腸施行時に挿入したカテーテルの物理的刺激によって痔核における拡張した静脈を損傷した場合、その部位からグリセリン浣腸液が生体内に吸収される危険性がある。

グリセリン浣腸は、左側臥位で行われるべきものであるが、臨床現場では、トイレにおいて様々な体位で実施されていることが実態調査によって明らかとなった²⁰⁾。さらに、有害事象として報告されている内容を詳細に検討してみると、直腸穿孔の部位は一樣ではなく、様々な部位に認められていた。このことは、患者の体位と看護職者の立つ位置が多様であることを裏づけており、グリセリン浣腸の実施方法に問題があることを示唆している。ディスプレイタイプの普及と共に、グリセリン浣腸の実施場所が、処置室からトイレへ移動したことも一因と推測している。狭いトイレでの実施では、挿入した長さも挿入角度も十分確認できていないと考えられ、このような場所での実施は避けるべきである。

グリセリン浣腸による溶血などの有害事象の臨床報告は、未だに後を絶たない状況となっている^{21)~23)}。日常的に行われているグリセリン浣腸による溶血などの有害事象の発生を予防するためには、実施状況の詳細(トイレでの実施方法など)について事例を共有することが重要である。また、挿入したカテーテルの先端を確認できない状況で盲目的に行われているグリセリン浣腸は、容易な技術ではなく高度な医療技術であることを改めて認識する必要がある。

武田 利明

岩手県立大学看護学部・基礎看護学講座

(〒020-0193 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字菓子152-52)

Adverse effects in performing glycerin enema: focus on hemolysis

Key words: ① glycerin enema, ② hemolysis, ③ adverse effects

Toshiaki Takeda

Faculty of Nursing, Iwate Prefectural University
152-52 Sugo, Takizawa, Takizawa-mura, Iwate-gun, Iwate
020-0193, Japan

J Jpn Soc Intensive Care Med. 2008;15:492~494.

文 献

- 1) 五十洲剛, 渡辺興治, 武藤ひろみ, 他. グリセリン浣腸が原因と考えられた血色素尿の1例. 臨麻. 1991;15:1489-90.
- 2) 今村美幸, 田中直文, 井上由実, 他. グリセリン浣腸液が原因と考えられた血色素尿. 臨麻. 1993;17:1509.
- 3) 江口政治, 楠戸和仁, 清岡博士, 他. グリセリン浣腸により溶血が誘発された1症例. 高知中病医誌. 1993;20:45-7.
- 4) 武田利明, 石田陽子, 川島みどり. グリセリン浣腸液と溶血に関するラットを用いた実験的研究 — 静脈内投与による溶血誘発について —. 日看研会誌. 2003;26:81-8.
- 5) 赤石 英, 押田茂実. 薬剤に関する医療事故について. 月刊薬事. 1974;16:23-31.
- 6) 武田利明. グリセリン浣腸による溶血誘発に関する実験動物を用いた実証的研究. 日看技会誌. 2006;5:45-50.
- 7) Meyer JS, Teraura T, Marx P, et al. Brain swelling due to experimental cerebral infarction. Changes in vasomotor capacitance and effects of intravenous glycerol. Brain. 1972;95:833-52.
- 8) Antonini FM, Bertini G, Fumagalli C, et al. Effects of intravenous infusion of glycerol on regional cerebral blood flow in cerebral infarction. Gerontology. 1977;23:376-80.
- 9) 日本医薬情報センター編. 医療用医薬品集. 東京: 丸善; 2008. p. 791-2.
- 10) Kumana CR, Chan GT, Yu YL, et al. Investigation of intravascular haemolysis during treatment of acute stroke with intravenous glycerol. Br J Clin Pharmacol. 1990;29:347-53.
- 11) Hägnevik K, Gordon E, Lins LE, et al. Glycerol-induced haemolysis with haemoglobinuria and acute renal failure. Report of three cases. Lancet. 1974;1:75-7.
- 12) Gilsanz V, Rebollar JL, Buencuerpo J, et al. Controlled trial of glycerol versus dexamethasone in the treatment of cerebral oedema in acute cerebral infarction. Lancet. 1975;1:1049-51.
- 13) Sugimura F, Ryoh H, Watanabe T, et al. Comparative studies on the usefulness of phosphate versus glycerin enema in preparation for colon examinations. Gastroenterologia Japonica. 1990;25:437-50.
- 14) 加賀谷奈穂子, 武田利明. グリセリン浣腸の実施状況に関する実態調査. 日看技会誌. 2007;6:23-9.
- 15) 藤井 徹. 長期臥床患者に於ける直腸粘膜血流動態について. 久留米医会誌. 1989;52:1071-8.
- 16) 石川雅彦, 稲葉雅史, 山崎弘資, 他. 特発性大腸穿孔症例の検討. 日臨外医会誌. 1994;16:25-34.

- 17) 平野昭彦, 武田利明, 菊池和子, 他. グリセリン浣腸の安全性に関する文献調査研究. 岩手大看紀. 2002;4:97-103.
- 18) 武田利明, 小坂橋喜久代, 香春知永, 他. グリセリン浣腸による有害事象の現状と今後の課題. 日看技会誌. 2006;5:4-11.
- 19) 下高原理恵, 島田和幸, 柴田興彦, 他. 肛門管の粘膜上皮の形態・機能. 2006;5:17-22.
- 20) 香春知永, 大久保暢子, 小坂橋喜久代, 他. 臨床およびテキストからみたグリセリン浣腸の実施方法の現状と課題. 日看技会誌. 2007;6:34-44.
- 21) 中島麻衣子, 久米 真, 佐藤 勤, 他. グリセリン浣腸によって溶血, 血色素尿症を呈した1例. 日臨外会誌. 2007;68:1862-7.
- 22) 村上晶子, 櫛方哲也, 橋本 浩, 他. グリセリン浣腸による血色素尿の1症例. 麻酔. 2007;56:610.
- 23) 岡島花江, 上田亮介, 樋口恭子, 他. グリセリン浣腸により溶血と術後持続する低血圧を呈した一例. 日集中医誌. 2008;15:571-2.

受付日 2008年 4 月 30 日

採択日 2008年 6 月 6 日

今号のハイライト⑪

日集中医誌. 2008;15:494~495.

Circadian rhythmと看護ケア

はじめに

ヒトのホルモン分泌, 臓器活動, 睡眠・覚醒リズム, 免疫機能や気分・感情などは, 外界の環境に直接反応する circadian rhythm (概日リズム) により周期的に変動しており, このリズムを制御するのは視床下部にある概日時計であると言われている¹⁾。外界からの影響を一切受けない状況下では, ヒトの概日時計は約25時間のリズムを刻む。これを1日24時間の日周期に同調させる因子として, 光が重要な役割を担っている²⁾。そこで近年, 光により昼夜のリズムを回復させる高照度光線療法が注目されている。

今回, 田口らは食道癌術後患者に対し高照度光線療法を行うことにより, 直腸温を指標とした circadian rhythm が整い, 術後の回復が促進される傾向があることを報告している³⁾。本稿では, circadian rhythm に関する看護の現状とその課題について概説する。

Criticalな患者の circadian rhythm

ICU患者は騒音, 照明, 治療などにより circadian rhythm が乱れやすい。布宮らは食道癌術後患者を対象に, 鎮静がメラトニン分泌に与える影響を調査した⁴⁾。その結果, 日内変動を付けたプロポフォールの使用では, メラトニン分泌の circadian rhythm は保たれていた。一方, ミダゾラムの使用では, 個体差が大きく, メラトニンが全く分泌されない例も観察された。同時にこの患者群では, 覚醒遅延や覚醒時せん妄の発

現率が高く, その原因としてミダゾラムによるメラトニン分泌抑制の関与が示唆された。また, Lanuzaが冠状動脈バイパス手術患者16名と心臓除細動器植え込み術患者9名の血漿コルチゾール, 心拍数および体温を測定した研究では, 両術式とも術後24時間以内の血漿コルチゾールの上昇と circadian rhythm の変化が認められた⁵⁾。一方, 西村らが, 食道癌術後患者7名の血中メラトニンを2時間ごとに測定した結果, 術当日から夜間のメラトニンの規則的な日周期分泌が認められた⁶⁾。このように, ICU患者の研究では一定の結果が得られていないが, circadian rhythm が何らかの影響を受けていると考えられる。

Circadian rhythmと高照度光線療法

一般に circadian rhythm の調節は, 2,500ルクス以上の高照度に依存している²⁾。そこで, 2,500~10,000ルクスを一定時刻に照射することで, 睡眠・覚醒リズムの矯正や躁うつ病の症状改善が試みられている。松繁らは, 65歳以上の消化器・呼吸器系の術後患者39名に対し高照度光線療法を実施し, 自作のせん妄状態チェックスコアを用いた評価を行い, せん妄発症から改善までの日数が短縮したと報告している⁷⁾。一方, 健康成人を対象としたParkらの実験的研究では, 昼間5,000ルクス, 夜間200ルクスの環境において, 夜間の尿中メラトニンと唾液中immunoglobulin A(IgA)が有意に増加した⁸⁾。また, Taguchiらは食道癌術後患者11名に対し高照度光線療法を行い, 術後4日目のせん妄レベルが有意に低かった