電撃性紫斑病 (purpura fulminans) —正しい病態の把握と皮膚所見による迅速な診断が重要である

はじめに

斎藤ら¹⁾は本誌で、脳神経外科の術後1週間目に院内で発症した、*Klebsiella pneumoniae* (*K. pneumoniae*) による電撃性紫斑病 (purpura fulminans) の成人男性の症例を報告した。本症は、感染症により急速進行性に四肢末端優位の虚血性壊死 (symmetric peripheral gangrene, SPG) と、ショック、播種性血管内凝固 (disseminated intravascular coagulation, DIC) を呈する症候群である。救命し得た例でも、最終的に四肢切断を要することが多い。本稿では、電撃性紫斑病の病態生理と治療について、敗血症との関連に触れながら述べる。

敗血症に関連した皮膚所見

KingstonとMackey²⁾は、敗血症に伴う皮膚所見の原因を5つに分類した。それは、①DICを含む凝固障害、②血管への浸潤と閉塞、③免疫関連の血管炎と免疫複合体形成、④心内膜炎における塞栓形成、⑤毒素(トキシン)による血管への影響、である。

①に特徴的な皮膚所見としては、SPGまたは電撃性紫斑病、局所壊死 (localized gangrene)、末端壊死 (acrocyanosis) などがあり、原因菌は *Neisseria meningitidis* (*N. meningitidis*)、*Streptococcus pneumoniae* (*S. pneumoniae*) などである。⑤に特徴的な病態としては、毒素性ショック症候群があり、原因菌は *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*)、*Streptococcus pyogenes* などで、それぞれ toxic shock syndrome (TSS)、toxic shock like syndrome (streptococcal toxic shock syndrome) と呼称されている。

SPGの定義と急性感染性電撃性紫斑病 (acute infectious purpura fulminans, AIPF)

SPGは、①四肢遠位部の虚血性壊死で、②二肢以上が同時に侵され、③近位の動脈閉塞を伴わないもの、と定義される³⁾。原因としては、①心原性ショックなどの血流低下、②麦角中毒やRaynaud症候群などの血管攣縮、③真性多血症や寒冷凝集素などの小血管閉塞、④ヘビ咬傷、⑤感染症、などがある。これらのうち⑤は、

AIPFと呼ばれ、敗血症性ショックのまれな合併症である。AIPFは、Guelliot によって1884年に初めて報告された⁴⁾。

AIPFの特徴と病態生理

(1) 発熱、ショック、DIC、多臓器障害を伴って、急速進行性に四肢末端優位の虚血性壊死を呈する。

(2) 現時点で考えられている原因は、血流低下、DIC (特にプロテインCおよびプロテインSの関与)、免疫学的異常であるが、まだ十分に解明されたとはいえない。

(3) DICに伴う血栓による組織障害は、手、指、足趾、鼻尖部など血流が障害されやすい遠位部に多い。一方、AIPFによって三肢の壊死をきたしたが、残りの一肢は出生時に腕神経叢障害を生じていたため壊死に至らなかったという症例報告もある⁵⁾。

(4) 凝固機能的には、①先天性あるいは一過性の、プロテインCあるいはプロテインSの欠損と関連している、②プロテインCのホモ欠損症の新生児に、新生児電撃性紫斑病が見られる、③プロテインCやプロテインSのヘテロ欠損症例で、ワルファリン投与初期に過凝固状態となり、皮膚壊死をきたすこと、がわかっている。

(5) 病的には、①びまん性の広範な出血、血管周囲 cuffing、血管内血栓を認める、②病変部位に細菌は認めない、③抗原抗体複合体の組織への沈着を伴う、などの特徴がある。これらの所見は、Shwartzman反応 (細胞性免疫反応) あるいはArthus反応 (免疫複合体反応) に似ている⁶⁾。

AIPFの疫学：原因菌・罹患率・罹患リスク

(1) 原因菌で多いのは、*N. meningitidis*、*S. pneumoniae*、他の *Streptococci*、*Haemophilus influenzae* (*H. influenzae*)、*S. aureus*、*Escherichia coli*、*Klebsiella*、*Proteus*、*Aeromonas hydrophila*、他のグラム陰性菌、*Aspergillus*、水痘、麻疹などであるが、細菌、真菌、ウイルスなど様々である⁷⁾⁸⁾。

(2) カリフォルニアのレビュー⁹⁾では、15年間で28人、7歳以下が82%、成人は2人(7%)で、原因菌は

N.meningitidis 36%, *S. pneumoniae* 11%, *H. influenzae* 11%であった。

(3) *N. meningitidis* 菌血症の10~20%に¹⁰⁾, *S. pneumoniae*による敗血症の6%に, AIPFを合併するという報告がある¹¹⁾。

(4) *S. aureus*はTSSの原因菌であるが, 時にはTSSの典型的な症状である全身の日焼け様紅斑を呈さず, AIPFにみられる全身紫斑で発症することがある。これについては, 健康成人女性での報告がある⁸⁾。

(5) 犬咬傷, 猫咬傷では, *Capnocytophaga canimorsus* (口腔内常在菌, 嫌気性グラム陰性菌)によるAIPFを考慮しなければならない¹²⁾。

(6) 健康人でも発症し得るが, 特に脾摘後や免疫抑制状態はリスクとなる¹²⁾。

このようにAIPFの原因菌は様々で, 各地域の流行疫学と感染経路によるところが大きい。本邦では*N. meningitidis*の侵淫率が低いため, AIPFの最多原因は*S. pneumoniae*である。米国では近年, 市中型メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(Methicillin-resistant *S. aureus*, MRSA)が増加しており, MRSAによるAIPFも考慮すべきとされている⁸⁾。本誌の斎藤らの報告¹⁾は院内発症で, *K. pneumoniae*が原因菌であるというまれな報告例である。我々が7年間に経験した6例のAIPF症例中1例は, 院内発症であった。このような劇症型の発症は市中, 院内を問わず, あり得ることを認識しておかねばならない。

また, 脾摘後は, 有荚膜細菌(*N. meningitidis*, *S. pneumoniae*, *H. influenzae*など)の劇症型感染症のリスクがある。脾摘後敗血症発症リスクは, 乳幼児に高率で, 5歳未満で5.6%, 5歳以上の小児で0.6%, 成人ではまれとされており, 死亡率は50~75%に及ぶとされる¹³⁾。しかし, AIPF症例が, 高率に脾摘を受けているわけではない。Childersらの28例報告中, 脾摘は1例, 先天性無脾症は1例のみであった⁹⁾。同じく, 我々が7年間に経験した6例のAIPF症例で脾摘後例はなかった。

AIPFの治療

前述の病態生理をふまえて, ニトログリセリン, プロスタサイリン, 局所神経ブロック, プロテインC, アンチトロンビン, 組織プラスミノゲンアクチベータ, ヘパリン, デキストランなどを用いた様々な治療法が試みられてきた¹⁴⁾。しかし, これらのうち, AIPFへの有用性が示されたのは, プロテインC補充療法のみである^{14),15)}。

プロテインC補充療法の根拠としては, ①プロテ

インCは, ビタミンK依存性の肝由来蛋白であり, 抗凝固(活性化第V因子, Ⅷ因子の不活性化), 線溶亢進(プラスミノゲン活性化因子インヒビター-1の不活性化)のほか, 抗炎症(炎症性サイトカインの産生抑制)に作用する, ②敗血症では血漿プロテインC濃度が低く, 低値であるほど予後が悪い, ③Surviving Sepsis Campaign 2008では, プロテインCは, acute physiological and chronic health evaluation II (APACHE II) スコア ≥ 25 または多臓器不全を有する場合, 禁忌がなければ, リコンビナントヒト活性化プロテインCの投与を推奨している, ことが挙げられる¹⁶⁾。

本邦では, 先天性プロテインC欠損症(5~15万人に1人と推定)による深部静脈血栓症, 肺塞栓症, 電撃性紫斑病に対して, ヒト血漿由来活性化プロテインC製剤がオーファンドラッグとして承認されている。海外では, 敗血症, AIPFに対する治療としてリコンビナントヒト活性化プロテインC製剤(drotrecogin alfa)がある。今後は本邦でも, これらの治療を考慮する必要がある。

現時点では, 血漿交換, 免疫グロブリン療法¹⁷⁾は, AIPF, 敗血症性ショック, TSSいずれにおいても確立された治療ではない。今後の知見の集積を要する。

AIPFによる四肢壊死への治療

AIPFから救命し得た症例の大半は四肢切断を要する¹⁸⁾。ただし, 急性期に遠位から全身に広がった紫斑は, 再び四肢へ限局してきて乾性壊死に至るので, 壊死領域が固定化していない早期に切断すべきではない¹¹⁾。しかし逆に, 経過中にコンパートメント症候群を合併することがあるため(7%⁹⁾), 壊死範囲の限局化を期待して, 早期に外科的介入をすべきとの意見もある。高圧酸素療法の有用性は未確定である。

AIPFの予後と敗血症

AIPFの死亡率は, 43%⁹⁾や42%¹⁹⁾という報告がある。また, 死亡例の3分の2は発症から2日以内の死亡であった⁹⁾。一方, 敗血症, 重症敗血症, 敗血症性ショックの死亡率は, それぞれ16%, 20%, 46%と報告されている²⁰⁾。予後の面からも, AIPFは敗血症の最重症の病態であるといえる。

おわりに

救急・集中治療に携わる医師はAIPFに遭遇する機会が多く, その存在を認識しているが, そうではない場合は, AIPFと認識できないまま電撃的な経過で死亡に至る例も多数あると推察される。救命率向上のた

めには、敗血症に関連した病態として、AIPFという症候群があることを認識し、早期に対応を開始することが重要である。

久保 健児, 千代 孝夫

日本赤十字社和歌山医療センター救急・集中治療部

(〒640-8558 和歌山県和歌山市小松原通4-20)

Purpura fulminans and sepsis

Key words: ①acute infectious purpura fulminans (AIPF), ②symmetric peripheral gangrene (SPG), ③toxic shock syndrome (TSS)

Kenji Kubo, Takao Chishiro

Department of Emergency and Critical Care Medicine, Japan Red Cross Wakayama Medical Center
4-20 Komatsubara-dori, Wakayama, Wakayama 640-8558, Japan

J Jpn Soc Intensive Care Med. 2009;16:13~15.

文 献

- 1) 斎藤淳一, 橋場英二, 大川浩文, 他. 肺炎桿菌性敗血症ショックによる電撃性紫斑病の一例. 日集中医誌. 2009;16:83-4.
- 2) Kingston ME, Mackey D. Skin clues in the diagnosis of life-threatening infections. Rev Infect Dis. 1986;8:1-11.
- 3) Goodwin JN. Symmetrical peripheral gangrene. Arch Surg. 1974;108:780-4.
- 4) Guelliot A. Note sur trois cas de purpura infectieux foudroyant. Un Med Sci Nord-Est. 1884;8:25.
- 5) Willis TM, Hopp RJ, Romero JR, et al. The protective effect of brachial plexus palsy in purpura fulminans. Pediatr Neurol. 2001;24:379-81.
- 6) Faust SN, Levin M, Harrison OB, et al. Dysfunction of endothelial protein C activation in severe meningococcal sepsis. N Engl J Med. 2001;345:408-16.
- 7) Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Pathogens or infectious conditions strongly associated with rash. In: Principles and practice of infectious disease. 6th ed. Amsterdam: Elsevier (Churchill Livingstone); 2004. p. 735-9.
- 8) Kravitz GR, Dries DJ, Peterson ML, et al. Purpura fulminans due to Staphylococcus aureus. Clin Infect Dis. 2005;40:941-7.
- 9) Childers BJ, Cobanov B. acute infectious purpura fulminans: a 15-year retrospective review of 28 consecutive cases. Am Surg. 2003;69:86-90.
- 10) Harrison OB, Robertson BD, Faust SN, et al. Analysis of pathogen-host cell interactions in purpura fulminans expression of capsule, type IV pili, and PorA by *Neisseria meningitidis* in vivo. Infect Immun. 2002;70:5193-201.
- 11) Johansen K, Hansen ST Jr. Symmetrical peripheral gangrene (purpura fulminans) complicating pneumococcal sepsis. Am J Surg. 1993;165:642-5.
- 12) Kullberg BJ, Westendorp RG, van't Wout JW, et al. Purpura fulminans and symmetrical peripheral gangrene caused by *Capnocytophaga canimorsus* (formerly DF2) septicemia-a complication of dog bite. Medicine (Baltimore). 1991;70:287-92.
- 13) 冲永功太, 飯沼久恵. 脾摘後重症感染症の救命に向けて. 日集中医誌. 2007;14:262-5.
- 14) Nolan J, Sinclair R. Review of management of purpura fulminans and two case reports. Brit J Anaesth. 2001; 86:581-6.
- 15) Vincent JL, Nadel S, Kutsogiannis DJ, et al. Drotrecogin alfa (activated) in patients with severe sepsis presenting with purpura fulminans, meningitides, or meningococcal disease. Crit Care. 2005;9:331-43.
- 16) Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008. Crit Care Med. 2008;36:296-327.
- 17) Werdan K, Pilz G, Bujdoso O, et al. Score-based immunoglobulin G therapy of patients with sepsis: the SBITS study. Crit Care Med. 2007;35:2693-701.
- 18) Warner PM, Kagan RJ, Yakuboff KP, et al. Current management of purpura fulminans: a multicenter study. J Burn Care Rehabil. 2003;24:119-26.
- 19) Rintala E, Kauppila M, Seppala OP, et al. Protein C substitution in sepsis-associated purpura fulminans. Crit Care Med. 2000;28:2373-8.
- 20) Rangel-Frausto MS, Pittet D, Costigan M, et al. The natural history of the systemic inflammatory response syndrome (SIRS). A prospective study. JAMA. 1995; 273:117-21.

受付日2008年 7 月25日

採択日2008年 8 月13日