多臓器不全を合併したインフルエンザAウイルス感染の1症例

吉田 豊^{*1} 永田 義毅^{*1} 広田幸次郎^{*1} 柴田 恵三^{*1}
石瀬 淳^{*1} 北 義人^{*1} 金兼 弘和^{*2}

要約: 多臓器不全を合併したインフルエンザA (H3N2) 感染の一例を経験した。既往歴に心電図異常を指摘されていた16歳女性が、数日間の感冒様症状の後、呼吸困難となり入院した。呼吸不全に加え、横紋筋融解症、心不全、腎不全を認め、インフルエンザ感染による合併症と診断された。直ちに人工呼吸管理、血液浄化法、カテコラミン投与を開始した。持続的血液濾過法は、水分、電解質バランスの維持およびミオグロビンの除去に効果的であったと考えられる。インフルエンザ感染による致死の合併症は高齢者で稀にみられるが、若年者においても慢性心疾患のある症例では、これを十分考慮し、速やかに対処することが重要である。

Key words: ① influenza infection, ② rhabdomyolysis, ③ pneumonia

はじめに

インフルエンザ感染は、一般的には軽症で推移することが多い。しかし、高齢者、慢性心肺疾患患者、妊婦では合併症を併発し、死亡例や胎児への影響があるといわれている¹⁾。今回、インフルエンザ感染後、多臓器不全を合併したが、無事救命しえた症例を経験した。

症 例

患者は、16歳女性。これまで、学校検診で心電図異常を指摘され、初期の心筋症を疑われていた。家族歴を含めて筋疾患の既往はない。

1995年1月23日より食欲低下、全身倦怠感、38℃の発熱を認め、感冒様症状を呈していた。27日夕より咳嗽、泡沫状喀痰、呼吸困難を認め、救急外来を受診し入院となった。患者は下顎呼吸状態であり $3\text{ l}\cdot\text{min}^{-1}$ の酸素投与で、動脈血ガス分析値がpH 7.01, PaO_2 38.8 mmHg, PaCO_2 36.0 mmHg, $\text{BE} - 21.6\text{ m mol}\cdot\text{l}^{-1}$ であった。このため経鼻気管内挿管後に10 cmH₂Oの圧支持換気 (pressure support ventilation; PSV) に10 cmH₂Oの呼気終末陽圧 (positive end-expiratory pressure; PEEP) を付加して人工呼吸を開始した。しかし、急性腎不全も認められたため、呼吸管理、血液浄化法の施行を目的に当日ICU入室となった。

ICU 入室時検査

意識は清明、血圧162/71 mmHg、心拍数166 min^{-1} 、整で、呼吸数42 min^{-1} と頻呼吸状態であった。また、入室前の1時間尿量は、利尿薬を使用した状態で3 mlであった。血液検査 (Table 1) では、急性腎不全の他に、著明な脱水、逸脱酵素、特にクレアチンホスホキナーゼ (CPK) の著増が認められた。動脈血ガス分析では、低酸素血症および高度の代謝性アシドーシスの状態であった。胸部単純X線写真 (Fig. 1) では、著明な肺うっ血像および肺実質、間質陰影が認められた。心エコーでは左室駆出分画 (left ventricular ejection fraction; LVEF) が0.41と収縮力の低下を示し、左室壁が14mmと肥厚していた。心電図では、洞性頻脈 (160 min^{-1})、左室肥大を認めたが、ST-Tの変化や異常Q波は認めなかった。

臨床経過 (Fig. 2, 3)

ICU入室後直ちに血液透析 (hemodialysis; HD) を施行し、以後、間欠的HDと連日の持続的血液濾過 (continuous hemofiltration; CHF) を併用した。第3病日の血清ミオグロビンは $5560\text{ ng}\cdot\text{ml}^{-1}$ と異常高値を示し、横紋筋融解症と診断された。血圧は収縮期圧100 mmHg以上を維持していたが、ドーパミンおよびドブ

^{*1} 金沢大学医学部附属病院救急部・集中治療部 (〒920 石川県金沢市宝町13-1)

^{*2} 同小児科

受付日 1996年3月21日

採択日 1997年8月11日

Table 1 Laboratory data on admission

Hematology		Biochemistry		Arterial blood gas *	
WBC	11800 mm ⁻³	BUN	146 mg · dl ⁻¹	pH	7.034
RBC	520 × 10 ⁴ mm ⁻³	Cr	9.1 mg · dl ⁻¹	PaCO ₂	49.3 mmHg
Hb	16.4 g · dl ⁻¹	Ca ⁺⁺	3.0 mEq · l ⁻¹	PaO ₂	58.7 mmHg
Plts	17 × 10 ⁴ mm ⁻³	ALP	218 IU · l ⁻¹	HCO ₃ ⁻	13.1 mmol · l ⁻¹
CRP	4.3 mg · dl ⁻¹	γ-GTP	20 IU · l ⁻¹	BE	-18.4 mmol · l ⁻¹
Na ⁺	132 mEq · l ⁻¹	GOT	1367 IU · l ⁻¹		
K ⁺	5.5 mEq/l ⁻¹	GPT	725 IU · l ⁻¹		
Cl ⁻	89 mEq · l ⁻¹	LDH	10300 IU · l ⁻¹		
		Ald	280 IU · l ⁻¹		
		CK	113800 IU · l ⁻¹		
			(MM 96.5%, MB 3.5%)		
		T-Bil	0.2 mg · dl ⁻¹		
		TP	6.5 g · dl ⁻¹		

PSV, pressure support ventilation; PEEP, positive end-expiratory pressure.

*, F_IO₂=1.0; PSV=10 cmH₂O; PEEP=10 cmH₂O.

Fig. 1 Chest X-ray on admission. Chest radiograph showing pulmonary congestion and consolidation in bilateral lung fields.

タミンの持続投与にもかかわらず、肺動脈楔入圧 (pulmonary wedge pressure; PCWP) は10 mmHg以下と低値ながら、心係数 (cardiac index; C.I.) は2.2 l · min⁻¹ · m⁻² 以下で体血管抵抗 (systemic vascular resistance; SVR) が2500 dynes · sec · cm⁻⁵ 以上の心不全状態であった。SVRの著明な上昇および150 min⁻¹以上の頻脈が継続したため、第4病日よりニトログリセリンおよびジルチアゼム投与を開始したところ、心不全は著明に改善した。第12病日にはカテコラミン、血管

拡張薬ともに離脱可能となり、心エコーでもLVEFが0.67、左室壁が11 mmと改善した。

人工呼吸は、塩酸モルヒネおよびミダゾラムの間欠的投与を行いながらPSVにPEEPを付加していた。免疫グロブリン製剤の投与および全身状態の改善にともない、血液ガスも改善し、人工呼吸からの離脱が可能となり、第17病日、抜管に成功した。また、第16病日に1日尿量が730 mlと増加し、第17病日には血液浄化を中止した。

DA ($\mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$)	4--2--3--2--1-----0
DOB ($\mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$)	4--2--3--7--5--0
NTG ($\mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$)	0.3--2---1.3-----0.9-0
Diltiazem ($\mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$)	2.5--5-----2.5-----0
C.I. ($\text{l} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)	2.2---1.5---4.0---3.6---4.3
SVI ($\text{ml} \cdot \text{beat}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)	12---8---27---28---35

Fig. 2 Changes in respiratory and hemodynamic variables after admission to the ICU. DA, dopamine; DOB, dobutamine; NTG, nitroglycerine; C.I., cardiac index; SVI, stroke volume index; PEEP, positive end-expiratory pressure; BP, arterial blood pressure; HR, heart rate.

後日行われた心筋生検では明らかな異常は認められず、退院時の胸部単純 X 線写真 (Fig. 4) はほぼ正常であった。

第 1, 第 13 病日のインフルエンザ A 型 (H3N2) の血清抗体価が, 1:64 から 1:2048 (正常値; < 32) へ上昇したことが確認され, 第 6 病日に行われた気管支鏡による血性肺胞洗浄液からもインフルエンザ A 型 (H3N2) ウイルスが後日確認された。

考 察

本症例は, 当初病因が明らかでなく, 感染症と心筋症の増悪, 膠原病, 悪性疾患の存在などが考慮された。しかし, 対症療法による病態の改善と, 血清のウイルス抗体価および肺胞洗浄液中のウイルスの存在で多臓器不全を併発したインフルエンザ感染症と確診した。インフルエンザ感染は, 高い罹患率と低い死亡率を

Fig. 3 Changes in renal variables after admission to the ICU. Cr, creatinine; CCr, creatinine clearance; CHF, continuous hemofiltration; HD, hemodialysis.

特徴とする伝染病であるが、伝染病の中で唯一超過死亡（注；社会集団レベルでの死亡率の増加）の見られる疾患でもある。重篤な合併症には、肺炎、筋炎、心筋炎、中枢神経障害、ライ症候群などが挙げられる¹⁾。

肺炎には、一次性的ウイルス性肺炎と二次的に細菌感染を合併した肺炎とがある。本症例ではウイルス性肺炎に特徴的な出血性肺炎を呈し、肺胞洗浄液でウイルスが確認され、他の起炎菌が培養上検出されなかったことからウイルスによる一次性的肺炎であったと思

われる。

ウイルス感染に伴う筋肉障害は、一般的に筋肉痛から筋炎まで幅広い症状を呈する¹⁾。成人のインフルエンザ感染では、感染早期から全身の筋肉痛が認められる程度である。しかし、本症例のように横紋筋融解症から急性腎不全に至る重症例は稀であり、文献的報告は10例に満たない^{2~4)}。腎不全は、ミオグロビン単独ではなく脱水、低血圧およびアシドーシスなどが尿細管障害を引き起こした結果であると考えられている⁵⁾。

Fig. 4 Chest X-ray on discharge. Chest radiograph showing no significant abnormality.

本症例も大量のミオグロビンに加えて、発熱による脱水、低酸素血症によるアシドーシス、心不全による腎血流の低下などが関与したものと考えられる。

ウイルス性心筋炎では心エコー図、心電図とも特徴的な所見はない⁶⁾。しかし、本症例でみられた心不全は、全身状態の改善後の心エコーで心筋肥厚が消失し、心機能も改善したことからウイルス性心筋炎によるものと診断した。しかし、以前に指摘されていた心電図異常との関連は否定できず、今後心筋症も念頭において経過観察する必要がある。

本症例は心不全、腎不全を併発したので、水分、電解質管理が非常に重要であった。今回行ったCHFは、調節性がよく急激な水分バランスの変化を来さず、また、ミオグロビンの除去にも有用であった。さらに、多臓器不全の引金となる種々のサイトカインの除去にも有効であった可能性がある⁷⁾。

インフルエンザ感染が重症化する原因は明らかではないが、本症例では、初期の心筋症と疑われていた心電図異常が関与した可能性がある。また、急性腎不全の併発には播種性血管内凝固症候群 (disseminated intravascular coagulation; DIC) の関与も示唆されており⁸⁾、この点に対する注意が重症化の早期発見に役立つかもしれない。

文 献

- 1) Nicolson KG. Clinical features of influenza. *Semin Respir Infect* 1992; 7: 26-37.
- 2) Berry L, Braude S. Influenza A infection with rhabdomyolysis and acute renal failure-a potentially fatal complication. *Postgrad Med J* 1991; 67: 389-90.
- 3) Takaya T, Tatsuyoshi T, Daisuke T, et al. Acute renal failure due to rhabdomyolysis associated with Echovirus 9 infection: A case report and review of literature. *Jpn J Med* 1989; 28: 237-41.
- 4) William F, Jeremy R, Caroline S. Influenza A and rhabdomyolysis. *J Infect* 1990; 21: 303-4.
- 5) Ayer G, Grandchamp A, Wyler T, et al. Intra-renal hemodynamics in glycerol-induced myoglobinuric acute renal failure in the rat. *Circ Res* 1971; 29: 128-35.
- 6) Michael N. Myocarditis and pericarditis caused by enterovirus. In: Wyngaarden J, Smith L, Bennett J, editors. *Textbook of Medicine*. Philadelphia : W. B. Saunders Company, 19th ed. 1992: 1857-60.
- 7) 菅井桂雄, 平澤博之. 多臓器不全と血液浄化法. *救急医学* 1993; 17: 219-23.
- 8) Whitaker AN, Bunce I, Graeme ER. Disseminated intravascular coagulation and acute renal failure in influenza A2 infection. *Med J Aust* 1974; 2: 196-201.

Abstract

A case of influenza A infection followed by multiple organ failure (MOF)

Yutaka Yoshita *¹, Yoshiki Nagata *¹, Koujirou Hirota *¹, Keizou Shibata *¹, Jun Ishise *¹,
Yoshihito Kita *¹, Hirokazu Kanegane *².

*¹ Section of Emergency Medicine and Intensive Care, Kanazawa University, School of Medicine.

*² Department of Pediatrics, Kanazawa University, School of Medicine.

13-1 Takara-machi, Kanazawa, Ishikawa 920, Japan.

We report a case of influenza A (H3N2) infection followed by multiple organ failure (MOF). The patient, a 16-year-old female who had been found to have an ECG abnormality, was admitted to our ICU for acute respiratory, cardiac and renal failure. On examination, it was established that the MOF resulted from rhabdomyolysis, viral pneumonia and viral myocarditis. She was immediately treated with artificial respiration, blood purification and catecholamines. In the treatment of MOF, continuous hemofiltration (CHF) was effective for the maintenance of proper water balance and electrolytes, and the removal of myoglobin. Although the fatal complications of influenza are very rare, early recognition and prompt treatment are important to prevent serious complications as shown in the case of a young adult with chronic heart disease.

Key words: ① influenza infection, ② rhabdomyolysis, ③ pneumonia

J Jpn Soc Intensive Care Med 1997; 4: 375 ~ 380