RA 患者の血清、関節液、関節組織における TNF α の発現

斎藤隆幸^{*1)}, 宇月美和^{*2)}, 力丸 暘^{*3)}, 櫻井 實^{*1)}, 澤井高志^{*2)}

Expression of TNF α in serum, synovial fluid and joint tissues of patients with rheumatoid arthritis

In order to identify the standpoint of TNF α in rheumatoid arthritis, we measured concentration of TNF α in serum and joint fluid, and further immunohistochemically examined TNF α -containing cells and their distributions in joint tissues of the patients with rheumatoid arthritis. TNF α concentration in serum and joint fluid was higher than controls, as mentioned by some preceding reports. No good correlation was seen between TNF α and other clinical and laboratory data except for positive correlation between serum TNF α concentration and serum IgG concentration.

There were a variety of cells that contained TNF α in the synovia and pannus of RA, in which osteoclast was the most striking of all cells. Expression of TNF α in the synovial tissues and concentration of TNF α in synovial fluid showed close relationship to the background feature, rather than the grade of lymphocytes aggregation in synovial tissues.

That is to say, the more severe the inflammatory infiltration is, the more highly the TNF α appears in synovia and joint fluid. Our data, *in vivo*, suggested that TNF α play an important role for persistence and progression of RA.

Takayuki Saitoh^{*1)}, Miwa Uzuki^{*2)},
Akira Rikimaru^{*3)}, Minoru Sakurai^{*1)},
Takashi Sawai^{*2)}

key words : rheumatoid arthritis, TNF α , serum,
synovial fluid, synovia

tumor necrosis factor α (TNF α , 腫瘍壊死因子 α) は、17 kD の糖鎖構造をもたない蛋白質であり、生体内では分子量 45 kD の 3 量体として存在

している。

1975 年、Carswell らにより、BCG で感作したマウスに lipopolysaccharide (LPS) を投与した際血清中に出現する移植腫瘍壊死物質としてはじめて報告された¹⁾。その後、IL-1 と同様に種々の細胞に対して多彩な生理活性を示すことが明らかにされ²⁾、現在では炎症と免疫の制御に重要な役割を演ずるサイトカインの一つとして理解されている。

関節炎に関連した TNF α の作用も多々報告されており、実際にヒトでも、rheumatoid arthritis (RA) 患者でその血清中^{3,4)}、およびその関節液中に TNF α が検出されること^{4~6)}、RA の関節滑膜において TNF α の蛋白とその mRNA の発現が認められていることから^{7~11)}、TNF α が RA の発症や持続および関節破壊に大きな役割を担っていることが示唆されている。

しかし、このように RA の病態における TNF α の関与が示唆されても、RA 個々の症例における TNF α の発現と病態との関係については、これまであまり検討されてこなかった。そこで本研究では、RA 患者の血清、関節液、滑膜、関節組織について、TNF α の定量や保有細胞の同定、保有の程度を調べ、TNF α の RA の病態への関与を検討した。

対象と方法

(1) 対象

1987 年のアメリカリウマチ学会による新しい診断基準を満足する RA 患者を対象とした。試料は関節穿刺、関節鏡検査、滑膜切除術および人工関節置換術の際に採取された血清、関節液と滑膜組織、および軟骨・骨の組織である。

対照としては、変形性膝関節症 (osteoarthritis deformans genu, OA) 患者の関節穿刺、関節鏡検

^{*1)} Department of Orthopedics, Tohoku University School of Medicine 東北大学医学部整形外科教室

^{*2)} Department of Pathology, Tohoku University Hospital 東北大学医学部附属病院病理部

^{*3)} Department of Orthopedics, Narugo National Hospital 国立鳴子病院整形外科

查, 人工関節置換術の際, 得られた試料と健常人の血清を用いた.

今回対象とした症例は, 全例で 161 例, うち RA 113 例で, 対照として OA 33 例, 健常人(血清のみ)15 例である. RA のうち 15 例は血清, 関節液, 関節組織で $\text{TNF}\alpha$ の検討が可能であった.

(2) $\text{TNF}\alpha$ の測定法・証明法

① 血清, 関節液の $\text{TNF}\alpha$ 濃度の測定

血清については, 採血後, 遠心分離し, 細胞成分などの沈澱物を除いたあと, 200 μl ずつ分注し, 使用時まで -80°C で保存した. 関節液も血清と同様に, 採取後, 遠心分離し, 200 μl ずつ分注して使用時まで -80°C で保存した.

試料中の $\text{TNF}\alpha$ 濃度の測定は, ヒト $\text{TNF}\alpha$ ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) キット ($\text{TNF}\alpha$ -EASIA[®], Medgenix Diagnostics 社, Belgium) で行った. 吸光度の測定は, マイクロプレートリーダー (UVmax Kinematic microplate reader, Molecular Device 社, USA) で 490 nm (reference filter 650 nm) で行った.

なお, ELISA の場合には, 試料中のリウマトイド因子との反応による偽陽性が懸念されるため, 本研究でも予めこの反応系に対し, 国立医療センター青塚博士より分与されたリウマトイド因子を添加し, その反応性を検討した. その結果, 本アッセイ系はリウマトイド因子の影響を受けないことが証明された.

② $\text{TNF}\alpha$ の免疫染色

関節から採取した組織中の $\text{TNF}\alpha$ は, 免疫組織化学的に証明した. その手順を簡単に述べると, 以下のごとくである¹²⁾.

採取した滑膜, 軟骨・骨組織は, ただちに 4% パラフォルムアルデヒド/10 mM PBS で 2 時間固定したあと, エタノールで脱水し, パラフィンに包埋した.

なお, 骨を含んだ組織については固定・脱脂後 4°C の EDTA による低温脱灰を行い, その後に包埋した. パラフィンプロックから 2~3 μm 切片を薄切し, 内因性ペルオキシダーゼブロック, 非特異的反応阻止操作のあと, 一次抗体には, ウサギ抗ヒト $\text{TNF}\alpha$ ポリクローナル抗体 (大塚製薬細胞工芸研究所) を用い, 4°C で一晚反応後, 二次抗体にビオチン化・ヤギ抗ウサギポリクローナル

表 1 RA 滑膜の組織分類*

(1) リンパ球集簇
0: リンパ球の集簇なし
1: 滑膜組織中に散在するリンパ球の小集簇
2: 滑膜表層細胞下のリンパ球の帯状集簇
3: 多数のリンパ球からなる, よく発達したリンパ濾胞

(2) 背景像

A: 浮腫像
B: びまん性炎症性細胞浸潤像
C: 毛細管増生を伴う肉芽組織像
D: 線維化像

* RA 滑膜の組織像を, リンパ球の集簇の程度と滑膜の背景像をもとに分類した.

IgG 抗体 (Vector Laboratories 社, USA) を用い, Avidin-Biotin-Complex Kit (Vector Laboratories 社, USA) と反応後, 3-3' diaminobenzidine で発色させた.

対照は, 希釈非免疫ウサギ血清を一次抗体のかわりに用いて作成した. なお, 切片の 1 枚には hematoxylin-eosin (HE) 染色を施した.

吸収試験は, 一次抗体を含むウサギ血清を, ELISA の標準曲線用の rh $\text{TNF}\alpha$ 溶液 (Medgenix Diagnostics 社, Belgium) と混合して, 一晚 4°C で反応させ, 翌日遠心分離し, その上清を一次抗体のかわりに用い, 同じ手順で染色を施行した.

(3) 評価方法

① 血清および関節液

RA 患者の血清および関節液の中の $\text{TNF}\alpha$ 濃度を, ELISA 法で測定した. 対照として, OA 患者の血清, 膝の関節液と, 健常人の血清を用いた. また, これらの結果を臨床データとの関連をも含めて, 統計学的に検討した. 有意差検定は, Wilcoxon の方法で行った. なお, RA テストは, (−), (±), (+), (++) と非連続的なデータであらわされるが, これとの関連は, (−): 0, (±): 0.5, (+): 1, (++) : 2, と置き換えて検討した.

② 滑膜, 軟骨・骨組織

採取した RA 患者の罹患関節の滑膜, 軟骨・骨組織に, 前述のごとく, HE 染色, および $\text{TNF}\alpha$ に対する免疫組織化学染色を施行し, 関節組織における $\text{TNF}\alpha$ 保有細胞を同定し, その分布を検討した.

対照として, OA 患者の膝の関節組織を用いた.

図 1 血清 TNF α 濃度

RA では OA, 健常人よりも有意に高値を示した (P < 0.01, P < 0.001).

図 2 関節液中 TNF α 濃度

RA では OA よりも有意に高値を示した (P < 0.001). RA 71 例中 64 例で 10 pg/ml を超えていた.

③ RA 滑膜の組織像分類と TNF α 発現の様相との対比

RA 関節滑膜の HE 染色標本を用い, その組織像を従来より筆者らの用いている, リンパ球の集簇の程度とその背景像をもとにした組織分類法で分類した^{13,14)}(表 1).

その分類は具体的には, HE 染色の結果に基づき, まず, リンパ球の集簇の発達の程度から, (0) から (3) までの 4 段階に分類し, つぎに, その背景に伴う炎症像から, A 型: 浮腫像, B 型: びまん性炎症性細胞浸潤像, C 型: 毛細管増生を伴う肉芽組織像, D 型: 線維化像, の四つに分類し, これを組み合わせる方法である. この分類は, リンパ球の集簇を主体とした炎症の免疫学的な要素と, その背景のマクロファージ, 好中球, 線維芽細胞からなる炎症の非特異的な要素を考慮したものであり, 滑膜の炎症の推移をあらわして

表 2 血清中・関節液中 TNF α 濃度と他の臨床データとの相関*

	血清 TNF α	関節液 TNF α
血清 TNF α	—	0.448
関節液 TNF α	0.448	—
ESR	0.045	0.262
CRP(+)	0.261	0.243
CRP(Conc.)	-0.102	0.223
RA テスト(—~++)	-0.044	-0.049
ANF	-0.147	0.046
IgG	0.579	0.298
IgA	0.267	NS
IgM	0.015	0.198
WBC	-0.070	0.078
好中球の割合(%)	0.219	0.131
RBC	-0.263	-0.177
Hb	-0.070	-0.217
PLT	-0.032	0.017
血清鉄	0.025	-0.233
STAGE	NS	NS
CLASS	NS	NS
関節の STAGE	—	-0.027
滑膜表層細胞中の 保有細胞の割合	0.119	-0.071
罹病期間	-0.014	0.144

* 数値は相関係数. NS: 相関なし.

血清中 TNF α 濃度と血清中 IgG 濃度との間に R = 0.579 と弱い正の相関がみられる. (P < 0.01)

いるものと思われる. 組織像は, 対象とした切片において優勢と思える分類型で代表させた.

組織での TNF α 発現の程度の検討は, TNF α を比較的高度に保有していた滑膜表層の上皮細胞様ないしは層構造状配列の細胞群に絞って行い, 発現の程度を滑膜の表層細胞群中に占める TNF α 保有細胞数の割合の百分率であらわした. なお, 細胞数は, 対象とした切片にみられる細胞を可能な限り多数, 数えた.

そして, この組織像分類と滑膜表層細胞中の TNF α 保有細胞数の割合, および関節液における TNF α 濃度との相関を検討した.

結 果

(1) 血清および関節液中の TNF α 濃度

血清中の TNF α 濃度を, RA 83 例, OA 16 例, 健常人 15 例について測定した. RA では平均 30.8 ± 65.6 pg/ml, OA 6.8 ± 7.3 pg/ml, 健常人 4.5 ± 2.1 pg/ml と RA で有意に高値を示した

図3 RA滑膜での $\text{TNF}\alpha$ の免疫組織化学染色と、その吸収試験

a: 通常の免疫組織化学染色. 滑膜内の種々の細胞に $\text{TNF}\alpha$ の保有が認められる.

b: 吸収試験. 抗体の特異性を確認するため、はじめに抗 $\text{TNF}\alpha$ 抗体を $\text{rhTNF}\alpha$ にて吸収させたあと、免疫染色を試みたもの. 染色性は殆ど消失し、特異性が証明された.

(original magnification, $\times 250$)

($P < 0.01$, $P < 0.001$) (図1).

関節液中の $\text{TNF}\alpha$ 濃度を、RA 71関節、OA 27関節について測定した. その結果、RAで平均 61.1 ± 68.9 pg/ml, OA 5.8 ± 4.0 pg/mlとRAで有意に高値を示した($P < 0.001$) (図2). なお、RA 71関節中64関節で10 pg/mlを超えていたのに対し、OAでは3関節のみであった.

RAで、関節液・血清の両者を測定した48関節についてみると、45関節で関節液のほうが血清に比較してより高値を示した. しかし両者の間には明確な相関は認められなかった($R = 0.448$, $P < 0.01$).

これら $\text{TNF}\alpha$ 濃度と種々の臨床データとを比較検討した結果、高度の相関を示す臨床データはないものの(表2)、血清中 $\text{TNF}\alpha$ 濃度と血清中IgG濃度との間に弱いながらも正の相関が認められた($R = 0.579$, $P < 0.01$).

(2) $\text{TNF}\alpha$ の免疫組織化学的検討

滑膜、軟骨・骨組織について、 $\text{TNF}\alpha$ の免疫組織化学染色を、RA 34例、37関節、OA 6例、6関節に行った. はじめに抗 $\text{TNF}\alpha$ 抗体を $\text{rhTNF}\alpha$ で吸収させたあと、RA 2例、2関節に対して同様に染色を試みたところ、染色性はほとんど消失し、免疫染色の特異性が証明された(図3 a・b).

症例に免疫染色を試みた結果、RA 37関節中35関節と大部分の関節に、 $\text{TNF}\alpha$ 陽性の所見が得られた.

すなわち、RA滑膜では滑膜表層細胞、血管内

皮細胞、線維芽細胞、深部のマクロファージに $\text{TNF}\alpha$ の保有が認められ(図3 a), また、軟骨・骨表面のパンヌスの部分では、線維芽細胞、骨芽細胞、破骨細胞、軟骨細胞に保有が認められた(図4). このなかでは、破骨細胞での保有がもっとも高度であった. また、滑膜表層細胞、パンヌスの線維芽細胞、滑膜深部のマクロファージなども比較的高度に $\text{TNF}\alpha$ を保有していた.

OAでも6関節中6関節で、滑膜表層細胞、血管内皮細胞などに $\text{TNF}\alpha$ の保有が認められた. しかし、その程度はRAに比較して、弱いものであった.

(3) RA滑膜の組織像分類と $\text{TNF}\alpha$ 発現との相関

滑膜組織量が十分採取されている症例を検討の対象とした. 対象となったRA関節は59関節で、そのうち免疫組織化学染色を行ったもの35関節、関節液 $\text{TNF}\alpha$ 濃度を測定したもの43関節で、19関節では組織像分類をも含め三者の検討が可能であった.

滑膜組織のリンパ球の集簇の発達程度との関係についてみると、リンパ球の集簇程度と滑膜表層細胞での $\text{TNF}\alpha$ 保有細胞比率との間には有意ではないものの、相関する傾向がみられた(図5).

一方、滑膜のリンパ球の集簇程度と、関節液中 $\text{TNF}\alpha$ 濃度との間には有意な関係は認められなかった(図6).

つぎに、背景にある炎症像との関係を検討すると、B型(びまん性炎症性細胞浸潤像)、C型(毛細

図4 RA関節のパンスス域での免疫組織化学染色線維芽細胞、骨芽細胞、破骨細胞、軟骨細胞に保有が認められた。なかでも破骨細胞の保有がもっとも高度であった。(original magnification, $\times 660$)

図5 RA滑膜でのリンパ球の集簇程度と滑膜表層でのTNFα保有細胞比率との関係

有意の差は認められなかったが、リンパ球の集簇程度が高まるとTNFα保有細胞比率も高まる傾向が認められた。

管増生を伴う肉芽組織像)でD型(線維化像)よりも、滑膜表層細胞中のTNFα保有細胞比率が有意に高かった($P < 0.05$, $P < 0.001$)(図7, 8)。

また、少数例間の比較ではあったが、同様にB型C型の関節で関節液中TNFα濃度が高かった($P < 0.01$)(図9)。

考察

TNFαとRAとの関係については、その密接な関係がこれまで示唆されてきたが、実際の症例を対象とした総合的な検討はあまりなされてこな

図6 RA滑膜でのリンパ球の集簇程度と関節液中TNFα濃度との関係

有意の差は認められなかったが、リンパ球集簇が2型(带状集簇型)の関節で、関節液中TNFα濃度が高い傾向がみられた。

図7 RA滑膜の背景像と滑膜表層細胞中のTNFα保有細胞比率との関係

B型(びまん性炎症性細胞浸潤像), C型(毛細管増生を伴う肉芽組織像)で、D型(線維化像)に比較してTNFα保有細胞比率が明らかに高かった($P < 0.05$, $P < 0.001$)。

かった。本研究の特徴は、RA患者から同時期に得た血清・関節液・関節組織を対象にして、TNFαの発現について多角的に病態の解析を行った点にある。

血清中のTNFα濃度が、局所の関節の状態をあらわすものでないことは、表2の関節液との関係が示すとおりである。そこで、血清TNFα濃度と、全身的な病態の指標となる種々の臨床的パラメーターとを比較した。結果的には、TNFαと高度の相関を示したパラメーターはなかったが、血清IgG濃度との間に0.579という弱いながら有意の正の相関が得られた。

TNFαの作用については、primingされたB細胞

図 8 免疫組織化学染色による、C型、D型での $\text{TNF}\alpha$ 発現の比較
a : C型, b : D型
C型ではD型に比較して滑膜表層細胞中の $\text{TNF}\alpha$ 保有細胞比率が高かった。
(original magnification, $\times 330$)

図 9 RA 滑膜の背後像と関節液中 $\text{TNF}\alpha$ 濃度

B型, C型では, D型に比較して関節液中 $\text{TNF}\alpha$ 濃度が高かった ($P < 0.01$).

胞での抗体産生を直接促進することが報告されており¹⁵⁾, $\text{TNF}\alpha$ が抗体産生の面からも RA の病態形成に関与していることが示唆される。

今回の関節液での測定では, RA では 71 例中 64 例と, ほとんどの関節で $\text{TNF}\alpha$ 濃度が 10 pg/ml を超えていたのに対し, OA では, 3 例を除いて (24/27), 10 pg/ml を下回っていた。Vilček らは, ヒト FS-4 線維芽細胞に対する $\text{TNF}\alpha$ の増殖刺激効果が 10 pg/ml 以上で著明になることを報告しているが¹⁶⁾, これは RA の滑膜, パンヌスで認められる線維芽細胞の増殖の状態をよく反映しているものと思われる。

RA の関節組織においては, 種々の細胞が

$\text{TNF}\alpha$ を保有していることが認められたが(図 3 a, 4, 8), このうち破骨細胞は, 骨組織を侵蝕するパンヌスに含まれる間葉系細胞や炎症性細胞浸潤とともに存在し, もっとも高度に $\text{TNF}\alpha$ を保有していた(図 4)。

破骨細胞については, 今回のように $\text{TNF}\alpha$ の発現が高度である一方, $\text{TNF}\alpha$ による破骨細胞の誘導・活性化の報告もあり^{17,18)}, RA 関節における破骨細胞の出現・活性化に $\text{TNF}\alpha$ が, autocrine, paracrine 的に大きく関与していることが示唆される。パンヌスを形成する線維芽細胞でも, $\text{TNF}\alpha$ の発現は比較的強く認められた。パンヌスにある線維芽細胞で $\text{TNF}\alpha$ レセプターが強く発現しているというこれまでの報告や¹⁹⁾, $\text{TNF}\alpha$ による線維芽細胞での蛋白分解酵素の誘導作用を考え合わせると^{20,21)}, $\text{TNF}\alpha$ がパンヌスによる軟骨・骨破壊に深く関わっていることが示唆される。

RA 滑膜の組織像分類と $\text{TNF}\alpha$ の発現との関係でみると, 滑膜のリンパ球の集簇の程度との関係では, リンパ球の集簇が高度であるほど滑膜での $\text{TNF}\alpha$ の発現が高度になる傾向がみられた(図 5)。さらに, 背景の炎症像との関係では, B 型(びまん性炎症性細胞浸潤像), C 型(毛細管増生を伴う肉芽組織像)で, D 型(線維化像)よりも滑膜表層細胞での $\text{TNF}\alpha$ 保有細胞の比率が有意に高く, 関節液中 $\text{TNF}\alpha$ 濃度が高い傾向が認められた(図 7, 9)。

細胞浸潤の程度からみて炎症活性の高いB型、C型滑膜では、TNF α の発現が高く、マクロファージの活性化や線維芽細胞の増殖^{16,22)}、コラーゲナーゼ産生亢進²⁰⁾によるマトリックスの分解が進行していることが示唆される。一方、D型のようなburn outし、線維化した滑膜組織では、TNF α が発現が低下しつつあり、これらのことを考え合わせると、炎症の状態とTNF α の発現の状態とが、組織学的な面からもよく関連していることが証明された。

筆者らは以前、リンパ濾胞形成の程度よりも、背景となる像が、非特異的な炎症マーカーである血沈やCRPあるいは、マクロファージ遊走能、好中球遊走能と関連していることを証明した²³⁾。これは、RAの滑膜炎を組織学的にみたとき、リンパ球の集簇傾向に代表される像を、免疫学的な評価因子とすれば、マクロファージ、好中球、線維芽細胞などを含む多彩な炎症性細胞の浸潤からなる背景像は、非特異的な炎症性状態を示す因子といえよう。したがって、この観点からみると、TNF α の発現は、免疫異常を特異的に裏付けるのではなく、むしろ免疫異常をも含むなんらかの原因で生じたRAという炎症の状態を示すものといえよう。

RAにおいては、その病態形成における種々のサイトカインの関与が報告されているが^{24,25)}、TNF α もその一つである。今回の結果から、TNF α の発現が滑膜の炎症の程度に平行することが認められたこと、破骨細胞をはじめとするパンスス内にある細胞に高度の保有が認められたことから、TNF α は、炎症の持続や進行だけでなく、RAの患者にとっての大きな問題である関節破壊に対しても大きな役割を果たしていることが示唆される。

今後は*in vitro*で証明されるTNF α のさまざまな機能を*in vivo*で確認するとともに、*in situ* hybridizationによるTNF α 産生細胞の同定、TNF α レセプター発現状態の把握など、TNF α を制御する因子の面からも検討していく必要がある。

まとめ

① RA患者の血清、関節液、関節組織を対象

にして、TNF α の動態を検討した。

② 血清、関節液中TNF α 濃度は、RAで対照よりも有意に高値を示した。

③ 血清中TNF α 濃度と、血清IgG濃度との間に、 $R=0.579$ と弱い正の相関が認められた。

④ RAの関節組織では、種々の細胞がTNF α を保有していた。このうち、もっとも強力にTNF α を保有していたのは破骨細胞であった。

⑤ RA滑膜の組織像分類と関節局所でのTNF α の発現との関係では、滑膜の非特異的な炎症の高度な関節で、線維化した関節よりも滑膜表層細胞でのTNF α の発現の程度・関節液中TNF α 濃度がともに高かった。

⑥ 以上、RAにおいてはTNF α が全身的にも関節局所でも高度に証明され、RAの病態形成に大きく関与していることが示唆された。

なお、本論文の要旨は第14回日本炎症学会にて口演した。本研究は一部“厚生省慢性関節リウマチ病態解明研究班”の助成によるものである。

文 献

- 1) Carswell, E. A., Old, L. J., Kassel, R. L., Green, S., Fiore, N., Williamson, B.: An endotoxin-induced serum factor that causes necrosis of tumors. *Proc. Nat. Acad. Sci. (USA)*, 72: 3666-3670, 1975.
- 2) Le, J., Vilček, J.: Biology of disease: tumor necrosis factor and interleukin 1: cytokines with multiple overlapping biological activities. *Lab. Invest.*, 56: 234-248, 1987.
- 3) Maury, C. P., Teppo, A. M.: Cachectin/tumour necrosis factor- α in the circulation of patients with rheumatic disease. *Int. J. Tissue React.* 11: 189-193, 1989.
- 4) Saxne, T., Palladino, M. A. Jr., Heinegard, D., Talal, N., Wollheim, F. A.: Detection of tumor necrosis factor α but not tumor necrosis factor β in rheumatoid arthritis synovial fluid and serum. *Arthritis Rheum.* 31: 1041-1045, 1988.
- 5) Di Giovine, F. S., Nuki, G., Duff, G. W.: Tumour necrosis factor in synovial exudates. *Ann. Rheum. Dis.* 47: 768-772, 1988.
- 6) Hopkins, S. J., Meager, A.: Cytokines in synovial fluid: II. The presence of tumor necrosis factor and interferon. *Clin. Exp. Immunol.* 73: 88-92, 1988.
- 7) Chu, C. Q., Feldmann, M., Maini, R. N.: Localization of tumor necrosis factor α in synovial tissues and at the cartilage-pannus junction in patients with rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum.* 34: 1125-1132, 1991.

- 8) Buchan, G., Barrett, K., Turner, M., Chantry, D., Maini, R. N., Feldmann, N.: Interleukin-1 and tumour necrosis factor mRNA expression in rheumatoid arthritis: prolonged production of IL-1 α . Clin. Exp. Immunol. 73: 449-455, 1988.
- 9) Husby, G., Williams, R. C. Jr.: Synovial localization of tumor necrosis factor in patients with rheumatoid arthritis. J. Autoimmun. 1: 363-371, 1988.
- 10) Firestein, G. S., Alvaro-Garcia, J. M., Maki, R.: Quantitative analysis of cytokine gene expression in rheumatoid arthritis. J. Immunol. 144: 3347-3353, 1990.
- 11) MacNaul, K. L., Hutchinson, N. I., Parsons, J. N., Bayne, E. K., Tocci, M. J.: Analysis of IL-1 and TNF- α gene expression in human rheumatoid synoviocytes and normal monocytes by in situ hybridization. J. Immunol. 145: 4154-4166, 1990.
- 12) 澤井高志, 宇月美和, 高橋裕一, 宮崎修吉, 斎藤隆幸, 井上紘子: パラフィン切片を用いたサイトカインの免疫染色学的方法. 病理と臨床 10: 1067-1070, 1992.
- 13) 大山 明, 服部 彰, 力丸 暁, 秋山文世, 斎藤隆幸, 澤井高志: 慢性関節リウマチにおける膝関節鏡視下滑膜生検例の検討. 関節鏡 13: 39-42, 1988.
- 14) 澤井高志, 大山 明, 村上一宏, 力丸 暁, 服部 彰, 京極方久: 慢性関節リウマチ滑膜初期病変の免疫組織化学的検討—モノクローナル抗体を用いた炎症性細胞の定性ならびに定量的解析—. リウマチ 30: 247-254, 1990.
- 15) Kehrl, J. H., Miller, A., Fanci, A. S.: Effect of tumor necrosis factor α on mitogen-activated human B cells. J. Exp. Med. 166: 786-791, 1987.
- 16) Vilček, J., Palombella, V. J.: Fibroblast growth enhancing activity of tumor necrosis factor and its relationship to other polipeptide growth factors. J. Exp. Med. 163: 632-643, 1986.
- 17) Bertolini, D. R., Nedwin, G. E., Bringman, T. S., Smith, D. D., Mundy, G. R.: Stimulation of bone resorption and inhibition of bone formation in vitro by human tumor necrosis factors. Nature 319: 516-518, 1986.
- 18) van der Pluijm, G., Most, W., van der Wee-Pals, L., de Groot, H., Papapoulos, S., Lowik, C.: Two distinct effects of recombinant human tumor necrosis factor- α on osteoclast development and subsequent resorption of mineralized matrix. Endocrinology 129: 1596-1604, 1991.
- 19) Deleuran, B. W., Chu, C. Q., Field, M., Brennan, F. M., Mitchell, T., Feldmann, M., Maini, R. N.: Localization of tumor necrosis factor receptors in the synovial tissue and cartilage-pannus junction in patients with rheumatoid arthritis—Implication for local actions of tumor necrosis factor α . Arthritis Rheum. 35: 1170-1178, 1992.
- 20) Dayer, J. M., Beutler, B., Cerami, A.: Cachectin/tumor necrosis factor stimulates collagenase and prostaglandin E₂ production by human synovial cells and dermal fibroblasts. J. Exp. Med. 162: 2163-2168, 1985.
- 21) MacNaul, K. L., Chartrain, N., Lark, M., Tocci, M. J., Hutchinson, N. I.: Discoordinate expression of stromelysin, collagenase, and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 in rheumatoid human synovial fibroblasts—Synergistic effects of interleukin-1 and tumor necrosis factor- α on stromelysin expression. J. Biol. Chem. 265: 17238-17245, 1990.
- 22) 上條竜太郎, 武田 健, 南雲正男, 紺野邦夫: TGF- β による TNF の線維芽細胞に対する作用の抑制. 炎症 10: 369-373, 1990.
- 23) 澤井高志, 朴沢孝治, 近藤恵美子, 和田昌子, 京極方久: ヒト慢性関節リウマチの滑膜組織に浸潤する炎症性細胞の質的・量的把握の試み. 炎症 4: 485-486, 1984.
- 24) 宮坂信之: 自己免疫疾患とサイトカイン. サイトカイン 基礎から最新情報まで. (笠倉新平・編), 日本医学館, 東京, 1991, p 155-162.
- 25) 松島綱治: リウマチ性関節炎の発症ならびに病態とサイトカイン. 炎症 13: 9-15, 1993.