シンポジウム II-3: 追加発言

Mantle Cell Lymphoma の腫瘍細胞起源

—再構成 IgHV の Somatic Mutation の検索—

田丸 淳¹⁾, Michael Hummel²⁾, 三方, 淳男¹⁾, Harald Stein²⁾

1) 千葉大学医学部第一病理

2) ペルリン自由大学病理研究部

The Origin of Mantle Cell Lymphoma Cells
—Study of Somatic Mutations in Rearranged IgHV—Jun-ichi Tamaru¹⁾, Michael Hummel²⁾, Atsuo Mikata¹⁾, Harald Stein²⁾

1) First Department of Pathology, Chiba University School of Medicine

2) Institute of Pathology, Free University of Berlin, University Hospital Benjamin Franklin

はじめに

Mantle cell lymphoma (MCL) は、我が国の Lymphoma Study Group (LSG) 分類ではびまん性中細胞型リンパ腫に、アメリカが中心となった Working Formulation (WF) 分類では ML, diffuse, small cleaved cell に、そしてドイツを中心とした Kiel 分類では centrocytic lymphoma の範疇に入れられていたが、最近では、腫瘍細胞形態や腫瘍増殖 pattern に加えて、免疫組織化学的にも Mantle zone より発生する B cell lymphoma であるという、独立した疾患概念としての認識が高まってきた。1975年には well differentiated lymphocytic lymphoma と poorly differentiated lymphocytic lymphoma の中間的細胞よりなるリンパ腫を intermediately differentiated lymphocytic lymphoma と呼ぶようになり¹⁾, Weisenburger らはそれを intermediate lymphocytic lymphoma と名付け、1982年にその follicular variant を Mantle zone lymphoma と称し、一つの新しい疾患概念を提唱し

た²⁾。その後の研究でこの範疇には follicular pattern のみならず、diffuse pattern を示すものもある事が明らかにされてきた³⁾。そして、1994年には International Lymphoma Study Group の提唱した Revised European-American Classification of Lymphoid Neoplasms (REAL 分類) で MCL は独立した疾患概念として分類された⁴⁾。

我々は、再構成免疫グロブリン (Ig) 遺伝子の Somatic Mutation (SM) と B 細胞の分化との関連性に着目し、悪性リンパ腫の腫瘍細胞起源の解明を行っており⁵⁾⁶⁾, MCL は pre-Germinal Centre (GC) naive B cell に由来するのか、あるいは GC B cell や post-GC memory B cell に由来するのか、はたまたこれらの混在したものなのかを明らかにするために、MCL より得られた再構成免疫グロブリン重鎖 (IgH) 遺伝子における Somatic Mutation を調べた。

図1 6%ポリアクリルアミドゲル電気泳動（エチジウムブロマイド染色）
S：マーカー DNA，1～6：Mantle cell lymphoma，R：Raji，PL：胎盤，TL：T-cell lymphoma。なお，PLには予想される範囲外に小さいバンドが認められるが，このバンドはリンパ組織以外（特に胎盤）より得られた DNA を増幅した際にしばしば認められる。

材料及び方法

1. 組織材料

REAL 分類に従って診断された 6 例の MCL のホルマリン固定パラフィン包埋切片を使用。さらに対照として，B-chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) および Follicle centre lymphoma (FCL) を各々 6 例ずつ検索に用いた。

2. 方法

20 μ m フォルマリン固定パラフィン包埋切片より DNA extractor (341A；Applied Biosystem) を用い DNA を抽出し Polymerase chain reaction (PCR) 法の template とした。VH プライマーとして FR2A，JH プライマーとして LJH 及び VLJH を使用し seminested PCR を，GeneAmp PCR system 9600 (Perkin Elmer-Cetus) にて行った。増幅産物は一部ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用しエチジウムブロマイド染色後，UV 下にてクロナリティーを判定した。モノクローナルバンドを示したものは，その増幅産物より DNA を抽出し，FR2A と VLJH プライマーにて両方向に，DyeDeoxy Terminator 法を用い自動 DNA シークエンサー (373A；Applied Biosystem) にて塩基配列を決定した。IgHV 領域の SM の検索の為に，GenBank に登録された Germline シークエンスと

比較した。

Ongoing mutation の検索のために Clone Amp System (GIBCOBRL) にてサブクローニングを施行した。各クローンは SP6 および T7 プライマーにて両方向にシークエンスし，各々のシークエンスを比較し，intraclonal diversity の有無を調べた。

結 果

図 1 に示すごとく，モノクローナルバンドは 240～260bp 付近に認められた。

表 1 と表 2 に示すごとく，Germline とのホモロジー検索では，6 例の MCL の内，1 つの塩基置換を認めた 1 例（Case 5）を除き全て既知の Germline シークエンスと全く相同であった。なお，対照として同様に検索した B-CLL 6 例はすべて Germline シークエンスを示し，6 例の FCL では増幅された IgHV 領域の CDR II および FW III に 10～25 個の塩基置換を示し，Mutation Rate は 11% と全例に高度な SM を認めた。また，ongoing mutation は FCL のみに認められた。

考 察

近年，人 IgH 遺伝子におこる SM と B 細胞の分化との関係が明らかにされ，この事は，B 細胞性悪性リンパ腫の腫瘍細胞起源や腫瘍発生の解明にも重要

表1 6例のMCLより得られたシークエンスと既知のGermlineシークエンスとの比較

	←-----	CDR II	-----→	FW III	-----→
VH3 / DP47 Case 1	GCT ATT AGT GGT AGC ACA TAC TAC GCA GAC TCC GTG ATG GGC TTC ACC ATC TCC AGA GAC AAT TCC AAG AAC ACC CTG TAT CTG CAA ATG AAC AGC GAG GAC ACC GCG GTA TAT TAC TGT GCG AAA Ala Ile Ser Gly Ser Gly Tyr Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ser Lys Asn Thr Leu Tyr Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Lys				
VH4 / DP63 Case 2	GAA ATC AAT CAT AGT GGA AGC ACC AAC TAC GCA GAC CCG TCC CTC AAG AGT CGA GTC ACC ATA TCA GTA GAC ACC TCC AAG AAC CAG TTC TCC CTG AAG CTG AGC TCT GTG ACC GCG GAG ACC GCT GTG TAT TAC TGT GCG AGA Glu Ile Asn His Ser Ser Thr Asn Tyr Asn Pro Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Val Asp Thr Ser Lys Asn Gln Phe Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg				
VH3 / DP77 Case 3	TCC ATT AGT AGT AGT TAC ATA TAC TAC GCA GAC TCA GTG ATG GGC CGA TTC ACC ATC TCC AGA GAC AAC GCC AAG AAC TCA CTG TAT CTG CAA ATG AAC AGC CTG AGA GCG GAG GAC ACC GCT GTG TAT TAC TGT GCG AGA Ser Ile Ser Ser Ser Tyr Ile Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg				
VH4 / DP63 Case 4	GAA ATC AAT CAT AGT GGA AGC ACC AAC TAC GCA GAC CCG TCC CTC AAG AGT CGA GTC ACC ATA TCA GTA GAC ACC TCC AAG AAC CAG TTC TCC CTG AAG CTG AGC TCT GTG ACC GCG GAG ACC GCT GTG TAT TAC TGT GCG AGA Glu Ile Asn His Ser Ser Thr Asn Tyr Asn Pro Ser Leu Lys Ser Arg Val Thr Ile Ser Val Asp Thr Ser Lys Asn Gln Phe Ser Leu Lys Leu Ser Ser Val Thr Ala Ala Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg				
VH3 / DP77 Case 5	TCC ATT AGT AGT AGT TAC ATA TAC TAC GCA GAC TCA GTG ATG GGC CGA TTC ACC ATC TCC AGA GAC AAC GCC AAG AAC TCA CTG TAT CTG CAA ATG AAC AGC CTG AGA GCG GAG GAC ACC GCT GTG TAT TAC TGT GCG AGA Ser Ile Ser Ser Ser Tyr Ile Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg				
VH3 / DP31 Case 6	GGT ATT AGT TGG AAT AGT AGC ATA GGC TAT GCG GAC TCT GTG AAG GGC CGA TTC ACC ATC TCC AGA GAC AAC GCC AAG AAC TCC CTG TAT CTG CAA ATG AAC AGT CTG AGA GCT GAG GAC ACC GCG TTG TAT TAC TGT GCA AAA Gly Ile Ser Trp Asn Ser Gly Ser Ile Gly Tyr Ala Asp Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Lys				

検索したMCLのシークエンスを中段に、それと最も相同性の高かったGermlineの塩基配列を上段に、そして検査症例のアミノ酸配列を下段に示した。中段の横棒はGermlineと相同な塩基を示し、アルファベットはMutationを示す。

表2 MCL, B-CLL および FCL より得られた IgHV における
Somatic Mutation の数および程度

	検索症例数	SM を示した 症例数	Silent Mutation 数	Replacement Mutation 数	Mutation%* (range)
MCL	6	0 (1) †	0	1 †	0 % (0 - 1)
B-CLL	6	0	0	0	0 % (0)
FCL	6	6	38	60	11% (10-25)

MCL : Mantle cell lymphoma, B-CLL : B-Chronic Lymphocytic Leukemia, FCL : Follicle Centre Lymphoma, IgHV : 再構成免疫グロブリン V 領域, SM : Somatic Mutation, * : CDRII および FWIII の全塩基数に対する Somatic Mutation の%, † : 1 例 (表 1 の Case 5) に FWIII に 1 個の Mutation を認めたが, これは未知の Germline あるいは Taq Polymerase の誤反応を否定できない。

な役割を果たすものと思われる。

IgH 遺伝子に見られる SM は, 抗体が抗原との高親和性を獲得するための出来事で, この抗体産生 B 細胞とともに, 抗原提示細胞と T 細胞との三者共同作業で行われる。そして, これら三者が存在する二次濾胞内で起こる現象である⁸⁾⁹⁾。Kueppers らは¹⁰⁾, 人リンパ節各部のリンパ球の IgH や IgL (免疫グロブリン軽鎖) 遺伝子の SM を調べ, Mantle zone の B cell は全くあるいはほとんど SM を持たず, 二次濾胞 Dark zone における Centroblast は軽度~中等度の SM を, そして, Light zone の Centrocyte は中等度~高度の SM を有する事を示した。また, これら Centroblast や Centrocyte の検索で二次濾胞の B cell は ongoing mutation の為に intracloal diversity を有する事も証明した。この様に彼らは Germline 遺伝子の配列と相同性である SM の無い Ig 遺伝子を持つ pre-GC naive B cell がリンパ節二次濾胞に入り, Centroblast から Centrocyte へと分化する過程で, 二次抗原刺激を受けながら SM を加えつつ, 抗原に対する高親和性を獲得してゆく事を明らかにした。

これまでの悪性リンパ腫・白血病における IgH あるいは IgL の SM の研究で pre-B-cell 由来の B-acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) や peripheral blood naive B cell 由来の B-CLL には SM がなく¹¹⁾¹²⁾, 我々が対照として用いた例でも同様の結果であり, B-CLL はまさしく pre-GC naive B cell

由来であると言えよう。また, 同様に検索した FCL では, これまでの報告のように¹³⁾, 増幅された IgHV 領域の CDR II と FW III に 10~25 塩基の置換を認め, その Mutation Rate は 11% と非常に高率であった。さらにサブクローニングでは, intracloal diversity が認められ, Mutation は ongoing である事が確認された。

MCL より得られた IgHV 領域は, 1 塩基置換を示した 1 例 (Case 5) を除き全ての例で Germline と全く相同の遺伝子配列であった。この FW III に見られた 1 つの塩基置換については, まだ検出されていない未知の Germline の存在あるいは Taq Polymerase による反応の誤りの可能性を否定できない。このように今回の結果で, MCL が二次抗原刺激を受けた GC derived memory B cell ではなく, pre-GC naive B cell, ひいてはリンパ濾胞の Mantle zone 由来であることを立証し得た。これは Klein らの研究¹⁴⁾によっても裏付けられている。彼らは人末梢血より得たリンパ球を表面免疫グロブリン (sIg) の発現により分離し, IgV 遺伝子の検索において sIgM+sIgD+B cell には SM がほとんどなく, sIgM+sIgD-および sIgM-sIgD- (sIgG sIgA を発現) Memory B cell は SM を有する事を実証した。実際, MCL の腫瘍細胞は Mantle zone の B cell と同様に sIgM および sIgD を共に発現している。一方, FCL は一般に sIgD は欠如し, 約半分の症例で sIgM の代わりに sIgG を発現している¹⁵⁾¹⁶⁾。

B-CLL と MCL は共に, Mantle zone B cell に関連する腫瘍と思われる。しかしながら, 両者には, 組織形態学的に pseudofollicle の有無¹⁷⁾や follicular dendritic cell のメッシュワークの有無¹⁵⁾¹⁶⁾, 免疫形質面では CD23 の発現の有無¹⁵⁾¹⁶⁾, そ

して観察される異なった染色体異常^{18)~22)}等, いくつかの相違点があり, このことは, 共に, sIgM および D を発現し, pre-GC naive B cell に由来するこれらの腫瘍の tumorigenesis を考える上で非常に興味深く, さらなる研究が必要とされている。

文 献

- 1) Braylan RC, Jaffe ES, Berard CW: Malignant lymphomas. Current classification and new observations. Pathology annual Appleton Century Crofts New York pp213-270, 1975
- 2) Weisenburger DD, Kim H, Rappaport H: Mantle-zone lymphoma: a follicular variant of intermediate lymphocytic lymphoma. Cancer 49: 1429-1438, 1982
- 3) Abe M, Ono N, Nozawa Y, Hojo H, Wakasa H: A histogenesis of malignant lymphoma, small cleaved cell of the B cell type and intermediate lymphocytic lymphoma (mantle zone lymphoma). An immuno- and enzyme-histochemical study. Virchows Archive A Pathol Anat 413: 205-213, 1988
- 4) Harris NL, Jaffe ES, Stein H, Banks PM, Chan JKC, Cleary ML, Delsol G, De Wolf-Peeters C, Falini B, Gatter KC, Grogan TM, Isaacson PG, Knowles DM, Mason DY, Muller-Hermelink HK, Pileri SA, Piris MA, Ralfkiaer E, Warnke RA: A Revised European-American Classification of Lymphoid Neoplasms: A proposal from the international lymphoma study group. Blood 84: 1361-1392, 1994
- 5) Hummel M, Tamaru J, Kalvelage B, Stein H: Mantle cell (previously centrocytic) lymphomas express VH genes with no or very little somatic mutations like the physiologic cells of the follicle mantle. Blood 84: 403-407, 1994
- 6) Tamaru J, Hummel M, Zemlin M, Kalvelage B, Stein H: Hodgkin's disease with a B-cell phenotype often shows a VDJ rearrangement and somatic mutations in the VH genes. Blood 84: 708-715, 1994
- 7) Ramasamy I, Brisco M, Morley A: Improved PCR method for detecting monoclonal immunoglobulin heavy chain rearrangement in B cell neoplasms. J Clin Pathol 45: 770-775, 1992
- 8) Berek C, Ziegner M: The maturation of the immune response. Immunology today 14: 400-404, 1993
- 9) Kocks C, Rajewsky K: Stable expression and somatic hypermutation of antibody V regions in B cell developmental pathways. Annu Rev Immunol 7: 537-559, 1989
- 10) Kueppers R, Zhao M, Hansmann M-L, Rajewsky K: Tracing B cell development in human germinal centres by molecular analysis of single cells picked from histological sections. EMBOJ 12: 4955-4967, 1993
- 11) Bird J, Galili N, Link M, Stites D, Sklar J: Continuing rearrangement but absence of somatic hypermutation in immunoglobulin genes of human B cell precursor leukemia. J Exp Med 168: 229-245, 1988
- 12) Kueppers R, Ganse A, Rajewsky K: B cells of chronic lymphatic leukemia express V genes in unmutated form. Leuk Res 15: 487-496, 1991
- 13) Levy R, Levy S, Cleary ML, Carroll W, Kon S, Bird J, Sklar J: Somatic mutations in human B-cell tumors. Immunol Rev 96: 43-58, 1989
- 14) Klein U, Kueppers R, Rajewsky K: Human IgM+IgD+B cells, the major B cell subset in the peripheral blood, express V_H genes with no or little somatic mutation throughout life. Eur J Immunol 23: 3272-3277, 1993
- 15) Stein H, Gerdes J, Mason DY: The normal and malignant germinal centre. Clin Haematol 11: 531-559, 1982
- 16) Stein H, Lennert K, Feller AC, Mason DY: Immunohistological analysis of human lymphoma: Correlation of histological and immunological categories. Adv Cancer Res 42: 67-147, 1984
- 17) Lennert K, Stein H, Kaiserling E: Cytological and functional criteria for the classification of malignant lymphomata. Br J Cancer 31: 29-43,

- 1975
- 18) Weisenburger DD, Sanger WG, Armitage JO: Intermediate lymphocytic lymphoma: Immunophenotypic and cytogenetic findings. *Blood* 69: 1617-1621, 1987
- 19) Medeiros LJ, van Krieken JH, Jaffe ES, Raffeld M: Association of bcl-1 rearrangements with lymphocytic lymphoma of intermediate differentiation. *Blood* 76: 2086-2090, 1990
- 20) Williams ME, Westermann CD, Swerdlow SH: Genotypic characterization of centrocytic lymphoma: Frequent rearrangement of the chromosome 11 bcl-1 locus. *Blood* 76: 1387-1391, 1990
- 21) Rosenberg CL, Wong E, Petty EM, Bale AE, Tsujimoto Y, Harris NL, Arnold A: Overexpression of PRAD1, a candidate bcl-1 breakpoint region oncogene, in centrocytic lymphomas. *Proc Natl Acad Sci USA* 88: 9638-9642, 1991
- 22) Banks PM, Chan J, Clearly ML, Delsol G, De Wolf-Peeters C, Gatter K, Grogan TM, Harris NL, Isaacson PG, Jaffe ES, Mason D, Pileri S, Ralfkiaer E, Stein H, Warnke R: Mantle cell lymphoma: A proposal for unification of morphologic, immunologic, and molecular data. *Am J Surg Pathol* 16: 637-640, 1992