シンポジウム

「唾液腺腫瘍の診断と治療」

唾液腺腫瘍の画像診断について

中山 英二¹⁾ 大内 知之²⁾ 賀 来 亨²⁾
柴 田 考 典³⁾ 有 末 眞⁴⁾ 永 易 裕 樹⁵⁾
安 彦 善 裕⁶⁾ 上 野 繭 美⁷⁾ 河 津 俊 幸⁷⁾
吉 浦 一 紀⁷⁾ 浅 香 雄 一 郎⁸⁾ 上 田 倫 弘⁸⁾
山 下 徹 郎⁸⁾ 仲 盛 健 治⁹⁾ 平 塚 博 義⁹⁾
針 谷 靖 史¹⁰⁾ 関 口 隆¹⁰⁾

要旨：唾液腺腫瘍は病理組織像が多彩であり、また、一つの腫瘍型の中にも多様な組織成分が混在するので、唾液腺腫瘍の病理組織学的診断は難しいことがある。それゆえ、唾液腺腫瘍において、良性和悪性の画像鑑別診断もまた困難なことがある。境界が画像上でほとんど明瞭のようであっても、実際は微妙に不明瞭である唾液腺腫瘍は悪性腫瘍のことがある。そこで、唾液腺腫瘍の画像診断においては、画像上の境界の明瞭度は非常に重要で、境界の明瞭度の注意深い判定は必須である。境界の明瞭度はCTではなく、超音波検査とMRIで判定されるべきである。さらに、CTとMRIでは、可能であれば、DICOMビューワー上で最適な画像表示状態で観察されるべきである。

大唾液腺腫瘍について：耳下腺腫瘍では良性腫瘍が70%以上であり、顎下腺腫瘍では40%が悪性で、舌下腺腫瘍では80%が悪性である。この事実は唾液腺腫瘍の画像診断をする上で重要である。境界が必ずしも明瞭とはいえない耳下腺腫瘍は悪性を疑う。画像所見が舌下腺から発生したことを示す病変は悪性腫瘍と診断されるべきである。

小唾液腺腫瘍について：腫瘍が小さい場合はたとえ悪性でも境界が明瞭なことがしばしばである。そこで、病変の境界が明瞭である画像所見は、その病変が良性である証拠とはならない。口蓋部の悪性唾液腺腫瘍では、画像所見として検出できない微妙な骨浸潤があることに特に注意を払う必要がある。口唇と頬部の唾液腺腫瘍には超音波検査が最も有用である。顎骨内に粘表皮癌が発生することについても注意したい。

キーワード：唾液腺、腫瘍、画像診断、大唾液腺、小唾液腺

緒 言

唾液腺腫瘍は、組織像が多彩であること、同じ腫瘍でも様々な組織構成成分が混在していることなど病理組織学的多様性がある。このことが画像による良性腫瘍と悪性腫瘍の鑑別診断の難しさに反映されている。一般に大唾液腺や小唾液腺存在部位に腫瘤性病変が疑われた場合、各種画像検査は、その腫瘤が炎症性か腫瘍性かの鑑別はかなりの正診率で診断できる。しかし、鑑別診断を唾液腺腫瘍に絞り込んだ後、それが良性か悪性かという最終的な診断は困難である。そこで、今回は、臨床所見や画像所見から唾液腺腫瘍であると判断した後の、良性和悪性の鑑別における画像診断の方法や留意点、および画像鑑別診断の限界にテーマを絞って考察する。

¹⁾ 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系歯科放射線学分野（主任：中山英二教授）

²⁾ 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野（主任：賀来 亨教授）

³⁾ 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系組織再建口腔外科学分野（主任：柴田考典教授）

⁴⁾ 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野（主任：有末 眞教授）

⁵⁾ 北海道医療大学個体差医療科学センター歯科部門顎顔面外科学（主任：永易裕樹教授）

⁶⁾ 北海道医療大学個体差医療科学センター歯科部門口腔内科学（主任：安彦善裕教授）

⁷⁾ 九州大学病院口腔画像診断科（主任：吉浦一紀教授）

⁸⁾ 恵佑会札幌病院歯科口腔外科（主任：山下徹郎副院長）

⁹⁾ 札幌医科大学医学部口腔外科学講座（主任：平塚博義教授）

¹⁰⁾ 手稲溪仁会病院歯科口腔外科（主任：関口 隆部長）

〔受付：2011年6月6日，受理：2011年7月11日〕

写真 1 画像検査の種類による腫瘍境界の描出性の違い (多形腺腫の同一症例)
 A: 超音波画像 (Power Doppler 法) では境界がかなり明瞭で, 形態は凹凸を示し内部はほぼ均一で, 多形腺腫と診断できる所見を呈する。
 B: 脂肪抑制 T2 強調 MR 画像でも境界が明瞭に描出されている。
 C: しかし CT 像では同じ症例であるのに境界がはっきりと描出されていない。

1. 唾液腺腫瘍の画像診断方法について

唾液腺腫瘍全体の中では良性が圧倒的に多く, さらにその良性腫瘍の中でも多形腺腫がほとんどである。悪性腫瘍の割合は低い¹⁾。しかし悪性腫瘍の中に低悪性の唾液腺腫瘍があり, 病理組織学的にも, 組織構成や細胞の性状が良性と似通っているものがあり, 境界についても一見良性的な腫瘍がある。そのために, 画像所見において境界が比較的明瞭で内部もほぼ均一であり, かつ臨床的にも悪性を示唆する所見がないにも関わらず, 病理組織学的に悪性と診断されることがある。このような腫瘍では臨床所見や画像所見では良性と悪性の鑑別診断は困難である。そこで, 唾液腺腫瘍の画像診断においては, 腫瘍の境界の明瞭度を厳密に判定する必要がある。つまり, 腫瘍の境界を, 「極めて明瞭」, 「明瞭」, 「ほぼ明瞭」, 「比較的明瞭」, 「やや不明瞭」か部分的に不明瞭, などのように多段階に細かく分類し, 判定する必要がある。

その境界は, X 線 CT 検査ではなく, 超音波検査と MRI 検査により判断すべきである (写真 1)。X 線 CT 画像は腫瘍の境界の明瞭度を正しく描出できない。耳下腺や頬部などの脂肪に囲まれた部位では脂肪抑制 MR 画像を追加撮像する。また, 造影 MRI 検査も有効である。それにより嚢胞腔や壊死組織が造影されない領域として区別出来る。さらに, 造影 T1 強調画像の撮像において, 造影剤注入より経時的に関心領域の信号強度を計測した時間-信号強度曲線: Time-signal Intensity Curve (TIC) を描

き, 病理組織型を判断しようとする方法がある²⁻⁴⁾。一般的には Dynamic MRI 検査と呼ばれる。このパターンは以下の 4 型に分類される (図 1)。漸増型: 信号強度のピークが 120 秒以降で, ゆっくりと上昇するもの。急増漸減型: 信号強度のピークが 120 秒以内で, ゆっくりと下降するもの。急増急減型: 信号強度のピークが 120 秒以内で, 急激に下降するもの。平坦型: 信号強度の上昇がみられないもの。多形腺腫は漸増型, Warthin 腫瘍は急増急減型, 悪性唾液腺腫瘍は急増漸減型が多いとされる³⁾。Warthin 腫瘍においては急増急減型がほとんどで TIC は有用である。しかし, それ以外の腫瘍では, いろいろなパターンを呈し単純な対応にはならない。さらに一つの腫瘍例においても組織組成の多様さから複数の TIC を呈する部分があるために, TIC を計測する部位を複数設定して解析しても鑑別診断の決定因子にならない⁴⁾。TIC を参考にする場合はこの点に注意する。

超音波検査は, 腫瘍の内部性状と境界の明瞭度を最も正確に表現できる。Doppler 法を併用して血流状態も評価できるので, 表在性の腫瘍の画像診断として有用である。そこで腫瘍境界部の明瞭度は超音波所見を第一に重視し, つぎに MR 画像所見を参考にして判断するのがよい。腫瘍の境界が画像診断所見として「極めて明瞭」であれば良性腫瘍と判断する要素になる。しかし, 「明瞭」や「ほぼ明瞭」レベルでは悪性の可能性があり, 「比較的明瞭」と「やや不明瞭」か部分的に不明瞭な場合は積極的に悪性を考慮する (写真 2)。

さらに, 超音波画像では嚢胞腔の有無と内部の不均一性

図 1 Dynamic MRI 検査における時間-信号強度曲線の分類

写真 2 超音波画像における腫瘍境界の明瞭度の違いによる良性和悪性の鑑別点
A：この耳下腺腫瘍では境界が全周において極めて明瞭で，良性腫瘍と判断できる所見を呈する。病理組織診断は多形腺腫であった。
B：この耳下腺腫瘍では境界が比較的明瞭であるものの，A の症例よりは明瞭度は低い。内部に嚢胞様部分も見られる。病理組織診断は低悪性の粘表皮癌であった。

が重要な所見となる。嚢胞腔を有するのは Warthin 腫瘍と粘表皮癌であり，多形腺腫にも現れる。内部性状では，不整な内部エコーで不規則な後方音響欠損を複数有する所見は悪性と判断してよい。ただし弱い後方音響欠損は多形腺腫にも現れる。

また，画像の観察は表示条件を最適化した状態で行うのがよい。X 線 CT 画像や MR 画像はデジタル画像であり，

画像処理が出来る。これらの画像を DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) 形式で保存し，画質を調整しながら画像をモニター上で観察できる。そこで DICOM 形式の医用画像を閲覧するアプリケーションソフトウェア (DICOM Viewer) を使って，画質調整や拡大表示をして腫瘍の性状を出来るだけ詳細に観察して，最適な画像診断を行いたい (写真 3)。

写真 3 デジタル画像の画像処理の違いによる腫瘍の画像所見の変化（下顎骨左側に発生した粘表皮癌）

- A：Window 値/window 幅 = 60/350 の条件で画像表示した CT 像。腫瘍内部は均一にみえる。
 B：Window 値 /window 幅 = 100/200 の条件に調整して画像表示した CT 像。DICOM 形式のデジタル画像を調整すると腫瘍内部に低 CT 値領域が観察された（矢印）。
 C：摘出された腫瘍と下顎骨の冠状断脱灰 HE 染色標本。摘出標本で嚢胞腔（矢頭）が認められた。断面は CT 像と一致していないが、B の画像のほうが病理組織所見によく対応している。

写真 4 口蓋部右側の多形腺腫由来癌腫

- A：冠状断再構成 CT 像で口蓋部右側の軟組織内に腫瘍が認められる（矢印）。
 B：FDG-PET/CT 像ではその部位には FDG の集積度に明らかな左右差を認めず、腫瘍の存在がはっきりしない。

^{18}F -fluorodeoxyglucose (FDG) を使用した Positron Emission Tomography (PET) は、悪性腫瘍の全身的な検索に有用である。しかし、唾液腺腫瘍においては、多形腺腫や Warthin 腫瘍にも集積する反面、悪性腫瘍であっ

ても集積しないこともあり、この検査法でも良性和悪性の鑑別を決定づけることはできない（写真 4）。ただし、悪性腫瘍において高い集積度が認められた場合はその悪性度と相関していると言われている⁵⁾。

写真 5 左側耳下腺内の多形腺腫

- A：脂肪抑制造影 T1 強調 MR 画像で耳下腺内に境界明瞭で内部均一な腫瘍が認められ、多形腺腫の特徴が見られる。
 B：しかし、腫瘍の上端部では超音波像で石灰化の存在を示唆する不規則なエコーレベルを示す部分（矢印）が見られた。
 C：冠状断の脂肪抑制造影 T1 強調 MR 画像でも超音波像に対応した部分（矢印）が見られ、多形腺腫由来癌腫の可能性を考慮した。手術後の病理組織学的な検討の結果は多形腺腫であった。

2. 大唾液腺腫瘍における画像診断の方針について

大唾液腺腫瘍では良性が圧倒的に多く、良性腫瘍の中でも多形腺腫がほとんどである。悪性腫瘍の割合は低い。しかし悪性の中に低悪性の唾液腺腫瘍があり、病理組織学的にも良性と似通っているものがあり、境界も一見明瞭な腫瘍がある。そのために、画像所見において悪性を示唆する所見がないにも関わらず、手術後の病理組織学的検索により悪性と診断されることがある。このような腫瘍では臨床所見や画像所見では良性と悪性の鑑別診断は困難である。さらに多形腺腫は長期経過中に一部の組織が癌化（多形腺腫由来癌腫）するために、全体的には多形腺腫などの良性腫瘍と矛盾しない所見であっても、一部に石灰化などにより内部不均一な領域があった場合は完全に悪性腫瘍を否定できなくなる（写真 5）。このことも唾液腺腫瘍の良性と悪性の鑑別診断を困難にしている。そこで、大唾液腺においては、純粋に画像所見に基づいた判断ではなく、大唾液腺の種類ごとに良性腫瘍と悪性腫瘍の出現率を考慮した判断が必要になる。

1) 耳下腺腫瘍について

耳下腺腫瘍の 70% 程度は良性で、そのほとんどが多形腺腫である。良性腫瘍としては Warthin 腫瘍が次に多い。残りの 30% 程度が多様な悪性腫瘍である¹⁾。Warthin 腫瘍は耳下腺にしか発生せず、柔らかく境界明瞭で、内部

に種々の程度に嚢胞腔を有する。90% 程度は Dynamic MRI で急増急減型の TIC を示し⁴⁾、FDG-PET で高集積を示すことが多く⁵⁾、また核医学検査で Oncocytoma とともに $^{99m}\text{TcO}_4^-$ が集積する。このように Warthin 腫瘍は他の唾液腺腫瘍とは異なる特異性があり、超音波検査や MRI 検査と臨床所見を参照すれば画像診断できる。そこで、耳下腺においては、まず Warthin 腫瘍を除外診断し、その後、それが多形腺腫であるか悪性腫瘍であるかの判断をする。明らかに境界が明瞭で、内部が均一であれば多形腺腫とする。そうでなければ低悪性の腫瘍を含め悪性腫瘍として対処する。境界が不明瞭であり、超音波検査で内部性状が明らかに不整であれば悪性と画像診断できる。腺様嚢胞癌は、腫瘍が小さい場合は多形腺腫との区別は困難である。

2) 顎下腺腫瘍について

顎下腺腫瘍の 40% 程度は悪性腫瘍である¹⁾。耳下腺における悪性腫瘍の発生率に比べ明らかに高い。そこで、画像所見から顎下腺から発生した腫瘍であると判断した場合、次に良性腫瘍としての確実な所見がそろっているかどうか判断する。少しでも良性であることに疑念があれば、積極的に悪性腫瘍を疑う。顎下腺腫瘍では、顎下腺内から発生したか腺外から発生したか画像では判断に迷う場合があるが、それらはほとんどの場合悪性である（写真 6）。

3) 舌下腺腫瘍について

舌下腺腫瘍の 80% 程度は悪性腫瘍である¹⁾。そこで、画像所見から舌下腺相当部に存在する腫瘍であると判断した

写真 6 右側顎下腺の腺様嚢胞癌

- A：造影 CT 像で右側顎下腺前方に不整形で境界やや不明瞭な腫瘍が認められた。顎下腺内から発生したかどうかははっきりしない所見である。
B：脂肪抑制造影 T1 強調 MR 画像でも顎下腺内から発生したかどうかははっきりしないが、周囲に広くびまん性に浸潤している。

写真 7 左側舌下腺の腺様嚢胞癌の T2 強調 MR 画像
腫瘍は境界が極めて明瞭で内部もほぼ均一であるので画像診断からは悪性所見を指摘しがたい。しかし舌下腺が存在する部位に発生した腫瘍であることから悪性の可能性が高いと判断する。

場合、たとえ境界が明瞭で内部が均一であっても舌下腺由来の悪性腫瘍と画像診断する（写真 7）。この部位に発生した神経原性腫瘍は舌下腺由来の悪性腫瘍によく似た画像所見を呈し、両者の鑑別は困難なことがある。

3. 小唾液腺腫瘍における画像診断の方針について

解剖学的に小唾液腺が存在する部位に唾液腺腫瘍が発生する。小唾液腺腫瘍は全体として悪性が約 50% であると言われている¹⁾。部位別でみると、下唇では 60% 以上、上

唇は 30% 程度、口蓋部では 50% 程度、舌、臼後部、口底では 80-90% 程度が悪性であるという¹⁾。良性腫瘍では多形腺腫が多い。多形腺腫は、大唾液腺ではよく発達した被膜で覆われているのに対し、小唾液腺では被膜がはっきりしない¹⁾。そのために小唾液腺の多形腺腫は悪性腫瘍と間違えて判断されやすい。逆に、小唾液腺腫瘍は比較的小さいものが多く、悪性腫瘍であっても画像上は良性腫瘍を思わせる所見を呈する（写真 8）。このように、小唾液腺においても画像所見だけに基づいた良性悪性の鑑別は難しいので、良性腫瘍を思わせる画像所見があっても、悪性腫瘍の出現率を考慮して、悪性腫瘍を積極的に疑うべきである。

1) 口蓋部について

口蓋部に多いのは多形腺腫と粘表皮癌で、次に腺様嚢胞癌である。とくに低悪性の粘表皮癌と多形腺腫の画像による鑑別はほとんど無理である（写真 9）。近接する骨に破壊があれば悪性と断定できる。悪性腫瘍では、画像所見からは骨破壊がないようにみえても骨破壊がしばしば見られるので注意する。

2) 頬部について

頬部は良質な診断画像が得られにくいことがあり、超音波画像が頼りである。頬部では様々な種類の腫瘍が発生し、唾液腺腫瘍と判断するのが難しい場合もある。また悪性腫瘍でも小さいことが多く、悪性所見が画像で認めにくい。そこで、画像所見から頬部に充実性の腫瘍が見られれば、悪性唾液腺腫瘍の可能性を常に考える。

3) 舌、口底について

舌の唾液腺腫瘍と大舌下腺を除いた口底の唾液腺腫瘍は

写真 8 上唇左側の腺房細胞癌

- A：造影 CT 像で上唇左側に腫瘍が認められた。
 B：超音波像では境界はかなり明瞭で内部も均一であるが，病理組織診断は悪性腫瘍であった。小唾液腺の唾液腺腫瘍はこのような症例が多いので注意が必要である。

写真 9 口蓋右側の腺癌 NOS

- A：造影 CT 像で上顎骨を圧迫吸収する腫瘍が認められ，内部には造影されない領域も観察される。
 B：冠状断の脂肪抑制造影 T1 強調 MR 画像では接する上顎骨を圧迫吸収し骨が菲薄化しているのが観察されるが，骨破壊があるかどうかは微妙な所見であり，良性か悪性かの判断が難しい。しかし手術所見では明らかな骨破壊が観察され，病理組織診断も悪性であった。

診断画像で明瞭な腫瘍として検出されにくい，びまん性であることが多い。そこでそのような状況があれば悪性唾液腺腫瘍の可能性を考慮する。

4. 顎骨に発生した唾液腺腫瘍について

上顎骨内や下顎骨内に唾液腺腫瘍が発生する。下顎では粘表皮癌が発生し，圧迫型，嚢胞様型，びまん性骨破壊型

写真 10 右側の上顎骨内に発生した低悪性の粘表皮癌

- A : 骨条件の 冠状断 CT 像で上顎骨内に多房様で骨を菲薄化させ、右側上顎洞内全体に膨隆する腫瘍が認められ、一見すると良性歯源性腫瘍のように見える。しかし一部に骨破壊を伴っているので悪性変化を考える。
- B : 軟組織条件の冠状断造影 CT 像で、腫瘍は造影される部分と造影されずに比較的低い CT 値を示す部分が混在しているのが観察される。

があり、その順に予後が悪くなる⁶⁾。その画像所見は下顎歯肉扁平上皮癌による圧迫型や下顎骨中心性扁平上皮癌と同様の所見を呈する。上顎骨では多胞性の類円形の画像所見を呈し、良性歯源性腫瘍との鑑別を要する。上顎骨に発生する唾液腺腫瘍は多形腺腫か粘表皮癌である。良性歯源性腫瘍を思わせる所見でも一部に骨破壊が見られれば粘表皮癌の可能性を考慮する (写真 10)。

ま と め

唾液腺腫瘍は Warthin 腫瘍を除いて大唾液腺由来でも小唾液腺由来でも良性と悪性の画像での鑑別診断が難しい。そこで診断画像を適切に選択し、まずは境界の明瞭度を厳密に判断したい。そして発生部位ごとの悪性腫瘍の発生率を考慮して、画像で悪性所見がなくても悪性の可能性が高いことを理解して対処することが重要である。

文 献

- 1) Ellis, G.L. and Auclair, P.L.: AFIP Atlas of Tumor Pathology 4th Series Fascicle 9 Tumors of The Salivary Glands, ARP Press, Silver Spring, 2008, 27-48.
- 2) Takashima, S., Noguchi, Y., et al.: Dynamic MR imaging in the head and neck. Radiology 189 : 813-821, 1993.
- 3) Yabuuchi, H., Fukuya, T., et al.: Salivary Gland Tumors: Diagnostic Value of Gadolinium-enhanced Dynamic MR Imaging with Histopathologic Correlation. Radiology 226 : 345-354, 2003.
- 4) Eida, S., Ohki, M., et al.: MR Factor Analysis: Improved Technology for the Assessment of 2D Dynamic Structures of Benign and Malignant Salivary Gland Tumors. J Magn Reson Imaging 27 : 1256-1262, 2008.
- 5) Ozawa, N., Okamura, T., et al.: Retrospective Review: Usefulness of a Number of Imaging Modalities Including CT, MRI, Technetium-99m pertechnetate scintigraphy, Gallium-67 Scintigraphy and F-18-FDG PET in the Differentiation of Benign from Malignant Parotid Masses. Radiat Med 24 : 41-49, 2006.
- 6) Inagaki, M., Yuasa, K., et al.: Mucoepidermoid carcinoma in the mandible: Findings of panoramic radiography and computed tomography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol and Endod 85 : 613-618, 1998.

Imaging diagnosis of salivary gland tumor

Eiji Nakayama¹⁾, Tomoyuki Ohuchi²⁾, Tohru Kaku²⁾,
Takanori Shibata³⁾, Makoto Arisue⁴⁾, Hiroki Nagayasu⁵⁾,
Yoshihiro Abiko⁶⁾, Mayumi Ueno⁷⁾, Toshiyuki Kawazu⁷⁾,
Kazunori Yoshiura⁷⁾, Yuichiro Asaka⁸⁾, Michihiro Ueda⁸⁾,
Tetsuro Yamashita⁸⁾, Kenji Nakamori⁹⁾, Hiroyoshi Hiratsuka⁹⁾,
Yasushi Hariya¹⁰⁾ and Takashi Sekiguchi¹⁰⁾

¹⁾ Division of Oral and Maxillofacial Radiology, Department of Human Biology and Pathophysiology,
Health Sciences University of Hokkaido, School of Dentistry

(Chief: Prof. Eiji Nakayama)

²⁾ Division of Clinical Oral Pathology, Department of Human Biology and Pathophysiology,
Health Sciences University of Hokkaido, School of Dentistry

(Chief: Prof. Tohru Kaku)

³⁾ Division of Reconstructive Surgery of Oral and Maxillofacial Region, Department of Human Biology
and Pathophysiology, Health Sciences University of Hokkaido, School of Dentistry

(Chief: Prof. Takanori Shibata)

⁴⁾ Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Human Biology and Pathophysiology,
Health Sciences University of Hokkaido, School of Dentistry

(Chief: Prof. Makoto Arisue)

⁵⁾ Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Dental Science,
Health Sciences University of Hokkaido

(Chief: Prof. Hiroki Nagayasu)

⁶⁾ Division of Oral Medicine and Pathology, Department of Dental Science,
Health Sciences University of Hokkaido

(Chief: Prof. Yoshihiro Abiko)

⁷⁾ Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Kyushu University Hospital

(Chief: Prof. Kazunori Yoshiura)

⁸⁾ Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Keiyukai Sapporo Hospital

(Chief: Dr. Tetsuro Yamashita)

⁹⁾ Department of Oral Surgery, Sapporo Medical University, School of Medicine

(Chief: Prof. Hiroyoshi Hiratsuka)

¹⁰⁾ Department of Dentistry and Oral Surgery, Teine Keijinkai Hospital

(Chief: Dr. Takashi Sekiguchi)

Abstract

The histopathological diagnosis of salivary gland tumors is sometimes difficult, because the tumors have various histologic patterns and manifold tissue components coexist in a histologic pattern. Therefore, the differential imaging diagnosis of a benign and malignant tumor in the salivary gland is also sometimes difficult.

A salivary gland lesion in which the border is slightly unclear is sometimes a malignant tumor, even though the borderline looks almost clear on the images. Therefore, in the imaging diagnosis of salivary gland tumors, the clearness of the boundary on the images is very important and its cautious interpretation is essential; the clearness should be judged not by CT but by ultrasonography and MRI. Moreover, the CT and MRI images should be observed by optimal indication on a DICOM Viewer, if possible.

Regarding major salivary gland tumors: over 70% of parotid gland tumors are benign, 40% of submandibular gland tumors are malignant, and 80% of sublingual tumors are malignant. These figures are important when interpreting diagnostic images of major salivary gland tumors. A parotid gland tumor in which the border is not always clear should be suspected as malignant. A lesion that is confirmed as a sublingual gland tumor on diagnostic images should be diagnosed as a malignant tumor.

Concerning minor salivary gland tumors: when the tumor is small, a borderline is often clear even though the tumor is malignant. Hence, imaging findings of a lesion with a clear boundary are not evidence of a benign tumor in the minor salivary gland. In malignant salivary gland tumors of the palatal region, particular attention should be paid to weak bone invasion, which cannot be detected on imaging findings. In the lip and buccal region, ultrasonography is the most effective imaging modality. It is necessary to remember that mucoepidermoid carcinoma occurs also in the jawbones.

Key words : salivary gland, tumor, imaging diagnosis, major salivary gland, minor salivary gland

Requests for reprints to: Dr. Nakayama E., Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido, 1757 Kanazawa, Ishikari-Tobetsu, Hokkaido, 061-0293, Japan