シンポジウム

「唾液腺腫瘍の診断と治療」

唾液腺腫瘍の放射線治療

三 浦 雅 彦

要旨：唾液腺癌の多くは腺癌由来で、その増殖も緩徐であり、一般に放射線抵抗性を示す。従って、その治療法の第一選択は外科療法であり、放射線治療は、切除断端の病理結果によって、補助的に施行されることが多い。しかしながら最近では、放射線治療技術の進歩により、腫瘍組織への線量集中度が著しく高まり、高精度放射線治療や粒子線治療が注目されてきている。本稿では、唾液腺癌に対する通常の放射線治療の役割についてレビューするとともに、本学放射線科で報告した唾液腺由来腺様嚢腫癌（ACC）に対する治療成績、放医研で行われている重粒子線による頭頸部 ACC に対する治療成績を紹介し、その問題点についても触れる。

キーワード：唾液腺癌、放射線治療、重粒子線治療、遠隔転移

はじめに

日本における唾液腺癌の頻度は、10 万人あたり約 0.5 人、頭頸部癌の約 5% とされ、病理組織学的には、腺癌が多くを占めるが、種々の病理組織型を示し、組織型によって予後が大きく異なることが知られている¹⁾。一般に増殖は緩徐であり、扁平上皮癌に比べ放射線抵抗性を示すことが多い。扁平上皮癌にあまり見られない特徴として、perineural invasion や neural dysfunction をあげることができる。また、肺への遠隔転移頻度が高いことも大きな特徴である。本稿では、こうした特徴を持つ唾液腺癌に対して、現在、放射線治療がどのような役割を担っているか、さらに、最近の放射線治療の進歩が今後どのような影響をもたらすかについて論じる。

1. 唾液腺癌に対する通常の放射線治療による治療成績

放射線による固形腫瘍の制御確率は、再発能力を有する癌幹細胞の放射線感受性とその数によって規定される。一般に放射線感受性の低い腺癌において、放射線治療による制御確率をあげるためには、理論的アプローチとして癌幹細胞の数を減らすこと、すなわち外科療法によって腫瘍容積を減量してから照射する方法が考えられる。オランダの Terhaard らは、500 例を超える種々の唾液腺癌治療症例

の局所制御に関する解析結果を報告しており²⁾、唾液腺癌に対する放射線治療の特徴が summarize されている。62Gy を中央値とする conventional な外照射による放射線治療（RT）を術後照射として施行した場合、15 年局所制御率は、T3、T4 症例であっても 85% 以上を示したのに対し、RT を施行しない場合、10 年局所制御率は 20% 以下であった。また、併用群では、切除断端が complete の場合、15 年局所制御率はほぼ 100% であったが、RT を施行しない場合、約 90% であった。断端 incomplete の場合でも、併用群では 15 年局所制御率は約 80% に対し、RT を施行しない場合、10 年局所制御率は約 40% であった。また、同じ論文で、術後、RT 開始までの期間と局所制御率との関係についても報告されている。増殖が速い頭頸部扁平上皮癌では、この間隔が長くなると、先に述べた標的細胞の数の増加が critical となり、同じ腫瘍制御確率を得るに必要な線量が有意に増加する³⁾。唾液腺癌では、間隔が 12 週を超えても有意な差は認められなかった。このことは、唾液腺癌の増殖速度が緩徐であることの証左でもある。RT 単独では、総線量が 66Gy 以上の場合、それ未満に比べて有意に局所制御率が高かったが、10 年生存率は 25% にすぎなかった。以上の結果は、放射線治療の術後照射としての役割の重要性を如実に示している。

2. 本学放射線科における唾液腺由来 ACC に対する放射線治療成績

次に本学放射線科で報告した唾液腺由来 ACC に対する 68 症例の放射線治療成績⁴⁾ について紹介する。症例は大

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔放射線腫瘍学分野（主任：三浦雅彦教授）
〔受付：2011 年 6 月 9 日，受理：2011 年 7 月 11 日〕

図 1 ACC の組織型別に分類された群における放射線治療後の Kaplan-Meier プロットと cribriform ならびに solid 型の典型的病理組織像

唾液腺由来 15 症例，小唾液腺由来 53 症例であった。そのうち RT 単独群は 23 例であった。大唾液腺由来症例と小唾液腺由来症例の 5 年現病生存率はいずれも約 60%，10 年現病生存率は，前者において約 40%，後者において約 15%であった。再発率，遠隔転移は 5 年を経過しても上昇し，10 年後にはそれぞれ約 50%，約 70%を示しており，長期にわたる予後観察が必要であることがわかる。RT 単独群では，症例数は少ないものの，curative なケース 11 例には主に Au グレインによる小線源治療が施行され，5 年生存率は 100%であったが，その後遠隔転移等により 10 年後には生存率は 0 に至った。inoperable な症例では，直ちに生存率の低下が認められ，7 年までに全員死亡している。また，病理組織学的には，solid component を含まず，典型的な cribriform または tubular pattern を示す症例 25 例，明らかに solid component が優位である 11 例，いずれにも分類できなかった 32 例に分けることが可能であった。いずれの群でも，最終的には生存率は 10%台に低下したものの，solid 型の症例は，2 年以内に 10%台に低下し，著しく予後が悪いことが示された。本学歯学部検査部岡田憲彦博士のご厚意により提供頂いた典型的な cribriform と solid 型の病理像ならびに Kaplan-Meier 法による生存曲線を図 1 に示す。

3. 放医研での頭頸部 ACC に対する重粒子線治療による治療成績

最近の放射線治療技術の進歩は著しい。正常組織への吸収線量を極力低下させ腫瘍組織に集中させる技術は，高精度放射線治療とよばれ，呼吸同期を考慮した四次元放射線治療として発展し，肺癌における治療成績を大きく向上させた。また，日本では，放射線医学総合研究所（放医研）が，15 年前から炭素線による重粒子線治療を施行し，その有効性が示されている。重粒子線の一つの特徴として，体表で吸収線量が低く，深部でピークを示すブラッグピークがあげられる。ブラッグピークの位置を調節することで，正常組織の線量を大きく低下させることが可能となり，優れた線量分布を得ることができる。もう一つの特徴は，高 LET 放射線の生物効果である。LET は，飛跡 $1 \mu\text{m}$ あたりの電離を表すが，X 線や γ 線に比べ，癌細胞における DNA 二重鎖切断誘発の収率が高いため，同じ線量でより高い殺細胞効果を与えることができることである。すなわち，生物学的効果比 (RBE) が高い。これら二つが，X 線や γ 線に比較して高い治療効果をもたらす要因となっている。頭頸部領域癌では，malignant melanoma と ACC

表 1 頭頸部 ACC に対する治療成績

文献	N	治療	5 年局所制御率 (%)	5 年生存率 (%)
Mendenhall et al. ⁵⁾	101	X 線	56	57
放医研	131	炭素線	80	71

に対し優れた局所制御率が得られている。東北大神宮啓一博士、放医研長谷川安都佐博士のご厚意によって提供頂いた放医研のデータと、フロリダ大学から報告された X 線による治療成績の比較を表 1 に示す。放医研のデータではまだ治療 5 年後のデータしか示されていないが、優れた局所制御率と生存率が得られている。しかしながら、前述したように ACC では、長期にわたる予後観察が必要であり、今後の結果が待たれる。

4. ま と め

本稿では、唾液腺癌に対する放射線治療の役割について、現在どのような位置づけにあるのかについて述べた。通常のライナックを用いた X 線による治療では、一般に単独では、腫瘍の治癒は期待できず、術後照射としての役割が大きい。curative な症例では、小線源治療を適応することで、優れた局所制御を得ることが可能である。また、重粒子線治療では、単独で高い局所制御が得られる可能性が出てきている。しかしながら、唾液腺癌の大きな特徴は、5 年を過ぎても遠隔転移が高頻度で起こることである。

これは、局所療法のみがどれほど向上しても対応できない問題であり、この克服のためには、化学療法や本腫瘍に有効な新規な分子を標的とした分子標的療法との併用が重要になってくるものと考えられる。今後の新しい展開を期待したい。

文 献

- 1) Guzzo, M., Locati, L.D., et al.: Major and minor salivary gland tumors. *Crit Rev Oncol Hematol* 74 : 134-148, 2010.
- 2) Terhaard, C.H.J., Lubsen, H., et al.: The role of radiotherapy in the treatment of malignant salivary gland tumors. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 61 : 103-111, 2005.
- 3) Withers, H.R., Taylor, J.M.G., et al.: The hazard of accelerated tumor clonogen repopulation during radiotherapy. *Acta Oncol* 27 : 131-146, 1988.
- 4) Horiuchi, J., Shibuya, H., et al.: The role of radiotherapy in the management of adenoid cystic carcinoma of the head and neck. *Int J radiat Oncol Biol Phys* 13 : 1135-1141, 1987.
- 5) Mendenhall, W.M., Morris, C.G., et al.: Radiotherapy alone or combined with surgery for adenoid cystic carcinoma of the head and neck. *Head Neck* 26 : 154-162, 2004.

Role of radiotherapy for malignant salivary gland tumors

Masahiko Miura

Oral Radiation Oncology, Graduate School of Medical and Dental Sciences,
Tokyo Medical and Dental University
(Chief: Prof. Masahiko Miura)

Abstract

Malignant salivary gland tumors are rare and their pathologic type is mostly adenocarcinoma, which is relatively slow-growing. Because the tumors are considered to be radioresistant, the first choice of treatment is surgery and conventional radiotherapy is usually combined when the tumor margin is close or incomplete. Recently, the availability of heavy ion beam therapy has increased the cure rate of radioresistant tumors. This article reviews the role of conventional radiotherapy, the prospects for heavy ion beam therapy, and emerging problems in the treatment of malignant salivary gland tumors.

Key words : malignant salivary gland tumors, radiotherapy, heavy ion beam therapy, distant metastasis

Requests for reprints to: Dr. Miura M., Oral Radiation Oncology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, 1-5-45, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8549, Japan