シンポジウム

「早期口腔癌に対する新たな診断法の確立」

唾液中のバイオマーカーを用いた早期診断の可能性

恩 田 健 志¹⁾ 林 宰 央¹⁾ 野 村 武 史^{1,2)}
高 野 伸 夫^{1,2)} 柴 原 孝 彦^{1,2)} 片 倉 朗^{2,3)}

要旨：わが国は、先進国の中で口腔がんが増加しているまれな国であり、早期に口腔がんを発見できる検査法の開発や検診システムの確立が望まれている。当講座では地域の歯科医師会と協力し口腔がんの集団検診を行い、その早期発見に努めてきた。しかしながら、集団検診は実施地域や時期、検診できる人数に制限があり検査対象となるのは極めて少ない集団である。これを解決するためには、歯科診療所における個別検診を普及させる必要があるが、現在、視診、触診に加えて一般歯科診療所でも簡便に行うことができる信頼性の高いスクリーニング方法はない。

近年の研究成果により、唾液が健康の維持増進のための様々な機能を有すること、血液や尿に劣らぬ多くの生体情報を有していることが続々と報告されてきている。唾液は場所を選ばず、非侵襲性に、無痛的に反復して容易に採取可能であり、血液と異なり赤血球や白血球、血小板などの細胞成分がほとんどなく、凝固することもない。そのため定量を目指す標的発現異常タンパク質に特化してキット化することが可能となり、歯科診療所のチェアサイドで判定することも可能と考えられる。著者らはこのような簡便かつ非侵襲的に反復して採取可能な唾液に注目し、プロテオミクス解析技術を駆使して、全唾液を試料とした簡便に行える口腔がんのスクリーニング法の開発ならびに早期診断分子マーカーの同定を試みてきたので、その概要を解説する。

キーワード：口腔扁平上皮癌、早期発見、唾液検査、プロテオミクス、メタボロミクス

1. はじめに

わが国のがん対策の一つとして、厚生労働省は「がん予防重点健康教育およびがん検診実施のための指針」（平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知）を定め、同指針に基づく検診（胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん）を推奨しており、この検診により発見されたがんの予後は非集団検診群と比較して良好であることが報告されている¹⁾。口腔がんにおいても、他臓器と同様に早期に発見し、早期に治療することが治療率向上のための最善策と考えられる。東京歯科大学口腔外科学講座では、地域の歯科医師会と協力し口腔がんの集団検診を行い、その早期発見に努めてきた。しかしながら、集団検診は実施地域や時期、検診できる人数に制限があり検査対象となるのは極めて少ない集団である。これを解決するためには、歯科診療所における個別検診を普及させる必要があるが、現在、視

診、触診に加えて一般歯科診療所でも簡便に行うことができる信頼性の高いスクリーニング方法は存在しないのが現状である。

2. バイオマーカーの探索

2003年4月に30億塩基対からなるヒトゲノムシーケンスが完全に解読され²⁾、その暗号の全てを手にしてから10年が経過した。この間に分子生物学的解析技術も飛躍的に進歩を成し遂げ、種々の疾患メカニズムも解明されつつあり、その臨床応用も進められている。これまでに、遺伝子多型解析やDNAマイクロアレイ技術を用いた遺伝子発現解析により、各種疾患の診断や治療に役立てようとする試みがなされてきた。しかしながら、生体内での種々のプロセスは、一部の例外を除き、実際に翻訳産生されたタンパク質によって制御されており、また、病気の早期発見や病態の把握に有用な血中や尿中のマーカー検索は、遺伝子レベルの解析では困難であることなどを考えると、臨床応用の可能性が最も高いのはタンパク質に焦点を当てた研究であると考えられる³⁾。口腔がんの早期発見のためには、バイオマーカーを用いた簡便で、信頼性の高い診断方法の開発が不可欠であり、そこで威力を発揮するのがタン

¹⁾ 東京歯科大学口腔外科学講座（主任：柴原孝彦教授）

²⁾ 東京歯科大学口腔がんセンター（主任：高野伸夫教授）

³⁾ 東京歯科大学オーラルメディスン・口腔外科学講座（主任：片倉朗教授）

〔受付：2013年6月3日、受理：2013年8月2日〕

図 1 口腔扁平上皮癌由来細胞株のプロテオーム解析
各プロテオームから約 3000 のタンパク質スポットが検出可能であった。表皮角化細胞と比較して、口腔扁平上皮癌由来細胞株が共通して発現異常を示すタンパク質は 126 スポット認められた。そのうち、共通して発現亢進を示すタンパク質は 49 スポット、共通して発現低下を示すタンパク質は 77 スポット認められた。

パク質を網羅的に調べるプロテオーム解析である。質量分析技術のめざましい進歩に伴い、生体試料中の微量なタンパク質の同定も可能となり、プロテオミクス研究は急速に広がっている。

3. 検査検体としての唾液

近年の研究成果により、唾液が健康の維持増進のための様々な機能を有すること、血液や尿に劣らぬ多くの生体情報を有していることが続々と報告されている。唾液は場所を選ばず、非侵襲性に、無痛的に反復して容易に採取可能であり、血液と異なり赤血球や白血球、血小板などの細胞成分がほとんどなく、凝固することもない^{4,5)}。そのため定量を目指す標的発現異常タンパク質に特化してキット化することが可能となり、歯科診療所のチェアサイドで判定することも可能と考えられる。また、唾液は血液から作られ、血液成分を反映するとも考えられ、血液から抽出されるがん細胞由来の様々な腫瘍マーカーについても唾液から検出できる可能性が考えられる^{4,6)}。著者らはこのような簡便かつ非侵襲的に反復して採取可能な唾液に注目し、全唾液を試料とした簡便に行える口腔がんのスクリーニング

法の開発ならびに早期診断分子マーカーの同定を試みた。

4. 口腔扁平上皮癌細胞のプロテオミクス解析

本研究では、唾液中の口腔内常在菌の影響やタンパク質分解酵素による唾液タンパク質の分解・変性の影響、日内変動や精神的要因による成分、量の変化などを考慮して、唾液を検体として解析する前に、培養細胞を用いる実験系を計画した。実験材料は、口腔扁平上皮癌由来細胞株 6 種 (KON, OSC-20, HSC-3, HSC-4, SAS, Ca9-22)、コントロールとして表皮角化細胞 (HaCaT)、および各々の培養液からタンパク質を抽出し、蛍光標識二次元電気泳動法 (2D-DIGE 法)、液体クロマトグラフィー質量分析法を用いて、口腔扁平上皮癌由来細胞株およびその培養液に共通して発現異常が認められるタンパク質を網羅的に解析し、同定したタンパク質群の中から Swiss-Prot データベースを用いて分泌タンパク質をリストアップした。

培養細胞のプロテオームからは約 3000 のタンパク質スポットが検出可能であった (図 1)。表皮角化細胞と比較して口腔扁平上皮癌由来細胞株に共通して統計学的に有意に発現亢進を示すタンパク質は 49 種類、発現低下を示す

図 2 発現異常を示す分泌タンパク質

表皮角化細胞と比較して、口腔扁平上皮癌由来細胞株が共通して発現異常を示す 126 種類のタンパク質についてタンパク質核酸データベース (Swiss-Prot) を検索した結果、分泌タンパク質は AnnexinA2, AMBP, Lysyl-tRNA synthetase の 3 種類であった。

タンパク質は 77 種類であった。これら 126 種類のタンパク質スポットを液体クロマトグラフィー質量分析法にて質量解析し、翻訳後修飾などの影響で重複したタンパク質を除く 92 種類のタンパク質を同定した。これら 92 種類の発現異常タンパク質について、タンパク質核酸データベースを検索した結果、分泌タンパク質は AnnexinA2, AMBP, Lysyl-tRNA synthetase の 3 種類のみであった (図 2)。

5. 口腔扁平上皮癌細胞の培養液のプロテオミクス解析

培養液のプロテオームからは約 1500 のタンパク質スポットが検出可能であった (図 3)。口腔扁平上皮癌由来細胞株の培養液と表皮角化細胞の培養液中の発現タンパク質の比較では統計学的に有意な発現異常タンパク質は 39 種類認められ、そのうち 36 種類はウシ血清由来であり、ヒト由来のタンパク質は 3 種類のみであった。質量解析の結果、JHD2C, PRSS3 protein, Transmembrane protein 14E が口腔扁平上皮癌由来細胞株の培養液中に共通して発現異常を示すヒト由来タンパク質としてリストアップされた (図 4)。

6. 唾液のプロテオミクス解析

同様にプロテオミクス解析を用いて、実際のヒト全唾液

を試料とした臨床検体を用いた実験を行った⁷⁾。本解析でターゲットとするタンパク質は、健康者の全唾液から検出されず、口腔がん患者の術前全唾液から高発現が検出され、かつ術後全唾液からは検出されないかまたは減少している口腔がん特異的分泌タンパク質であった。

唾液のプロテオームからは、各々約 1200 のタンパク質が画像解析ソフト上で検出可能であった。口腔がん患者の術前唾液に共通して特異的に発現していたターゲットタンパク質は 10 種類のみであり、質量解析の結果、そのほとんどが細菌由来と考えられるタンパク質であったが、口腔がん患者の術前唾液のみで検出される Enolase 1 が、ヒト由来の候補タンパク質としてリストアップされた (図 5)。

7. 唾液中のバイオマーカー候補

著者らは、これまでに培養細胞・培養液・唾液を用いたプロテオミクス解析により表 1 に示す、7 種類のバイオマーカー候補をリストアップすることに成功した。これらリストアップされたターゲットタンパク質候補について、検証実験を行いデータベース化し、マイクロ流体デバイス化することで、唾液を試料とした口腔がんのスクリーニング検査へ応用できる可能性を期待し、現在解析を行っているところである。次にその一部を解説する。

図 3 培養液（培養上清）のプロテオーム解析
各プロテオームから約 1500 のタンパク質スポットが検出可能であった。
口腔扁平上皮癌由来細胞株の培養液に共通して発現異常を示すタンパク質は 39 スポット認められた。質量分析の結果、36 種類はウシ血清由来であり、ヒト由来のタンパク質は 3 種類であった。

図 4 培養液（培養上清）中の発現異常タンパク質
質量解析の結果、培養液中のヒト由来発現異常タンパク質として、JHD2C, PRSS3 protein, Transmembrane protein 14E がリストアップされた。

図 5 口腔がん患者の唾液中に発現異常を示すタンパク質
健常者の全唾液中では発現が低く、口腔がん患者の術前全唾液には高発現を示し、術後全唾液では発現が減少しているタンパク質は 10 種類であった。質量解析で同定したタンパク質は、細菌由来と考えられるものがほとんどであったが、口腔がん患者の術前全唾液のみで検出される Enolase1 がリストアップされた。

表 1 唾液中のバイオマーカー候補

Cellular component: Swiss-Prot Data-base	
・ <u>Annexin A2</u>	Basement membrane Extracellular matrix Secreted
・ <u>Protein AMBP</u>	Secreted
・ <u>Lysyl-tRNA synthetase</u>	Cell membrane Mitochondrion Cytoplasm Nucleus Membrane Secreted
・ <u>JHD2C</u> (Probable JmjC domain-containing Histone demethylation protein 2C)	Nucleus
・ <u>PRSS3 protein</u>	Unknown
・ <u>TM14E</u> (Transmembrane protein 14E)	Membrane
・ <u>Enolase 1</u>	Cell membrane Membrane Cytoplasm Nucleus

8. Annexin A2

Annexin A2 は、口腔がん細胞で発現低下を示す、分泌タンパク質として著者らが注目している候補タンパク質である。Annexin A2 に関する文献を検索すると、Rodrigo JP ら⁸⁾ が、免疫組織化学染色法を用いて、口腔扁平上皮癌組織中の Annexin A2 タンパク質の発現低下を報告している。その中で Annexin A2 タンパク質の発現低下と組織分化度との間に統計学的有意差が認められたとし、中分化型および低分化型扁平上皮癌組織で高頻度に Annexin A2 タンパク質の発現低下が認められたとしている。その他、腎細胞がん⁹⁾、膵臓がん¹⁰⁾、直腸がん¹¹⁾、脳腫瘍¹²⁾、

肺がん¹³⁾、乳がん¹⁴⁾などで Annexin A2 タンパク質の発現異常が報告されている。これらは主に Annexin A2 の発現異常は浸潤能の獲得や転移との関連を示唆するものであった⁹⁻¹⁴⁾。

著者らも口腔扁平上皮癌の手術時切除標本 80 症例を用いて、免疫組織化学染色法にて検証実験を行った。免疫組織化学染色の評価方法は、Carl Barrett ら¹⁵⁾ に準じて半定量的に行った。その結果、80 症例中 51 症例 64%において Annexin A2 タンパク質の発現低下が認められた (図 6)。しかしながら、Annexin A2 の発現低下と Rodrigo JP ら⁸⁾ が報告した組織分化度をはじめとする、各種臨床指標との相関は認められなかった。一方で、Annexin A2 タンパク質は免疫組織化学染色法により、正常上皮細胞では細胞膜お

図 6 口腔扁平上皮癌組織中の AnnexinA2 タンパク質発現状態 (免疫組織化学染色法)
免疫組織化学染色の結果, AnnexinA2 タンパク質発現状態は, 正常口腔組織と比較して
口腔扁平上皮癌組織中では高頻度に発現低下が認められた ($n = 51/80$, 64%)。

よび細胞間隙が染色されるが, 上皮内癌の状態では正常上皮と変わらない発現状態を示し, 基底細胞層を超える段階で発現が低下し, 粘膜固有層に浸潤すると発現が消失する症例が比較的多く認められた。統計学的有意差は認められなかったが, 他の報告と同様に細胞の浸潤能と関連している可能性が考えられた。現在, 口腔扁平上皮癌患者の唾液から Annexin A2 タンパク質の発現異常が検出できるか検証中である。

9. Enolase 1

Enolase 1 は, 口腔がん細胞で発現亢進を示すタンパク質として著者らが注目している候補タンパク質である。Enolase 1 に関する文献を検索すると, Tsai, ST ら¹⁶⁾ が, 免疫組織化学染色法を用いた頭頸部扁平上皮癌での Enolase 1 タンパク質の発現亢進を報告している。その中で Enolase 1 タンパク質の発現亢進と TNM 病期分類との間に統計学的有意差が認められたとし, ステージが進むにつれて Enolase 1 タンパク質の発現が亢進すると報告している。その他, 非小細胞肺癌¹⁷⁾ において Enolase 1 の過剰発現が血清から検出できる可能性についてや, 乳がん¹⁸⁾ において Enolase 1 の過剰発現と腫瘍の大きさに統計学的有意差があるとするもの, 前立腺がん¹⁹⁾ の浸潤・転移と Enolase 1 の過剰分泌とに相関があるとするものなどの報告がある。Enolase 1 は著者らの研究⁷⁾ において, 口腔扁平上皮癌患者の唾液サンプルを用いたプロテオミクス解析によりリストアップされた候補タンパク質であり, 唾液から検出可能であることは実証済みで, 有力なバイオマーカー候補であると考えている。

同様に Enolase 1 タンパク質発現状態も口腔扁平上

図 7 口腔扁平上皮癌組織中の Enolase 1 タンパク質発現状態 (免疫組織化学染色法)

Enolase 1 タンパク質発現状態は, 正常口腔組織と比較して口腔扁平上皮癌組織中では高頻度に発現亢進が認められた ($n = 42/80$, 53%)。

皮膚の手術時切除標本 80 症例を用いて, 免疫組織化学染色法にて検証実験を行った。その結果, 80 症例中 42 症例 53% において Enolase 1 タンパク質の高発現が認められた (図 7)。口腔扁平上皮癌組織で Enolase 1 の高発現が確認できたことにより, 現在, 口腔扁平上皮癌患者の唾液から Enolase 1 タンパク質の発現異常がどの程度の頻度で検出できるか検証中である。

以上, 著者らがリストアップした代表的な 2 つの唾液中のバイオマーカー候補についての検証実験の進捗状況について解説した。その他の 5 つのバイオマーカー候補について

も実際に口腔扁平上皮癌患者の唾液を用いた検証実験を進行中である。

10. メタボローム解析

近年、メタボローム解析をバイオマーカー検索や疾患診断に応用しようという動きが顕著に活発化している^{20, 21)}。メタボロームとは、ある時点における体液、組織、細胞に含まれる低分子代謝物のセットを意味する。この代謝物を網羅的に定性、定量解析することをメタボローム解析といい、主にキャピラリー電気泳動-質量分析装置 (CE-TOFMS) を使って行われる。特に、メタボローム解析はバイオマーカー検索²²⁻²⁶⁾で注目されている。それは、がん細胞では、発現異常タンパク質や酵素による代謝の変動が起こり、がん特有の代謝パターンへと変化し、それが血液・尿などにも反映することが予想されるからである。mRNA を網羅的に定量するトランスクリプトーム解析や、著者らが行っている発現タンパク質を網羅的に解析するプロテオーム解析などの高分子を対象とする解析は、検査目的でよく用いられる血液・尿から検出できないことがあり、早期発見、進行度・予後の判定などを目的とするバイオマーカーとしては、当初期待していたほどの成果がでていないことを指摘する意見もある。メタボローム解析の利点としては、低分子代謝物を対象としており、体液から検出可能であること、ゲノミクス、トランスクリプトーム、プロテオミクスと比較して対象となる代謝物の数が少ないこと、代謝物は最終の表現型なので、がん関連分子が見つかりやすいことなどがあげられる。一方で、試料の採取や処理方法、分析装置の選択、データ解析において標準となる評価系が確立されていないという欠点もある。

11. 唾液のメタボローム解析

慶應義塾大学の杉本ら²⁷⁾の研究グループは、アメリカカリフォルニア大学ロサンゼルス校との共同研究により、メタボローム測定による唾液を用いた解析結果から、唾液で膀胱がん 99%、乳がん 95%、口腔がん 80%と極めて高い検出感度でがんの診断が可能という研究成果を発表し、ニュース等で報道されて大きな話題となった。杉本らは、CE-TOFMS を用いて唾液中イオン性物質のノンターゲット解析を行い、健常者および口腔がん、乳がん、膀胱がん、歯周病、各患者の合計 215 症例の唾液サンプルから代謝プロファイルを取得し、健常者と各病態で統計学的に有意差のある 57 種類の代謝物質の特定に成功した。これらの代謝物の濃度パターンから、どの病態も極めて高い精度で分離可能であると報告している。画期的な研究成果であり、実用化に向けたさらなる研究が期待される。

12. 唾液中のバイオマーカーを用いた診断の課題

以上述べてきたように、近年の研究成果により唾液中のバイオマーカーを用いた口腔がんの診断法の確立が目前にせまっていると言っても過言ではないと考えている。しかしながら実用にはクリアすべき課題も残されている。

まず、100%信頼のあるバイオマーカーとして、Key となる単一遺伝子・単一遺伝子産物・単一代謝物の単離は非常に困難であり不可能に近いと思われる。単一のバイオマーカーで診断するのではなく、複数のバイオマーカーを一度に測定し、その発現異常を評価し、スコア化して診断する判定基準を設定する必要があると考えている。また、ターゲットとするバイオマーカーも DNA、RNA、タンパク質、化合物、各々単体のみで評価するのではなく、ゲノミクス、トランスクリプトーム、プロテオミクス、メタボロミクスの成果を総合して評価する判定基準の設定を行うことでより信頼のある診断法が確立できると考えている。この判定基準の設定が最大の課題である。

次に、検査の条件を考慮する必要がある点があげられる。唾液を用いた検査は、検査時刻、食事、歯ブラシ・含嗽の有無、口腔細菌叢の違いなどで結果に変動がでる可能性がある。検査の条件を一定にすることで解決できる可能性が高いと考えるが、この検査条件の設定をどうするか基準をつくる必要がある。

また、バイオマーカーを用いた診断基準が設定できた際に、それを簡便、迅速、低コストに検出する検査キットの開発や評価法の確立が必要と考える。バイオベンチャー企業等との提携により開発していく必要があると思われる。

一方で、健常者の唾液と口腔がん患者との唾液中のバイオマーカーにのみ注目がされがちで、口腔がん患者と判別すべき前癌病変、前癌状態、上皮異型性患者の唾液と口腔がんの唾液を確実に見分けられるか調べておく必要があると考えられる。これについては、現在解析を開始しており、検証中である。

その他、基礎疾患を有する人の唾液中には基礎疾患の影響を受けないか調べておく必要がある。医科では、血液、尿からのバイオマーカー単離の研究は盛んに行われているが、唾液を用いた研究は少ないのが現状である。臨床他科と連携し、各種疾患と唾液に関する解析を行っておく必要がある。

13. まとめ

以上、唾液中のバイオマーカーを用いた早期診断の可能性について概説した。克服すべき課題がまだ残るものの、唾液は、早期発見、早期診断としてスクリーニング検

査に応用できると確信している。唾液を試料とした研究の展望としては、口腔がんの転移や再発のマーカーとして、唾液が応用できる可能性がある。さらに唾液で、前癌病変・前癌状態・上皮異型性と口腔がんを確実に見分けられる可能性もある。また、唾液中のバイオマーカーの発現状態で、健康人においても、唾液成分を調べることで、将来口腔がんになりやすい口腔内環境か否かを判定し、口腔内環境の改善から未然に発癌を防ぐ予防技術としても応用できるかもしれない。

唾液は、唾液採取の簡便性、非侵襲性に加え、有用な因子を多く含んでいることから、比較的早期に、口腔がんのスクリーニングあるいは確定診断の手段として一役を担うであろうことが期待される。

本論文について申告すべき利益相反状態はありません。

文 献

- 1) 柴原孝彦：口腔がんの制御に向けて。歯科学報 109 : 58-71, 2008.
- 2) International Human Genome Sequencing Consortium: Finishing the euchromatic sequence of the human genome. *Nature* 21; 431(7011) : 931-945, 2004.
- 3) Honda, K., Ono, M., et al.: Proteomic approaches to the discovery of cancer biomarkers for early detection and personalized medicine. *Jpn J Clin Oncol* 43 : 103-109, 2013.
- 4) Wong, D.T.: Salivary diagnostics: the enabling factors for detecting oral diseases. *J Calif Dent Assoc* 41 : 94-96, 2013.
- 5) Shankar, A.A., Routray, S.: Trends in salivary diagnostics — a 5-year review of oral oncology (2007-2011). *Oral Oncol* 48 : 22-23, 2012.
- 6) Liu, J., Duan, Y.: Saliva: a potential media for disease diagnostics and monitoring. *Oral Oncol* 48 : 569-577, 2012.
- 7) 片倉 朗, 作間 巧, 他: 唾液による口腔癌のスクリーニング検査。頭頸部癌 34 : 503-507, 2008.
- 8) Rodrigo, J.P., Lequerica-Fernández, P., et al.: Clinical significance of annexin A2 downregulation in oral squamous cell carcinoma. *Head Neck* 33 : 1708-1714, 2011.
- 9) Ohno, Y., Izumi, M., et al.: Annexin II represents metastatic potential in clear-cell renal cell carcinoma. *Br J Cancer* 21; 101 : 287-294, 2009.
- 10) Diaz, V.M., Hurtado, M., et al.: Specific interaction of tissue-type plasminogen activator (t-PA) with annexin II on the membrane of pancreatic cancer cells activates plasminogen and promotes invasion in vitro. *Gut* 53 : 993-1000, 2004.
- 11) Emoto, K., Yamada, Y., et al.: Annexin II overexpression correlates with stromal tenascin-C overexpression: a prognostic marker in colorectal carcinoma. *Cancer* 92 : 1419-1426, 2001.
- 12) Reeves, S.A., Chavez-Kappel, C., et al.: Developmental regulation of annexin II (Lipocortin 2) in human brain and expression in high grade glioma. *Cancer Res* 52 : 6871-6876, 1992.
- 13) Lu, Q.Y., Jin, Y., et al.: Green tea inhibits cyclooxygenase-2 in non-small cell lung cancer cells through the induction of Annexin-1. *Biochem Biophys Res Commun* 427 : 725-730, 2012.
- 14) Eiró, N., González, L., et al.: Relationship between the inflammatory molecular profile of breast carcinomas and distant metastasis development. *PLoS One* 7 : e49047, 2012.
- 15) Lombardi, D.P., Geradts, J., et al.: KAI1 expression in the progression of colorectal cancer. *Cancer Res* 59 : 5724-5731, 1999.
- 16) Tsai, S.T., Chien, I.H., et al.: ENO1, a potential prognostic head and neck cancer marker, promotes transformation partly via chemokine CCL20 induction. *Eur J Cancer* 46 : 1712-1723, 2010.
- 17) Zhang, Y., Li, M.: ENO1 protein levels in the tumor tissues and circulating plasma samples of non-small cell lung cancer patients. *Zhongguo Fei Ai Za Zhi* 13 : 1089-1093, 2010.
- 18) Tu, S.H., Chang, C.C.: Increased expression of enolase alpha in human breast cancer confers tamoxifen resistance in human breast cancer cells. *Breast Cancer Res Treat* 121 : 539-553, 2009.
- 19) Yu, L., Shi, J., et al.: Estrogen promotes prostate cancer cell migration via paracrine release of ENO1 from stromal cells. *Mol Endocrinol* 26 : 1521-1530, 2012.
- 20) Nicholson, J.K., Lindon, J.C., et al.: 'Metabonomics': Understanding the metabolic responses of living systems to pathophysiological stimuli via multivariate statistical analysis of biological NMR spectroscopic data. *Xenobiotica* 29 : 1181-1189, 1999.
- 21) Kuo, Y.T., Li, C.W., et al.: In Vivo Proton Magnetic Resonance Spectroscopy of Large Focal Hepatic Lesions and Metabolite change of Hepatocellular Carcinoma Before and After Transcatheter Arterial Chemoembolization Using 3.0-T MR Scanner. *J. Magn Reson Imaging* 19 : 598-604, 2004.
- 22) Sreekumar, A., Poisson, L.M., et al.: Metabolomic profiles delineate potential role for sarcosine in prostate cancer progression. *Nature* 457 : 910-914, 2009.
- 23) Woo, H.M., Kim, K.M., et al.: Mass spectrometry based metabolomic approaches in urinary biomarker study of women's cancers. *Clin Chim Acta* 400 : 63-69, 2009.
- 24) Denkert, C., Budczies, J., et al.: Mass spectrometry-based metabolic profiling reveals different metabolite patterns in invasive ovarian carcinomas and ovarian borderline tumors. *Cancer Res* 66 : 10795-10804, 2006.
- 25) Petrik, V., Loosemore, A., et al.: OMICS and brain tumour biomarkers. *Br J Neurosurg* 20 : 275-280, 2006.
- 26) Yan, S.K., Wei, B.J., et al.: A metabonomic approach to the diagnosis of oral squamous cell carcinoma, oral lichen planus and oral leukoplakia. *Oral Oncol* 44 : 477-483, 2008.
- 27) Sugimoto, M., Wong, D.T., et al.: Capillary electrophoresis mass spectrometry-based saliva metabolomics identified oral, breast and pancreatic cancer-specific profiles. *Metabolomics* 6 : 78-95, 2010.

Possibility of early diagnosis by using salivary biomarkers

Takeshi Onda¹⁾, Kamichika Hayashi¹⁾, Takeshi Nomura^{1, 2)},
Nobuo Takano^{1, 2)}, Takahiko Shibahara^{1, 2)} and Akira Katakura^{2, 3)}

¹⁾ Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College
(Chief: Prof. Takahiko Shibahara)

²⁾ Department of Oral Cancer Center, Tokyo Dental College
(Chief: Prof. Nobuo Takano)

³⁾ Department of Oral Medicine, Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College
(Chief: Prof. Akira Katakura)

Abstract

Although oral cancer is relatively rare in Japan among developed countries, incidence is increasing. Therefore, there is a pressing need to develop test methods for early detection of oral cancer and to establish medical checkup systems. This study involved working with regional dental associations and performing group medical checkups for cancer for early discovery. However, there is a limit to possible regions, periods and number of people for group checkups. Checkups can be performed for only a few groups, so instead, personal medical checkups should be performed more widely in dental clinics. However, there is currently no reliable screening or inspection method that public dental clinics can easily use.

Recent research has shown that saliva has several functions to maintain and promote health, and contains biological information related to the blood and urine. Saliva can easily be collected noninvasively at any place and many times without pain. Unlike blood, saliva rarely has cell components such as erythrocytes, leukocytes and platelets, and never solidifies. Therefore, specialized toolkits can be made for the assay of abnormal proteins of targeted expression, perhaps enabling diagnosis to be made at the chair-side in dental clinics. The authors have focused on saliva which can easily be collected noninvasively many times, and have attempted to develop easy screening methods for the cancer using saliva as samples and to identify early diagnosis molecular markers by fully using proteomics analytic technology. This paper explains an outline.

Key words : oral squamous cell carcinoma, early diagnosis, laboratory test for saliva, proteomics, Metabolomics

---

Requests for reprints to: Dr. Onda T., Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College, 1-2-2 Masago, Mihama-ku, Chiba-shi 261-8502, Japan