臨床

唾液腺腫瘍 90 例の臨床統計的検討

山 中 康 嗣   桐 田 忠 昭   山 本 一 彦
大 儀 和 彦   今 井 裕 一 郎   下 岡 尚 史
杉 村 正 仁

要旨：1981 年 10 月当科開設より 1997 年 6 月までの 15 年 8 か月間に奈良県立医科大学口腔外科において病理組織学的に唾液腺腫瘍と診断された 90 例について臨床統計的検討を行い以下の結果を得た。

1. 性別は男性が 46 例，女性が 44 例とほぼ同数であった。
2. 平均年齢は良性腫瘍では 45.1 歳，悪性腫瘍は 56.4 歳で，男女間の平均年齢は良性腫瘍ではほぼ同じであったが，悪性腫瘍では男性は女性より約 25 歳高齢であった。
3. 組織型では良性腫瘍 72 例のうち多形性腺腫 61 例，Warthin 腫瘍 9 例，筋上皮腫，嚢胞性リンパ管腫，各々 1 例で，悪性腫瘍 18 例のうち，腺様嚢胞癌 12 例，粘表皮癌，基底細胞腺癌，各々 2 例，多形性腺腫内癌，扁平上皮癌，各々 1 例であった。
4. 発生部位では大唾液腺原発が 36 例（40.0%），小唾液腺原発が 54 例（60.0%）で，大唾液腺では耳下腺が 25 例（69.4%）と最も多く，小唾液腺では口蓋が 37 例（68.5%）と最も多くを占めた。
5. 初診時臨床症状は良性腫瘍では全例に無痛性腫脹が認められた。悪性腫瘍では腫脹に疼痛等，何らかの症状が合併している症例が多く認められた。
6. 治療法は良性腫瘍では全例に手術を施行し，悪性腫瘍では手術単独療法が 4 例で，術前，術後に放射線，化学療法を併用したものが 11 例と多くを占めていた。
7. 良性腫瘍では全例に再発は認められず，良好な結果を示したが，悪性腫瘍では 5 年及び 10 年累積生存率は 55.0%で，Stage 別では I，II 群 100%，III，IV 群 41.6%，N 分類別では N（1-3）群 46.7%，N（0）群 75.0%であり，進行例が予後不良であった。

キーワード：唾液腺腫瘍，臨床統計的検討，臨床病理学的検討，予後

緒 言

唾液腺腫瘍は頭頸部領域における腫瘍の約 5 % 前後^{1, 2)}を占め，一般に耳下腺に好発するが³⁻⁶⁾，その報告には若干の差異があり，口腔外科領域ではむしろ小唾液腺由来のものが多数を占める傾向にある⁷⁻¹¹⁾。唾液腺腫瘍の病理組織像は多彩で良性，悪性の鑑別が必ずしも明確ではない場合が多く，臨床上問題の多い疾患である。今回われわれは，当科において 15 年 8 か月間に経験した唾液腺腫瘍 90 症例について臨床統計的検討をおこなっ

たので報告する。

対象および方法

1981 年 10 月当科開設より 1997 年 6 月までの 15 年 8 か月間に当科を受診し，病理組織学的に唾液腺腫瘍と診断された 90 症例を対象とした。これらについて性・年齢分布，組織型，発生部位，初診時臨床症状，腫瘍の大きさ，来院までの期間，紹介経路，悪性腫瘍については病期分類，治療法，治療成績等を分析，検討した。なお，組織型分類については，1991 年の WHO 分類¹²⁾に従い，

奈良県立医科大学口腔外科学講座（主任：杉村正仁教授）
〔1998 年 7 月 27 日受付，1998 年 11 月 20 日受理〕

悪性腫瘍の病期分類は 1998 年の UICC 分類¹³⁾を用い、大唾液腺は唾液腺分類、小唾液腺は口唇および口腔の分類に従った。また、治療成績は病期別に Kaplan-Meier 法により累積生存率を算出し、有意差は Wilcoxon 検定を用いた。なお、観察開始期日は初診日とし、生存確認日は 1997 年 12 月 31 日とした。

結 果

1. 性・年齢分布 (図 1)

全 90 症例の性別分布では男性が 46 例、女性が 44 例と、ほぼ同数であった。

初診時年齢は良性腫瘍では 1 歳から 94 歳で平均 45.1 歳 (男性 45.1 歳, 女性 45.1 歳), 悪性腫瘍では 16 歳から 80 歳で平均 56.4 歳 (男性 68.9

歳, 女性 43.9 歳) と平均年齢は悪性腫瘍にやや高い傾向が認められた。また、良性腫瘍での男女間の平均年齢はほぼ同じであったが、悪性腫瘍では男女間の年齢差が顕著であった。

2. 組織型, 発生部位 (表 1)

全 90 症例のうち良性腫瘍と悪性腫瘍の発生比は 4 : 1 であった。良性腫瘍は 72 例 (80.0%) で、そのうち多形性腺腫が 61 例 (67.8%) と最も多く、次いで Warthin 腫瘍 9 例 (10.0%), 筋上皮腫, 嚢胞性リンパ管腫が各々 1 例 (1.1%) と続いた。一方、悪性腫瘍は 18 例 (20.0%) で、そのうち腺様嚢胞癌が 12 例 (13.4%) と最も多く、粘表皮癌 (低悪性 1 例, 高悪性 1 例) と基底細胞腺癌が各々 2 例 (2.2%) と続き、多形性腺腫内癌, 扁平上皮癌が各々 1 例 (1.1%) 認められた。また

図 1 年齢・性別分布

表 1 組織型と部位別症例数

	耳下腺	顎下腺	舌下腺	口蓋	頬粘膜	口底	口唇	舌	計
多形性腺腫	14	7	1	30	2		6	1	61
Warthin 腫瘍	9								9
筋上皮腫						1			1
嚢胞性リンパ管腫	1								1
良性腫瘍計	24	7	1	30	2	1	6	1	72
腺様嚢胞癌	1	1		5	2	2		1	12
粘表皮癌					1		1		2
基底細胞腺癌		1		1					2
多形性腺腫内癌				1					1
扁平上皮癌		1							1
悪性腫瘍計	1	3		7	3	2	1	1	18
計	25	10	1	37	5	3	7	2	90

表 2 初診時臨床症状

	良性腫瘍 (%)	悪性腫瘍 (%)
腫脹のみ	69 (95.8)	6 (33.3)
腫脹+疼痛	3 (4.2)	7 (38.8)
腫脹+神経麻痺		2 (11.1)
腫脹+潰瘍		1 (5.6)
腫脹+疼痛+神経麻痺		1 (5.6)
腫脹+複視		1 (5.6)
総 計	72 (100)	18 (100)

表 3 腫瘍径と来院期間

良性腫瘍		大唾液腺/小唾液腺				
来院期間/腫瘍径（mm）	≤20	20< ≤40	40< ≤60	60<	計	
≤ 1 か月	5/13	6/2	0/1	0/0	11/16	
≤ 3	0/4	1/1	1/0	0/0	2/5	
≤ 6	1/2	3/1	2/0	0/0	6/3	
≤ 1 年	0/3	2/1	2/0	0/0	4/4	
≤ 5	1/4	4/1	2/1	0/0	7/6	
5 <	0/2	1/4	1/0	0/0	2/6	
計	7/28	17/10	8/2	0/0	32/40	
悪性腫瘍		≤20	20< ≤40	40< ≤60	60<	計
≤ 1 か月	0/1	0/1	0/2	0/1	0/5	
≤ 3	0/0	1/0	0/1	0/0	1/1	
≤ 6	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
≤ 1 年	0/1	0/2	0/1	0/0	0/4	
≤ 5	0/2	0/0	1/0	0/0	1/2	
5 <	1/0	0/0	1/1	0/1	2/2	
計	1/4	1/3	2/5	0/2	4/14	

大・小唾液腺別発生比は1:1.5と小唾液腺に多く認められ、そのうち大唾液腺原発36例(40.0%)では、耳下腺が25例(27.8%)と最も多く、次いで顎下腺10例(11.1%)、舌下腺1例(1.1%)であった。小唾液腺原発54例(60.0%)では、口蓋が37例(41.1%)と最も多く、口唇7例(7.8%)、頬粘膜5例(5.6%)、口底3例(3.3%)、舌2例(2.2%)であった。また、大唾液腺原発中、良性腫瘍は32例(88.9%)、悪性腫瘍は4例(11.1%)であり、小唾液腺原発では良性腫瘍が40例(74.1%)、悪性腫瘍が14例(25.9%)と、大唾液腺と比較して小唾液腺に悪性腫瘍の頻度が高かった。

3. 初診時臨床症状(表2)

初診時の臨床症状では全症例に局所の腫脹を認めた。良性腫瘍では72例中69例(95.8%)に無痛性腫脹が認められた。一方、悪性腫瘍では18例中12例(66.7%)に腫脹と疼痛などの何らかの症状が組み合わさっており、そのうち知覚神経麻痺は3例(16.7%)に認められた。

4. 腫瘍径と来院期間(表3)

良性腫瘍における初診時腫瘍径では、20mm以内のものが72例中35例(48.6%)と約半数を占め、大・小唾液腺別比では1:4と小唾液腺原発が多数を占めた。また、60mmを越えるものではなく、40-60mm以下のものに大唾液腺腫瘍が80%を占めた。来院期間では、1か月以内のものが72例中27例(37.5%)と最も多かったが、5年を越

図 2 当科への紹介経路

えるものも 8 例（11.1%）認められた。悪性腫瘍では、良性腫瘍と異なり、大・小唾液腺腫瘍共に特に目立った偏りはなく、腫瘍径及び来院期間にばらつきを認めた。

5. 紹介経路（図 2）

他の医療機関より当科を紹介されてきた患者は全症例の約 88%であり、そのうち良性腫瘍では一般歯科からが 65.3%と最も多く、内科、外科などの医科からの紹介は 26.4%であった。悪性腫瘍では一般歯科からの紹介は 27.8%と良性腫瘍に比べ低く、かわって医科からの紹介が外科、内科等を合わせ 44.4%と高くなり、紹介なく患者の意志で来院したものも 27.8%と良性腫瘍に比べ高いものであった。

6. 悪性腫瘍の組織型と病期分類（表 4）

悪性腫瘍の臨床病期は I 期 1 例（T1N0M0）、II 期 4 例（T2N0M0）、III 期 7 例（T3N0M0 が 2 例、T1N1M0 が 1 例、T2N1M0 が 3 例、T3N1M0 が 1 例）、IV 期 6 例（T4N0M0、T2N2M0、T3N2M0、T4N1M0、T4N2M0、T4N2M0、各 1 例）であった。stage III、IV の進展例が 18 例中 13 例（72.2%）と最も多く認められたが、組織型とは

表 4 悪性腫瘍の組織型と病期分類

組織型/stage	I	II	III	IV	計
腺様嚢胞癌		4	6	2	12
粘表皮癌	1			1	2
基底細胞腺癌			1	1	2
多形性腺腫内癌				1	1
扁平上皮癌				1	1
計	1	4	7	6	18

特に大きな関連性は認めなかった。

7. 治療法

悪性腫瘍 18 例中治療を施行した 16 例のうち 15 例に手術を施行し、6 例に各種再建術を併用した。また、頸部リンパ節転移が認められるものには全例に頸部郭清術を施行した。手術のみを施行した症例は 4 例（25.0%）で、術前、術後に放射線療法あるいは化学療法を併用した症例は 11 例（68.9%）であった。組織型と治療法とは明かな関連は認められなかった（表 5）。病期分類との関連では stage I、II 症例では 50%が手術単独で、stage III、IV 症例や術後腫瘍残存が疑われた症例では手術の他に放射線療法や放射線と化学療法

表 5 悪性腫瘍の組織型と治療法

組織型/治療法	S	S+S	S+C	S+R+C	R+C	計
腺様嚢胞癌	3	2	2	2	1	10
粘表皮癌			1	1		2
基底細胞腺癌		1		1		2
多形性腺腫内癌	1					1
扁平上皮癌				1		1
計	4	3	3	5	1	16
S：手術療法 R：放射線療法 C：化学療法						

表 6 病期と治療法

stage/治療法	S	S+R	S+C	C+R+C	R+C	計
I			1			1
II	2	1				3
III		2	2	2		6
IV	2			3	1	6
計	4	3	3	5	1	16

S : 手術療法   R : 放射線療法   C : 化学療法

図 3 唾液腺腫瘍病期分類別累積生存率

図 4 T 分類別累積生存率

の併用療法が12例中10例（83.3％）に施行されていた（表6）。治療を施行しなかった2例は高齢による全身状態不良や治療拒否症例であった。良性腫瘍では全症例に腫瘍摘出術を施行したが、再建術を必要とした症例はなかった。

8. 予後

良性腫瘍においては最長16年の追跡調査で全症例に再発を認めず経過良好であった。

悪性腫瘍では、5年及び10年累積生存率はstage I, IIで100％, stage III, IVで41.6％, 全症例では55.0％であり、進行例が予後不良であった（図3）。T分類別累積生存率ではT1で100％, T2で50.0％, T3で26.7％, T4で66.7％であった（図4）。頸部リンパ節転移症例は全18例中11例（61.1％）で、N分類別累積生存率はN（1-3）群で46.7％, N（0）群で75.0％とN（0）群が良

図 5 N 分類別累積生存率

図 6 大・小唾液腺別累積生存率

好であった（図5）。また、大・小唾液腺別累積生存率は大唾液腺原発で50.0%、小唾液腺原発で57.1%であり、小唾液腺にやや良好である傾向を示した（図6）。死亡例は8例で、その死因は、原発巣非制御死が2例、遠隔転移死が4例、他病死と不明がそれぞれ1例であり、腺様嚢胞癌3例、基底細胞腺癌1例において肺に、粘表皮癌（低分化型）1例において脳に、それぞれ一次治療終了後3か月から約4年の間に遠隔転移が認められた。

考 察

唾液腺腫瘍の頭頸部領域腫瘍に占める割合は粘膜炎上皮由来の癌腫に比べると低く¹⁴⁾、一般に5%前後と考えられている。しかし、その臨床症状や経過は複雑であり、病理組織学的にも多彩な像を呈することが多く、臨床医にとって適切な診断と治療法の選択が要求される重要な疾患であるといえる。

性別頻度では良性、悪性腫瘍とも女性が若干割合が高いという報告^{7,10,11)}が多いが、当科においては良性腫瘍の男女比は1.1:1、悪性腫瘍では1:1とほぼ同数であった。年齢別頻度では、良性腫瘍は平均45.1歳（男性45.1歳、女性45.1歳）、悪性腫瘍は平均56.4歳（男性68.9歳、女性43.9歳）といずれも中年層に多く、悪性腫瘍の平均年齢が良性腫瘍に比べ約10歳ほど高いことは、他報告と同様であった。しかし悪性腫瘍においては、男性の平均年齢が女性より約25歳高く、両者に関きがみられたが、その理由については症例数が少なく明かではない。

組織型別では、良性腫瘍は多形性腺腫が84.7%と圧倒的に多く、次いでWarthin腫瘍が12.5%であった。一方、悪性腫瘍では腺様嚢胞癌が最も多く66.7%を占め、粘表皮癌、基底細胞腺癌が11.1%と続いており、良性、悪性とも他報告⁷⁻¹¹⁾とほぼ同様であった。

発生部位別頻度では一般に耳下腺、顎下腺に高いとされているが、当科においては口蓋が41.1%と最も多く、耳下腺27.8%、顎下腺11.1%と続いていた。口蓋に多いのは口腔外科としての特徴と考えられるが、他の口腔外科領域の報告⁷⁻¹¹⁾と比較すると大唾液腺原発の占める割合が高かった。また、小唾液腺腫瘍に限っても、口蓋の占める割合は68.5%と最も高く、Isacssonら¹⁵⁾の74.6%、堀之内ら¹⁶⁾の73.4%など高い値があるが、他の報告^{9,10,17,18)}に比べ10%程度高い値を示した。部位別の悪性腫瘍頻度に関しては口底66.6%、頬粘膜60.0%、顎下腺30.0%、口蓋19.0%、口唇14.2%

であり、小唾液腺領域には悪性率が高く、悪性腫瘍の 77.8% は小唾液腺原発で、口底、臼後部、舌などに悪性腫瘍の発生頻度が高いとの他報告^{7, 11)}と一致していた。

初診時臨床症状において、良性腫瘍では境界は明瞭で表面粘膜にもほとんど変化がなく、自覚症状が乏しいこともあって無痛性腫脹のみが 95.8% と大部分を占めた。一方、悪性腫瘍では腫脹だけではなく、疼痛、潰瘍形成、知覚神経麻痺など多岐にわたっており、多彩な症状を呈していた。一般に、疼痛、潰瘍形成、神経麻痺などの症状は良性腫瘍との鑑別に有効である⁵⁾と考えられているが、今回の検討でも無痛性腫脹のみが 33.3% あり、必ずしも臨床所見のみで悪性腫瘍の鑑別は容易ではないものと思われた。

唾液腺腫瘍の治療は良性、悪性腫瘍ともに原則として手術療法が第一選択とされている。悪性腫瘍においては、切除断端部に腫瘍残存が疑われる場合に広汎切除術後の再発予防、また、手術不能症例に対して放射線療法や化学療法が行われることが多い。当科においては進行例が多く、手術のみを行った症例は 4 例 (25.0%) のみで、11 例 (68.9%) は放射線あるいは化学療法を併用した。特に、放射線療法については、最近その意義についていくつかの報告がある。唾液腺原発悪性腫瘍は、放射線の感受性は低いとされているものの、手術との併用療法によりより高い局所制御率が得られたとの報告^{8, 19)}や、術後顕微鏡的腫瘍残存に対し 50Gy~60Gy の高線量の術後照射が有効であるという報告^{19, 20)}がみられる。当科においても進展例において手術療法のみで局所制御が不十分と考えられた場合には術後放射線療法を併用している。一方、化学療法については、cisplatin (CDDP), cyclophosphamide (CPA), adriamycin (ADM), 5-fluorouracil (5-FU), vincristine (VCR) などが単独あるいは多剤併用療法として用いられ、切除不能例などに有効であるとの報告²¹⁻²³⁾があるが、現状ではその有効性に関しては必ずしも明確ではない。佃²⁴⁾は頭頸部腺系悪性腫瘍に対し、ADM+CPA+CDDP の多剤併用療法を行い、有効率 20~50% と報告している。当科でも最近はこの regimen を用いているが、手術単独療法に比べ併用療法に若干の効果がみられたものの、現状で

は、手術を第 1 選択とした補助療法の 1 つにすぎないと考えている。

予後については、良性腫瘍では最高 15 年の追跡調査で全例に再発は認めていないが、多形性腺腫における癌化の可能性や²⁵⁾、口蓋原発腫瘍は他の小唾液腺腫瘍や大唾液腺腫瘍より悪性転化しやすいとの報告²⁶⁾もあり、十分な経過観察が必要であると思われる。一方、唾液腺悪性腫瘍の 5 年累積生存率は 50%~70% 台と報告されている。当科においても、5 年、10 年累積生存率はいずれも 55.0% と、ほぼ同様の結果であった。当科においては、初診時頸部リンパ節転移症例が 18 例中 11 例 (61.1%) と、Spiro ら²⁷⁾の 13.1%, Chidzonga ら⁴⁾の 2.0% などの報告に比べその頻度が高く、stage I, II 症例の 5 年累積生存率は 100% と良好な結果が得られたものの、全体の 72.2% を占める stage III, IV 症例では 41.6% と不良であったことが大きく影響していると考えられた。死亡例 7 例中 4 例 (57.1%) は遠隔転移死であり、特に進展症例においては、原発巣及び頸部の制御のみならず、一次治療終了後の遠隔転移をいかに抑えるかが非常に重要な問題であると考えられる。遠隔転移の予防には化学療法が妥当であると考えられるが、現状ではその有効性に関しては明確にはされていない。また、小西ら²⁸⁾は原発巣と遠隔転移巣では抗癌剤に対する感受性が異なり、一次治療に用いた抗癌剤では遠隔転移巣に対する有効性が減弱することを報告している。このことから原発巣に対し感受性の高い regimen であっても遠隔転移の予防に役立つとは言い難く、今後、その予防は重要な課題の一つである。また、最近では遠隔転移巣に対する外科的治療も積極的に施行される傾向にあり、末舛²⁹⁾は、転移性肺腫瘍の切除療法に関する臨床統計をおこない、頭頸部癌の中では、唾液腺癌の肺転移切除例の予後は良好であると述べている。これは、唾液腺悪性腫瘍では遠隔転移出現までの期間が長いこと、また、遠隔転移巣の発育が通常緩慢で、無症状のまま長期にわたって経過することが多いことが考えられる。しかし、現状では、原発巣の大きさと局所進展の有無がリンパ節転移、遠隔転移を予測する主な因子である³⁰⁾とされるため、これらを十分に考慮に入れた治療法の選択が必要である。

結 語

1981 年 10 月当科開設より 1997 年 6 月までの 15 年 8 か月に唾液腺腫瘍と診断された 90 例について臨床統計的検討を行い以下の結果を得た。

1. 性別は男性が 46 例, 女性が 44 例とほぼ同数であった。

2. 平均年齢は良性腫瘍では 45.1 歳, 悪性腫瘍は 56.1 歳で, 男女間の平均年齢は良性腫瘍ではほぼ同じであったが, 悪性腫瘍では男性は女性より約 25 歳高齢であった。

3. 組織型では良性腫瘍 72 例のうち多形性腺腫 61 例, Warthin 腫瘍 9 例, 筋上皮腫, 嚢胞性リンパ管腫各々 1 例で, 悪性腫瘍 18 例のうち, 腺様嚢胞癌 12 例, 粘表皮癌, 基底細胞腺癌各々 2 例, 多形性腺腫内癌, 扁平上皮癌各々 1 例であった。

4. 発生部位では大唾液腺原発が 36 例 (40.0%), 小唾液腺原発が 54 例 (60.0%) で, 大唾液腺では耳下腺が 25 例 (69.4%) と最も多く, 小唾液腺では口蓋が 37 例 (68.5%) と最も多くを占めた。

5. 初診時臨床症状は良性腫瘍では全例に無痛性腫脹が認められた。悪性腫瘍では腫脹に疼痛等, 何らかの症状が合併している症例が多く認められた。

6. 治療法は良性腫瘍では全例に手術を施行した。悪性腫瘍では手術単独療法が 4 例で, 術前, 術後に放射線, 化学療法を併用したものが 11 例に認められた。

7. 良性腫瘍では全例に再発は認められず, 良好な結果を示した。悪性腫瘍では 5 年及び 10 年累積生存率は 55.0% で, stage 別では I, II 群 100%, III, IV 群 41.6%, N 分類別では N (1-3) 群 46.7%, N (0) 群 75.0% であり, 有意差はないが, 進行例に予後不良の傾向を示した。

本論文の要旨は第 14 回日本口腔腫瘍学会 (1996 年 1 月 30 日・31 日, 鎌倉) において発表した。

文 献

1) 戸川 清, 野村恭也, 他: 唾液腺の良性・悪性腫瘍. 耳鼻咽喉科頭頸部外科 MOOK2, 金原出版, 東京,

1986, 82-100.

- 2) 横尾恵美子: 病理分類, 組織学的所見, 組織由来, 病理診断. 歯科ジャーナル Vol. 41 No. 1, 国際医書出版, 7-14, 1996.
- 3) Eneroth, C. M.: Salivary gland tumors in the parotid gland, submandibular gland, and the palate region. *Cancer* 27: 1415-1418, 1971.
- 4) Chidzonga, M. M., LopezPerez, V. M., et al.: Salivary gland tumor in Zimbabwe: report of 282 cases. *Int J Oral Maxillofac Surg* 24: 293-297, 1995.
- 5) 鶴田至宏, 佐藤武男, 他: 唾液腺腫瘍 92 例の臨床統計. 耳鼻 89: 724-730, 1986.
- 6) 横山正人, 鈴木光也, 他: 唾液腺腫瘍 96 例の臨床統計. 耳鼻臨床 87: 1373-1387, 1994.
- 7) 亀山忠光, 田中俊一, 他: 過去 26 年間の当教室における唾液腺腫瘍の臨床的検討. 口科誌 38: 635-644, 1989.
- 8) 海野 智, 川辺良一, 他: 唾液腺腫瘍 105 例の検討. 日口外誌 39: 428-436, 1993.
- 9) 宮田和幸, 森田展雄, 他: 唾液腺腫瘍 60 例の臨床統計的観察. 日口外誌 35: 1514-1521, 1989.
- 10) 領家和男, 齊藤鉄朗, 他: 唾液腺腫瘍 52 例の臨床的検討. 日口外誌 37: 1712-1720, 1991.
- 11) 齊藤雅子, 倉地洋一, 他: 当科における唾液腺腫瘍の臨床的検討. 昭歯誌 11: 334-344, 1991.
- 12) Seifert, G., Sobin, L. H.: Histological typing of salivary gland tumors. second edition. World Health Organization, Geneva, 1991.
- 13) UICC: TNM classification of malignant tumors. 5th ed, International Union against Cancer, Geneva, 1998.
- 14) 二階宏昌: 小唾液腺腫瘍の病理診断. 病院病理 11: 28-31, 1993.
- 15) Isacson, G., Shear, M.: Intra-oral salivary gland tumors: retrospective study of 201 cases. *J Oral Pathol* 12: 57-62, 1983.
- 16) 堀之内康文, 篠原正徳, 他: 唾液腺腫瘍 160 症例の臨床統計的検索. 日口外誌 36: 1730-1737, 1990.
- 17) 玉生みい: 唾液腺腫瘍の臨床的研究. 特に小唾液腺について. 日口外誌 5: 2-18, 1959.
- 18) Sugimura, M., Sakamoto, T., et al.: Analysis of 102 lesions diagnosed as "palatal tumor" in a spot diagnosis. *Int. J. Oral Surg* 4: 143-150, 1975.
- 19) 堀内淳一, 渋谷 均, 他: 唾液腺癌の放射線治療成績. 癌と臨床 32: 117-122, 1986.
- 20) 中野隆史: 放射線治療各論. 唾液腺. 癌と臨床別冊: 553-561, 1995.
- 21) 犬山征夫, 堀内正敏, 他: 頭頸部 adenoid cystic carcinoma に対する化学療法の検討. 耳喉 53: 45-52, 1981.
- 22) Creagan, E. T., Woods, J. E., et al.: Cisplatin-based chemotherapy for neoplasms arising from salivary glands and contiguous structures in the head and neck. *Cancer* 62: 2313-2319, 1988.

- 23) Dimery, I. W., Legha, S. S., et al.: Fluorouracil, doxorubicin, cyclophosphamide, and cisplatin combination chemotherapy in advanced or recurrent salivary gland carcinoma. *J Clin Oncol* 8:1056-1062, 1990.
- 24) 佃 守: 腺系癌に対する制がん剤の選択. *耳喉頭頸* 15:193-196, 1990.
- 25) 村上 泰: 唾液腺良性腫瘍. *JOHNS Vol.2 No. 4*, 東京医学社, 1986.
- 26) Chaudhry, A. P., Vickers, R. A., et al.: Intraoral minor salivary gland tumors. *Oral Surg* 14:1194-1226, 1961.
- 27) Spiro, R. H., Huvos, A. G., et al.: Adenoid cystic carcinoma of salivary origin. A clinicopathologic study of 242 cases. *Am J Surg* 128:512-520, 1974.
- 28) 小西一夫, 坂本浩一, 他: 当科における悪性腫瘍転移症例の検討. *頭頸部腫瘍* 21(1):137-142, 1995.
- 29) 末舛恵一: 転移性肺腫瘍の外科治療を中心とした集学的治療. *日医誌* 18:275-279, 1985.
- 30) 新谷 悟, 松浦秀博, 他: 大唾液腺癌のリンパ節転移, 遠隔転移についての臨床的検討. *日癌治* 31(3):211-217, 1996.

Clinico-statistical Analysis of 90 Cases of Salivary Gland Tumors

Yasutsugu Yamanaka, Tadaaki Kirita, Kazuhiko Yamamoto
Kazuhiko Ohgi, Yuuichirou Imai, Hisashi Shimooka
and Masahito Sugimura

Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Nara Medical University
(Chief: Prof. Masahito Sugimura)

Abstract

Ninety cases of salivary gland tumors pathologically diagnosed at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara Medical University between October 1981 and June 1997 were clinicostatistically analyzed.

The results were as follows:

1. The subjects were 46 male and 44 female patients.
2. Their mean age was 45.1 years for benign tumor and 56.4 years for malignant tumor.

The mean age for the benign tumor was similar in both sexes. Males were about 25 years older than females for malignant tumors.

3. Histologically, 72 benign tumors were composed of 61 pleomorphic adenomas, 9 Warthin tumors, 1 myoepithelioma, and 1 cystic lymphangioma. The 18 cases of malignant tumors were composed of 12 adenoid cystic carcinomas, 2 mucoepidermoid carcinomas, 2 basal cell carcinomas, 1 squamous cell carcinoma, and 1 carcinoma in pleomorphic adenoma.

4. The primary tumor sites were the major salivary gland in 36 cases and the minor salivary gland in 54 cases. The most common primary site was the parotid gland for the major salivary gland in 25 cases and the palate for the minor salivary gland in 37 cases.

5. Painless swelling was a characteristic symptom found in all cases of benign tumors.

The first clinical findings of malignant tumors were mixed symptoms of pain and others in addition to swelling.

6. Surgical treatment was performed for all benign tumors. For malignant tumors, 4 cases were treated with surgery alone and 11 cases with radiation and/or chemotherapy in addition to surgery.

7. There was no recurrence in any benign tumor case. These cases demonstrated favorable prognoses. The 5-year and 10-year cumulative survival rates were 55.0% in all cases, 100% for the stage I and II group, 41.6% for stage III and IV group, 46.7% for N (1-3) group, and 75.0% for N (0) group, respectively.

Key words : salivary gland tumor, clinicostatistical analysis, clinicopathological study, prognosis

---

Requests for reprints to: Dr. Y. Yamanaka., Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara Medical University, 840, Shijo-cho, Nara-Kashihara, 634-0813, Japan