症 例

舌に発生した乳頭状囊腺癌の 1 例

堀 川 拓 郎 山 根 源 之 外 木 守 雄
野 々 山 進 横 澤 貴 宏 田 中 陽 一*

要旨：今回、我々は舌に発生した乳頭状囊腺癌の1例を経験した。

乳頭状囊腺癌は、1991年、WHO の唾液腺腫瘍の分類に新たに追加されたまれな疾患で、嚢胞様構造を持ち、この胞内に乳頭状発育を示す悪性腫瘍である。

50 歳女性の右側舌縁部の小腫瘤に対して、舌小唾液腺腫瘍の診断のもと、舌部分切除術を施行。病理組織像にて、乳頭状囊腺癌との診断が得られた。周囲に浸潤傾向やリンパ管侵襲が認められたことから、術後、周囲組織に放射線外部照射（total 55.6Gy）を施行した。術後約 1 年の現在、再発や転移を疑う所見は認められない。

治療法、予後に関して文献的考察を加え報告した。

キーワード：乳頭状囊腺癌、唾液腺悪性腫瘍、舌

緒 言

乳頭状囊腺癌（Papillary cystadenocarcinoma）は、1991年、WHO の唾液腺腫瘍の分類に新たに追加されたまれな疾患で、嚢胞様構造を持ち、胞内に乳頭状発育を示す悪性腫瘍である¹⁾。

今回我々は舌に発生した乳頭状囊腺癌の 1 例を経験し、興味ある知見を得たので、病理組織学および文献的考察を行いその概要を報告する。

症 例

患者：50 歳、女性

初診：1999 年 4 月 23 日

主訴：右側舌縁部の違和感

家族歴、既往歴：特記事項なし

現病歴：1998 年 6 月頃より同部に小豆大の腫瘤を自覚するも無痛性のため放置。その後腫瘤は徐々に増大し違和感が増したため、当科を受診した。

現症：口腔内所見；右側舌後方縁部に約 20×30×15mm、小指頭大の健常色を呈した境界不明瞭

な無痛性で弾性硬の腫瘤を認めた（写真 1）。

所属リンパ節所見；右側顎下部に直径 10mm の可動性リンパ節を 1 個触知した。

画像所見；MRI T2 強調前額断像では、舌組織内に類円形の高信号成分が認められた。この領域の中心部はわずかに信号が低くなっており、粘液の貯留や腫瘍中心部の壊死が疑われた（写真 2）。

しかし、T2 強調水平断像で舌組織内に境界明瞭な高信号を呈する類円形の成分と周囲に淡い高信号を示す成分が認められたことなどから（写真 3）、腺様嚢胞癌、粘表皮癌なども否定できなかった。なお、穿刺吸引細胞診では核異型が弱く、Class III と診断した。

臨床診断：舌小唾液腺腫瘍

処置および経過：舌小唾液腺腫瘍の診断のもと、6 月 14 日全身麻酔下で舌部分切除術を施行した。病巣が比較的小さかったため、術前の病理組織検査は行わず、excisional biopsy とした。

切除物所見：切除物は楕円形で約 25×35×20 mm で、割断面には粘調性の内容液を含んだ嚢胞

東京歯科大学オーラルメディシン講座・東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科（主任：山根源之教授）

*東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理

〔2000 年 7 月 31 日受付，2000 年 8 月 18 日受理〕

写真 1 初診時口腔内写真
右側舌後方縁部に腫瘤を認める。

写真 2 術前 MRI T2 強調前額断像
類円形の高信号成分の中心部は信号が低くな
っており、粘液の貯留や腫瘍中心部の壊死が疑わ
れる。

写真 3 術前 MRI T2 強調水平断像
舌組織内に境界明瞭な高信号を呈する類円形の
成分と周囲に淡い高信号を示す成分が見られる。

様構造が見られ、周囲には充実性胞巣が認められ
た(写真4)。

病理組織学的所見：上皮下に嚢胞様構造がみら
れ、胞内には大型の円形核をもつ細胞の乳頭状増

写真 4 切除物所見(断面)
粘調性の内容液を含んだ嚢胞様構造が見られ、周囲
には充実性腫瘍が認められる。

写真 5 病理組織学的所見(H-E 染色 弱拡大像)
胞内の乳頭状増殖が顕著な嚢胞様構造がみられる。
周囲に粘液産生を伴った浸潤像をみる。

写真 6 病理組織学的所見(H-E 染色 強拡大像)
乳頭状増殖を示す腫瘍細胞は異型性も弱く、分裂
像もわずかである。

殖が顕著に認められた。これらの細胞は異型性も
弱く、分裂像もわずかであった。周囲結合組織の粘
液産生の著明な深部では、浸潤像が認められた

表 1 乳頭状嚢腺癌の報告例

No.	発症年齢	性別	発症部位	大きさ	治療及び経過	予後(年)
1	62	M	口腔粘膜	2×2 cm	切除, 4年後再発 その後放射線治療	他病死(19)
2	62	M	耳下腺	3×2.5 cm	切除, 2年後リンパ節転移, 切除及び放射線治療	生存(7)
3	36	M	口腔粘膜	2×2 cm	切除, 放射線治療	生存(13)
4	60	F	耳下腺	4×2 cm	切除	生存(14)
5	38	M	耳下腺	不明	切除	生存(0.5)
6	71	M	口蓋	3×1.5 cm	切除, 放射線治療	生存(3)
7	80	M	舌	3×4 cm	切除, 頸部郭清 6カ月後再発, 放射線治療	不明
8	55	M	口腔粘膜	5×3.5 cm	切除	生存(1)
自験例 9	50	F	舌	2.5×3.5 cm	切除, 放射線治療	生存(1)

(写真5, 6)。周囲に軽度のリンパ管侵襲も認められたことから粘液産生の著明な乳頭状嚢腺癌(Papillary cystadenocarcinoma)と診断した。

病理学的所見で、腫瘍の浸潤傾向やリンパ管侵襲が認められたことなどから、周囲組織に放射線外部照射(X線 total 55.6Gy)を施行した。

現在、週1回の経過観察および、頸部リンパ節に対する精査などを行っているが、術後約1年経過して、局所再発や転移を疑う所見は認められない。

考 察

唾液腺悪性腫瘍は、1972年のWHO分類において8型に分類され、これらに分類できない組織型の腺系癌は腺癌(Adenocarcinoma)に総称されていた。このうち乳頭状嚢腺癌(Papillary cystadenocarcinoma)は、1991年にWHO唾液腺腫瘍の分類第2版において腺癌から分かれ、新たに追加され現在に至っている¹⁾。

また、1991年のAFIP(Armed Forces Institute of Pathology)における唾液腺腫瘍の分類では、Papillary formationの有無にかかわらず、予後は同様であることから、Papillary formationをもつものを含めて嚢腺癌(Cystadenocarcinoma)と定義している^{2,3)}。

今回、我々が乳頭状嚢腺癌として検索し得たのは自験例を含めて9例であった(表1)。その発症

部位は口腔粘膜3例、耳下腺2例、舌2例、口蓋で1例ずつであった⁴⁻⁸⁾。発症年齢は36~80歳、平均年齢は57歳で、男女比は男性7名、女性2名と男性優位であった。

嚢腺癌と分類されたAFIPの調査では、好発部位は耳下腺で、発症年齢は20~86歳、平均年齢は58.8歳、男女比は1:1と報告され、我々の検索した9例の乳頭状嚢腺癌とは性格を異にするのではないかと推察された。

自験例は、臨床所見より悪性を疑う要素は少なかったがMRI所見では、T2強調水平断像において腫瘍周囲に淡い高信号を示す成分が認められたことなどから腺様嚢胞癌、粘表皮癌などの悪性像も否定しえず、悪性腫瘍に準じた治療方針を立て、細胞診後に周囲組織を含めた舌部分切除とした。

文献的にも、本疾患の治療方針は外科的切除が第一選択で、全例、外科的切除が施行されていた。

今回我々は術前の病理組織検査は行わず、excisional biopsyとした。病巣は臨床的には境界明瞭ではなかったが、明らかに浸潤性の状態ではなく、safety marginは病巣周囲5mm外側に設定した。本来なら、1cm以上で設定すべきであるが、本症例では病巣の位置から後方部で1cm以上のsafety marginを設定することは困難なため、今回は5mmとした。

予後に関しては、WHOおよびAFIPでは乳頭状嚢腺癌および嚢腺癌はlow-gradeな経過を示す

とされており、外科的切除後も予後は良好とされている。しかし、我々の渉猟した乳頭状嚢腺癌の報告例では 9 例中 3 例に再発がみられ、そのうち 1 例は 6 ヶ月で局所再発している。

また、本疾患の予後を推察する上で、乳頭状嚢腺癌が分類表記される以前の報告として Mucus-producing adenopapillary (nonepidermoid) carcinoma⁹⁾がある。これは粘液および乳頭状構造物という 2 つの組織学的特徴を伴った腺癌であり、非常に類似した特徴をもつ。特に今回、病理組織学的所見にて、粘液産生が顕著だったこともあり同一疾患である可能性が高い。この報告⁹⁾では、組織学的に low-grade なものと high-grade なものに分類されており、その比率は約 2 : 3 になるとされている。本症例でも high-grade と思われる組織型から、予後不良である可能性が高いことが推察される。すなわち、本症例が Mucus-producing adenopapillary (nonepidermoid) carcinoma と同一疾患であるとするならば、予後不良の可能性も十分考慮した治療法を選択する必要がある。

自験例では、病理組織学的に浸潤性発育を示し、周囲のリンパ管侵襲を認めたことから、術後放射線療法を施行した。文献上でも 5 例が放射線療法を施行しており（内 2 例は再発後）、その結果はいずれも良好であった。

これらのことから放射線療法は後療法として妥当性があると考ええる。

以上、乳頭状嚢腺癌は臨床的に良性疾患を思わせる所見が多く、術前検査では確定診断をすることが難しい疾患であり、予後について悪性疾患を十分念頭に入れた後療法を準備しておく必要があると考える。本例に対して今後とも慎重な follow up が必要であると思われる。

結 語

今回我々は舌に発生した乳頭状嚢腺癌の 1 例を経験したので、その概要を報告し、予後について検討した。

本症例は悪性腫瘍ではあるが、良性所見を呈す

ことが多い。さらに文献的にも、再発をきたしやすい疾患とされ、慎重な follow up が必要だと考えた。

本論文の要旨は、2000 年 1 月 23 日第 18 回日本口腔腫瘍学会総会（名古屋市）において口頭発表した。

稿を終えるにあたり、画像所見について御教示いただいた、東京歯科大学市川総合病院放射線科、辰野 聡先生に深謝いたします。

文 献

- 1) Seifert, G., Sobin, L. H., et al.: Carcinomas. Seifert, G., Sobin, L. H., et al.; Histological Typing of Salivary Gland Tumours, 2nd ed, Springer-Verlag, Berlin, 1991, 17-31.
- 2) Ellis, G. L., Auclair, P. L.: Cystadenocarcinoma. Ellis, G. L., Auclair, P. L.; Atlas of Tumor Pathology Tumors of The Salivary Glands, 1st ed, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC, 1996, 289-296.
- 3) Foss, R. D., Ellis, G. L., et al.: Salivary gland cystadenocarcinomas A clinicopathologic study of 57 cases. Am J Surg Pathol 20:1440-1447, 1996.
- 4) Klijanienko, J., Vielh, P.: Salivary carcinomas with papillae: cytology and histology analysis of polymorphous low-grade adenocarcinoma and papillary cystadenocarcinoma. Diagn Cytopathol 19:244-249, 1998.
- 5) Danford, M., Eveson, J. W., et al.: Papillary cystadenocarcinoma of the sublingual gland presenting as a ranula. Br J Oral Maxillofac Surg 30:270-272, 1992.
- 6) Shteyer, A., Fundoianu-Dayana, D.: Papillary cystic adenocarcinoma of minor salivary glands. Int J Oral Maxillofac Surg 15:361-364, 1986.
- 7) Pollett, A., Perez-ordonez, B., et al.: High-grade papillary cystadenocarcinoma of the tongue. Histopathology 31:185-188, 1997.
- 8) Kobayashi, I., Kiyoshima, T., et al.: Immunohistochemical and ultrastructural study of a papillary cystadenocarcinoma arising from the sublingual gland. J Oral Pathol Med 28:282-286, 1999.
- 9) Blanck, C., Eneroth, C.: Mucus-producing adenopapillary (non-epidermoid) carcinoma of the parotid gland. Cancer 28:676-685, 1971.

A case of papillary cystadenocarcinoma of the tongue

Takuro Horikawa, Gen-yuki Yamane, Morio Tonogi,
Susumu Nonoyama, Takahiro Yokosawa and Youichi Tanaka*

Department of Oral Medicine, Oral and Maxillofacial Surgery,
Ichikawa General Hospital, Tokyo Dental College
(Chief: Prof. Gen-yuki Yamane)

*Clinical Laboratory, Division of surgical pathology,
Ichikawa General Hospital, Tokyo Dental College

Abstract

This report describes a case of papillary cystadenocarcinoma of the tongue.

Papillary cystadenocarcinoma is a rare disease newly added to the WHO classification of salivary gland neoplasms in 1991. And it is a malignant tumor with a papillary growth pattern in a cystic structure.

The patient was a 50-year-old woman. Clinically, a minor salivary gland tumor of the tongue was the diagnosis for a small mass on the right-side lingual edge, so a partial excision of the tongue was performed. The histopathological diagnosis was papillary cystadenocarcinoma. Postoperative external irradiation (total 55.6Gy) was performed to the perifocal tissue, because infiltrative growth and lymph vessel invasion were found in the circumference. Present in postoperative about 1 year, the opinion which suspects recurrence and metastasis is not found.

We report on the therapy and prognosis with a literary consideration.

Key words : papillary cystadenocarcinoma, salivary gland neoplasm, tongue

Requests for reprints to : Dr. Horikawa T., Department of Oral Medicine, Oral and Maxillofacial Surgery, Ichikawa General Hospital, Tokyo Dental College, Sugano 5-11-13, Ichikawa-shi, Chiba, 272-8513 Japan