症 例

嚢胞が疑われた頸部扁平上皮癌の1例

—画像診断学的所見を中心として—

三 輪 邦 弘 田 畑 修 湯 浅 賢 治
神 田 重 信 樋 口 勝 規* 大 石 正 道*

要旨：臨床的に嚢胞と診断された頸部皮下腫瘍性病変の一例を種々の画像診断法（コンピュータ断層撮影法，超音波診断法および唾液腺造影法）によって検討した。コンピュータ断層撮影法と唾液腺造影法では腫瘍と唾液腺およびその周辺組織の関係を知ることができた。超音波診断法では病変の内部構造を把握することができた。その結果，病変は唾液腺外に存在する悪性腫瘍と診断した。病理組織診断は扁平上皮癌であった。

キーワード：頸部腫瘍，画像診断，扁平上皮癌

緒 言

一般に側頸部に表在性に発現する腫瘍性病変は触診によってその形態的特徴を漠然と類推することができる。また，内部性状についても嚢胞性か充実性かを察知することも可能ではある。しかし，実際にはその組織内部で多種多様な変化が起こっており臨床における経験的概念からだけで臨床診断を決定することは容易なことではない。そこで，最近急速に進歩してきた医療診断機器を利用して，多角的に描出される病変画像から多くの情報が得られるようになった¹⁻³⁾。今回，これらの画像情報を駆使して側頸部腫瘍性病変の一例を検討した。

症 例

患者：71歳男性

主訴：左側頸部腫瘍

現病歴：1988年10月初旬に左上頸部に腫脹が発現した。痛みや発熱はなかった。近医にて抗生剤を処方され腫脹は減退したが，小さな腫瘍が残存した。同年12月下旬に再度同部位に鶏卵大の腫瘍

が出現した。同日某外科医院を受診し抗生剤を投与された。1989年1月下旬に九大第1口腔外科を受診した。

現症：左下顎角部後方に縦横径が約60mm×40mm程で境界やや不明瞭な弾性硬の腫瘍を認めた。腫瘍の表面は平滑で波動を触知し，深部組織と癒着しており，腫瘍前方部に軽度の圧痛を認めた。唾液の流出は良好であり，口腔内には他に特記すべき所見はない。

臨床検査：腫瘍の皮膚面より穿刺・吸引を行い，角質物を含む赤褐色の漿液（約10cc）を採取した。

臨床診断：以上の臨床所見から側頸嚢胞と診断し手術施行までの期間（約2カ月）経過観察とした。

画 像 診 断

1. CT 所見（図1）

左側耳下腺下極から舌骨付近にかけて3.5cm×4cm×5cm程度のsoft tissue density massを認める。Massは左側顎下腺を前方へ，左側

九州大学歯学部歯科放射線学教室（主任：神田重信教授）

* 九州大学歯学部口腔外科学第一教室（主任：田代英雄教授）

〔1993年10月7日受付〕

a ; 横断像

舌骨体後外方に突出した大きな soft tissue density mass を認める。Mass の内部には low density area が広がっている。Mass 前方に接して顎下腺を認める。Mass 内方に存在する頸動・静脈との境界は明瞭でない。

H : 舌骨, SG : 顎下腺, SCM : 胸鎖乳突筋, M : 腫瘍

b ; 前額断像

Soft tissue density mass は左耳下腺下内方に存在し、耳下腺を外方へ圧排している。

PG : 耳下腺, SG : 顎下腺, M : 腫瘍

図 1 C T 像

耳下腺を外方へ圧排し、胸鎖乳突筋の内方まで及んでいる。Mass の形態は西洋梨状でありその境界は比較的明瞭であるが、mass が密接した耳下腺下極と胸鎖乳突筋前縁部の一部で不明瞭である。また、左側頸動脈の内方への圧排を認める。

Mass の内部性状はその形状にそって不規則な厚みをもった帯状構造 (CT value ; 20-30 H. U.) とその内側でやや density が低い比較的均質な領域 (CT value ; 10-20 H. U.) との二層構造を呈している。また、mass のほぼ中央部に見られた一層の索状構造像は一塊の mass の内部構造物か二塊の mass の接触界面かの判別は困難である。Mass が近接する舌骨体には著変を認めない。

約2か月を経て mass は著明に増大し、それに伴って内部の lower density area がやや拡大した。また、mass の周辺組織への圧排はより顕著となった。CT 所見では耳下腺由来もしくはリンパ節由来の腫瘍が考えられた。

2. US 所見 (図2)

左側耳介下部の皮下に約 30mm×30mm×35mm の楕円形の huge mass とその上方に密接した径約20mm の類球形の mass を認める。2個の mass とともに耳下腺下極と胸鎖乳突筋との間に

存在し、小さい方の mass は耳下腺下極内側に位置している。Huge mass の一部が胸鎖乳突筋の内側に突出している所見が得られたが、この部分が mass 本体の一部であるか別個の mass が密接しているのかは不明である。Mass は頸動脈と密接しているが、圧排は認めず頸静脈との関係は不明である。

Mass の境界は明瞭でありその辺縁は比較的 smooth である。また、内部エコーは不均一であり、その大部分を占める echogenic structure のなかに地図状に入り組んだ anechoic structure を認める。Mass の深側には比較的強い底面エコーを認め、その深方でのエコー増強は軽微である。

約2か月を経て mass は増大し、huge mass の内部に認められた anechoic area が著明に拡大した。

3. 唾液腺造影所見 (図3)

左側耳下腺体は外側方へ圧排されているが、Stensen 管および腺内主管に著変は認められない。一次・二次導管および末梢導管には管径の軽度の拡張を認めるが、導管の断絶や造影剤の漏洩は認められない。全体的に導管および腺系の描出は良好である。

左側顎下腺体は前方に圧排されているが、

a ; 横断像

下顎下縁にほぼ平行な断層像である。Huge mass が胸鎖乳突筋内側にまで及んでいる。一部が突出したようにみられる像は別個の mass が密接していると考えられる。Mass の内部は不均一であり anechoic area が地図状に広がっている。

SG : 顎下腺, SCM : 胸鎖乳突筋, M : 腫瘤

b ; 縦断像

下顎後縁にほぼ平行な断層像である。Mass の上部は耳下腺下極内方に存在し、深方は後下顎静脈に近接している。

PG : 耳下腺, RMV : 後下顎静脈, M : 腫瘤, SCM : 胸鎖乳突筋

図 2 超音波断層像

Wharton 管, 腺内主管および末梢導管系などの導管系と腺系には著変は認められない。

4. 総合画像診断

正常パターンを呈した左側耳下腺および顎下腺への圧排所見によって mass は大唾液腺外に存在することが示唆される。また, CT 値などから mass の内部は外縁に沿って広がる充実性の部分とその内方に不規則に広がる液状成分を有する領域との混在が考えられる。

また, Mass の経時的な増大による内部性状パターンの変化から内部組織の変性が推察できた。

以上のことから mass は単なる嚢胞ではなく内部に変性が進行した腫瘍または類似腫瘍と考えられる。そこで, 抗生物質に対する反応や比較的急速な増大傾向なども考慮して第一義的に悪性腫瘍と診断した。

手術所見

腫瘤の摘出および左頸部郭清術が施行された。

腫瘤は広頸筋と癒着し嚢胞状を呈し、壁の一部の迅速切片において squamous cell carcinoma と診断されたので、頸部郭清術を施行した。胸骨および舌骨筋の高さで胸鎖乳突筋と内頸静脈を結紮切断し、通法に従って上方へと郭清を進めた。腫瘍の本体は頸動脈分岐部よりやや上方にあり内頸静脈・外頸動脈・顎二腹筋に癒着していた。また、副神経・舌下神経は腫瘍に含まれていたため切除した。咽頭より上方には癌病巣らしき所見は認められなかった (図4)。

病理所見

病巣は角化傾向が強い高分化型の扁平上皮癌細胞の浸潤増生から成り、中心部は融解壊死が著しく嚢胞状を呈している。しかし、嚢胞の所見はなく、本病巣が嚢胞壁の癌化あるいは転移巣かについては明らかではない (図5)。

病理組織診断 : Squamous cell carcinoma (well-differentiated type)

図3 唾液腺造影像

耳下腺・顎下腺の導管系には著変を認めない。
顎下腺の腺房が前方へ圧排されている(▼印)。
PG: 耳下腺, SG: 顎下腺

図4 摘出標本

SG: 顎下腺, M: 腫瘍本体, C: 腫瘍内腔

a; ×35

b; ×70

図5 病理組織像 (H.E. 染色)

治療

腫瘍摘出および左頸部郭清術を施行した後、放射線外照射および化学療法を実施した。同時に耳鼻咽喉領域において原発巣の精査を行ったが確認できなかった。

術後経過

術後1年3か月間経過観察をしていたが、胸痛の出現で肺転移が確認され、まもなく呼吸不全によって死亡した。

考察

1. CT 診断について

腫瘍性病変に対するCT診断では発現部位に関係なく腫瘍の存在を確認できるだけではなく、腫瘍と周囲構造との関係や腫瘍の辺縁・内部の性状評価も客観的に行うことができる^{6,8,9)}。本症例のCT像は病変(腫瘍)のvolumeが大きく広範囲にROIの設定を行うことによって病変自体の内部性状を詳細に捉えることができた。一般にwater density levelにおけるCT値は0-20(H. U.)程度であり液成分の粘度の差や含有物

の有無によってその値は20 (H. U.) 程変動する。そのため、関心領域内の CT 値が30 (H. U.) 前後の組織では充実性か液性かを判断することが困難である。本症例では腫瘍が外周を取り囲むような形の二層構造を呈し両構造ともに CT 値が30 (H. U.) 前後かそれより低い値を示したが、いずれの断層域においても内側組織の CT 値が外側組織のそれより低い傾向を示したために内側構造を液状成分を主体とした組織とし、これと境界を有する外周構造を充実性組織とした。また、この腫瘍は厚い壁を有する嚢胞が中心部から液状変性（壊死）を起こした充実性腫瘍が類推できたが、外側構造はかなり不均等な厚みを呈しており嚢胞壁の可能性は低かった。

我々は CT における唾液腺腫瘍の悪性鑑別診断基準を設定し、耳下腺腫瘍に対して1) 腫瘍の辺縁が浸潤性であること、2) 腫瘍内部に CT 値が15H. U. 以下の low density area が見られその割合が腫瘍体積の20%以上であることとした。この基準を唾液腺以外の悪性腫瘍にも準拠させて検討した。本症例は耳下腺下極および胸鎖乳突筋前縁との境界が一部不明瞭であり、この部分で周囲への浸潤が考えられ、low density area の平均 CT 値は15H. U. 以下であり、その volume も腫瘍全体の50%以上を占めていた。以上の所見は診断基準を充し悪性と診断できた。

そこで、最終的な CT 診断は内部変性を伴った悪性腫瘍として、耳下腺下極末梢部から出現した唾液腺腫瘍あるいはリンパ節腫瘍（原発性あるいは転移性）が考えられた。

2. 超音波診断について

近年、超音波診断における診断基準が各種臓器ごとに決定されつつあるが、頭頸部領域では確立されていない。通常の診断法では病変の形態、境界、辺縁、内部エコー、底面および後方エコー、縦横比に関してその描出パターンからその良性、悪性を分類している^{4,5,7,8)}。

そこで、我々はこれらのサインの中で腫瘍性病変の良悪性に関する重要な鑑別サインは「辺縁」、「内部エコー」、「後方エコー」の所見と考えた。一般に良性腫瘍は「辺縁＝整、内部エコー＝均一、後方エコー＝増強」、悪性腫瘍は「辺縁＝不整、内部エコー＝不均一、後方エコー＝減弱」を基本的

所見としている文献が多い。これらのサインは腫瘍の存在部位や大きさの違いによってそれぞれ比重を持たせて解釈する必要がある。また、副次的に「形状」などの所見を加味する。これらは唾液腺腫瘍や頸部リンパ節腫瘍などに特異的なサインではないが、多数の乳腺・甲状腺腫瘍において病理組織学的に良悪性が裏付けられているために表在性腫瘍には適用しやすい。そこで、我々は唾液腺腫瘍像の「内部エコー」について均一性と共に内部音響陰影の有無について詳細に検討し、内部が不均一で音響陰影を認めた像はすべて悪性であることを確認した。この所見は唾液腺以外の表在性腫瘍についても適用できると考えられる。本症例の内部エコーは中央部の最大断層域で比較的強い反射をもった領域（echogenic area）とその内部に細かに入り組んだ殆ど反射を認めない領域（anechoic area）から成り、これらの2つの領域はほぼ明瞭に境界されていた。また、腫瘍像内部に一部弱い音響陰影を認めた。

以上のことから本症例は充実性構造の内部に変性を有した腫瘍と考えられ、CT と同様に悪性腫瘍と考えられた。

3. 唾液腺造影診断について

造影は非イオン系造影剤を使用して耳下腺と顎下腺を同時に実施した。この造影では病変と腺体との相互関係の把握を主目的として、腫瘍性病変が腺内に存在するか腺外に存在するかを導管系の走行（位置異常や断裂の有無）によって診断する。また、造影剤の注入量を増量することによって腺系自体の輪郭を描出して外圧による腺体の変形を確認する。そこで、腺の管系・腺系には異常を認めず、外方からの圧排のみを認めた場合には腺外腫瘍の可能性が大きい。一方、腺内腫瘍は一般に導管系が取り巻く様相を呈するといわれているが、実際にはその発生部位によって診断が困難なことがある。特に腺組織の末梢部から発生して外方へ突出した腫瘍性病変の造影像から腺外腫瘍を示唆する所見を得ることがある。以上のことから本病変は耳下腺、顎下腺の外方に存在する腺外腫瘍と考えられた。

4. 総合画像診断について

顎顔面領域における腫瘍性病変の画像診断ではその病変の良・悪性の判定をどのような基準で行

うかが最大の主眼点である。そこで、CT や超音波検査（大唾液腺との関連を考える場合には唾液腺造影検査）などが選択される。このうち、病変の存在範囲や形状の把握には CT が最も優れた modality と考えられる。一方、病変内部性状診断では超音波像が優れている。現在、良・悪性病変の確立した診断基準は得られていないが、その最も確な判断材料を提供すると思われる病変の内部性状を組織性状診断へ結びつけることが急務である。その点でまず超音波像を客観的に詳細に検討しその判別点を見いだすことが必要である。

結 語

今回、著明に腫大した頸部皮下腫瘍性病変に種々の画像診断法を施行することによって、病変の性状や周囲組織との関係を明かにすることができた。

最近、医療における診断画像は医療検査機器の発達によって組織構造の特徴をより詳細に描出することができるようになった。それに伴って、画像を総合的に診断する能力にも多角的な判断力が要求されるようになった。そこで、個々の検査方法（Computed tomography, Ultrasonography, Magnetic resonance imaging, Contrast radiography）における画像の特色を生かしつつその診断基準を深く追求していく必要がある。それと同時に同一組織構造に対して描出された画像を相互に照合してそれぞれの画像構築の理論的裏付けを踏まえて病変の組織性状診断へと向上していくことが肝要である。

稿を終えるにあたり、本症例の画像および組織標本作成に御協力いただきました九州大学歯学部歯科放射線科診療放射線技師、同学部口腔外科学第一教室のスタッフの皆様は心より感謝いたします。

文 献

- 1) Chodosh, P.L., Silbey, R., et al.: Diagnostic use of ultrasound in diseases of the head and neck. *Laryngoscope* 90: 814-821, 1980.
- 2) Carter, B.L.: Computed tomographic scanning in head and neck tumors. *Otolaryngol Clin North Am* 13: 449-457, 1980.
- 3) Balso, A.M., Williams, E., et al.: Parotid masses: Current modes of diagnostic imaging. *Oral Surg* 54: 360-364, 1982.
- 4) 畔田 貢: 頭頸部領域における超音波断層像の診断学的研究. *日口外誌* 29: 2181-2200, 1983.
- 5) Ishikawa, H., Ishii, Y., et al.: Evaluation of gray scale ultrasonography in the investigation of oral and neck mass lesions. *J Oral Maxillofac Surg* 41: 775-781, 1983.
- 6) Mooyart, E.L., Panders, A.K., et al.: CT scanning of tumor in or near the parotid or submandibular glands. A comparison with conventional sialography. *Diag Imag Clin Med* 53: 177-181, 1984.
- 7) 石井純一: 口腔外科領域の超音波診断に関する臨床的研究. *日病誌* 54: 129-155, 1987.
- 8) Yoshimura, Y., Oka, M., et al.: Imaging evaluation of several diseases of the salivary glands and surrounding structures: A preliminary report on sialographic, computed tomographic, ultrasonographic, and scintigraphic findings. *J Osaka Univ Dent Sch* 27: 123-145, 1987.
- 9) 湯浅賢治, 神田重信: 耳下腺部腫瘍の CT 診断. *口腔腫瘍* 3: 107, 1991.

A case of squamous-cell carcinoma with a suspected cervical cyst

Kunihiro Miwa, Osamu Tabata, Kenji Yuasa, Shigenobu Kanda,
Yoshinori Higuchi* and Masamichi Ohishi*

Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Kyushu University
(Chief: Prof. Shigenobu KANDA)

*First Department of Oral Surgery, Faculty of Dentistry, Kyushu University
(Chief: Prof. Hideo TASHIRO)

Abstract

A case of a cervical subcutaneous mass lesion, clinically diagnosed as a cyst, was studied using some imaging modalities, such as computed tomography (CT), ultrasonography (US), and sialography (SL). The CT and SL images informed us how the lesion had become enlarged in the major salivary glands and the surrounding tissues. The US images informed us how the internal structures of the lesion had been formed. Therefore, we were suspected that the lesion was extrinsic to the major salivary glands, and that it might be diagnosed as a malignant tumor. Thereafter, a histological diagnosis revealed a squamous-cell carcinoma.

Key words: cervical mass, imaging diagnosis, squamous-cell carcinoma

Requests for reprints to: Dr. Miwa K.
Dept. of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Kyushu University, 3-1-1, Maidashi,
Higashi-ku, Fukuoka, 812. Japan