後咽頭隙内腫瘍性病変に対する CT ガイド下

Fine-Needle Aspiration Biopsy の経験

木 村 幸 紀 関 健 次 岡 野 友 宏

要旨：近年の CT ガイド下 fine needle aspiration (FNA) biopsy の進歩が、頭頸部癌患者の治療計画に役立っている。甲状腺癌の頸部リンパ節後発転移を伴った下顎歯肉癌症例の後咽頭隙内に腫瘍がみられた。甲状腺癌のルビエールリンパ節転移が疑われ、確認のため、CT ガイド下 FNA 生検を retromandibular approach で行なった。細胞診断では転移は否定された。その後の経過は良好で、本検査の結果とは矛盾しなかった。よって、本術式を用いたことにより他の方法では不可能な後咽頭隙リンパ節の生検を可能にした。

キーワード：CT ガイド下針生検，吸引生検，頭頸部癌，咽頭後リンパ節，転移

緒 言

画像診断の進歩により、CT や US (超音波) などによる画像ガイド下に胸腹腔穿刺やドレナージなどの外科的処置、抗癌剤投与などが施行されることも今や珍しくない^{1,2)}。さらに、細胞診断学の進歩にともない精度の高い標本採取の技術が必要となり画像ガイド下の針生検の技術は格段に進歩している。今回われわれは、下顎歯肉癌症例に対して行われた頸部郭清術の結果、甲状腺癌のリンパ節転移が判明し、術前から後咽頭隙内に存在していた嚢胞様病変に対して転移を疑い、CT ガイド下で fine needle aspiration biopsy (以下、FNA 生検)を行なう機会を得た。本稿では、その概要を術式を含めて報告する。

症 例

1. CT ガイド下 FNA 生検までの経過

患者は64歳の女性で、⁸臼の抜歯窩治癒不全を主訴に、1992年10月5日に本学第1口腔外科を受診

した。既往歴として1982年に甲状腺癌にて右葉切除を受けていた。口腔内所見では、⁸臼抜歯窩相当部から臼後部におよぶ潰瘍がみられ、パノラマ X線写真では同部にびまん性の骨吸収像がみられた。また、所属リンパ節については、右側上頸部に29×15mm、可動性はあるものの弾性硬のリンパ節を1つ触知した。X線 CT 所見では、下顎歯肉部の腫瘍性病変は描出されず、頸部リンパ節は、右側上頸部に10×8mm、中頸部に8×8mmの類円形、内部は軽度の low density を呈したリンパ節が1つずつ認められ、その他にも長径8mm未満のリンパ節が複数みられた(写真1)。また、甲状腺周囲にはリンパ節は認められず、残存する甲状腺にも異常所見は認められなかった。また、第2頸椎の高さでは右側において、茎状突起の内側で上行咽頭動脈と内頸動脈の間にあり、後方は頸長筋と内頸動脈とに接して、大きさ20×10mm比較的境界明瞭な楕円形の病変が認められた。rim enhancement が軽度にみられ、内部は water density を示していた。したがって、本病変は

写真 1 術前の造影 CT 所見
右側上頸部にみられたリンパ節腫脹 (→)

写真 2 術前の造影 CT 所見
右側後咽頭隙内にみられた嚢胞様病変 (←)
内頸動脈 (↑) 上行咽頭動脈 (↓)
茎状突起 (↩)

後咽頭隙内に生じた嚢胞様病変と画像診断を下した(写真2)。下顎歯肉高分化型扁平上皮癌(T2-N1M0)診断のもとに右側下顎部に合計38Gyの術前外照射ののち、同年11月25日に右側下顎骨区域切除ならびに上顎骨部分切除および口峽部合併切除による一塊(en bloc)腫瘍摘出術、根治的頸部郭清術および遊離前腕皮弁とチタンプレートによる口腔と下顎の再建術が施行された。術後、移植皮弁の全部壊死を生じ口腔内に開放創を生じたが、術後8週目に閉創した。この間に、頸部リンパ節転移は扁平上皮癌ではなく甲状腺癌の転移(上頸部1, 中頸部1, 下頸部3個)であることが病理組織学的に確認された。翌年1月21日に術後1回目のCT検査を行なったところ、原発腫瘍再発の所見はみられなかった。一方、術前に嚢胞と画像診断された後咽頭隙内の嚢胞様病変については、術前のCT所見と比較して著変はないも

写真 3 術後の造影 CT 所見
明瞭な rim enhancement がみられた嚢胞様病変 (←)

のの上述の病理報告から甲状腺癌転移巣の嚢胞変性との疑いが強く持たれた(写真3)。そこで、同日、引きつづいてCTガイド下でのFNA生検術が同病変に対して計画された。

2. CT ガイド下 FNA 生検術

本検査は、表1に示したようにCTガイド下FNAの標準的な術式³⁾で進め、穿刺生検用針にはクリエートメディック社製TSK Surecut®(21G, 50mm)³⁾を使用した(写真4)。1回目の穿刺では、嚢胞壁に生検針が接する位置までCTガイド下で誘導し、その位置からSurecut®の針先の機構³⁾を利用して嚢胞壁からの標本採取を試みたが適切な標本が得られなかった。したがって、2回目の穿刺では嚢胞内部まで生検針をCTガイド下で誘導し、嚢胞内容物の採取を試みた(写真5)。

その結果、淡黄色の漿液性内容物が約1cc得られ、細胞診ではClass IIIで、甲状腺乳頭癌細胞は認められなかった(写真6)。したがって、患者は原発巣とともに後咽頭隙内病変も定期的に予後観察されることになった。本検査から4か月経過した時点のCT像でも穿刺によると思われる変形を認めるものの増大傾向は認められず(写真7)、約1年が経過した現在も臨床的に著変は認められなかった。

考 察

FNA生検は、今やルーチンに行われている検査であり、最近では画像ガイドの下に深部臓器にも頻繁にかつ安全に応用されている。頭頸部領域

表 1 CTガイド下針生検法の手順

1. 穿刺部位の決定
 - 1) 耳下腺皮膚面に数本のマーカー（21G注射針 1 シート）を頭尾側方向に貼付
 - 2) 頭蓋底部から上頸部までの軸位方向の造影スキャンニングを施行
 - 3) 後咽頭隙内の病変を最もよく描出したスライス面を 1 つ選択
 - 4) 画面で皮膚面に垂直に刺入した病変に達しうる部位を決定：上下的位置の決定（どのマーカーから何 mm 上または下か）
 - 5) マーカーを除去して、その位置を通る水平線を皮膚にマーキング
 - 6) テーブルを移動し、皮膚面に目標のスライス面を positioning light で表示：前後（頭尾側）的位置の決定
 - 7) 2 つの線の交点を決定し皮膚面にマーキング：刺入点の決定終了
2. 穿刺生検針（TSK Surecut 針®）の刺入
 - 1) 皮膚面を消毒し、局所麻酔を施行後、刺入点の皮膚に小切開を入れる。
 - 2) 刺入点（切開部）で、TSK Surecut 針®を皮膚に垂直に浅く穿刺
 - 3) 刺入点付近の造影スキャンを施行
 - 4) 針先の位置を確認し、方向の妥当性を検討：方向修正あるいは再刺入
 - 5) 針先から病変表層までの距離を算出
 - 6) 生検針にその距離を示すマークを記入
 - 7) 生検針をマークまで深部へ向かって刺入
 - 8) 刺入点付近の造影スキャンを施行
 - 9) 針先が病変の表面（あるいは内部）に正確に位置したかどうかを確認
 - 10) 生検針の機構による標本の採取
 - 11) 生検標本として検査に提出
 - 12) 生検針の抜去
 - 13) 止血の確認～針生検術の終了

でも応用されており、われわれの施設においても頸部の病変に対し少数だが経験している³⁾。今回、われわれは、後咽頭隙内の腫瘍性病変に対して CT ガイド下 FNA 生検を経験した。以下、症例に関する特徴と本術式から得られた知見について述べる。

自験例の特徴としては、甲状腺乳頭癌の頸部リンパ節転移を伴った下顎歯肉癌症例で、術前 CT 検査で既に患側の後咽頭隙内に嚢胞様病変の存在を認めていたことがあげられる。本病変に対して

写真 4 生検針

上：TSK Surecut®（18G，50mm）

中：TSK Surecut®（21G，50mm）

下：TSK Surecut®（21G，70mm）

写真 5 造影 CT 下 FNA 生検（2回目）
嚢胞様病変内に生検針を留置

写真 6 内容物の細胞診所見（×200）

膨大したマクロファージが散見され、嚢胞性疾患が示唆される。

術前は単なる嚢胞ないし嚢胞様変性した良性病変と画像診断していた。しかし、頸部郭清術の結果から下頸部のみならず上頸部リンパ節にも甲状腺癌の転移が認められたため、にわかに本病変も転

写真 7 造影 CT 所見 (検査後4か月)。
変形しながらも残存する嚢胞様病変 (←)。

移との疑いが濃くなった。すなわち本病変が位置する後咽頭隙内には、いわゆる Rouviere のリンパ節⁴⁾が存在するため同リンパ節への転移が疑われた。よって、病変の摘出術を行なう前に FNA 生検を施行し、その結果をみながら摘出術を再考することになった。また、FNA 生検の施行に際しては、自験例では術後の瘢痕拘縮による開口障害を生じていたため、後咽頭隙内病変に対する口腔内からのアプローチは困難であり口腔外からが適当と思われた。しかし、口腔外アプローチでは CT 像 (写真5) で示したように retromandibular approach すなわち再建用プレート⁵⁾の後縁と茎状突起の狭い間隙を通過させ、かつ病変部に隣接する内頸動脈を避けながら正確に病変に到達しなければならない。このような高度な術式を実行するには、術者の勘のみに頼る従来のブラインド法では困難である。そこで、FNA 生検は画像ガイド下で施行されることになった。

画像ガイド下生検法が発達した現在では頭頸部領域においても CT ガイド下^{5,6)}のほかに MR 下⁷⁾でも行なわれているが、超音波下が最も簡便であることなどを理由に実施頻度が高い⁸⁾。しかし、本症例では下顎再建用金属プレートが用いられていたため超音波ガイドではアーチファクトを生じると予想された。また、MR ガイド下では FNA 生検針は MR 用の針を必要とし、やはり下顎再建用金属プレートによる金属アーチファクトが著しく生じて画像ガイドが得られないと判断したため CT ガイド下による方法を選択した。また、画像ガイド下での FNA 生検針の位置決め

方法には、tandem technique と coaxial technique⁹⁾があるが今回の穿刺は狭い通過経路と小さな病変に対して行うため、穿刺が一度で済む後者の術式が、適当と考え、この方法を一つの道具で簡便にできるように考案された TSK Surecut 針[®]を用いて実施した。この FNA 生検針は侵襲性の低い二重針構造を持ち、テーパーポイントの内針が臓器内の目標部位まで中間組織をコアリングすることなく外針を誘導し、この内針を引くと陰圧が生じて外針によって円筒状にカットされた組織が針管内に採取されるという機構を持つ³⁾。このため、深部に位置する後咽頭隙内まで、内頸動脈など重要臓器を避けながら、できる限り非侵襲的に生検針を刺入する必要のあった自験例のような場合では特に有用な FNA 生検針と考えられる。

今回われわれは上記の生検針を CT ガイド下で誘導することにより的確にしかも比較的容易に後咽頭隙内の病変に誘導することに成功した。その術中の感触で特筆すべきこととして、画像ガイド下で得られた方向と深さにて茎状突起が針先であたかも骨に衝突するかの如く触知できたことがあげられる。これにより、内頸静脈の方向に向かわずにすみ、また、茎状突起の上縁に接しながら針を進められたため再び下方へ向いて内頸動脈に当たることも避けられ病変に正確に到達することができた。retromandibular approach では、このように茎状突起が合併症を防止するうえで重要な存在となる¹⁰⁾。生検針が病変に到達したあとは前述したように2度の穿刺生検をやはり画像で得られた作業長(病変の大きさ)を考えて施行した。病変が嚢胞様構造であったためと思われるが、穿刺吸引では充実性組織が得られず嚢胞内容液が得られたのみであった。しかし、甲状腺乳頭癌の細胞は特徴的で細胞診断は比較的容易とされている¹¹⁾ことから細胞診用として提出した。その結果では腫瘍細胞は認められず、今回の検索では甲状腺乳頭癌の転移の証拠は得られなかった。しかし後咽頭隙内に嚢胞が発生することは極めて稀である¹²⁾。一方で、甲状腺乳頭癌のリンパ節転移では嚢胞様変性を生じることが多い¹³⁻¹⁶⁾。CT 像および細胞診の結果から Rouviere のリンパ節に生じた単純性リンパ節炎が最も考えられるが、甲状腺

乳頭癌の転移の可能性は完全には否定できない。したがって、われわれとしては今後の経過観察の中で再度 CT ガイド下 FNA 生検法を施行すべきであろうと考えている。

結 語

今回われわれは、下顎歯肉癌症例の後咽頭隙内にみられた嚢胞様病変に対して、口腔外アプローチの retromandibular approach による FNA 生検を CT ガイド下で実施した。本検査は、甲状腺乳頭癌の Rouviere リンパ節転移が疑われた上でのものであった。本術式は難度が高いと思われたが、CT ガイド下で実施したため確実に病変から生検材料が採取でき、それを画像上でも確認できた。生検材料の細胞診断の結果では甲状腺乳頭癌の転移の所見は得られなかったが、本検査は自験例に非常に有用であったと思われた。

文 献

- 1) 平松京一 編集：Interventional Radiology 手技の実際と適応。画像診断別冊 11，秀潤社，東京，1992。
- 2) 林 信成：超音波・CT ガイド下穿刺術＝生検からドレナージまで IVR の実際＝。金芳堂，京都，1990，61-104。
- 3) 木村幸紀，関 健次，他：CT ガイド下針生検が有効であった上内深頸部リンパ節腫脹の一例。歯放 33：10-17，1993。
- 4) Rouviere, H.: Anatomy of the human lymphatic system. English edition Edwards Brothers, Inc. Ann Arbor, Michigan, 1938, 16-18。
- 5) Ljung, B.M.E., Larsson, S.G. et al.: Computed tomography-guided aspiration cytologic examination in head and neck lesions. Arch Otolaryngol 110: 604-607, 1984。
- 6) Abemayor, E., Ljung, B.M. et al.: CT-directed fine-needle aspiration biopsies of masses in the head and neck. Laryngoscope 95: 1382-1386, 1985。
- 7) Duckwiler, D., Lufkin, R.B. et al.: Head and neck lesions: MR-guided aspiration biopsy. Radiology 170: 519-522, 1989。
- 8) 林崎勝武，角原滋子，他：頸部腫瘍の穿刺吸引細胞診；唾液腺腫瘍。耳喉頭頸 64: 265-269, 1992。
- 9) Robbins, K.T., van Sonnenberg, E. et al.: Imaged-guided needle biopsy of inaccessible head and neck lesions. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 116: 957-961, 1990。
- 10) Gatenby, R.A., Mulhern, C.B. et al.: CT-guided percutaneous biopsies of head and neck masses. Radiology 146: 717-719, 1983。
- 11) 高橋久昭，河西信勝：頸部腫瘍の穿刺吸引細胞診；甲状腺腫瘍の穿刺吸引細胞診。耳喉頭頸 64: 259-263, 1992。
- 12) Davis, W.L., Harnsberger, H.L. et al.: Retropharyngeal space: Evaluation of normal anatomy and diseases with CT and MR imaging. Radiology 174: 59-64, 1990。
- 13) 山田弘之，竹内理子，他：興味ある超音波像を呈した甲状腺癌の 1 例。耳喉頭頸 60: 381-386, 1988。
- 14) 桐山 健，吉賀浩二，他：オトガイ下部の嚢胞性疾患を思わせた甲状腺癌の転移の 1 例。癌の臨床 38: 582-588, 1992。
- 15) 宇野芳史，齊藤龍介，他：副咽頭間隙腫瘍を呈した甲状腺乳頭癌。耳鼻臨床 84: 77-81, 1991。
- 16) 河西信勝：甲状腺切除のテクニックと患者管理。医学書院，東京，1987，23-27。

A case of CT-guided fine-needle aspiration biopsy for a mass lesion in the retropharyngeal space

Yukinori Kimura, Kenji Seki, and Tomohiro Okano

Department of Oral Radiology, Showa University School of Dentistry

(Chief: Prof. Tomohiro OKANO)

Abstract

Treatment planning of head and neck cancer patients has been assisted in recent years by the development of fine-needle aspiration (FNA) biopsy guided by computed tomography (CT). A case of lower gingival carcinoma with late cervical metastasis of thyroid cancer showed a mass lesion in the retropharyngeal space. The lesion was suspected of metastasizing the thyroid cancer to Rouviere's node. To verify the metastasis, CT-guided FNA biopsy was performed by means of a retromandibular approach. Cytological diagnosis was negative for metastasis, and the result was not inconsistent with the prognosis. The technique used here allows biopsy of the retropharyngeal node in cases where it may otherwise not be accessible.

Key words : fine-needle aspiration biopsy, CT guided needle biopsy, head and neck cancer, retropharyngeal lymphnode, metastasis.

Requests for reprints to: Dr. Kimura, Y., Department of Oral Radiology, Showa University School of Dentistry, 2-1-1, Kitasenzoku, Ohta-ku, Tokyo, 192 Japan