症 例

他部位から口腔領域へ転移した悪性腫瘍の 2 症例

伊 藤 竜 男 山 田 健 久 林 康 司
藤 内 祝 上 田 実 岡 崎 恭 宏*
山 田 祐 敬**

要旨：頭頸部以外に原発した悪性腫瘍が口腔領域に転移したものは比較的まれである。今回、口腔領域に転移した悪性腫瘍の症例を 2 例経験したので報告した。

症例 1 は左頬部の腫脹を主訴に当科来院した 84 歳の女性である。口腔内病変部の生検の結果は腺癌であった。患者は約 10 年以上前に左乳房腺癌の既往を有し、病理組織学的検討などより、乳癌の口腔内への転移と診断した。

症例 2 は左頬部から顎下部にかけての腫脹と疼痛が主訴の 71 歳の男性である。臨床診断は下顎歯肉癌で、生検の結果は大細胞癌であった。レントゲン、CT、喀痰細胞診より肺の大細胞癌が疑われ、肺癌の口腔内への転移と診断した。

キーワード：口腔転移性腫瘍、乳癌、肺癌

緒 言

口腔領域への転移性悪性腫瘍は比較的まれであり、口腔領域の悪性腫瘍の中で、転移性のものは 1～2% である¹⁻³⁾。今回われわれは、乳房および肺から口腔領域へ転移したと思われる悪性腫瘍を 2 例経験したので、若干の考察を加えて報告する。

症 例 1

患者：84 歳、女性。

初診：1994 年 6 月 2 日。

主訴：左頬部の腫脹。

既往歴：1982 年 10 月 1 日、左乳癌診断下にて当院外科で左乳房切除術を施行された。1994 年 2 月 24 日、子宮体癌診断下にて当院産婦人科で子宮体及び両側付属器の摘出術と、乳癌からの転移である腹部皮下腫瘍の摘出術を施行された。

家族歴：特記事項なし。

現病歴：当院初診の 3 日前、左頬部の腫脹を自

覚したため近医を受診した。同医の紹介により 6 月 1 日、市立岡崎病院歯科口腔外科を受診し、左上顎歯肉頬移行部の生検を施行された。その後患者の都合にて、翌日当科を受診した。

現症：口腔外所見としては、左頬部から左上顎部にかけてのびまん性の腫脹が認められた。顔面皮膚の麻痺等は認められなかった。

口腔内所見としては、左上顎歯肉頬移行部に、3×2×2 cm 大の硬結を伴った境界不明瞭なびまん性の腫脹が認められた。所属リンパ節所見としては、左顎下部に小豆大で弾性硬、可動性のリンパ節を 1 個触知し、圧痛が認められた。

X 線所見：パノラマ X 線写真で左上顎洞外側下縁の不連続性が一部に認められた。ウォーターズ法で左上顎洞のびまん性不透過像と、頬骨弓の骨吸収像を認めた（写真 1）。CT、MRI では、左頬骨と左上顎洞の前壁および後壁の骨破壊を有する 5 cm 大の腫瘍が認められた（写真 2）。

処置および経過：1994 年 6 月 2 日、当科入院後、

名古屋大学医学部口腔外科学講座（主任：上田 実教授）

* 刈谷総合病院歯科口腔外科（主任：西原幸治部長）

** 市立岡崎病院口腔外科（主任：山田祐敬部長）

〔1995 年 6 月 29 日受付，1995 年 10 月 14 日受理〕

図1 初診時X線写真(ウォーターズ法)
左頬骨弓の消失が認められる

図2 初診時MRI
左上顎に骨破壊を有する腫瘍が認められる

市立岡崎病院歯科口腔外科での生検の結果が腺癌と判明した。既往の乳癌の病理組織学的標本と比較検討した結果、乳癌の頬骨部への転移と診断した。また全身の各種検査の結果、頬骨以外にも肺に転移が認められた。転移、患者の年齢、および患者の希望などから、積極的な治療は困難と判断し7月7日退院とした。その後当院外科にて姑息的化学療法(5-FU)と、消炎鎮痛剤による対症療法を現在まで行い、腫瘍は存在するも病状に著

変は認められず、存命中である。

病理組織学的所見：口腔内から得た生検材料の組織像では類円形の核をもち、N/C比の増大した腫瘍細胞が胞巣状、充実性に増生、浸潤を示していた(写真3-1)。また、既往の乳癌の組織像もほぼ円形のクロマチンに富んだ核を有する細胞からなり、豊富な線維性間質を伴い、小胞巣を作って増生、浸潤している像がみられ、口腔内のものと類似の像を呈していた。病理組織学的には充実腺管癌であった(写真3-2)。

症 例 2

患者：71歳、男性。

初診：1994年8月31日。

主訴：左側頬部から顎下部にかけての腫脹と疼痛。

既往歴：1941年に虫垂炎の手術。

家族歴：特記事項なし。

現病歴：1994年7月頃、左下顎歯肉部の腫脹と疼痛に気付くも放置していた。8月に入り、徐々に疼痛が増大し、下顎部から頬部まで腫脹が増大したため近歯科を受診し、紹介により8月31日刈谷総合病院歯科口腔外科を受診、入院となった。

現症：口腔外所見では、顎下部から左頬部にかけてびまん性の腫脹が認められた。口腔内所見としては[4]～[7]相当部の歯槽頂から歯肉頰移行部に5×5cm程の表面粗造な有茎性の腫瘍が認められた(写真4)。所属リンパ節所見としては、顎下部に大豆大1個、小指頭大1個の弾性硬、固着性のリンパ節が触知された。

X線所見：パノラマX線写真では[6]の根尖部に比較的境界明瞭なX線透過像が認められた。CTにて左側下顎骨外側に5cm大の腫瘍が認められたが、下顎骨吸収は著明ではなかった(写真5)。また、左顎下部に転移と思われるリンパ節の腫脹も認められた。胸部X線では右肺中葉にほぼ円形のX線不透過像が認められ(写真6)、胸部CTの結果、直径7～8cm程の腫瘍が認められた(写真7)。

処置及び経過：8月31日刈谷総合病院歯科口腔外科に入院後、左下顎歯肉部の生検を施行した結果、大細胞癌の診断を得た。また全身検索の結果、肺に腫瘍性病変が疑われ、喀痰細胞診を施行し、

写真 3-1 頬腺癌の病理組織像
(H-E 染色, ×200)

写真 3-2 乳房腺癌の病理組織像
(H-E 染色, ×200)

図 4 初診時口腔内病態写真
口腔内に表面粗造な有茎性の腫瘍が認められる

大細胞癌の診断が得られた。その結果から、口腔内の病変は肺よりの転移と考えられた。治療としては THP-ADM, CDDP, CPM, を 1 クールとする化学療法を 2 クール行い、疼痛に対しては対症的に鎮痛剤の投与を行ったが、その後全身状態の悪化のため、1995年1月19日不幸な転帰をとった。

生検の病理組織学的所見：大型の核小体を 1 ～ 数個有し著明なクロマチンの増量を見る類円形～不整形の核と、好塩基性の胞体を有する異型上皮細胞が一部合胞体化して増生した未分化な大細胞癌の像を呈していた（写真 8）。喀痰細胞診でも

図 5 初診時 CT 像
左下顎骨外側に 5 cm 大の腫瘍が認められる

同様の異型細胞を認め、大細胞癌と診断された。

考 察

悪性腫瘍が口腔領域に転移する頻度は、1 ～ 2 % であると言われている¹⁻³⁾。口腔悪性腫瘍が転

図 6 初診時胸部X線写真
右肺中葉にX線不透過像が認められる

図 7 初診時胸部 CT 像
右肺中葉に直径 7～8 cm 大の腫瘍が認められる

図 8 下顎歯肉大細胞癌の病理組織像

移行性腫瘍かどうかの判定基準として、Meyer & Shklar¹⁾ は次の 4 つの条件をあげている。(1) 原発腫瘍が組織学的に確認されること、(2) 口腔転移腫瘍が組織学的に確認されること、(3) 転移腫瘍と原発腫瘍が病理学的に関連があること、(4) 原発腫瘍が転移腫瘍と解剖学的に近接している場合、2 つの腫瘍の間には腫瘍細胞がなく、原発腫瘍にははっきりとした境界があること、と述べている。今回われわれが経験した 2 例について、症例 1 では (1)～(4) まですべて条件を満たしているが、乳癌罹患後 10 年以上も経過しているため一般的には乳癌からの転移とは考えにくい。しかし、乳癌では長期間経過してからも他部位に転移性腫瘍の症状が発現するという報告⁴⁾もある事などから、乳癌の口腔内への転移と診断した。症例 2 では肺の組織診を行っていないが、レントゲン上の臨床診断と細胞診所見から肺の大細胞癌と診断された。また大細胞癌が口腔内に原発する事はきわめてまれ⁵⁾である事から、肺の大細胞癌の口腔内転移と診断した。

転移性口腔悪性腫瘍の原発臓器としては、報告者によって異なるが Meyer ら¹⁾は乳房、腎、肺の順に、Clausen ら⁶⁾や Appenzellen ら⁷⁾は乳房、肺、腎の順に、尾崎ら⁸⁾は肺、乳房、腎の順に多いという報告があり、今回の 2 症例はどちらも原発としては多い部位と言える。また従来言われている口腔への転移部位としては軟組織よりも硬組織の方が多いが、その大半は下顎骨、特に下顎骨体臼歯部であって、今回の症例 1 のように頬骨への転移は比較的少ない。下顎骨の中でも前歯部より臼歯部に多い理由は、臼歯部顎骨は造血組織に富んでいるので、同部への血行性転移をきたしやすいためと考えられている⁹⁾。

また、口腔領域への転移病巣が原発病巣に先立って発見される場合は、尾崎ら⁸⁾によると約 25% とも言われている。一方、口腔内に原発する悪性腫瘍のほとんどは扁平上皮癌であるが、口腔内に転移した悪性腫瘍は圧倒的に腺癌が多いため、口腔領域に腺癌が発現した場合は転移性腫瘍の可能性も十分考慮に入れ、肺、乳房、腎といった全身所見のスクリーニングをも怠らないようにしなければならないと思われる。原発巣より先だって口腔顎下領域に腺系癌が発見された例として、清

水ら¹⁰⁾は甲状腺癌の 1 例を報告しているが、濾胞・乳頭腺癌混合型の診断例であった。他部位から口腔に腫瘍転移した場合の予後は不良とされており、Clausen ら⁹⁾は70%が 1 年以内に、船本ら¹¹⁾、Ellis ら¹²⁾はそのほとんどが数カ月から 1 年以内に死亡すると報告している。これは口腔内転移をした場合、原発腫瘍の存在の有無にかかわらず、そのほとんどに多発転移を認めるためと考えられている。一般的に口腔転移腫瘍において、根治性を望む事は非常に難しく、姑息的な化学療法、放射線療法、外科療法等による姑息的療法と対症療法が、治療の中心となる。今回は症例 1, 2 とも化学療法による姑息的療法と、鎮痛剤の内服による対症療法を行うだけにとどまった。

結 語

今回われわれは乳癌（腺癌）から頬骨へ、及び肺癌（大細胞癌）から下顎歯肉への転移と思われる 2 症例を経験したので、考察を加えて報告した。

文 献

- 1) Meyer, I. and Shklar, G.: Malignant tumors metastatic to mouth and Jaws. *Oral Surg* 20: 350-362, 1965.
- 2) Cash, C.D., Royer, R.Q., et al.: Metastatic tumors of the jaws. *Oral Surg* 14: 897-905,

- 1965.
- 3) Bhasker, S.N.: Malignant tumors of soft tissues. *Synopsis of oral pathology*, 6th ed, Mosby Co., St Louis, 1981, 567.
- 4) Hirshberg, A. and Leibovich, P., et al.: Metastatic tumors to the jaw bones: analysis of 390 cases. *J Oral Pathol Med* 23: 337-341, 1994.
- 5) 小森康雄, 高木澄雄, 他: 肺からの転移による下顎癌の 1 症例. *日口外誌* 26: 1352-1357, 1980.
- 6) Clausen, F. and Poulsen, H.: Metastatic carcinoma to the jaws. *Acta Path Microbiol Scand* 57: 361-374, 1963.
- 7) Appenzeller, J., Weitzner, S., et al.: Hepatocellular carcinoma metastatic to the mandible: report of case and review of literature. *J Oral Surg* 29: 668-671, 1971.
- 8) 尾崎登喜雄, 領家利男, 他: 口腔転移癌（腺癌）の 2 例並びに文献的考察. *日口科誌* 27: 173-185, 1978.
- 9) Bucher, A. and Ramon, Y.: Distant metastasis to the jaws: Report of four cases. *J Oral Surg* 25: 246-249, 1967.
- 10) 清水正嗣, 塩入重彰, 他: 8 年後に甲状腺原発巣の見出された上顎部転移性腺系悪性腫瘍の 1 例. *日口外誌* 29: 950-956, 1983.
- 11) 船本長一郎, 塩田 覚, 他: 下顎骨へ転移をきたした腎癌の 1 症例と文献的考察. *日口外誌* 31: 1412-1420, 1985.
- 12) Ellis, G.L., Jensen, J.L., et al.: Malignant neoplasms metastatic to gingivae. *Oral Surg* 44: 238-245, 1977.

Malignant tumors metastasized to oral and maxillofacial regions from other organs ; Report of two cases

Tatsuo Ito, Takehisa Yamada, Yasushi Hayashi, Iwai Tohnai,
Minoru Ueda, Yasuhiro Okazaki* and Yutaka Yamada**

Department of Oral Surgery, Nagoya University School of Medicine
(Chief: Prof. Minoru Ueda)

* Department of Dentistry and Oral Surgery, Kariya General Hospital
(Chief: Dr. Hiroharu Nishihara)

** Department of Oral Maxillofacial Surgery, Okazaki Municipal Hospital
(Chief: Dr. Yutaka Yamada)

Abstract

Two cases of metastatic carcinoma of the oral region, which are comparatively rare, were reported.

Case 1: An 84-year-old woman was referred to our clinic with the chief complaint of left buccal swelling. This case was diagnosed as adenocarcinoma which metastasized to the zygomatic bone from the breast.

Case 2: A 71-year-old man was referred to our clinic with the chief complaint of left buccal and submandibular swelling and pain. The diagnosis was large cell carcinoma which metastasized to the mandibular gingiva from the lung.

Key words: oral metastatic tumor, breast cancer, lung cancer

Requests for reprints to: Dr. Ito, T., Department of Oral Surgery, Nagoya University School of Medicine, 65 Tsurumai-cho, Showa-ku, Nagoya, 466 Japan