細菌感染と気管支喘息

小田島 安 平¹⁾三 浦 克 志^{*)}斉 藤 多 賀 子¹⁾酒 井 菜 穂¹⁾伊 藤 良 子¹⁾今 井 孝 成¹⁾昭和大学小児科¹⁾, 宮城県立こども病院^{*)}

1. はじめに

衛生仮説 hygiene・hypothesis が1989年に発表された当初は裏付けが充分されなかったことから広く受け入れられることはなかった。しかしこの考え方が広まるにつれて、感染がアレルギー疾患を予防する、ないし、発生頻度を減少させるとことが徐々に実証されてきた。特に細菌感染と気管支喘息に関し考えるとき、結核菌と気管支喘息に関する知見がある。SirakawaらはBCGを接種するとTh-1タイプの細胞免疫が誘導され、アレルギーの発症が予防されると報告した¹⁾。また反対に百日咳に乳児早期に罹患する、ないし、百日咳ワクチンを早期に接種するとアレルギーの発症が多くなるとの疫学調査もある²⁾。我々も東京都神津島で小中学生すべてを対象に調査したところ早期に3種混合ワクチン(DPTワクチン)を接種した児の方がアレルギー発症が多く、BCGを接種しツ反が陽性化した児の方がアレルギー発症が少ない結果であった³⁾。乳幼児期の生活環境が近年変わり、兄弟内の感染が少いと、感染によりアレルギーが起こってくる率も高くなるとの報告もある。保育園に入る年齢が低い方がアレルギーが少ないとの報告があり⁴⁾、スイスでは農場で育った方がアレルギーの発症が少ないこれはエンドトキシンに暴露する機会が農場の方が多く、エンドトキシンがTh-1サイトカインの誘導物質であるためにアレルギー発症が少ないとされている⁵⁾。これらの知見はウイルス感染よりも細菌感染が関与していることを示している。しかし、細菌感染が発作の誘因や増悪因子になっていることも多く体験する。今回、細菌感染と気管支喘息について我々のデータを検証する。

2. 気管支喘息発作時の気管吸引痰よりの細菌の検出

気管支喘息発作時の気管からの吸引痰より細菌を検出すると、多くの患児の発作時に肺炎球菌やインフル

エンザ菌を中心に多くの症例で細菌が検出できる(表1)。対象は、10月から2月の冬季に、喘鳴を主訴として昭和大学小児科に入院加療した気管支喘息児で、男児33例、女児35例、計68例である。年齢は、生後3ヶ月から15歳7ヶ月、平均4歳1ヶ月であった。年齢分布を見るとインフルエンザ菌、肺炎球菌ともに低年齢児に多く検出されている。特に肺炎球菌は3歳を超えたとほとんど検出されなくなる。低年齢児の気管支喘息には肺炎球菌、インフルエンザ菌が関与していることがわかる。また、同時にRSVによる発作時には細菌の検出率が低く、インフルエンザウィルスの検出時には細菌が検出されることが多い(表2)。特に低年齢児に多く肺炎球菌やインフルエンザ菌が検出され、同時にRSVやインフルエンザ・ウイルスも低年齢児に多く検出される。低年齢児の喘息発作時には細菌、ウイルスが関与している割合が多い。

3. 肺炎球菌の頻回検出例の臨床像

気管支喘息児の中でも細菌が繰り返し検出される感染型喘息の臨床像を検討した。中でも経口抗生剤にての治療が難しいペニシリン耐性肺炎球菌PRSPが3回以上気管支喘息発作時に検出された8例を検討してみると、全例ともに重症であり、発作時の平均年齢は1歳2ヶ月であり、平均2歳6ヶ月までに3回以上検出されている。特にPRSPが繰り返し検出される気管支喘息は感染時に経口抗生剤の使用による改善が難しく、重症化することが考えられる。これらの症例は全例静注による抗生剤の治療を受けた後に、再度気管支喘息発作時にはPRSPが出現する。このようにこのペニシリン耐性肺炎球菌が繰り返し検出される感染型喘息のは重症例が多く、他の喘息と分けて考える必要がある⁶⁾。

表1. 気管支喘息発作時の吸引痰における検出菌

肺炎球菌	24 例 (39.3%)
肺炎球菌のみ	6 例 (9.8%)
肺炎球菌混合感染	18 例 (29.5%)
肺炎球菌+インフルエンザ菌	6 例
肺炎球菌+ブランハメラ菌	9 例
肺炎球菌+インフルエンザ菌+ブランハメラ菌	3 例
インフルエンザ菌	18 例 (27.9%)
インフルエンザ菌のみ	3 例 (4.9%)
インフルエンザ菌混合感染	15 例 (23.0%)
インフルエンザ菌+肺炎球菌	6 例
インフルエンザ菌+ブランハメラ菌	6 例
インフルエンザ菌+肺炎球菌+ブランハメラ菌	3 例
ブランハメラ菌	27 例 (44.3%)
ブランハメラ菌のみ	9 例 (14.8%)
ブランハメラ菌混合感染	18 例 (29.5%)
ブランハメラ菌+肺炎球菌	9 例
ブランハメラ菌+インフルエンザ菌	6 例
ブランハメラ菌+肺炎球菌+インフルエンザ菌	3 例
有意菌 (—)	17 例 (27.8%)

表2. 気管支喘息発作時のウイルス感染と細菌感染の合併

RSV のみ	9 例
RSV + 細菌	16 例
インフルエンザ・ウイルスのみ	2 例
インフルエンザ・ウイルス+細菌	15 例

4. エリスロマイシン少量持続療法

エリスロマイシン少量持続療法は歴史的には、成人のびまん性汎細気管支炎 (Diffuse Pan-Bronchiolitis : 以下 DPB) に導入されたのが始まりである。DPB の特徴を述べると両肺のびまん性の細気管支の炎症で副鼻腔気管支炎の病像をとり、初期にはインフルエンザ菌ないし肺炎球菌の感染が多く、進展すると緑膿菌感染となる。レントゲン像は過膨張像とびまん性散在性顆

粒像を呈する。このような症例に対しエリスロマイシン少量持続療法が導入され、歴史的に劇的な予後の改善を見た。エリスロマイシン少量持続療法導入以前は5年生存率が40%前後の大変予後不良な疾患であったが、導入後は5年生存率で95%以上となり死亡例はごくわずかとなった。

このような歴史的事実をふまえ、上記のような PRSP が頻回に検出される感染型気管支喘息が DPB に比較的病像として似ていると考え、エリスロマイシン少量持続療法を試みた。上記8例中5例に施行し、1例のみ不変であったが4例に効果があった。開始前は全例重症であったが、1例は発作が消失、2例は軽症、1例は中等症に軽減した⁵⁾。その後対象を広げ、36例の気管支喘息児で中等症持続型11例、重症持続型15例、(アトピー型21, 非アトピー型15例)で検討した。図はエリスロマイシン少量持続療法開始後の発作点数、治療点数、喘息点数の3ヶ月ごとの推移を示している。治療開始後3ヶ月後には有意に発作点数が減少している(図1)。また、この検討では、非アトピー型に比し

アトピー型により効果があり，エリスロマイシン少量持続療法は感染合併型気管支喘息にのみ効果があるものではないことが判明した⁷⁻⁹⁾。

5. 肺炎球菌多糖体ワクチン（ニューモバックス）による治療効果

反復性肺炎球菌感染を伴う気管支喘息4例，反復性肺炎1例，反復性気管支炎1例の計6例に肺炎球菌多糖体ワクチンを接種した。全例インフォームドコンセプトをとり，前後で採血を行い，肺炎球菌多糖体ワクチン（ニューモバックス）接種した。ニューモバックスの添付文書上2歳以下の接種には問題があるが，アメリカではニューモバックスより肺炎球菌特異抗原が少ない種類の肺炎球菌多糖体ワクチンを2歳以下にも接種している。このことも考え対象を2歳以下まで広げ，保護者の同意のもと接種した。平均年齢2.6歳。ワクチンを接種後，全例で肺炎球菌特異的IgG2が上昇し，全例が健康小児の平均値である4.3mg/dlを超えていた。その結果全例で入院回数の減少，喘鳴，下気道感染が減少し，副作用と考えられる症状は出現した症例はなかった。反復性肺炎球菌感染を伴う重症の気管支喘息

には肺炎球菌多糖体ワクチンを接種することも選択肢の1つであると考えられる^{10,11)}。

6. 感染型喘息に対するγグロブリン大量静注療法

7歳以下で過去6ヶ月間に気管支炎を伴う気管支喘息発作を3回以上起こしたの感染型喘息の重症を選択基準とし，対象者17例に対しγグロブリン400mg/kg 5日間静注を行った。結果は静注前6ヶ月間で平均 2.1 ± 0.9 回の入院回数が0～7ヶ月，7～12ヶ月，12～18ヶ月，18～24ヶ月でそれぞれ 1.5 ± 0.8 回， 0.5 ± 0.7 回， 0.7 ± 0.9 回， 0.3 ± 0.5 回に減少している。発作点数も静注後1ヶ月より有意に減少し，その効果は7ヶ月後まで持続していた。重症度の改善を見た症例は12/17例（70.6%），臨床症状の改善を見た症例13/17例（76.5%）であった¹²⁾。

7. 死菌ワクチンによる治療

気管支喘息と細菌感染を考えると，我々は古くから気管支喘息に対し肺炎球菌やインフルエンザ菌の死菌ワクチン（商品名ブロンカスマベルナ，パスポート）

図1. 少量EM長期投与の臨床学的検討－3カ月毎の点数推移－

表3. 細菌浮遊液（死菌ワクチン）の成績

多種の常在菌（ブ菌，肺炎球菌，連鎖球菌）の死菌浮遊液の治療成績				
対 象	方 法		結 果	発表雑誌
感染性喘息	Open	小児～成人	差なし	BMJ 1955 (Frankland ら)
感染性喘息	DBPC	小児	症状に差	JAMA 1965 (Fontana ら)
感染性喘息	PC	小児	差なし	Acta Allergol 1973 (Koivikko ら)
感染性喘息	Open	小児	発作の有意な減少	JAMA 1969 (Mueller ら)
喘息	DBcross-over	成人	差なし	Ann Allergy 1997 (Wheeler ら)

を使用していた。文献上死菌ワクチンの小児気管支喘息での成績を見ると，小児の気管支喘息に対し効果ありとの報告と，無効との報告があり，過去の報告をまとめると表のようになる（表3）。近年は死菌ワクチンがサイトカインの誘導やNK活性を活性化するとの報告が散見されるようになったが，現在では死菌ワクチンが販売停止となり，本邦での使用ができなくなった。

8. 最後に

気管支喘息の発症や増悪に細菌感染が関連する。Farooqi らは (1) 母親にアトピー性疾患があること (2) 百日咳ワクチンの接種の既往があること (3) 生後2歳までに抗生剤の投与の既往があることがアトピー性疾患のリスクファクターとしている²⁾。また，腸内細菌とアレルギーの発症に関する知見が近年多く報告されている。すなわち，アトピー性疾患の児では大腸菌，黄色ブドウ球菌，クロストリジウム菌が多く繁殖し，アトピー性疾患ではない児ではビフィズス菌，ラクトバシルス菌が多く腸内で繁殖しているという事実である。また，感染型喘息において細菌感染のコントロールと気管支喘息発作の関係について考えるとき，低年齢児はウイルス感染とともに細菌感染が気管支喘息の発症や増悪に関連していることが多く，特に経口の抗生剤で治療がスムーズに行かない症例では重症化しやすいと考えられる。このような児の治療はガイドラインにも記載がなく，1例ずつ考えるよりほかないが，上記に示した，エリスロマイシン少量持続療法，肺炎球菌多糖体ワクチン， γ グロブリン大量療法が選択肢として考え得る。今後このような症例も大規模治験等により治療が標準化されることを望んでいる。

文 献

- 1) Sirakawa T, Enomoto T, Shimazu S, Hopkin JM. The inverse association between tuberculin response and atopic disorder. *Science* 275: 77-79, 1997.
- 2) Farooqi IS and Hopkin JM. Early childhood infection and atopic disorder. *Thorax* 53: 928-932, 1998.
- 3) 米山 宏，鈴木まゆみ，藤井浩一，小田島安平. 三種混合ワクチン（DPT）摂取およびBCG摂取がアトピー性疾患に及ぼす影響. *アレルギー* 49: 585-592, 2000.
- 4) Kramer U, Heinrich J, Wjst M, Wichmann HE. Age of entry to day nursery and allergy in later childhood. *Lancet* 353: 450-454, 1999.
- 5) Braun-Fahrlander CH, Gassner M, Grize L. Prevalence of hay fever and allergic sensitization in farmer's children and their peers living in the same rural community. *Clin Exp Allergy* 29: 201-208, 2000.
- 6) 高村まゆみ，小田島安平，伊東三吾，井村総一. ペニシリン耐性肺炎球菌による反復性下気道感染を有する気管支喘息例の臨床経過. *日本小児アレルギー学会誌* 13: 15-20, 1999.
- 7) 高村まゆみ，小田島安平，飯倉洋治. 小児気管支喘息への少量エリスロマイシン長期投与の検討. *アレルギー免疫* 14: 405-407, 2000.
- 8) 高村まゆみ，小田島安平，鈴木章市，今井孝成，吉田英生，飯倉洋治. 小児気管支喘息児へのマクロライドの少量持続療法の試み. *日本小児アレルギー学会誌* 15: 181-187, 2001.
- 9) Takamura, Y. Odajima, Y. Iikura, H. Usui. Low-Dose

- and Long-Term Erythromycin Therapy in Children with a Mixed and Infectious Type Bronchial Asthma. *Showa Univ J Med Sci*, 13(1): 43-50, 2001.
- 10) 三浦克志, 今井孝成, 北林 耐, 渡邊修一郎, 小田島安平, 飯倉洋治. 小児肺炎球菌感染症に対する肺炎球菌多糖体ワクチンの有用性. *日本小児科学会誌* 107: 348, 2003.
- 11) 斉藤多賀子, 桜井基一郎, 藤井隆成, 三浦文宏, 酒井菜穂, 今井孝成, 高場恵美, 三浦克志, 辻祐一郎, 古庄純一. 肺炎球菌で膿胸をともなった1男児例. *小児感染免疫* 14: 59, 2002.
- 12) 椿 俊和, 坂口直哉, 小屋二六, 細野稔彦, 澤井清, 船橋 茂, 永山洋子, 小田島安平, 飯倉洋治, 他. 感染を繰り返す難治性小児気管支喘息に対する γ -グロブリン製剤の有能性の検討. *日本小児アレルギー学会誌*. 12: 323-337, 1998.