重症、難治性喘息群に対する Disodium Cromoglycate (DSCG)

+Salbutamol 吸入液の regular use の効果について

(昭和63年4月20日受付)

(昭和63年7月4日受理)

国立療養所香川小児病院

西 川 清

Key Words : 小児難治性気管支喘息, regular use, β -adrenergic blockade, DSCG, β_2 agonist

要 旨

これまであらゆる治療法を駆使しても、コントロールの困難であった成人を含む重症・難治群が、電動ネブライザーを使用した DSCG+salbutamol 吸入の regular use (DSCG 2ml+salbutamol 0.25~1mg 1日2回) により最長8ヵ月、ほぼ全例に著明な臨床症状および日常生活の改善をみた。regular use 施行前3ヵ月と施行後3ヵ月の臨床症状を比較すると、発作点数は難治群で71.7から17.4に、重症群で22.8から10.2に減少した。救急外来受診回数は、7名の外来難治群で27.3回(3~44回)から1.1回(0~3回)に、12名の重症群では12.3回(0~38回)から3.1回(0~13回)に減少した。また難治群の副腎皮質ホルモン使用量は Prednisolone 換算で460.7mg (150~945mg) から74.2mg (0~415mg) へと減量できた。学校・仕事の欠席日数は、難治群で14.1日から0.6日に、重症群で11.1日から2.0日に減少した。著明な臨床症状の改善をみた症例、家族とも、心理的にも大幅な改善を示した。

DSCG+ β_2 agonist の regular use は、気管支拡張持続作用と気道炎症の抑制作用により発作を予防するだけでなく、これまで困難であった難治群の0レベルを実現し、気道過敏性に影響を与え、寛解に導き得る治療法となる可能性を示唆した。

はじめに

重症、難治性喘息は、昨今の治療薬の進歩や病態の解明にもかかわらず、全喘息患者の各々15%、3%前後存在し¹⁾、常に重症発作や呼吸不全に陥る危険性がある。これらの重症発作に対しては、副腎皮質ホルモンの大量投与や isoproterenol の持続吸入²⁾、気管内挿管などにより死亡率こそ低下の傾向にあるもののそれらの日々の発作コントロールや、まして治癒を望むことは、喘息を扱う医師の夢であった³⁾。これらの重症難治群に対し、電動ネブライザーによる DSCG+salbutamol 吸入液の regular use⁴⁾を施行したところ、最長で8ヵ月の現在まではほぼ全例に著明な臨床症状および日常生活の改善がみられ、これまで実現できなかった0レベルを維持できたので、その結果について報告し、DSCG+

β_2 agonist の regular use の効果発現の mechanism について考察する。

対 象

対象は、当院喘息外来通院中および喘息施設入院療法中の日本小児アレルギー学会喘息重症度判定基準および小児難治性喘息対策委員会による重症度判定で難治群12名(外来9名、入院3名)、重症群18名(外来12名、入院6名)の計30名である。年齢は、56歳の成人例1例を除けば難治群15.1歳(4~30歳)、重症群11.9歳(7~20歳)で、15歳を過ぎた、いわゆる思春期喘息、成人移行型喘息が各々7名、3名、計10名含まれる。性別は難治群 男6名、女6名、重症群 男14名、女4名である。発症年齢は難治群で53歳発症の成人喘息を除いて1.2歳(0~3歳)、重症群で2.3歳(1~10歳)、重症化年齢は難治群で4.5歳(1~10歳)、重症群で5.1歳(1~10歳)、平均罹患年数は難治群で13.9年、重症群で9.6年で、56歳の成人例を除き、16歳以上の症例はいずれも小児期発症の移行型である。これらの症

Abbreviations

RTC: Round the clock EIA: Exercise induced asthma BDI: Becromethasone dipropionate inhaler MDI: metered dose inhaler

表1 DSCG+salbutamol 定期吸入症例

(難治群)

No.	case	年齢	性	開始後	入・外	発症年齢	重症化年齢	既 治 療	効 果
1		7	♀	6カ月	入院	0	2	BDI 減感作 RTC DeS	著効
2		9	♀	3カ月	外来	0	1	BDI DeS RTC DSCG	著効
3		4	♂	6カ月	入院	1	3	RTC BDI	有効
4		8	♀	4カ月	外来	1	5	RTC DSCG BDI	有効
5		10	♀	6カ月	入院	2	2	RTC DeS BDI DSCG	著効
6		15	♂	5カ月	外来	0	2	RTC 入院 BDI 減感作	著効
7		20	♂	5カ月	外来	0	3	RTC 入院 BDI	著効
8		25	♀	3カ月	外来	1	6	RTC 入院 BDI 減感作	著効
9		30	♀	3カ月	外来	3	9	BDI ケナコルトA RTC 入院	著効
10		56	♂	7カ月	外来	53	54	BDI RTC	著効
11		16	♂	3カ月	外来	3	10	BDI 入院 RTC DeS	やや有効
12		22	♂	5カ月	外来	2	7	BDI 入院 RTC DeS	不変

+ 施行率 30 %

+ 施行せず

(重症群)

No.	case	年齢	性	開始後	入・外	発症年齢	重症化年齢	既 治 療	効 果
13		7	♂	4カ月	入院	0	2	BDI DSCG	有効
14		7	♂	4カ月	外来	1	6	DSCG	やや有効
15		8	♂	6カ月	入院	1	1	BDI DSCG	有効
16		8	♀	4カ月	外来	1	5	BDI RTC	著効
17		9	♂	4カ月	入院	3	5	BDI 入院	有効
18		11	♂	4カ月	外来	3	5	DSCG 入院	著効
19		11	♀	5カ月	外来	3	5	BDI 入院	有効
20		10	♂	5カ月	入院	1	6	RTC DeS	有効
21		11	♂	4カ月	外来	2	5	BDI DeS	著効
22		12	♂	4カ月	外来	2	5	BDI DSCG	やや有効
23		12	♀	6カ月	外来	2	5	BDI 入院	著効
24		14	♂	3カ月	外来	2	3	RTC 入院	著効
25		14	♂	6カ月	外来	3	10	BDI 入院	有効
26		14	♂	3カ月	入院	4	8	BDI 入院	有効
27		13	♂	6カ月	外来	3	6	BDI 入院 DSCG DeS	著効
28		18	♀	5カ月	外来	8	8	BDI 入院 DeS	有効
29		20	♂	4カ月	外来	2	5	BDI DeS	著効
30		15	♂	3カ月	入院	0	1	BDI DeS	やや有効

BDI : Becromethasone
dipropionate
inhalorDeS : 減感作療法
入院 : 施設入院

例は当院の入院、外来の最重症グループで、当院における呼吸不全、ニアミスを来した症例が全て含まれている。(表1)

方 法

吸入方法は、ネブライザー吸入器(日商式加圧コンプレッサー、またはレスピネブ:東京MI商会)ガラス嘴管を用いて、DSCG吸入液(7歳以下1ml/回、8歳以上2ml/回)とsalbutamol吸入液(Venetlin®:喘鳴有時0.1~0.2ml、0.5~1mg、喘鳴ない時0.05~0.1ml、0.25~0.5mg)を混合し、朝、就寝前の2回、5

~10分かけて定期的に連日吸入させた。それまで使用薬剤は吸入開始直後はそのまま併用させ、症状改善の著明な例では漸次減量した。朝、就寝前の2回の定期吸入以外に発作が出現した場合は、同量またはsalbutamolを0.1~0.5ml(0.5~2.5mg)まで増量し、1日4回を超えるか、吸入にても呼吸困難の軽減の見られないときは、外来受診するよう指導した。各々喘息日記を記録させ、救急外来受診回数および副腎皮質ホルモン使用量は、外来カルテにより算定した。本人および家族の心理的变化については、今回は電話または直接

面談の上医師により評価した。(表2)

表2 DSCG+ β_2 刺激剤 定期予防吸入

目的：重症または難治性喘息の呼吸不全、大発作を予防する。
軽快、寛解の目的で使用する。

準備するもの：加圧式ネブライザー吸入器一式

① 日商式加圧コンプレッサー

② レスビネブ（東京M1商会）

使用薬剤：D.S.C.G.吸入液（アンプル入り）

β_2 気管支拡張剤

① Salbutamol（ベネトリン）

② Procaterol（メブチン）

方法：D.S.C.G.吸入液（0～7才 1ml 8才以上 2ml）

β_2 気管支拡張剤 非発作時

（ベネトリン 小児 0.05 ml

又は 成人 0.1 ml

メブチン 小児 0.05 ml

成人 0.1 ml

喘息（有）

（ベネトリン 小児 0.1 ml

又は 成人 0.2 ml

メブチン 小児 0.1 ml

成人 0.2 ml

2つを混合し、5～10分かけて朝・夜の2回吸入する。

発作頻発時：以上の吸入を3時間毎に繰り返してもよいが、4回を超えるときは外来を受診させる。

結 果

1. 発作点数

定期吸入施行前3ヵ月および施行後3ヵ月の発作点数は、小発作1、中発作2、大発作3と規定して算出すると、難治群で71.7から17.4に減少した。（症例11, 12は指示どおり殆ど施行できていないため、今回の算定からは除外したが、その後、施行し始め、大発作での来院は症例11が1回のみとなっている。）重症群では、22.8から10.2にいずれも0.1%以下の危険率で有意に減少した。

2. 救急外来受診回数

外来通院者の救急外来受診回数（発作を来して受診した回数）を算定すると、難治群で施行前3ヵ月が平均27.3回（3～44回）であるのに対し、施行後3ヵ月には平均1.1回（0～3回）と大幅に減少、重症群で12.3回（0～38回）から3.1回（0～13回）に減少、難治群では0.1%以下の危険率で統計学的に有意であった。（図2）。

3. 副腎皮質ホルモン使用量

特に著明な減少を見たのは難治群の副腎皮質ホルモン使用量で、プレドニン[®]、注射用 hydrocortisone とともに prednisolone 換算で460.7mg（150～945mg）から74.2mg（0～415mg）へと減量が可能であり、うち4名は0であった。（図3）

図1 DSCG+salbutamol 定期吸入開始前後3ヵ月の発作点数の変化

図2 DSCG+salbutamol 定期吸入開始前後3ヵ月の救急外来受診回数の変化

図3 DSCG+salbutamol 定期吸入開始前後3ヵ月の難治性喘息群のSteroid投与量

4. 学校、仕事の欠席日数

欠席を1日、遅刻・早退を各々0.5日として算定し、発作による欠席日数を施行前後で各3ヵ月を比較すると、外来受診中の患児では難治群7名で平均14.1日から0.6日に、重症群12名で平均11.1日から2.0日に、両群とも0.1%の危険率で有意な減少を示した。難治群7名中6名、重症群12名中6名で、欠席、遅刻、早退が皆無であった。入院中の患児では、難治群3名中2名は学童期に達しておらず、1名も学校欠席はなかった。入院児重症群6名でも院内養護学校通学で、欠席日数は施行前後ともに0回であった。(図4)

図4 DSCG+salbutamol 定期吸入開始前後3ヵ月の学校欠席遅刻早退の回数の変化

5. 運動や仕事中の息ぎれ, EIA

難治群, 重症群では非発作時に運動や仕事中に, 息ぎれ, EIA や体のだるさなどを訴えるが, そのような症状に対する本人の印象につき, 施行前後で回答を得たところ, 難治群で著明改善5名, 改善3名, やや改善1名, 不変0, 重症群でも著明改善6名, 改善7名, やや改善5名, 不変0と, 全員が運動, 仕事中の症状の改善を認めた. このほか, 睡眠と朝の目覚めが以前と比較にならないくらい改善したと訴えるものが多かった. (表3)

表3 運動・クラブ活動・仕事の改善度

	難 治 群 N = 9	重 症 群 N = 18
著 明 改 善	5	6
改 善	3	7
やや改善	1	5
不 変	0	0

6. 本人および家族の心理的改善

殆ど全員が, 心理的な面でも改善しておりその主な症例を表9に示した. 症例1の7歳女児では, 2歳より重積発作が続くため, 幼児の長期入院例として様々の問題を含んでいたが, 7歳の学齢期に達するまで, 通年発作で, 入院中にも月1~4回の点滴治療を要した. 母親は家業が忙しく, 大発作の時のみ面会があるため, 患児はイライラし, 号泣し, 発作を悪化させた. 62年4月より一年生となったが, 学習も10分と集中できず, 内容理解も極端に悪く, 担任を困らせていた. 母親も大家族の中で仕事, 病院と度重なる発作のために, 心身ともに疲労し, 看護婦と衝突したり, 医療不信の言動もみられた. 62年5月定期吸入開始し, 日を迫る毎に発作が減少し, 副腎皮質ホルモンの隔日投与も中止し, 8月末には6年ぶりに退院した. 退院後2ヵ月のとき, 運動会の後, 発作あり, 一度入院したが回復も早く, それ以外には喘鳴を時折認める程度で, 学校欠席もなく, 本人, 家族ともに安心し, 学習態度にも落ち着きがみられるようになったとのことである.

症例6は, 15歳男子で, 入院中発作は時に重症であったが, 問題行動が多く, 61年12月事故退院したが, 退院直後より発作が頻発し, 以来外来において呼吸不全を示すなど, 3ヵ月間に44回の aminophylline+hydrocortisone の静脈注射を行った. DSCG+salbutamol

定期吸入施行後, 発作は減少し, 3ヵ月間で発作のため3回受診し静脈注射を受けたのみとなった. しかし, そのうちの1回は意識不明となる呼吸不全を伴う大発作であった. 現在, 問題行動も少なくなり家庭内でも笑顔がみられるとともに, スムーズに地元校へ通学しているとのことである.

症例7は, 20歳男子で2歳より発作があり自信がない, おどおどしている, 家庭内では母親と口論が絶えないなど, 毎日が発作と心理的葛藤の繰り返しで, 家庭でネブライザー吸入を行いながらもなお42回外来受診し, 時に呼吸不全を呈し, isoproterenol の持続吸入を行ったこともある. 定期吸入を62年6月に開始したところ, 開始した日以来, 救急外来受診は皆無となり, 専門学校を休むこともなく, これまで全く考えもしなかった旅行に友達と出かけ, 表情が自信に満ちている.

症例9は, 30歳主婦で筆者の経験した最重症患者であるが, 13年間に呼吸停止を2度経験し, 10年前エーテル麻酔にて救命し報告した例である. 年に数回は呼吸不全を伴う大発作がありながら結婚, 出産と困難な障害を乗り越えてはきたものの, 62年7月にも1週間に及ぶ大発作を来し, プロタノール持続吸入を5日間続けてやっと回復するなど発作自体の重症度は変化がなかった. 当初, 本症例のような最重症難治例に今回の regular use が効果を示すとは考えられず施行も遅れて62年9月より開始したが, 予想に反して著効を示し, 夜間睡眠障害, morning dipping もなく, 仕事にも以前の息切れがなく, 30年間これほど快適に過ごした時期はないとのことであった.

症例10は, 56歳の成人であり, 53歳で発症アレルギー検査では全て陰性, IgE RIST も114IU/ml と低値であった. 54歳時より発作は次第に頻回, 重症となり, 62年4, 5月には, 副腎皮質ホルモンを使用してもコントロールできず, 入院を要とし短期間に難治化した. 仕事も月のうち10日は欠勤, 早退などがあった. 62年5月より定期吸入開始, 発作点数は1/3に減少, 副腎皮質ホルモンは300mg から0に, 救急外来受診回数は35回から0回へと改善した. 以来一度も欠勤することなく過ごしている. 生活に安心感があり, 仕事ぶりにも改善がみとめられた.

症例4, 6, 16, 21, 27は, 学童, 中学生であるが, 引っ込み思案, 友達がいない, メソメソする, 登校拒否傾向があるなど, 長年にわたりカウンセリングや心理指導, サマーキャンプなどを続けてもさほど改善がみられなかったが, 定期吸入施行後, 発作の大幅な減

表4 性格・心理的变化と家族の印象

			本人		家族	
			施行前	施行後	施行前	施行後
1		7 ♀	2才より7才まで入院、イライラ	退院、落ちつき、集中力	母親イライラ、医療不信	明るさ、家庭内円満
2		9 ♀	不安、むらつき	安心感、積極性	不安	ホッとしている
4		8 ♀	引っ込み思案、無口	友人宅へ、一輪車クラフ	不安、仕事先へ電話	助かった、安心して仕事ができる
6		15 ♀	非行、暴言、イライラ	落ちつき、学校が楽しい	家庭が暗い、不安	安心、家庭内円満
7		20 ♀	親子げんか、不安	旅行、落ちつき、活気	干渉、負担	よずみて心配
9		30 ♀	毎日が苦しい、不安	かせむひかない、子どもが欲しい	不安、負担	なぜもっと早くこの治療を……
10		56 ♀	先行き不安	安心感	不安	安心感
16		8 ♀	元気がない	ゆとり、力強さ、明るい	イライラ、せっぱつまった	ホッとした、明るいムード
18		11 ♂	一人遊び、集中力がない	頑張りがきく、友達とよく遊ぶ	不安	安心、うれしい
21		11 ♂	メソメソする	明るい、積極的	イライラ、不安	安心、喜び
27		13 ♂	登校拒否、甘え、無理	テニスに熱中、友達多い	不安	安心、ホッとした

少と日常生活の改善により、登校やクラブ活動までスムーズに出来るようになり、友人との交遊や、積極性もみられるなど心理的な問題が消失し、家族も好転の喜びにより、望ましい接し方となっている。(表4)

考 察

難治性喘息に対して、従来の治療法では、薬物を減量したり日常生活の改善などもままならず、ひとたび大発作を来すと、大量のステロイド剤を必要とし、常に呼吸不全や喘息死⁹⁾の危険性を有することも少なくない。特に思春期、青年期の成人移行型喘息では、受診率の低さや薬物の compliance の低さから最近死亡率の上昇が問題とされている³⁾⁶⁾。当科においても10数名の難治群を有し、四苦八苦してきたのが現状である。

それらの難治群とそれに続く重症群が、今回の DSCG+ β_2 刺激剤の regular use により、臨床症状はもちろん、日常生活、運動、仕事時の改善に加え、ステロイド離脱も可能となり、心理的にも著明な変化をみたことは、喘息を長らく診てきた臨床医にとって実に驚くべき治療効果である。

β_2 agonist の regular use は欧米では主流となっている⁷⁾が、本邦ではまだコンセンサスは得られず、内科領域において最近徐々に広まりつつあるのが現状である。小児科領域では吸入ことに定量噴霧式携帯用スプレーに対して、極端に制限する風潮が一般的である。⁸⁾筆者らも同様で、かたくなに吸入療法を制限してきたし、regular use に対しても冷ややかな反応を示してきた。しかし今回の臨床効果を前にして、regular use に対する新たな認識とこれまでの喘息治療における位置づけを再検討する必要がある。今回の治療が示唆するいくつかの点について考察する。

1. 難治化について

今回の DSCG+ β_2 刺激剤の regular use により、難治群の 0-level が実現できたことで殆どの症例で、長年のステロイド剤の離脱が可能となった。我々の診てきた難治群は発症時から難治でなく、各々の難治化要因はあるものの、数年～10数年を経て重症化、難治化したものである。難治化の主因は、ステロイド剤の乱用にあると言われて久しいが、あらゆる配慮を尽くしても、目の前で難治化する症例もあり、そういった例は先天的？難治例あるいは心因にその原因を求めることもあった。しかし今回の結果から、難治化はステロイド剤やその他の薬物を使用しても重症発作を繰り返してきた、その結果気道の炎症(アレルギー性、感染性、物理的炎症)を反復し気道過敏症の亢進⁹⁾を来したことにあるのではないかと考える。難治化とは薬の乱用というより、発作を繰り返したという実績にあるように思える。その意味で、10年以上前の勝呂等の予防吸入の報告⁹⁾に敬意を表するとともに馬場のいう 0-level 作戦が治療の上で、重要性を帯びてくる。

2. 0-level 作戦の意味するもの

我々はこれまで、薬物、ことにステロイド剤や β_2 刺激剤の使用には慎重であったし多少発作があっても、薬物を極力手びかえたという誇りさえ持ってきた。それで大部分の患者は軽快に向かったが、ある程度以上の者では重症化する例があった。

RTC 療法が提唱され広く普及し、数種の抗アレルギー剤の発売により、それまで発作のない時にも薬物を服用させることへの違和感は次第に慣らされていった。しかし、これらの薬物でも、重症群、ことに難治群の 0 レベルを実現するに至らず、重症発作のたびに大量

のステロイド剤や isoproterenol による対症療法を続けてきた。そのコントロールの悪さを患者の compliance の低さや、心因に求めてきた。このような難治群に対して、我々は今回の DSCG+salbutamol の regular use により初めて 0 レベルを経験した。もしこの 0 レベルが維持できるならば、新たな気道炎症を回避し、気管支表面の修復や、気道過敏性に対する好影響も期待でき、難治群を寛解へと導き得る可能性をも示唆するものである。

3. β_2 刺激剤吸入の regular use について

RTC 療法や抗アレルギー剤の服用など、発作のない時にも薬物を連日服用することに対する違和感を感じながらも、次第に広まり定着してゆく中で β_2 吸入剤の regular use に対してだけは危惧する風潮がある。それは、過度の使用による死亡率の上昇¹⁰⁾と β_2 刺激剤の連用による tachyphylaxis や down regulation の問題¹¹⁾である。MDI の販売量と死亡率の関係は、むしろ MDI の限界を越えた発作にも MDI に固執した結果、受診が遅れ適切な治療の時期を逸することにあると言われ、現在では否定的である¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾。連用による tachyphylaxis の出現に関しては、in vitro では肯定的な報告があるものの、肺 β -receptor では起こりにくく¹¹⁾、また宮本ら¹⁵⁾¹⁶⁾、Larsson¹⁷⁾、Repsher ら¹⁸⁾は臨床使用量の MDI では、tachyphylaxis の発現は認めなかったとしている。

今回の我々の regular use では、salbutamol 使用量は 0.5~2mg/日であり、従来経口投与してきた 6~12mg/日に比較してずっと少量でありしかも全身投与に対して、肺への局所投与という点を考えると、むしろ tachyphylaxis は経口投与により危惧されねばならない。また、MDI でなく、電動ネブライザーによる定期吸入であり、その準備、後始末の繁雑さから過度の使用に陥る危険性は少なく、むしろ症状の改善により、患者自身が施行回数を減少させてしまう方が大多数である。

4. DSCG の抗喘息作用

DSCG は既に歴史的喘息薬であるが、最近脱顆粒、mediator 遊離抑制作用の他に histamin, PG F₂ α などの気管支収縮作用を減弱させ、isoproterenol, epinephrin, salbutamol の平滑筋弛緩作用を増強持続させる作用が報告され¹⁹⁾²⁰⁾我々も DSCG+salbutamol 吸入で、気管支拡張作用の増強、持続効果を観察している。

また DSCG には、気管支表面の暴露された irritant receptor²¹⁾や C fiber の修復作用²⁰⁾²²⁾も報告されており、気道の炎症阻止、修復に効果的に作用しているものと

思われる。

5. 経口と吸入、発作時非発作時投与

今回の DSCG+ β_2 刺激剤の regular use は、これまでもカプセル剤や経口薬と同じく連続使用されてきた薬物でありながら、その臨床効果は、経口薬の比でなく、この効果の違いは投与方法によるものと思われる。

吸入による β_2 agonist の投与は、ずっと少量でも、その効果および速効性において経口薬の比でなく、しかも局所投与であって、血中移行が少なく他臓器や胎児に対しても無用の副作用を回避できる²³⁾。また regular use は非発作時に行うことにより、発作時に比べ、十分拡張した気道に吸入剤が入り沈着するということで、この到達量は発作時よりずっと多いと推察される。

6. 今後の展望と課題

regular use により、気道過敏性が長期的にみてどのように変化するか、 β_2 刺激剤に対する反応性の変化すなわち tachyphylaxis などについては、十分に経過を観察する必要がある。適応症例をいかにするかは難治群と難治予備群については適応できるが、それ以下の重症群や、施設入院を要する症例に対しての適応をいかにするかは今後の課題である。施行症例の併用薬の減量や regular use そのものの減量、中止の時期などまだまだ問題点も多い。現在まだ最長 8 ヶ月であり、2 度の好発シーズンはクリアしたが、今後その効果が維持するかどうかは不明であるが、ステロイド離脱が可能となり、0 レベルが維持できるならば軽快、寛解、略治もあながち非現実的ではない。

これまで我々が吸入療法について危惧してきたことは、患者の過度の使用と依存であり以前の過ちを再び繰り返すことは避けねばならない。この治療法が重症発作に対しては絶対でなく、あくまで予防療法であることを熟知させ、医師と患者が意志疎通をはかり、きめ細かく指導するならば、regular use はこれまでにない画期的な治療法になり得ると考える。

ま と め

重症難治例に DSCG+salbutamol 吸入液の regular use を行い、著明な臨床症状の改善、ステロイドの減量離脱と日常生活の改善を得た。

難治例に 0 レベルを実現できたことで難治化は薬物乱用よりも、重症発作の持続による気道過敏性の亢進が主要因であると考えられた。

患者と一体化したきめ細かい指導により施行されるならば、DSCG+ β_2 刺激剤吸入液の regular use は、これまでにない画期的治療法となり得ると考えられた。

文 献

- 1) 村野順三：難治性小児喘息の問題点と対策。小児内科 15, 1431-1435, 1983.
- 2) 朱 博充, 清酒外文, 中野猛夫他：気管支喘息重症発作に対するイソプロテレノールの持続吸入療法について。小児科 22, 537, 1981.
- 3) 松井猛彦, 馬場 実：小児気管支喘息22-35年後の長期予後。アレルギー 30, 197-204, 1987.
- 4) 川生泰子, 金 保洙, 東郷知子, 比留間藤昭, 近藤康夫, 大成 滋, 戸賀崎久美, 橋本剛太郎：Salbutamol 吸入の Regular use の効果と適応。第4回日本小児難治喘息研究会抄録, 1987.
- 5) 梅枝愛郎, 小林節雄, 伊藤秀明：喘息死。呼吸 6, 568-574, 1987.
- 6) 馬場 実, 赤坂 徹, 西間三馨, 永倉俊和, 矢野靖子：小児喘息をめぐる。呼吸 6, 350-361, 1987.
- 7) Harvey, J. E. and Tattersfield, A. E. : Airway response to salbutamol : Effect of regular salbutamol inhalation in normal, atopic and asthmatic subjects. Thorax 37, 280-287, 1982.
- 8) 引田 享, 佐々木孝夫：喘息と気道過敏性。Pharma Medica 3, 101-107, 1985.
- 9) 勝呂 宏, 中野猛夫, 清酒外文, 松山秀介：喘息発作予防を目的とした重症喘息児の自宅での気管支拡張剤吸入療法。小児科診療 39, 1493-1499, 1976.
- 10) Inman, W. H. W. and Adelstein, A. M. : Rise and fall of asthma mortality in England and Wales in relation to use of pressurised aerosols. Lancet 1, 279-285, 1969.
- 11) 佐野靖之, 可部順三郎： α -, β -, adrenergic receptor おもに気道過敏性との関連について。第2回免疫薬理シンポジウム 123-133, 1984.
- 12) 光井庄太郎, 細川久昭, 堀江 肇：吸入療法剤, 喘息死亡統計から。綜合臨床 21, 3039-3043, 1972.
- 13) Herxheimer, H. : Asthma mortality and pressurised aerosols. Lancet I, 642-643, 1969.
- 14) Lewis, H.E. : Asthma mortality and pressurised aerosols. Lancet II, 799-800, 1969.
- 15) 宮本昭正, 信太隆夫, 可部順三郎, 浜田朝雄他：Procaterol 吸入剤連用の臨床研究。呼吸 4, 1141-1151, 1985.
- 16) 宮本昭正：成人気管支喘息に対するベロテックエアゾル regular use の有用性。呼吸 6, 422-430, 1987.
- 17) Sven Larsson, Nils Svedmyr, Gunnar Thiringer : Lack of bronchial beta adrenoceptor resistance in asthmatics during long-term treatment with terbutaline. J. Allergy. Clin. Immunol. 59, 93-100, 1977.
- 18) Repsher, L. H., Anderson, J. A., Bush, R. K., Falliers, C. J., Kass, I., Kemp, J. P., Reed, C., Siegel S. and Webb, D. R. : Assessment of tachyphylaxis following prolonged therapy of asthma with inhaled Albuterol aerosol. Chest 85, 34-38, 1984.
- 19) 北村 論, 石原陽子, 杉山幸比古, 林隆司郎, 和泉孝志, 許 栄宏, 小坂樹徳：気管支筋作動等の作用に及ぼす disodium Cromoglycate (DSCG) の効果について。日本胸部疾患学会雑誌 19, 40-45, 1981.
- 20) 谷崎勝朗, 周藤真康, 駒越春樹, 森永 寛, 大谷純, 多田慎也, 高橋 清, 木村郁郎：気管支喘息に対する Disodium cromoglycate (DSCG) 吸入液の効果 Salbutamol, DSCG 併用吸入療法の換気機能に及ぼす影響。臨床と研究 61, 2357-2360, 1985.
- 21) Harries, H. G : Bronchial irritant receptors and a possible new action for cromolyn sodium : Ann Allergy 46, 156-158, 1981.
- 22) Dixon M, Tackson, and Richards, I. M. : The action of sodium cromoglycate on C fibre endings in the dog lung. Br. J. Pharmac. 70, 11-13, 1980.
- 23) Sven Larsson, and Nils Svedmyr : Bronchodilating effect and side effect of beta 2 adrenoceptor stimulants by different modes of administration (tablets, metered aerosol, and combinations thereof). Am. Rev. Respir. Dis. 116, 861-869, 1979.

THE EFFECTS OF REGULAR INHALATION OF DISODIUM CROMOGLYCAT (DSCG) AND SALBUTAMOL IN SEVERE AND INTRACTABLE ASTHMA PATIENTS.

Kiyoshi Nishikawa MD

Kagawa National Children's Hospital

Although it has been difficult to control severe and intractable asthma patients, even adults, using conven-

tional therapy, a new treatment featuring regular use of DSCG and salbutamol inhalation produced an improvement in the clinical symptoms and the quality of life for almost all patients with asthma.

When the clinical symptoms for 3 months before regular use were compared with those for three months after use, asthma attack scores for severe and intractable patients decreased from 22.8 to 10.2, and from 71.7 to 17.4, respectively.

Frequency of emergency room visits decreased from 12.3 to 3.1 times in 12 severe patients and from 27.3 to 1.1 times in 7 intractable patients. Mean dosage of corticosteroid (prednisolone) for intractable patients decreased from 460.7mg (range 150 to 945mg) to 74.2mg (range 0 to 415mg).

It is concluded that the regular use of DSCG and a β_2 agonist not only prevented asthmatic attacks, but also induced an improvement in intractable patients by prolonging bronchodilatation, inhibiting the effect against bronchial inflammation and reducing bronchial hypersensitivity.