原 著 (臨床研究)

早期胃癌に対する腹腔鏡下胃切除後の感染性合併症危険因子としての骨格筋脂肪化の意義

内田 恒之, 関根 隆一, 松尾 憲一, 木川 岳, 梅本 岳宏,
喜島 一博, 原田 芳邦, 若林 哲司, 高橋 裕季, 塩澤 敏光,
小山 英之, 柴田 栞里, 田中 邦哉

背景：サルコペニアは胃癌をはじめ各種悪性腫瘍の短期・長期成績に関与するが、骨格筋の質を表す脂肪化と術後感染性合併症（IC）の関連性は明らかでない。

目的：腹腔鏡下胃切除（LG）を施行した胃癌症例における骨格筋脂肪化と術後 IC との関連を明らかにする。

方法：2009 年から 2018 年までの LG 施行早期胃癌 173 例を対象とした。周術期諸因子と術後 IC の関連を後方視的に検討した。骨格筋脂肪化は術前 CT 画像による Intramuscular adipose tissue content (IMAC) で評価した。

結果：術後 IC は 20 例（11.6%）に認めた。多変量解析による術後 IC の独立危険因子は男性（ $P=0.003$ ）、Prognostic nutritional index 低値（ $P=0.008$ ）、IMAC 高値（ $P=0.020$ ）であった。IMAC 高値群は低値群に比較し高齢（ $P=0.001$ ）で高 Body mass index（ $P=0.027$ ）であり糖尿病並存例（ $P=0.021$ ）が多かった。

結語：骨格筋脂肪化は LG 後の術後 IC 発生の危険因子であった。適切な術前栄養・運動療法の介入が術後 IC 制御に寄与する可能性がある。

早期胃癌, 腹腔鏡下胃切除, 感染性合併症, 骨格筋脂肪化, サルコペニア

I はじめに

胃癌は疾患別にみた癌死亡数が世界的に第 3 位を占める疾患であり¹⁾、腫瘍の完全切除が唯一の根治治療となる。早期胃癌では内視鏡による治療も適応されるが、内視鏡治療が適応外の病変に対しては一般にリンパ節郭清を伴う胃切除術が施行される²⁾。昨今では手術手技の画一化や周術期管理の標準化により胃手術は比較的安全となったが、胃癌術後の感染性合併症の発症率はいまだ 10.2-17.6% と高率である³⁾⁻⁵⁾。さらに術後合併症は予後規定因子のひとつと報告されており⁶⁾、胃手術の際にはこれら根治性の担保と安全性の確保が必須である。

サルコペニアは、筋肉量の低下に加えて筋力低下あるいは身体機能低下を伴うものと定義されており⁷⁾、歩行速度や握力および筋肉量により診断され

る。さまざまな悪性腫瘍において術後短期・長期成績と関連することが報告されており^{8),9)}、胃癌では術後合併症発症の独立危険因子で、かつ術後の予後規定因子のひとつと報告されている¹⁰⁾⁻¹²⁾。近年、筋肉の脂肪化を表す Intramuscular adipose tissue content (IMAC) が、筋肉量ではなく筋肉の質を示すパラメーターとされ、サルコペニア診断法の 1 つとして報告されている^{13),14)}。IMAC は肝細胞癌や膵癌、胆管癌に対する術後感染性合併症の危険因子であり、また長期成績を悪化させる因子と報告されている¹⁵⁾⁻¹⁷⁾。しかし胃癌に関する報告はなく、その意義は明らかでない。本研究では胃癌術後の感染性合併症に注目し、筋肉の質を表す IMAC の術前値と術後合併症発症の相関を検討することで、術前 IMAC の意義を明らかにすることを目的とした。

II 対象と方法

2009 年 1 月から 2018 年 12 月までに当教室で腹

図1 Psoas Muscle mass index (PMI) と Intramuscular adipose tissue content (IMAC) の測定方法

図 (A) PMI 測定方法. L3 レベルの CT 画像で両側腸腰筋の断面積を測定し、以下の計算式で算出. $PMI = \text{両側腸腰筋断面積 (cm}^2\text{)} / \text{身長}^2 \text{ (m}^2\text{)}$. (B) IMAC 測定方法. L3 レベルの CT 画像で両側多裂筋の CT 値を測定し、かつ背部皮下脂肪の 5 箇所の region of interest (ROI, 60 mm²) の CT 値を測定し以下の計算式で算出. $IMAC = \text{両側多裂筋 CT 値} / \text{背部皮下脂肪 CT 値 (いずれも中央値)}$.

腔鏡下胃切除術を施行した胃癌症例は 277 例であった。本研究では腫瘍因子による低栄養や筋肉量減少などの二次性サルコペニアの影響を可及的に排除し宿主因子のみに着目することを目的として全 277 例のうち病理組織学的に pStageI と最終診断された 201 例を抽出した。このうちデータ欠損 26 例と胆嚢以外の他臓器合併切除を症例した 2 例を除外し、173 例を最終的な検討対象とした。

術後感染性合併症は Clavien-Dindo 分類¹⁸⁾ の Grade II 以上の術後合併症のうち、38℃ 以上の発熱もしくは白血球数 10000/μL 以上に対し治療的な抗菌薬投与を要した感染症と定義した。

年齢、性別、既往疾患、Body mass index (BMI)、Neutrophil Lymphocyte Ratio¹⁹⁾ (NLR)、Prognostic Nutritional Index²⁰⁾ (PNI)、骨格筋量および骨格筋脂肪化、胃切除術式、手術時間、病理学的因子といった周術期諸因子と術後感染性合併症の関連性を後方視的に解析した。骨格筋の評価は、術前造影 CT 画像（平衡相）の L3 レベルを用いて行い、骨格筋量は [両側腸腰筋断面積 (cm²) / 身長²

(m²)] から Psoas muscle mass index (PMI) を計算し、骨格筋の質は [両側多裂筋の region of interest (ROI) の CT 値 / 5 箇所の背部皮下脂肪 ROI の CT 値 (いずれも中央値)] から Intramuscular adipose tissue content (IMAC) を計算し評価した (図 1)¹³⁾。PMI 低値は骨格筋量低下を表し、IMAC 高値は骨格筋脂肪化すなわち質の低下を示すものとした。PMI と IMAC はいずれも性差が顕著であることから、男女別に第 1 四分位数と第 3 四分位数をカットオフ値として高値群、正常値群、低値群の 3 群に分類した (図 2)。

単変量解析での群間比較は Fisher's exact 検定で有意差検定を行い、多変量解析はロジスティック回帰分析により行った。統計解析ソフトは JMP® Pro 14 を使用し、P 値 < 0.05 を統計学的有意差ありと定義した。

III 結果

全例の患者背景を表 1 に示す。年齢は中央値が 70 歳で、男女比は 111 : 62 であった。胃切除術式は 137 例が幽門側胃切除で、36 例が胃全摘であり、出血量、手術時間はそれぞれ中央値で 25 g, 370 分であった。

術関連死亡は認めなかった。一方、Clavien-Dindo 分類 Grade II 以上の術後合併症は 30 例 (17.3%) に認め、このうち 20 例 (11.6%) に術後感染性合併症を発症した。内訳は肺炎が 7 例、縫合不全による腹腔内感染が 5 例、胆汁漏による腹腔内感染が 3 例、他の原因による腹腔内膿瘍が 2 例、尿路感染症が 2 例、カテーテル関連感染症が 1 例であった (表 2)。

術後感染性合併症に関する単変量解析を行うと、男性、NLR 4.0 以上、PNI 45.4 未満、PMI 低値、IMAC 高値で有意差を認めた。PMI は低値群と正常 / 高値群、IMAC は高値群と正常 / 低値群の 2 群に分類し多変量解析を行うと、感染性合併症の発症リスク因子は男性 (オッズ比 = 10.50, P = 0.021)、PNI 45.4 未満 (オッズ比 = 5.59, P = 0.034)、IMAC 高値 (オッズ比 = 6.78, P = 0.008) であった (表 3, 4)。

全例を IMAC 高値群 (n = 42) と正常 / 低値群 (n = 152) に分類し両群を比較すると、IMAC 高値群では高齢者が多数で (P = 0.001)、BMI が高値であり (P = 0.027)、糖尿病並存例が高率であった (P = 0.021, 表 5)。

図2 PMI と IMAC の男女別箱ひげ図

(A) PMI の男女別箱ひげ図. 男性：中央値=7.75, Interquartile range (IQR) = 6.38-8.71, 女性：中央値=5.42, IQR=4.71-6.54. (B) IMAC の男女別箱ひげ図. 男性：中央値=-0.51, IQR=-0.58--0.41, 女性：中央値=-0.37, IQR=-0.51--0.24.

IV 考察

本研究により，骨格筋の脂肪化を表す IMAC 高値が腹腔鏡下胃癌手術の術後感染性合併症の独立危険因子であること，そして高齢者，BMI 高値例，糖尿病並存例で IMAC 高値症例が多いことが明らかとなった。

一般に，胃癌術後の感染性合併症の危険因子として筋肉量を指標としたサルコペニアが有用であると報告されてきたが²¹⁾，本研究では骨格筋量を表す PMI は感染性合併症の危険因子とはならなかった。PMI は CT 画像における腸腰筋の面積をもとに計算されるため腸腰筋内に多くの脂肪成分を含む場合，これらすべてを筋肉量として測定することになる。この場合は PMI が実際の筋肉量を正確に反映していない可能性があり，このため PMI が感染性合併症の危険因子とならなかったと推測された。一方で，本研究では IMAC が感染性合併症の危険因子として選択されており，単に筋肉量のみでなく脂肪化を考慮した筋肉の質の評価が重要であることが示唆された。

IMAC 高値で表される骨格筋脂肪化が術後感染性合併症を引き起こす機序については明らかでない。本研究では，IMAC 高値例では高齢者，高 BMI 症例，糖尿病並存例が多かった。高齢者では一般に食事摂取時の骨格筋での蛋白合成能が低下し筋肉量が減少する²²⁾。筋肉はインスリンの標的組織であるため，筋肉量の減少はインスリン抵抗性を惹起し糖尿病の発症につながる²³⁾。糖尿病の併存は易感染状態となるため術後感染性合併症のリスクになることは容易に理解される。一方，日本肥満学会の診断基準では，BMI 25 以上が肥満と定義されているが²⁴⁾，

表1 患者背景

N = 173			
年齢 (歳)		70	[38-86]
性別	男性	111	(64.2%)
	女性	62	(35.2%)
BMI (kg/m ²)		22.6	[15.6-33.8]
COPD		5	(2.9%)
糖尿病		26	(14.5%)
NLR		2.09	[0.74-21.50]
PNI		48.9	[30.9-61.1]
術式	DG	137	(79.2%)
	TG	36	(20.8%)
手術時間 (分)		370	[123-695]
出血量 (g)		25	[5-720]
深達度	T1	146	(84.4%)
	T2	27	(15.6%)
リンパ節転移	N0	161	(93.1%)
	N1	12	(6.9%)

BMI : Body mass index, COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease, NLR : Neutrophil Lymphocyte Ratio, PNI : Prognostic Nutritional Index, DG : Distal gastrectomy, TG : Total gastrectomy

最近の研究では肥満により増加した脂肪組織が前炎症性アディポカインを増加させ，かつ抗炎症性アディポカインを抑制することが報告されている^{25), 26)}。肥満で IMAC 高値を示す症例に手術侵襲が加わると，前述のようなアディポカインを介する機序で炎症が容易に惹起され，また糖尿病の併存などで免疫抑制が加わることにより感染性合併症が誘発されやすいことが類推される。したがって，高齢，高 BMI，糖尿病などにより IMAC が高値を示す症例では，術後感染性合併症を発症するリスクが高いと考えられる。

以上から術後感染性合併症の制御のためには骨格筋の脂肪化の進展抑制もしくは改善が求められる。サルコペニア患者に対しては，タンパク質摂取を中

表2 感染性合併症の詳細

	Clavien-Dindo 分類			計
	Grade II	Grade III	Grade IV	
感染性合併症	14 (8.1%)	4 (2.3%)	2 (1.2%)	20 (11.6%)
肺炎	5 (2.9%)	0	2 (1.2%)	7 (4.0%)
縫合不全	3 (1.7%)	2 (1.2%)	0	5 (2.9%)
瘻液漏	3 (1.7%)	0	0	3 (1.7%)
腹腔内膿瘍	0	2 (1.2%)	0	2 (1.2%)
尿路感染症	2 (1.2%)	0	0	2 (1.2%)
CRBSI	1 (0.6%)	0	0	1 (0.6%)

CRBSI : Catheter related blood stream infection

表3 感染性合併症に関する単変量解析

		IC (-)	IC (+)	P 値
年齢	<71	83	7	0.152
	≥71	70	13	
性別	男性	92	19	0.002
	女性	61	1	
BMI	<21.4	49	9	0.314
	≥21.4	104	11	
COPD	なし	150	18	0.067
	あり	3	2	
糖尿病	なし	132	16	0.497
	あり	21	4	
NLR	<4.0	145	16	0.035
	≥4.0	8	4	
PNI	<45.4	28	12	<0.001
	≥45.4	125	8	
術式	DG	121	16	1.000
	TG	32	4	
手術時間	<360	69	11	0.478
	≥360	84	9	
出血量	<25	80	7	0.162
	≥25	73	13	
深達度	T1	131	15	0.201
	T2	22	5	
リンパ節	N0	141	20	0.364
	N1	12	0	
PMI	低値	36	8	0.043
	正常値	75	11	
	高値	42	1	0.022
IMAC	低値	41	4	
	正常値	80	6	
	高値	32	10	

IC : Infectious complication, BMI : Body mass index, COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease, NLR : Neutrophil Lymphocyte Ratio, PNI : Prognostic Nutritional Index, DG : Distal gastrectomy, TG : Total gastrectomy, PMI : Psoas muscle mass index, IMAC : Intramuscular adipose tissue content

心とした栄養管理や運動療法により筋肉量や筋力の改善が得られたといった報告がある^{27)~29)}。また、骨格筋の脂肪化に関しては、肝硬変患者に対する分岐鎖アミノ酸製剤の投与³⁰⁾や脊髄損傷患者に対する運動療法³¹⁾の有用性が報告されている。しかしながらいずれも月単位のインターバルでの介入を要しており、悪性腫瘍に対する術前の介入期間としては適切でない。さらに骨格筋脂肪化の改善は特定の

表4 感染性合併症に関する多変量解析

		オッズ比	95%信頼区間	P 値
年齢	≥71	1.89	0.43-8.26	0.398
性別	男性	15.50	1.50-160.02	0.021
BMI	<21.4	1.97	0.46-8.52	0.364
COPD	あり	3.81	0.31-47.51	0.298
糖尿病	あり	1.28	0.26-6.27	0.757
NLR	≥4.0	3.62	0.40-32.52	0.252
PNI	<45.4	5.59	1.14-27.35	0.034
術式	TG	1.83	0.34-9.73	0.478
手術時間	<360	1.73	0.43-6.92	0.436
出血量	≥25	4.30	0.93-19.85	0.062
PMI	低値	1.89	0.46-7.82	0.378
IMAC	高値	6.78	1.66-27.71	0.008

BMI : Body mass index, COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease, NLR : Neutrophil Lymphocyte Ratio, PNI : Prognostic Nutritional Index, TG : Total gastrectomy, PMI : Psoas muscle mass index, IMAC : Intramuscular adipose tissue content

表5 IMAC による群間比較

		IMAC 高値 (N = 42)	IMAC 正常 / 低値 (N = 131)	P 値
年齢		73 [56-85]	67 [38-86]	0.001
性別	男 / 女	27/15	84/47	1.000
BMI		23.9 [17.9-32.0]	22.2 [15.6-33.8]	0.027
COPD		1 (2.4%)	3 (2.3%)	1.000
糖尿病		11 (26.2%)	14 (10.7%)	0.021
NLR		2.2 [0.90-13.69]	2.1 [0.74-21.5]	0.837
PNI		48.2 [35.9-61.1]	49.5 [30.9-60.9]	0.279
感染性合併症		10 (23.6%)	10 (7.6%)	0.010

IMAC : Intramuscular adipose tissue content, BMI : Body mass index, COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease, NLR : Neutrophil Lymphocyte Ratio, PNI : Prognostic Nutritional Index

疾患を有する患者における有用性の報告であり、手術対象患者における有用性は明らかでない。術前の短期間での栄養・運動療法の介入による骨格筋脂肪化の改善を目指したプロトコルの確立、および手術対象症例への速やかな介入が可能となるような複数診療科を跨ぐ体制の構築が急務と考えられた。

以上、IMAC 高値は胃癌の術後感染性合併症のリスク因子であり、高齢、高BMI、糖尿病併存がIMAC 高値を規定する重要な因子であった。今後は、サンプル数が十分でない単施設後ろ向き研究といった本研究の弱点を克服する研究も必須ではある

が、IMAC 値の改善を目指した術前栄養・運動療法の介入に関する前向き臨床試験を検討していく必要があると考えられた。

文献

- Global Burden of Disease Cancer Collaboration, Fitzmaurice C, Akinyemija TF et al. : Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived with Disability, and Disability-Adjusted Life-Years for 29 Cancer Groups, 1990 to 2016 : A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study. *JAMA Oncol* 4 : 1553-1568, 2018
- 日本胃癌学会：胃癌治療ガイドライン（第5版），金原出版，東京，2018
- Hayashi T, Yoshikawa Y, Aoyama T et al. : Impact of infectious complications on gastric cancer recurrence. *Gastric Cancer* 18 : 368-374, 2015
- Fujiya K, Tokunaga M, Mori K et al. : Long-Term Survival in Patients with Postoperative Intra-Abdominal Infectious Complications After Curative Gastrectomy for Gastric Cancer : A Propensity Score Matching Analysis. *Ann Surg Oncol* 23 : S809-S816, 2016
- Mohri Y, Tanaka K, Toiyama Y et al. : Impact of Preoperative Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Postoperative Infectious Complications on Survival After Curative Gastrectomy for Gastric Cancer : A Single Institutional Cohort Study. *Medicine* 95 : e3125, 2016
- Kubota T, Hiki N, Sano T et al. : Prognostic significance of complications after curative surgery for gastric cancer. *Ann Surg Oncol* 21 : 891-898, 2014
- Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM et al. : Sarcopenia : European consensus on definition and diagnosis : Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. *Age Ageing* 39 : 412-423, 2010
- Simonsen C, de Heer P, Bjerre ED et al. : Sarcopenia and Postoperative Complication Risk in Gastrointestinal Surgical Oncology : A Meta-analysis. *Ann Surg* 268 : 58-69, 2018
- Voron T, Tselikas L, Pietrasz D et al. : Sarcopenia Impacts on Short-and Long-term Results of Hepatectomy for Hepatocellular Carcinoma. *Ann Surg* 261 : 1173-1183, 2015
- Fukuda Y, Yamamoto K, Hirao M et al. : Sarcopenia is associated with severe postoperative complications in elderly gastric cancer patients undergoing gastrectomy. *Gastric Cancer* 19 : 986-993, 2016
- Kawamura T, Makuuchi R, Tokunaga M et al. : Long-Term Outcomes of Gastric Cancer Patients with Preoperative Sarcopenia. *Ann Surg Oncol* 25 : 1625-1632, 2018
- Zhuang CL, Huang DD, Pang WY et al. : Sarcopenia is an Independent Predictor of Severe Postoperative Complications and Long-Term Survival After Radical Gastrectomy for Gastric Cancer Analysis from a Large-Scale Cohort. *Medicine* 95 : e3164, 2016
- Kitajima Y, Hyogo H, Sumida Y et al. : Severity of non-alcoholic steatohepatitis is associated with substitution of adipose tissue in skeletal muscle. *J Gastroenterol Hepatol* 28 : 1507-1514, 2013
- Marcus RL, Addison O, Kidde JP et al. : Skeletal muscle fat infiltration : impact of age, inactivity, and exercise. *J Nutr Health Aging* 14 : 362-366, 2010
- Hamaguchi Y, Kaido T, Okumura S et al. : Preoperative quality of skeletal muscle is a novel prognostic predictor after hepatectomy for hepatocellular carcinoma. *J Hepatobiliary Pancreat Sci* 22 : 475-485, 2015
- Okumura S, Kaido T, Hamaguchi Y et al. : Impact of preoperative quality as well as quantity of skeletal muscle on survival after resection of pancreatic cancer. *Surgery* 157 : 1088-1098, 2015
- Okumura S, Kaido T, Hamaguchi Y et al. : Impact of preoperative quality and quantity of skeletal muscle on outcomes after resection of extrahepatic biliary malignancies. *Surgery* 159 : 821-833, 2016
- Clavien PA, Barkun J, de Oliveira ML et al. : The Clavien-Dindo classification of surgical complications : five-year experience. *Ann Surg* 250 : 187-196, 2009
- Templeton AJ, McNamara MG1, Šeruga B et al. : Prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in solid tumors : a systematic review and meta-analysis. *J Natl Cancer Inst* 106 : dju124, 2014
- Kanda M, Mizuno A, Tanaka C et al. : Nutritional predictors for postoperative short-term and long-term outcomes of patients with gastric cancer. *Medicine* 95 : e3781, 2016
- Tamura T, Sakurai K, Nambara M et al. : Adverse Effects of Preoperative Sarcopenia on Postoperative Complications of Patients with Gastric Cancer. *Anticancer Res* 39 : 987-992, 2019
- Vincent HK, Raiser SN, Vincent KR : The aging musculoskeletal system and obesity-related considerations with exercise. *Ageing Res Rev* 11 : 361-373, 2012
- Srikanthan P, Hevener AL, Karlamangla AS et al. : Sarcopenia exacerbates obesity-associated insulin resistance and dysglycemia : findings from the National Health and Nutrition Examination Survey III. *PLoS One* 5 : e10805, 2010
- 日本肥満学会：肥満症診療ガイドライン 2016，ライフサイエンス出版，東京，2016
- Tilg H, Moschen AR : Adipocytokines : mediators linking adipose tissue, inflammation and immunity. *Nat Rev Immunol* 6 : 772-783, 2006
- Park J, Morley TS, Kim M et al. : Obesity and cancer--mechanisms underlying tumour progression and recurrence. *Nat Rev Endocrinol* 10 : 455-465, 2014
- Kim HK, Suzuki T, Saito K et al. : Effects of exercise and amino acid supplementation on body composition and

- physical function in community-dwelling elderly Japanese sarcopenic women : a randomized controlled trial. *J Am Geriatr Soc* 60 : 16-23, 2012
- 28) Houston DK, Nicklas BJ, Ding J et al. : Dietary protein intake is associated with lean mass change in older, community-dwelling adults : the Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study. *Am J Clin Nutr* 87 : 150-155, 2008
- 29) Malafarina V, Uriz-Otano F, Iniesta R et al. : Effectiveness of nutritional supplementation on muscle mass in treatment of sarcopenia in old age : a systematic review. *J Am Med Dir Assoc* 14 : 10-17, 2013
- 30) Kitajima Y, Takahashi H, Akiyama T et al. : Supplementation with branched-chain amino acids ameliorates hypoalbuminemia, prevents sarcopenia, and reduces fat accumulation in the skeletal muscles of patients with liver cirrhosis. *J Gastroenterol* 53 : 427-437, 2018
- 31) Karelis AD, Carvalho LP, Castillo MJ et al. : Effect on body composition and bone mineral density of walking with a robotic exoskeleton in adults with chronic spinal cord injury. *J Rehabil Med* 49 : 84-87, 2017

Impact of preoperative quality of skeletal muscle measurement on infectious complications after laparoscopic gastrectomy for early gastric cancer

Tsuneyuki Uchida, Ryuichi Sekine, Kenichi Matsuo, Gaku Kigawa, Takahiro Umemoto, Kazuhiro Kijima, Yoshikuni Harada, Tetsuji Wakabayashi, Yuki Takahashi, Toshimitsu Shiozawa, Hideyuki Oyama, Shiori Shibata, Kuniya Tanaka

Background : Sarcopenia has been reported to be associated with short- and long-term outcomes in patients with gastric cancer (GC). However, the impact of muscle quality on infectious complications after laparoscopic gastrectomy for GC is unclear. The aim of this study was to investigate the impact of preoperative skeletal muscle quantity and quality on infectious complications in patients undergoing laparoscopic gastrectomy for early gastric cancer.

Methods : This study included 173 early gastric cancer patients who underwent laparoscopic gastrectomy between 2009 and 2018. The relationships among clinical factors, intramuscular adipose tissue content (IMAC), and postoperative infectious complications were examined retrospectively.

Results : Postoperative infectious complications were observed in 20 patients (11.6%). Independent risk factors for postoperative infectious complications by multivariate analysis were male gender ($p = 0.003$), a low Prognostic Nutritional Index ($p = 0.008$), and a high IMAC ($p = 0.020$). Patients with a high IMAC were older, had a higher body mass index, and a higher prevalence of diabetes mellitus.

Conclusion : Low-quality skeletal muscle is a risk factor for postoperative infectious complications of laparoscopic gastrectomy. Nutritional support and preoperative rehabilitation to improve the muscle quality were suggested to be useful to prevent postoperative infectious complications.

early gastric cancer, laparoscopic gastrectomy, infectious complication, intramuscular adipose tissue content (IMAC), sarcopenia