◆ 症例報告 ◆

舌骨による機械的刺激が原因で脳梗塞再発を繰り返した
頸部内頸動脈軽度狭窄症の1症例

小川 由夏¹⁾ 川原 一郎¹⁾ 上野 未貴²⁾ 副島 航介³⁾ 塩崎 絵理¹⁾ 本田 和也³⁾
伊藤 健大³⁾ 諸藤 陽一¹⁾ 原口 渉¹⁾ 小野 智憲¹⁾ 堤 圭介¹⁾

要旨：症例は81歳女性。左前頭葉の塞栓性脳梗塞再発を繰り返し各種精査施行されるも、塞栓源不明の脳塞栓症と診断された。頸部MRAでは、内頸動脈起始部は軽微な壁不整のみであったが、後方視的に3D-CTAを見直すと、舌骨が左総頸動脈遠位部を捕捉しており、舌骨による頸動脈への機械的刺激が原因と考えられ、後日内膜剝離術を行った。MRIや頸動脈エコーのみでは舌骨による頸動脈への接触は見逃されてしまう場合があり、塞栓源不明の脳塞栓症例における原因検索として頸動脈周囲の骨構造物も注意深く観察すべきであると考えた。

Key words: carotid stenosis, ischemic stroke, hyoid bone

はじめに

頸部内頸動脈は、一般的には骨との接触はないため、通常の日常生活における頸部の動きによって脳梗塞を来すことは比較的稀であると考えられている。一方、茎状突起による内頸動脈への圧迫によって引き起こされるEagle症候群は近年良く知られるようになった^{1, 2)}。しかしながら、舌骨による内頸動脈の圧迫および脳梗塞の報告は、以前と比べると散見されるようになったが、未だその認知度は低く、病態に関しても不明な点が多いのが現状である³⁻¹³⁾。

今回我々は、舌骨による内頸動脈への機械的刺激によって脳梗塞を繰り返した内頸動脈軽度狭窄症例を経験したため、文献的考察を加え報告する。

症 例

患者：81歳、女性

既往歴：高血圧、糖尿病

嗜好歴・家族歴：なし

現病歴：右上下肢の脱力にて発症し、magnetic resonance imaging (MRI)では左前頭葉に新規梗塞巣が散見され、当院神経内科にて保存的加療が行われた。その際、種々の塞栓源精査が施行されたが明らかな塞栓源は認められず、2次予防としてアスピリン(100 mg)が投与された。約8カ月後に右手の脱力および言語障害を呈し、MRIでは前回と同様、左前頭葉に新規脳梗塞巣が確認された。再度種々の塞栓源精査が施行され、著変は認められなかったが、前回のthree-dimensional computed tomographic angiography (3D-CTA)を見直すと、舌骨が左総頸動脈遠位部を捕捉し内頸動脈起始部に接触している所見が認められ、舌骨による機械的刺激が原因の脳塞栓症と考えられたため、後日当科にて手術予定となった。シロスタゾール(200 mg)を追加し、手術目的に当科入院となったが、術直前の3D-CTAでは舌骨が外頸動脈側に変位していた。高齢かつ軽度狭窄病変でもあったため、脳塞栓のリスクは回避されたと判断し、一旦手術はキャンセルとした。しかしながら、その3カ月後に言語障害の悪化を来し、MRIでは左前頭葉の新規梗塞巣を再び認め、脳梗塞再々発と診断、3D-CTAでは再度舌骨による左総頸動脈遠位部の捕捉が確認されたため、その1カ月後に当科にて手術を行った。

神経放射線学的所見：(初発時)MRIでは左前頭葉に拡散強調画像にて新規梗塞巣が散見された(Fig. 1A)。

¹⁾ 国立病院機構長崎医療センター脳神経外科

²⁾ 国立病院機構長崎医療センター神経内科

³⁾ 国立病院機構長崎医療センター初期研修プログラム

責任著者：〒856-8562 長崎県大村市久原2丁目1001-1

国立病院機構長崎医療センター脳神経外科 小川由夏

E-mail: ogawa.yuka.ur@mail.hosp.go.jp

(2020年9月24日受付, 2020年12月17日受理)

doi: 10.3995/jstroke.10859

Fig. 1 発症時の MRI 所見

A, B : 初発時, C, D : 再発時, E, F : 再々発時

拡散強調画像にて左前頭葉に新規梗塞巣の散在を認める。左内頸動脈起始部は軽微な壁不整を認めるのみで変化は見られない。

MRA では両側内頸動脈起始部にごく軽度の壁不整が確認された (Fig. 1B)。3D-CTA では、左内頸動脈起始部は石灰化を呈する軽度狭窄病変であり、その直下で総頸動脈は舌骨により捕捉されていた (Fig. 2A, B, I)。左内頸動脈起始部の plaque imaging では、T1 強調画像にて等信号域を呈し、頸動脈エコーでも明らかな可動性や低輝度の所見は認められず、不安定性は確認されなかった。(再発時)MRI では左前頭葉に新規梗塞巣が確認された (Fig. 1C)。MRA では変化は見られなかった (Fig. 1D)。3D-CTA では著変なく左総頸動脈表面に舌骨が接触し捕捉されていたが、手術目的に入院となった際のフォローアップ画像では、舌骨は完全に外頸動脈の方へ変位し外頸動脈自体を捕捉していた (Fig. 2C, D, J)。(再々発時)MRI では左前頭葉に新規梗塞巣が確認された (Fig. 1E)。MRA では変化は見られなかった (Fig. 1F)。3D-CTA では舌骨は再度変位し、左総頸動脈を捕捉し内頸動脈起始部に接触していた (Fig. 2E, F, K)。(術後)左内頸動脈起始部の狭窄部位は改善し、舌骨も頸動脈から離れた正常位置に整復、総頸動脈自体もやや内側走行から外側の正常走行に整復されていた (Fig. 2G, H, L)。

手術：術前計画としては、通常の内頸動脈内膜剥離術および舌骨大角の部分切除を計画したが、術中所見として頸動脈表面に色調変化は見られたものの明らかな舌骨の接触は確認されず (Fig. 3A)、触手にて舌骨は頸動

脈から離れた前方正常箇所自然に整復されていたため、舌骨大角の切除までは施行せず、癒着した結合組織の剥離および内頸動脈内膜剥離術を施行した。プラーク自体は線維性優位の表面不整な形状で、一部にゼラチン様の柔らかい成分を確認した (Fig. 3B)。

術後経過：高齢でもあったため、フレイルおよびサルコペニアの回避を目的として術翌日よりリハビリ介入を行い、経過良好にて術後 2 週間で自宅退院となった。術後 2 カ月経過し、舌骨の変位は認めず、頸動脈の再狭窄や脳梗塞の再発なく経過している。

症例報告にあたっては患者の同意を得た。

考 察

頸部における主な骨構造物としては、頸椎、茎状突起、舌骨および甲状軟骨があげられる。頸椎に関しては、交通事故、スポーツ、整体やカイロプラクティックなどによる頸部の回旋、回転および過伸展が原因となる椎骨脳底動脈循環不全症 (bow hunter syndrome, beauty polar stroke syndrome, golf stroke) の発症が一般的に良く知られており¹⁴⁻¹⁶⁾、しばしば椎骨動脈解離などで発症する場合が多く、高齢者など動脈硬化を呈した症例でより発症しやすいとされている。頸部内頸動脈は、一般的には骨との接触はないため、通常の日常生活における頸部の動きによって虚血症状を来すことは比較的稀であると考えられており、椎骨動脈解離が原因検索として頸椎との関連性の有無をルーチンとして精査するのに対して、頸部内頸動脈解離の症例に対しては周囲骨構造との関連性まではそれほど精査されていないのが現状であろうと推測される。しかしながら茎状突起に関しては、骨自体の過長、茎状舌骨靱帯の骨化に伴い周囲神経などに何らかの機械的刺激がもたらされる Eagle 症候群が有名で、疾患としての概念がほぼ成立したと言える^{1,2)}。一方、舌骨や甲状軟骨に関しては、それらに起因した脳梗塞発症の報告例は散見されるが、稀な病態であるため、その認知度は未だ極めて低い³⁻¹³⁾。

茎状突起先端から舌骨小角までは茎状舌骨靱帯によって連なっており、内外頸動脈の間を走行し、発生学的には中胚葉性で第 2 鰓弓内の Reichert 氏軟骨由来であるため、化骨する可能性が高いと言われている。部分的化骨は stylohyoid syndrome として報告されており¹⁷⁾、Eagle 症候群の中には、こうした stylohyoid syndrome も含まれている場合があると推測される。さらには、茎状舌骨靱帯の停止部である舌骨小角部の過形成は、stylo-stylohyoid syndrome などとして報告されており、若干の混同を見るようである¹⁸⁾。1953 年に Brown は、舌骨および舌

Fig. 2 3D-CTA 所見

A, B, I: 初発, C, D, J: フォローアップ, E, F, K: 再々発時, G, H, L: 術後

I-L: 元画像, 矢頭: 舌骨大角, *: 内頸動脈起始部

舌骨により左総頸動脈遠位部は捕捉され内頸動脈起始部に接触(矢印). 総頸動脈自体もやや内側走行を呈している. フォローアップ画像では舌骨が変位し外頸動脈を捕捉している(矢印). 手術にて舌骨は正常位置に整復され, 左総頸動脈も正常走行へと整復されている.

A	C	E	G
B	D	F	H
I	J	K	L

Fig. 3 手術所見

A: 内頸動脈起始部の表面はやや色調の変色が認められる(矢印)が, 明らかな舌骨の干渉は確認されない.

B: 線維性優位の表面不整なプラークで, 一部にゼラチン様の成分が付着.

C: 上段: 摘出プラークの外観, 下段: 切断

D, E: Elastica van Gieson(EVG)染色. Lipid coreを有しプラーク肩部には比較的薄い線維性被膜が認められ内膜損傷も一部疑われる(矢印).

A	B	
C	D	E

骨と連動する組織によって種々の症状を呈するものを舌骨症候群(hyoid bone syndrome)として報告した¹⁹⁾。1975年, Kopstein は, 舌骨器官(茎状突起, 茎状舌骨靱帯, および舌骨)由来のいくつかの症候群(Eagle syndrome, stylohyoid syndrome, stylo-stylohyoid syndrome)に関して, それらはすべて舌骨症候群に含まれると提言した²⁰⁾。つまり, 茎状突起から舌骨までを一連の stylohyoid chain であるとみなしている。

解剖学的には, 頸部における内頸動脈の走行と骨構造との関係は十分に解明されていない点も多い。前述したように, 頸部内頸動脈は, 一般的には骨との接触はないため, 頸部の通常の動きによって虚血症状を来すことは比較的稀であると考えられているが, Eagle 症候群以外にも, twisted type や外頸動脈と内頸動脈の走行が逆位を呈するなど走行異常を来している場合には, 周囲骨構造物との関係に十分注意すべきであると考えられる⁹⁾。

慢性的な接触や繰り返し起こる頸動脈への機械的刺激は, 血管内皮の障害を引き起こし, 結果的に, 狭窄, 閉塞, 解離, プラーク形成へと導き, 脳梗塞を引き起こしたり仮性動脈瘤を形成したりする可能性もあることを十分理解する必要がある³⁻¹³⁾。自験例に関しても, 狭窄病変自体は軽度であったが, 慢性的な舌骨の機械的刺激によりプラークが形成され, 脳梗塞再発を繰り返したものと考えられた。あるいは, 対側の内頸動脈も軽度の壁不整があるため, 左内頸動脈起始部にはもともと軽度のプラークがすでに形成されており, そこへ舌骨による機械的な刺激が加わり, 内膜損傷の機転となって血栓形成が起こり塞栓症が引き起こされた可能性もあり得る。舌骨自体は, 他骨と関節がなく宙に浮いた状態の極めて特異な存在であり, 舌骨上筋群, 舌骨下筋群の作用により自在に上下に移動し, 呼吸, 開口, 咀嚼, 嚥下, 会話, さらに歌唱など, 目的とする運動を実現している。正常位置から逸脱した変位がなぜ起こるのかに関しては, 支持する筋肉の問題なのか, それを支配する神経の問題なのか, 周囲結合組織の問題なのかは未だ明らかにはされていない。また, 過長した骨構造物のみが内頸動脈への機械的刺激を与え得るわけではなく, 左右差のない場合でさえも, 時に通常の日常生活において変位し得ることに十分注意すべきである。さらには, 画像上, 舌骨と頸動脈との明らかな接触が見られない場合でも, 両者が極めて隣接し, 舌骨の延長上に狭窄病変などが認められる場合などは, 狭窄の原因として舌骨による機械的刺激が関与している可能性は極めて高いものと考えられる⁹⁾。

舌骨による頸動脈への機械的刺激における病態の可視化において, 頸動脈エコーで嚥下時や体位変化時による

リアルタイムな動的状态の評価が可能な場合もあるが, MRI や頸動脈エコーのみで判断するのは通常困難であり, 塞栓源検索の際は種々の modality を用いた総合的な評価が重要である。自験例のような軽度狭窄病変であれば, MRI や頸動脈エコーのみでは見過ごされてしまい, 塞栓源不明の脳塞栓症(embolic stroke of undetermined source: ESUS)と診断されてしまう場合もあるものと推測される。それゆえ, ESUS や頸部内頸動脈の走行異常を呈した症例においては, 積極的に 3D-CTA まで施行し, 周囲骨構造物との関与の有無を精査することが極めて重要である⁹⁾。

治療に関しては, 耳鼻科的に舌骨大角の部分切除のみ施行した報告や, 内頸動脈内膜剝離に加えて舌骨大角の部分切除を行ったものが散見される³⁻¹³⁾。一方で, 正常位置に自然整復され内頸動脈と離れた位置にある舌骨が確認された場合, 舌骨の切除まで行うかどうかの定まった見解はない。我々も同様の症例を数例経験し, 舌骨の切除までは行わず, いずれの症例も術後の 3D-CTA でも自然整復が確認され, 再発は一度も認められていない⁹⁾。しかしながら, その病態解明においては, 下顎挙上, 頸部伸展といった手術時の体位によって舌骨が正常位置に自然整復されたのかどうかは定かではなく, さらなる知見を要し, 今後も注意深い観察が必要と考えられる。

結 語

舌骨による頸部内頸動脈への機械的刺激によって脳梗塞再発を繰り返した頸部内頸動脈軽度狭窄症の稀な 1 症例を経験した。ESUS 症例においては, 原因検索として頸動脈周囲の骨構造物の関与の可能性も常に念頭に置くべきである。

著者は日本脳卒中学会への COI 自己申告を完了しており, 本論文の発表に関して, 開示すべき COI はない。

参考文献

- 1) Hoffmann E, Räder C, Fuhrmann H, et al: Styloid-carotid artery syndrome treated surgically with Piezosurgery: a case report and literature review. *J Craniomaxillofac Surg* 41: 162-166, 2013
- 2) 入佐 剛, 大田 元, 山崎浩司ら: 頸部内頸動脈解離による脳梗塞を合併した Eagle 症候群の 1 例. *脳卒中の外* 46: 210-215, 2018
- 3) Abdelaziz OS, Ogilvy CS, Lev M: Is there a potential role for hyoid bone compression in pathogenesis of carotid artery stenosis? *Surg Neurol* 51: 650-653, 1999
- 4) Kölbel T, Holst J, Lindh M, et al: Carotid artery entrapment by the hyoid bone. *J Vasc Surg* 48: 1022-1024, 2008
- 5) Mori M, Yamamoto H, Koga M, et al: Hyoid bone compression-

- induced repetitive occlusion and recanalization of the internal carotid artery in a patient with ipsilateral brain and retinal ischemia. *Arch Neurol* 68: 258–259, 2011
- 6) Renard D, Freitag C: Hyoid-related internal carotid artery dissection. *J Neurol* 259: 2501–2502, 2012
 - 7) Janczak D, Skora J, Rucinski A, et al: Recurrent syncope caused by compression of internal carotid artery by an anomalous hyoid bone. *Vasa* 41: 221–224, 2012
 - 8) Tokunaga K, Uehara T, Kanamaru H, et al: Repetitive Artery-to-Artery Embolism Caused by Dynamic Movement of the Internal Carotid Artery and Mechanical Stimulation by the Hyoid Bone. *Circulation* 132: 217–219, 2015
 - 9) 川原一郎, 大園恵介, 藤本隆史ら: 舌骨に関連した頸部内頸動脈狭窄症について—舌骨は急性脳血管症候群の危険因子となり得るか? *Neurol Surg* 44: 835–841, 2016
 - 10) Martinelli O, Fresilli M, Jabbour J, et al: Internal carotid stenosis associated with compression by hyoid bone. *Ann Vasc Surg* 58: 379.e1–e3, 2019
 - 11) Plotkin A, Bartley MG, Bowser KE, et al: Carotid artery entrapment by the hyoid bone—a rare cause of recurrent strokes in a young patient. *Ann Vasc Surg* 57: 48.e7–e11, 2019
 - 12) Liu S, Nezami N, Dardik A, et al: Hyoid bone impingement contributing to symptomatic atherosclerosis of the carotid bifurcation. *J Vasc Surg Cases Innov Tech* 6: 89–92, 2020
 - 13) Yamaguchi Y, Saito A, Ohsawa Y, et al: Dynamic 3D-CT angiography during swallowing for diagnosing hyoid bone or thyroid cartilage compression-induced thromboembolism. *Radiol Case Rep* 15: 1468–1472, 2020
 - 14) Sorensen BF: Bow hunter's stroke. *Neurosurgery* 2: 259–261, 1978
 - 15) Weintraub MI: Beauty parlor stroke syndrome: report of five cases. *JAMA* 269: 2085–2086, 1993
 - 16) Maroon JC, Gardner P, Abula AA, et al: "Golfer's stroke": golf-induced stroke from vertebral artery dissection. *Surg Neurol* 67: 163–168; discussion 168, 2007
 - 17) Shenoi PM: Stylohyoid syndrome. *J Laryngol Otol* 86: 1203–1211, 1972
 - 18) Dolan EA, Mullen JB, Papayouanou J: Styloid-stylohyoid syndrome in the differential diagnosis of atypical facial pain. *Surg Neurol* 21: 291–294, 1984
 - 19) Brown LA: Hyoid bone syndrome. *Miss Doct* 31: 177–180, 1953
 - 20) Kopstein E: Hyoid syndrome. *Arch Otolaryngol* 101: 484–485, 1975

Abstract

A case of low-grade internal carotid artery stenosis presented repetitive ischemic stroke due to the mechanical stimulation of the hyoid bone

Yuka Ogawa, M.D.,¹⁾ Ichiro Kawahara, M.D., Ph.D.,¹⁾ Miki Ueno, M.D., Ph.D.,²⁾
 Kousuke Soejima, M.D.,³⁾ Eri Shiozaki, M.D.,¹⁾ Kazuya Honda, RN., NP, MSN.,³⁾
 Takehiro Ito, RN., NP, MSN.,³⁾ Yoichi Morofuji, M.D., Ph.D.,¹⁾ Wataru Haraguchi, M.D., Ph.D.,¹⁾
 Tomonori Ono, M.D., Ph.D.,¹⁾ and Keisuke Tsutsumi, M.D., Ph.D.¹⁾

¹⁾Department of Neurosurgery, National Hospital Organization Nagasaki Medical Center

²⁾Department of Neurology, National Hospital Organization Nagasaki Medical Center

³⁾Residency Program, National Hospital Organization Nagasaki Medical Center

We describe a rare case of 81-year-old woman who presented repetitive ischemic stroke due to the mechanical stimulation of the hyoid bone. The patient suffered from embolic strokes three times in a year. Although she had several examinations to detect embolic source, a definite embolic source was not detected. Magnetic resonance angiography showed only low-grade internal carotid artery stenosis, but three-dimensional computed tomographic angiography proved clearly the entrapment of the top of common carotid artery due to hyoid bone. We diagnosed embolic stroke due to the mechanical stimulation of the hyoid bone, and the patient underwent carotid endarterectomy. The anatomical position of hyoid bone may be variable and more than expected, and it can be a risk factor for embolic stroke even if low-grade carotid artery stenosis. We should examine carefully the relationship between the carotid artery and the surrounding bone structures in the cases of embolic stroke of undetermined source.

Key words: carotid stenosis, ischemic stroke, hyoid bone

(Jpn J Stroke 43: 457–461, 2021)