変異原性試験法*

梅 田 誠

各種物質の人体への影響を知るために、最終的には動物実験による確認が必要としても、より簡易で経済的な方法で数多くの物質をスクリーニングすることが実際的である。特に、変異原性や発癌性物質の検索は動物実験では長い日時と巨額の費用を要するので、簡易テストでまずスクリーニングすることが望まれる。

変異原性はそれが胚細胞遺伝子に生ずれば、一般には悪性遺伝子として子孫代々に伝わるので、いわゆる遺伝毒性として重要な意味を持っている。ショウジョウバエ、カイコ、さらにマウスなどを用いて子供に生ずる突然変異を調べることは、本来の遺伝毒性を検出する意味で重要である。しかし、一般に広く利用されている簡易テスト法は遺伝子突然変異を調べるバクテリアの突然変異検出法と、染色体異常検出法である。また、生体に投与して生ずる変化を調べる小核試験も簡易テストとして使用されている。本来の意味での遺伝毒性を調べることも重要である。

一方で多くの発癌性物質は、変異原性試験や染色体異常検出試験が陽性である。それゆえ、発癌性物質のスクリーニングにもこれら試験法が第一段階のテストとして重要な役割を果たしている。しかし、発癌性物質と一口に言っても、実際には変異原物質のようにDNAに作用を及ぼすものと、ホルモンや金属のように別の機構で働いているものがある。さらに、発癌機構の中にはプロモーションの段階が解明されているが、この段階で有効に働くプロモーターも広い意味では発癌性物質である。そして、プロモーターはDNAに直接作用しないとされている。このように一部の発癌性物質は変異原性試験に全く反応しない。それゆえプロモーター検出のための特殊な試験法も簡易テストと

して重要である。一方で、培養内形質転換実験法は、動物実験に較べれば比較にならないが、他の簡易試験法より手間と費用がかかる。しかし、細胞の直接の悪性化を指標としており、イニシエーターもプロモーターも検出できるので重要な実験法である。

以下に変異原性物質、発癌性物質検出のためのテスト法を列举する。

1 遺伝子突然変異誘発を指標とする試験

- 1-1 細菌を用いる遺伝子突然変異試験
- 1-2 哺乳類培養細胞を用いる遺伝子突然変異試験
- 1-3 昆虫を用いる遺伝毒性試験
- 1-4 マウスを用いるスポット試験
- 1-5 マウスを用いる特定座位試験

2 染色体異常誘起性を指標とする試験

- 2-1 哺乳類培養細胞を用いる染色体異常試験
- 2-2 げっ歯類の骨髄細胞を用いる染色体異常試験
- 2-3 げっ歯類を用いる小核試験
- 2-4 げっ歯類の生殖細胞を用いる染色体異常試験
- 2-5 げっ歯類を用いる優性致死試験
- 2-6 マウスを用いる相互転座試験
- 2-7 植物細胞を用いる染色体異常試験

3 DNA 損傷性を指標とする試験

- 3-1 細菌を用いるファージ誘発試験
- 3-2 細菌を用いるDNA修復試験
- 3-3 哺乳類細胞を用いる不定期DNA合成(UDS)試験
- 3-4 哺乳類細胞を用いる姉妹染色分体交換(SCE)試験

4 その他の試験

- 4-1 酵母を用いる有糸分裂乗り換え、および遺伝子交換試験
- 4-2 マウスを用いる精子形態異常試験
- 4-3 哺乳類培養細胞を用いる形質転換試験

Makoto Umeda

昭和32年 横浜市立大学医学部卒業
59年 同大学木原生物学研究所教授

* Mutagenicity Tests, 昭和59年6月28日受理

以上多数の試験法が開発されているが、スクリーニングの目的ではこれら全てを実施するわけにはいかない。実際には重要な試験法を選んで実施することになる。日本の化学物質、農薬、食品添加物、医薬品の毒性試験テストガイドラインでは、またOECDで作成された化学物質のテストガイドラインでは、だいたい細菌を用いる遺伝子突然変異試験、染色体異常試験、それに時に小核試験を加えた2あるいは3試験法を必要最小限として義務づける方向にある。これは数多くの物質をテストしなければならない時の経済性を考慮に入れた妥協の線である。ヒトへの危険性を評価するという本来の意味からすると、さらに他の試験を追加して確かめることが必要である。それでも無制限に増やすことはできないのは当然である。似かよった試験法の中より選んで実施することになる。ここでは上の3試験法と、哺乳類培養細胞を用いる形質転換試験、さらにプロモーター検出試験法についてのみ解説する。

I 細菌を用いる遺伝子突然変異試験

Amesの系では*S. typhimurium*のTAシリーズの菌株を用いる。TA 1535, 100株は塩基対置換(basepair change)を、TA 1536, 1537, 1538, 98株はフレームシフト(frame-shift change)を起こす変異原に反応する。これらはヒスチジン要求株(his⁻)であるが、突然変異が生じるとヒスチジン合成酵素が復帰し、ヒスチジン非要求性(his⁺)になる。ヒスチジンをほとんど含まない培地中でテスト化合物を作用させ、復帰体(revertant)のコロニーを作らせ、それを算定してテスト化合物の変異原性を判定する。*E. coli* WP 2株はトリプトファン要求株(Trp⁻)である。これが突然変異によりトリプトファン非要求性(Trp⁺)になることを、上と同じような方法で調べる。菌株のテストセットとしては、TA 1535, 1537, 100, 98, *E. coli* WP 2があげられている。

細菌の薬物代謝は動物体のそれと異なる場合が多い。細菌が活性化酵素を持ち合わせていない前駆型変異原性あるいは発癌性物質(多環芳香族化合物、ニトロソアミン化合物など)の場合、突然変異の系に代謝活性化の系を組み入れる必要がある。代謝活性化には一般に肝ミクロゾーム分画法が用いられている。ラット、ハムスターなどの肝ホモジネートの9,000g上清(ミクロゾーム分画で、この中にチトクロームP-450などの薬物代謝酵素を含む)とNADPHなどの補因子(S9 mix)をテスト化合物と混じて細菌に使用させる。S9 mixにより代謝生成された産物がテスト細菌に作用して変異原性を示すかどうか調べる。

II 哺乳類培養細胞を用いる染色体異常試験

染色体異常を調べるには、染色体数が比較的少なく、安定した核型を示すチャイニーズハムスター由来の培養細胞がよく用いられている。正常2倍体細胞もこまかい解析が出来るので有用である。テスト化合物で処理後、S期を1回および2回まわった時点で染色体標本作製する。一般には24および48時間後としている。各標本について染色体の異常(ギャップ、切断、交換、2動原体染色体、微小染色体、大きな数異常)の出現を調べる。必要に応じて代謝活性化法を組み入れる。

III 小核試験

生体にテスト化合物を投与し、作用を受けた細胞で染色体異常が生じた結果形成される小核を指標にする方法である。生体を用いての変異原の初期スクリーニングとして評価を受けている。

化学物質により染色体や分裂装置に異常が生ずると、動原体を持たない染色体は細胞内に取り残され、つぎの分裂間期で小核を形成する。赤芽球から正常赤血球に分化していく過程で脱核現象がおこるが、小核がある場合は小核のみ脱核されずに細胞内に残る。脱核直後の細胞は多染色性であるので、テスト化合物処理マウス骨髓の塗抹標本で、多染色赤血球の小核出現率を調べる。

IV 培養内形質転換試験

発癌性をテストするのに、突然変異性を調べたり、染色体に及ぼす作用を調べるのは、いわば間接的な検索に過ぎない。直接に正常細胞を形質転換させ悪性化にいたらしめる実験系として、培養内形質転換実験法は重要である。

数種ある実験法のうち、現在評価されている方法はBALB/c3T3細胞と、C3H10T^{1/2}細胞を用いるものである。テスト化合物処理後、細胞がいっぱいになっても継代せずに培地交換のみを続けて4から6週間培養する。発癌性物質処理により生ずる細胞の密生し、pile up, criss crossのある悪性形態細胞増殖巣(フォーカス)の形成を調べる。必要に応じて代謝活性化法を組み入れる。

V 発癌プロモーター検出試験

a 生化学的検出法

マウス皮膚発癌実験のさい、発癌プロモーターの12-O-tetradecanoyl phorbol-13-acetate (TPA)塗布後、いちばん早期に著しく現れる反応はornithine decarboxylase (ODC)の誘導とされている。一方、

plasminogen activator (PA)も TPA 投与で上昇する。発癌プロモーターは臓器特異性が高いことが知られている。ODC の誘導と PA の上昇はともに TPA タイプの皮膚の発癌プロモーターで顕著な反応を示すので、簡易検出法として広く利用されている。しかし、皮膚以外の発癌プロモーターの多くには反応しない。

b 細胞間代謝協同阻止検出法

代謝協同とは細胞が接着したときに形成されるギャップ結合を通して、おたがいの細胞内の低分子物質の移入の行われる現象のことである。培養細胞を用いてこの現象を調べると、多くの発癌プロモーターによりこの細胞間代謝協同現象が阻止される。幅広く発

癌プロモーターを検出する可能性のある方法として脚光をあびている。

c 培養内形質転換実験法

前述した培養内形質転換実験法において、イニシエーター処理後、発癌プロモーター物質で処理し続けると、形質転換率が上昇する。この現象を利用してテスト化合物のプロモーター作用を調べる。

これらプロモーター検出法に関してはここに紹介したような方法があるが、その評価はこれからといった段階である。しかし、発癌プロモーターは癌発生に関して重要な役割を担っている可能性が大であるので、今後その検索は重要になろう。

せせらぎ

(社) 日本水質汚濁研究協会関東支部設立される！

昨年から支部設立のため、準備を進めてきましたが、去る7月10日、国立公衆衛生院において設立記念講演会を開催することができましたので御報告致します。

当日は約200名の方々の御参加のもと、講演会の前にまず設立のための会を開催しました。

金成幹事の司会で開会し、議案審議のため議長に川原、書記に細見の各氏が選出されました。そして、次の議案の審議が行われ、満場一致で承認されました。

1. 支部設立のための経過報告（古見幹事提案）
2. 支部規約について（内山幹事提案）
3. 支部役員について（資料1）（内山幹事提案）

その後、支部役員を代表して北支部長（東京都公害研究所所長）から、支部発足にあたっての挨拶があり、支部設立会は終了致しました。

記念講演会は次のテーマで、国立公害研究所陸水環境研究室室長須藤隆一氏、信州大学助教授桜井善雄氏のおふたりをお願い致しました。両氏とも暑中、貴重なスライド等を混じえながら御講演いただき、参加者一同深く感銘したところです。本誌を借りて深く感

謝の意を表します。

演題 1. 最近の水質汚濁問題と今後の動向

須藤隆一氏（国立公害研究所）

2. 水辺環境の機能とその保全

桜井善雄氏（信州大学）

今後は支部会員の御意見を伺いながら、できるだけ地域に密着した課題を選んで講演会や討論会等を計画していきたいと思っております。また、支部運営についてはお叱り、御意見をどしどしお寄せ下さい。

なお、大変勝手ですが、支部の連絡場所は当分の間次の場所と致します。

連絡場所；東京都千代田区有楽町2-7-1

東京都公害研究所水質部 川原または高橋
Tel (03-212-6804)

1985年3月以降は移転致しますので、そのときはまたお知らせ致します。

(文責、川原 浩)

(資料1) 水質汚濁研究会関東支部 役員一覧

役職名	氏名	所 属
支部長	北 博正	東京都公害研究所
副支部長	早川 登	新潟県環境衛生研究所
	山浦 源太郎	長野県衛生公害研究所
幹事長	川原 浩	東京都公害研究所
幹 事	茨城県 細見 正明	国立公害研究所
	山本 哲也	茨城県公害技術センター
	栃木県 村上 敬吾	栃木県公害研究所
	群馬県 内山 征洋	群馬県衛生公害研究所
	川口 勝	群馬県環境技術研究所
	埼玉県 谷口 通朗	埼玉県公害センター
	千葉県 滝 和夫	千葉工業大学(土木)
	中島 淳	千葉県水質保全研究所
	東京都 相沢 貴子	国立公衆衛生院
	安藤 正典	国立衛生試験所
	大久保 泰宏	新潟県環境衛生研究所
	金成 英夫	国士館大学(工)
	佐藤 博雄	東京水産大学(環工)
	高橋 淑子	東京都公害研究所
	神奈川県 斉藤 克夫	横浜市公害研究所
	吉見 洋	神奈川県公害センター
	新潟県 酒井 洋	新潟県衛生公害研究所
	山梨県 飛田 修作	山梨県衛生公害研究所
	長野県 川村 実	長野県衛生公害研究所
	静岡県 岩橋 光育	静岡県庁水質保全課
監 事	小倉 紀雄	東京農工大学(農)
	山田 茂	川崎市公害研究所