都市公園池の隔離水界における *Microcystis*属によるアオコの長期再現実験

Empirical Study on Long-term Reoccurrence of *Microcystis* Blooms
in an Enclosure Constructed in an Urban Park Pond.

山岸知彦^{1*}, 西村 修², 須藤隆一³

¹一般社団法人埼玉県環境検査研究協会／〒330-0855 さいたま市大宮区上小町1450-11

²東北大学大学院工学研究科／〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-06

³特定非営利活動法人環境生態工学研究所／〒984-0051 仙台市若林区新寺1-5-26-104

TOMOHIKO YAMAGISHI¹, OSAMU NISHIMURA², and RYUICHI SUDO³

¹Saitama-ken Environmental Analysis & Research Association
/1450-11, kamikocho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0855, Japan

²Graduate School of Engineering, Tohoku University
/6-6-06, Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-8579, Japan

³Non-Profit Organization Institute of Ecological Engineering
/1-5-26-104, Shintera, Sendai, Wakabayashi-ku, Miyagi 984-0051, Japan

Abstract

The purpose of this study was to determine whether *Microcystis* blooms could be reoccurred in the enclosure constructed in the eutrophic pond in the urban park where *Microcystis* blooms occurred annually. The size of the enclosure was 10 m square, and the lower end of the enclosure was embedded in sediment to isolate from outside water. The water depth of this pond was about 1 m.

The occurrence of *Microcystis* blooms and changes of water quality items in the enclosure were investigated for two and a half years and compared with those in the urban park pond. As in the case of the urban park pond, *Microcystis* blooms were occurred in the enclosure in the summer for three years, but the density in the third year (1,500 colonies/mL) was decreased significantly compared to that in the first year (5,360 colonies/mL).

In the enclosure, the water temperature and concentrations of total phosphorus and particulate phosphorus showed seasonal changes similar to those in the urban park pond over two and a half years. These results indicated that phosphorus released from the sediment as the water temperature increased caused the occurrence of *Microcystis* blooms. Since this mechanism was similar for the urban park pond and the enclosure, it was considered that similarity was observed in the occurrence of *Microcystis* blooms.

In the enclosure, concentrations of nutrients (total nitrogen, total phosphorus, particulate nitrogen and particulate phosphorus) showed seasonal changes with increasing and decreasing concentrations of chlorophyll a. These changes were similar to those in the urban park pond.

In addition, the densities of competitors (diatom) and predators (small-bodied cladocerans, copepods, and rotifers) showed similarly seasonal changes in the enclosure and the urban park pond.

* Corresponding author:
t.yamagishi@saitama-kankyo.or.jp

These results suggest that the enclosure is useful in evaluating water purification technologies for eutrophic urban park ponds where *Microcystis* blooms have occurred.

Key words: *Microcystis* bloom, urban park pond, enclosure, water purification technology

1. はじめに

日本の都市公園内には修景施設として都市公園池（以下公園池と称する）を整備することが多く、都内では上野恩賜公園の不忍池や井の頭恩賜公園の井の頭池が有名である。しかし近年、公園池において富栄養化が進行し、植物プランクトンの異常増殖による景観の劣化、アオコの発生、毒性物質やかび臭の産生等の水質問題が発生している^{1)–6)}。このため公園管理者は、人々の憩いの場である公園池の水質を良好な状態に維持管理でき、自然景観に配慮した経済的かつ効果的な水質浄化技術を求めている⁷⁾。

海外ではOlquinら⁸⁾が、生活排水等により富栄養化したメキシコの人工池における抽水植物を用いたFTWs (Floating Treatment Wetlands) の効果について2年間調査を行い、糞便性大腸菌及び栄養塩類（特に窒素）の除去効果が高かったことを報告している。また、Teissierら⁹⁾は、ベルギーの公園池13箇所で実施しているバイオマニピュレーションの効果を5年間調査し、池内に繁茂している沈水植物と大型動物プランクトンにより、栄養塩がある程度の濃度以下であれば植物プランクトンの異常増殖を抑制できることを報告している。しかし、どちらの研究も富栄養化において重要な植物プランクトンの現存量や種組成の変遷等は評価されていない。

国内における公園池の水質浄化技術に関しては、室内実験や公園池に設置した実験プラント等による研究開発の報告はあるものの、実際に公園池の富栄養化をどの程度浄化できるのか定量的に効果を評価した例がほとんどなく¹⁰⁾、公園池の浄化技術を植物プランクトンの現存量や種組成の変遷等も含めて評価した例は皆無である¹⁰⁾。この理由としては、富栄養化対策技術の評価方法自体の問題があげられる。公園池の浄化技術として水質や底質等を改善する様々な技術が提案されているが、どの程度効果を発揮し持続するかについては、技術の適用の有無による公園池の生態系の差異を詳細かつ長期的に解析する必要がある。しかし、実際には経済的な問題、あるいは浄化実験における種々の問題（公園池の利用制限、景観の悪化、公園池生態系への予期せぬ悪影響等）により、浄化技術の適用は制限される場合が多い。

一方、環境省では有用性がある「先進的環境技術」の評価試験を行い、その効果を客観的なデータとして「実証」する環境技術実証事業（以下ETV事業と称する）を行っている¹¹⁾。ETV事業は、既実用化された先進的環境技術について、開発者でも利用者でもない信頼できる第三者機関（実証機関）が実際の現場等で実証し、その結果を環境省ウェブサイト等で公表することで、環境技術の普及を支援し、環境保全に資することを目的としている。

筆者らはETV事業の湖沼等水質浄化技術分野¹²⁾における実証機関として、水質浄化技術の実証試験を実施している。これに先立って前述した浄化技術の評価方法自体の問題を解決する手段として、公園池の一部を隔離して水質・生態系、特に富栄養化状態を再現できる隔離水界を構築し、これを用いた富栄養化改善技術の実験的解析・評価を行なうことが有効と考えた。しかし、隔離水界に関しては、①外界（隔離水界の外の水域）から取り込めなかった部分の存在、②外界にはない特徴の存在により、当初は外界の生態系と一致するものの、時間経過とともに互いに離れていくという問題が指摘されている¹³⁾。例えば渡辺ら¹⁴⁾は、諏訪湖に設置した隔離水界と外界の水質を比較し、壁面に付着する微生物（主体は糸状の珪藻、球状の緑藻で試験開始の4月～5月に付着微生物層が発達）の存在により、隔離水界内では栄養塩の吸収及び湖水と底泥への有機物供給が外界とは大きく異なる可能性を示唆している。したがって、隔離水界を用いる場合でも、実際の公園池の富栄養化状態、特にアオコの発生を再現できることを確認して浄化技術を適用する必要があるが、隔離水界と外界の生態系の相似性がどの程度の期間保たれ、アオコの発生が再現できるのか、2年を超える期間で季節変化の再現性が検討された例はない。さらに林ら¹⁵⁾は、湖沼に設置した隔離水界への風波等による影響（固定ロープ等の構造物の破損、隔離壁の耐久性、外部の水の縁越えによる浸入、底泥の巻き上げ等）を報告しており、長期間の試験を実施するためには、隔離水界を維持管理するための対策も重要となる。

そこで、本研究ではアオコの長期再現実験として、例年アオコの原因種である*Microcystis*属が発生している公園池内に隔離水界を設置し、隔離水界の外の池水（外界）と隔離水界内の池水（隔離水界）について約2年半（夏

期3回含む)の水質及び動植物プランクトンの変遷を調査し、測定結果を比較・評価することで、公園池の隔離水界における*Microcystis*属の再現性及び水質特性について検討し、隔離水界を用いた浄化技術の評価手法の有効性について考察を加えた。

2. 実験方法

2.1 実験を行った公園池の概要

Fig. 1に公園池の略図と隔離水界の配置図を示す。公園池は、1978年5月に埼玉県内に設立された総合公園の中に整備されており、南北に延びた形状をしている。水面積 $24,300\text{ m}^2$ 、平均水深 0.95 m ($0.55\sim 1.25\text{ m}$)、平均泥厚 0.61 m (固い粘土層より上部の底泥層: $0.44\sim 0.93\text{ m}$)であり、排水路や河川等の流入は無いが、地下水を2箇所(地図上のI-1、I-2)から揚水により流入させており、北側、中央及び南側の流出口3箇所(地図上のO-1、O-2、O-3)からオーバーフローして隣接する用水路に流出する。なお、滞留時間は約30日である。筆者ら¹⁶⁾は、本公園池の水質及びプランクトン調査を本研究に先立つ

Fig. 1 The map of the pond in the urban park showing the sampling point positions and the enclosure layout.

2011年6月より2014年9月まで実施し、毎年アオコが発生し、その主な原因種が*Microcystis*属であることを確認している。

2.2 隔離水界の設置方法

隔離水界の設置箇所は、設置面積を広く確保でき、樹木等による影や落ち葉等の影響を最も受けにくい池の南端の中央付近を選定した (Fig. 1 中下の囲み線で示す箇所)。拡大図に示すように隔離水界は3箇所設置した。渡辺ら¹⁴⁾の研究に用いられた隔離水界 (水深 5.4 m 、水面積 23 m^2 ($4.8\text{ m}\times 4.8\text{ m}$)、水容積 124 m^3 、壁表面積 104 m^2)を参考に、本研究では、壁面による影響を小さくするために、隔離水界の構造を水面積 100 m^2 ($10\text{ m}\times 10\text{ m}$)、水深約 1 m 、水容積 100 m^3 、壁表面積 40 m^2 とした。渡辺らが用いた隔離水界では水容積に対する壁表面積の比が約 0.83 であるのに対し、本研究では 0.40 と半分以下となる。なお、本隔離水界の大きさは、ミクロコスム (水容積 $< 1\text{ m}^3$ 、水面積 $< 0.1\text{ m}^2$)とマクロコスム (水容積 $> 1000\text{ m}^3$ 、水面積 $> 100\text{ m}^2$)の中間に位置し、その性質は前者 (再現性、操作性、均一性の高さ)と、後者 (栄養段階の多様性、自然の再現性、緩衝効果の高さ)の中間にあたり、週または月単位での生物の群集動態や季節遷移の現象解析に適している¹³⁾とされている。これらの観点も含めて隔離水界の構造を決定した。隔離水界の作成にあたっては、長期間の試験における持続性・耐久性を考慮し、陸上にて建築足場用鉄製単管を用いて枠を組み、周囲をゴムシート (黒色、厚さ 3 mm)で囲み隔壁とした。池内への移動にはクレーンを使用し、風波による縁越えを防ぐためにゴムシートの上端は水面から約 40 cm 上に調整し、下端は底泥に約 30 cm 差し込むことで側面を隔離し、底面はそのままの状態で隔離水界に取り込んだ (Fig. 2)。なお、ゴムシートの上端を水面下に引き下げて (四面で可能)、隔離水界内の水の入れ替えが可能な構造とした。本研究では、約1ヶ月間 (2012年1月18日～2月22日)水の入れ替えを実施した後、ゴムシートを水面上に引き上げて隔離水界を設置した。

池水 (以下外界と称する)の採水地点は、隔離水界か

Fig. 2 The cross section of the enclosure experiment.

ら約5m離れた箇所(地図上のSt-1)とし、隔離水界の採水地点は隔離水界内(地図上のSt-2)とした。

2.3 試料採取方法

外界(St-1)と隔離水界(St-2)における調査は、2012年2月22日から2014年9月16日までの2年半行った。また、鉛直方向の水温分布(水深:5cm、40cm、80cm)の調査は、2012年2月22日から2013年3月21日までの1年間行った。調査期間中は、隔離水界内の水の入れ替えは一切行わなかった。水質調査は毎月1回午前10時に開始した。ゴムボートを用いて採水地点に移動し、水温と溶存酸素(DO)はハンディDO計(DO-5Z、KPK)、透明度は透明度板を用いて測定し、その他の項目は実験室に持ち帰って測定した。分析に供する水は、地下水採水用のペーラーを改良したポリエチレン製円筒形採水器を用いて水面から水深80cmまでの部分(全水深約1m)を垂直円筒状に採取した。

2.4 水質分析方法

採取した試料のpH、化学的酸素消費量(COD_{Mn})、懸濁物質質量(SS)、クロロフィルa(Chl.a:アセトン抽出-分光光度法)、全窒素(TN:アルカリ性ペルオキソ二硫酸カリウム分解-紫外線吸光度法)、全リン(TP:ペルオキソ二硫酸カリウム分解法)及びリン酸態リン(PO₄-P:モリブデン青法)を、それぞれ河川水質試験方法¹⁷⁾に則して分析した。また、溶存態窒素(DTN)及び溶存態リン(DTP)は、セルロース繊維濾紙(No.5C、ADVANTEC)により濾過し、濾液を用いてTN及びTPと同様の手法により分析した。懸濁態窒素(PTN)及び懸濁態リン(PTP)は、それぞれTN値-DTN値、TP値-DTP値から求めた。

2.5 生物計数方法

採取した試料の一部を分取し、植物プランクトンを測定した。中性ホルマリン(2%)を用いて固定した後、計数板(MPC-200、MATSUNAMI GLASS IND.)及び光学顕微鏡(ECLIPSE 80i、NIKON)を用いて定量調査¹⁸⁾を実施した。

なお、固定した試料の一部を分取し、遠心機(H-103N、KOKUSAN)を用いて(1,400×g、20min)10倍に濃縮処理した試料を用いて、植物プランクトンの主な捕食者である動物プランクトン(ミジンコ類、カイアシ類及びワムシ類)の定量調査も実施した。なお、固定によりプランクトンの細胞が破壊されることがあるため、固定前の試料についても定性調査を実施して固定の影響が無い

ことを確認した。

2.6 解析方法

調査項目である水温(水深:5cm)、透明度、pH、DO、COD、SS、TN、PTN、DTN、TP、PTP、DTP、PO₄-P、TN/TP比、Chl.a、夏期にアオコを形成する主な優占種である浮遊性藍藻類の*Microcystis*属(群体/mL)の現存量、年間を通じて出現する珪藻類(優占種である*Aulacoseira*属(糸状体/mL)、*Cyclotella*属(細胞/mL)及び*Synedra*属(細胞/mL))及び動物プランクトン(個/L)の現存量について、隔離水界と外界の水質及び生態系の相似性がどの程度の期間保たれるのかを検討するため、項目ごとに量的な関係(最大値、最小値等)、季節変化の特徴等について比較した。また、1年ごとの調査結果(1年目:2012年2月~2013年1月、2年目:2013年2月~2014年1月、3年目:2014年2月~2014年9月)について、スピアマンの方法を用いてそれぞれ相関分析を行った。さらに隔離水界の調査結果について、各項目の再現性を検討するために、1年目と2年目、2年目と3年目の相関分析も行った。なお、時系列データの相関分析では擬似相関が出やすいために注意を要するが¹⁹⁾、その因果関係を統計的手法で正確に解析することは難しいため、本研究では相関係数はあくまで参考値として示した。

3. 結果と考察

3.1 アオコ発生状況の再現性

Fig.3に外界と隔離水界における*Microcystis*属の現存量の季節変化を示す。

調査期間中は、例年6~11月に目視でアオコの形成を観測した。アオコ発生の目安として、増田ら²⁰⁾のアオコ発生の定義を参考とし、*Microcystis*属の現存量が1,000群体/mL以上とした。なお、発生頻度は少なかったが、*Anabaena*属の発生も確認した。Fig.3に示すように、隔

Fig. 3 Seasonal changes of density of *Microcystis* spp. in the urban park pond (dotted line) and the enclosure constructed in the pond (solid line).

隔離水界及び外界とも3年間にわたって夏期に*Microcystis*属の現存量が1,000群体/mL以上となり、隔離水界においてもアオコの発生が3年間継続したことが確認された。*Microcystis*属の現存量について隔離水界と外界の相関をみると、1年目： $r=0.92$ ($n=11$ (2月欠測)、 $p<0.05$)、2年目： $r=0.67$ ($n=11$ (12月欠測)、 $p<0.05$)、3年目： $r=0.78$ ($n=8$ 、 $p<0.05$)であった。

次に、隔離水界におけるアオコ発生時の現存量の最大値の推移をみると5,360群体/mL (2012年9月)、3,560群体/mL (2013年8月)、1,500群体/mL (2014年8月)となり、経年的に減少傾向を示した。また、アオコの発生期間は1年目のアオコは6月から9月にかけて発生したのに対し、2年目は7月と8月、3年目は8月のみの発生であった。

隔離水界の*Microcystis*属の現存量について1年目と2年目、2年目と3年目のそれぞれの相関をみると、前者は $r=0.81$ ($n=10$ 、 $p<0.05$)、後者は $r=0.82$ ($n=8$ 、 $p<0.05$)であった。しかし、前述したようにアオコ発生時の現存量は年々低下しており、1年目から2年目にかけての減少割合よりも、2年目から3年目にかけての減

少割合の方が大きかった。一方、外界におけるアオコ発生時の現存量の最大値の推移をみると14,800群体/mL (2012年9月)、1,980群体/mL (2013年9月)、3,060群体/mL (2014年7月)となった。2012年に極めて高い値を示したのは、風による集積の効果が影響した可能性がある。一方、2年目に隔離水界よりも低い値での発生にとどまったのは、集積とは逆に風による分散の可能性が考えられるが、原因は明らかでない。

本研究結果より、外界で3年間確認されたアオコの発生が、隔離水界においても同様に発生したことが確認された。この結果は、富栄養化改善技術の長期的な解析・評価に対して、1年目のみに適用した技術の効果が2年目にも継続してアオコ発生抑制に寄与するかどうか、評価できる可能性を示唆するものである。ただし、隔離水界におけるアオコの発生は、現存量及び期間ともに年々小規模化していることも明らかになり、このことも踏まえて富栄養化改善技術を評価する必要がある。

3.2(1) 隔離水界における水質の経年変化

Fig. 4とFig. 5に外界と隔離水界における各項目の季節

Fig. 4 Seasonal changes of (a) water temperature, (b) transparency, (c) pH, (d) dissolved oxygen, (e) chemical oxygen demand(COD), (f) suspended solids (SS) in the urban park pond (dotted line) and the enclosure constructed in the pond (solid line).

変化を示す。全ての水質項目において量的な変動に類似した傾向が見られた。また、水温変動と同様に、Fig. 4に示すCOD、透明度及びSS、Fig. 5に示すChl. a、TP、TN、PTP及びPTNについては季節変化がみられた。しかし、Fig. 5に示すDTP、DTN及びPO₄-Pについては、1年目は夏期にピークが見られる季節変化を示したが、その傾向は経年的に弱まり、3年目には変動が見られなかった。さらにFig. 4に示すpHとDOについては季節変化が最初からみられなかった。Table 1に外界と隔離水界における各水質項目の1年ごとの相関関係の判定結果を示す。外界と隔離水界に有意な相関 ($p < 0.05$) があるとされ

た水質項目数は、1年目12項目、2年目10項目、3年目4項目と徐々に減少したことがわかる。隔離水界の設置における、①外界から取り込めなかった部分の存在、②外界にはない特徴の存在が年々影響を強めて相似性を消失させたものと考えられる。

季節変化が認められなかったpHは平均値(外界: 9.5、隔離水界: 9.5)に差はなく、1年を通じて両者とも8.3~10.1の範囲にあった。またDOも平均値(外界: 14.6 mg/L、隔離水界: 15.2 mg/L)に大きな差はなく、1年を通じて両者とも7.3~20.0 mg/Lの範囲にあった。外界と隔離水界はともに年間を通じて富栄養化しており、植

Fig. 5 Seasonal changes of (a) concentrations of chlorophyll a (Chl. a), (b) concentrations of total nitrogen (TN), (c) concentrations of particulate TN (PTN), (d) concentrations of dissolved TN (DTN), (e) concentrations of total phosphorus (TP), (f) concentrations of particulate TP (PTP), (g) concentrations of dissolved TP (DTP), (h) concentrations of orthophosphate (PO₄-P) in the urban park pond (dotted line) and the enclosure constructed in the pond (solid line).

Table 1 Spearman correlation coefficients between the urban park pond and the enclosure constructed in the pond of water quality parameter during the first year, Feb. 2012 – Jan. 2013, during the second year, Feb. 2013 – Jan. 2014 and during the third year, Feb. 2014 – Sep. 2014.

Water quality parameter	during the first year, Feb. 2012 – Jan. 2013		during the second year, Feb. 2013 – Jan. 2014		during the third year, Feb. 2014 – Sep. 2014	
	Correlation coefficient (r)	p -value	Correlation coefficient (r)	p -value	Correlation coefficient (r)	p -value
Water temperature (°C)	0.9930	0.001	1.0000	0.002	0.9286	0.014
Dissolved oxygen (DO) (mg/L)	0.6130	0.042	0.1000	0.752	0.1429	0.706
Transparency (m)	0.8252	0.006	0.8211	0.009	0.5952	0.115
pH	0.2270	0.452	0.1200	0.704	0.4199	0.267
Chemical oxygen demand (COD) (mg/L)	0.8546	0.005	0.8273	0.009	0.2857	0.450
Suspended Solids (SS) (mg/L)	0.8348	0.006	0.7244	0.022	0.4524	0.231
Concentrations of chlorophyll a (Chla) (μ g/L)	0.5114	0.090	0.6818	0.031	0.2755	0.466
Concentrations of total nitrogen (TN) (mg/L)	0.7671	0.011	0.8818	0.005	0.4762	0.208
Concentrations of particulate TN (PTN) (mg/L)	0.9021	0.004	0.7745	0.014	0.2619	0.488
Concentrations of dissolved TN (DTN) (mg/L)	0.6364	0.044	0.6333	0.045	0.3114	0.410
Concentrations of total phosphorus (TP) (mg/L)	0.7972	0.008	0.8727	0.006	0.7857	0.038
Concentrations of particulate TP (PTP) (mg/L)	0.8273	0.009	0.8364	0.008	0.7857	0.038
Concentrations of dissolved TP (DTP) (mg/L)	0.7900	0.013	0.5275	0.095	0.2909	0.442
Concentrations of orthophosphate (PO ₄ -P) (mg/L)	0.0671	0.824	0.0598	0.850	0.1938	0.608
Ratio of total nitrogen and total phosphorus (TN/TP)	0.7368	0.015	0.4455	0.159	0.8743	0.021

$p < 0.05$

物プランクトンの光合成による炭酸同化作用でpHとDOがそれぞれ高い値を保ったものと考えられた。村上らは²¹⁾、富栄養化した児島湖における植物プランクトン種組成の5年間(1993年4月～1998年3月)の調査結果として*Microcystis*属は6月～11月に、珪藻類(*Aulacoseira*属、*Cyclotella*属等)は年間を通じて優占種として出現したことを報告しており、本公園池でも同様な種組成の変遷がみられた。

本研究結果より外界と隔離水界においては、特に水温、TP及びPTPが約3年間継続して類似の季節変化を示していることが示唆された(Table 1)ことから、水温の上昇に伴う全リンの底泥からの溶出、それにともなう*Microcystis*属等の植物プランクトンの増加というアオコ発生メカニズムが外界と隔離水界で同様に働いているのではないかと考えられた。以下に、季節変化が認められた項目ごとに結果を考察する。

3.2(2) 水温

Fig. 6に外界と隔離水界における水温の季節変化(水深: 5 cm、40 cm、80 cm)を示す。外界と隔離水界で、水深5～80 cmの範囲で類似した季節変化がみられ、水深5 cmで8月に最大(外界: 34.2°C、隔離水界: 35.2

Fig. 6 Seasonal water temperature changes in the urban park pond (A) and the enclosure constructed in the pond (B).

The curves with open circles symbol show the water temperature at 5 cm depth, the curves with open squares symbol show the water temperature at 40 cm depth, and the curves with open triangles symbol show the water temperature at 80 cm depth.

The gray shaded columns indicate the temperature difference between 5 cm and 40 cm depths.

℃)となり、1～2月に最小(外界:4.5～4.6℃、隔離水界:4.5～4.7℃)となる傾向を示した。また、最大値を示した8月(網掛)には、水深5cmと40cmにおいて4℃以上の温度差(外界:4.7℃、隔離水界:4.1℃)が確認された。

高橋らは²²⁾、諏訪湖に設置した隔離水界内では、外界よりも水の攪乱が小さいために、表層近くに水温の躍層がみられやすく、水の動きが両系で異なることを指摘している。しかし、本隔離水界は水深が外界と等しく浅く、また外界は比較的小規模な閉鎖性水域である公園池のため、両系における鉛直方向の水の動きに大きな差異が生じにくい。このため、浮遊性藍藻類によるアオコが形成されやすい水温の鉛直分布を再現できたと考えられる。

3.2(3) COD、透明度及びSS

Fig. 4に示した外界と隔離水界におけるCOD、透明度、SSの季節変化から、COD及びSSは夏季(7月から9月)に高く、冬季に低い傾向にあった。これはFig. 5に示したChl. aの季節変化と類似し、夏季に植物プランクトンが増殖してCODやSSを上昇させていると考えられた。なお、CODとChl. aの関係を図示するとFig. 7(a)の通りとなり、線形関係が認められた。一方、透明度は逆に夏季に低く、冬季に高い傾向を示したが、これも植物プランクトンの増殖が影響したと考えられる。

しかし、外界と隔離水界における水温の類似性に比べて、COD及びSSにおいては最大値の大小やその出現時期にズレが見られた。例えば、CODの1年目はピーク位置がずれた(外界8月、隔離水界9月)もののCOD値の差としては外界に対して8月14%、9月30%程度であったが、2年目のピークは8月で一緒だったが、外界に比べて44%大きなCOD値を示した。この量的な関係はFig. 3に示した*Microcystis*属の2年目に類似しているように見える。CODと*Microcystis*属の現存量の関係を図示するとFig. 7(b)の通りとなり、線形関係が認められた。なお、外界に関しては、調査期間中の最大値14,800個/mL(2012年9月)を除くと $R=0.74$ となり隔離水界と近似した線形関係を示した。

このことから本池のCODの変化はアオコを形成する藻類種の挙動に大きく支配されていると考えられた。

3.2(4) Chl. a及び栄養塩類

Fig. 5に示した植物プランクトンの指標であるChl. aは、両系において6～10月の期間に最大値(外界:2012年6月(350 $\mu\text{g/L}$)、2013年9月(310 $\mu\text{g/L}$)、2014年8月

Fig. 7 (a) Relationship between concentrations of chlorophyll a (Chl.a) and chemical oxygen demand (COD), (b) Relationship between concentrations of chlorophyll a (Chl.a) and density of *Microcystis* spp..
○: the urban park pond
×: the enclosure constructed in the pond

(230 $\mu\text{g/L}$)、隔離水界:2012年8月(290 $\mu\text{g/L}$)、2013年10月(250 $\mu\text{g/L}$)、2014年8月(210 $\mu\text{g/L}$)となり、1～5月の期間に最小値(外界:2012年3月(48 $\mu\text{g/L}$)、2013年3月(57 $\mu\text{g/L}$)、2014年5月(97 $\mu\text{g/L}$)、隔離水界:2012年5月(58 $\mu\text{g/L}$)、2013年4月(38 $\mu\text{g/L}$)、2014年1月(34 $\mu\text{g/L}$)を示し、季節変化の傾向は両系で類似していた。

また、Fig. 5に示した栄養塩類TN、PTN、TP、PTPも季節変化が見られ、ピーク位置の一致などからChl. aの増減に伴う変化が生じていると考えられた。大島ら²³⁾は富栄養化した公園池では、夏期に植物プランクトンが栄養塩を取り込み増殖することでChl. a、TN及びTPが同調して高くなることを報告しており、本研究でも同様の傾向が示された。なお、Chl. aと栄養塩類の関係については、Chl. aとPTNの間にのみ外界と隔離水界の両系で3年間相関があると判定され、TN、TP、PTPは2年目まで相関があったが、3年目には両系で相関が無かった(Table 2)。

一方、DTNとDTPは1年目と2年目には6～9月に

Table 2 Spearman correlation coefficients between concentration of Chl. a and concentrations of water quality parameter in the urban park pond (A) and the enclosure constructed in the pond (B) during the first year, Feb. 2012 – Jan. 2013, during the second year, Feb. 2013 – Jan. 2014 and during the third year, Feb. 2014 – Sep. 2014.

the pond in the urban park (A)	during the first year, Feb. 2012 – Jan. 2013		during the second year, Feb. 2013 – Jan. 2014		during the third year, Feb. 2014 – Sep. 2014	
Water quality parameter	Correlation coefficient (r)	p -value	Correlation coefficient (r)	p -value	Correlation coefficient (r)	p -value
Concentrations of total nitrogen (TN) (mg/L)	0.7035	0.020	0.9545	0.003	0.6826	0.071
Concentrations of particulate TN (PTN) (mg/L)	0.8109	0.010	0.9455	0.003	0.8862	0.019
Concentrations of dissolved TN (DTN) (mg/L)	0.4693	0.138	0.6150	0.052	-0.2651	0.483
Concentrations of total phosphorus (TP) (mg/L)	0.8652	0.004	0.7818	0.013	0.3473	0.358
Concentrations of particulate TP (PTP) (mg/L)	0.9066	0.004	0.8182	0.010	0.3473	0.358
Concentrations of dissolved TP (DTP) (mg/L)	0.3554	0.261	-0.5923	0.061	-0.0667	0.860
Concentrations of orthophosphate (PO ₄ -P) (mg/L)	0.5483	0.069	-0.3196	0.312	0.2073	0.583

the enclosure constructed in the pond (B)	during the first year, Feb. 2012 – Jan. 2013		during the second year, Feb. 2013 – Jan. 2014		during the third year, Feb. 2014 – Sep. 2014	
Water quality parameter	Correlation coefficient (r)	p -value	Correlation coefficient (r)	p -value	Correlation coefficient (r)	p -value
Concentrations of total nitrogen (TN) (mg/L)	0.9301	0.002	0.7545	0.017	0.5952	0.115
Concentrations of particulate TN (PTN) (mg/L)	0.8702	0.006	0.8064	0.011	0.8571	0.023
Concentrations of dissolved TN (DTN) (mg/L)	0.6727	0.033	0.6727	0.033	-0.2381	0.529
Concentrations of total phosphorus (TP) (mg/L)	0.8881	0.003	0.8091	0.011	0.6667	0.078
Concentrations of particulate TP (PTP) (mg/L)	0.7909	0.012	0.8455	0.008	0.6667	0.078
Concentrations of dissolved TP (DTP) (mg/L)	0.6667	0.035	0.1556	0.623	-0.3952	0.296
Concentrations of orthophosphate (PO ₄ -P) (mg/L)	0.4261	0.158	0.5126	0.105	-0.6506	0.085

$p < 0.05$

増加する傾向が両系でみられたが、3年目は両系とも年間を通じて季節変化はみられなかった。また、PO₄-Pは両系とも1年目には9月に大きなピークを示したが、2年目以降は両系のピークの時期がずれ、TPに示されるような季節変化も明瞭ではなかった。TNに対するPTNの割合（外界：21.4～80.8%（平均：62.6%）、隔離水界：29.3～76.7%（平均：57.7%））と、TPに対するPTPの割合（外界：60.7～90.8%（平均：81.9%）、隔離水界：50.0～91.0%（平均：79.3%））を比べると、両系でリンの方が懸濁態の占める割合が高くなる傾向を示し、調査時には底泥の巻き上げ等による粘土鉱物の混入が無いことを確認しており、植物プランクトンの細胞内に取り込まれた状態であることが示唆された。前述した渡辺ら¹⁴⁾の指摘のように、隔離水界実験では、壁面の付着微生物層の代謝による栄養塩類の取り込みが懸念されており、本実験でも壁面の付着藻類として、珪藻類の*Achnanthes*属、*Nitzschia*属、*Gomphonema*属が優占種として確認されたが、ピークの時期はずれるものの外界と類似した栄養塩類の存在形態が再現され、それに伴うChl. aの季節

変化がみられたことから、隔離水界の水容積に対する壁表面積の割合が0.40程度であれば、その影響が少ない可能性が示唆された。しかし、3年目には両系でPTPとChl. aの相関が無かったことから、動物プランクトンやデトリタス等の懸濁態に含まれる窒素とリンの評価も今後の課題として残された。

3.2(5) 栄養塩類の溶出量の推定

1年間（2012年2月～2013年1月（1年目）、2013年2月～2014年1月（2年目）、2014年2月～2014年9月（3年目））における外界（A）と隔離水界（B）のTN及びTPの箱ひげ図（最大値、75%値、50%値（中央値）、25%値及び最小値）をFig. 8（TN）とFig. 9（TP）にそれぞれ示す。なお、外界では、池底の堆積物からの栄養塩類の回帰の他に、地下水（全窒素：0.57～1.42 mg/L、全リン：0.44～0.71 mg/L）や降水時における池周囲からの土壌の流入により栄養塩類が供給されるが、隔離水界における主な栄養塩類の供給は、降水と堆積物からの回帰であり、外部からの流入はない。

Fig. 8 Box and whisker plot of the concentrations of total nitrogen (TN) in the urban park pond (A) and the enclosure constructed in the pond (B); a: the first year (Feb. 2012 – Jan. 2013), b: the second year (Feb. 2013 – Jan. 2014), c: the third year (Feb. 2014 – Sep. 2014).

Fig. 8より、TNの外界 (A) における年間ごとの最大値、最小値及び中央値は、1年目 (a) : 4.60 mg/L (8月)、0.87 mg/L (1月)、2.00 mg/L、2年目 (b) : 3.67 mg/L (9月)、0.80 mg/L (3月)、2.29 mg/L、3年目 (c) : 3.81 mg/L (6月)、1.66 mg/L (5月)、2.56 mg/Lであった。一方、隔離水界 (B) における年間ごとの最大値、最小値及び中央値は、1年目 : 3.91 mg/L (9月)、0.91 mg/L (1月)、1.68 mg/L、2年目 : 4.65 mg/L (9月)、0.41 mg/L (3月)、2.22 mg/L、3年目 : 3.13 mg/L (8月)、1.68 mg/L (7月)、2.26 mg/Lであった。外界における最大値と最小値の差は、1年目 : 3.73 mg/L、2年目 : 2.87 mg/L、3年目 : 2.15 mg/Lとなり年々減少したが、隔離水界では、1年目 : 3.00 mg/L、2年目 : 4.24 mg/L、3年目 : 1.45 mg/Lとなり2年目が1年目より高い値となり、3年目に減少した。

Fig. 9より、TPの外界 (A) における年間ごとの最大値、最小値及び中央値は、1年目 : 0.491 mg/L (8月)、0.143 mg/L (1月)、0.276 mg/L、2年目 : 0.357 mg/L (8月)、0.123 mg/L (1月)、0.253 mg/L、3年目 : 0.316 mg/L (8月)、0.133 mg/L (2月)、0.245 mg/Lであった。一方、隔離水界 (B) における年間ごとの最大値、最小値及び中央値は、1年目 : 0.482 mg/L (9月)、

Fig. 9 Box and whisker plot of the concentrations of total phosphorus (TP) in the urban park pond (A) and the enclosure constructed in the pond (B); a: the first year (Feb. 2012 – Jan. 2013), b: the second year (Feb. 2013 – Jan. 2014), c: the third year (Feb. 2014 – Sep. 2014).

0.127 mg/L (1月)、0.238 mg/L、2年目 : 0.443 mg/L (9月)、0.088 mg/L (1月)、0.209 mg/L、3年目 : 0.273 mg/L (8月)、0.089 mg/L (2月)、0.183 mg/Lであった。外界における最大値と最小値の差は、1年目 : 0.348 mg/L、2年目 : 0.234 mg/L、3年目 : 0.183 mg/LとなりTN同様に徐々に減少したが、隔離水界では、1年目 : 0.355 mg/L、2年目 : 0.355 mg/L、3年目 : 0.184 mg/Lとなり2年目が1年目と同様の値となり、3年目に減少した。

TN及びTPにおける「最大値と最小値の差」は、どちらも2年目に隔離水界において外界よりも高い値を示した。したがって、隔離水界においては、1年目に藻類の増殖で消費された栄養塩類が枯渇せずに、堆積物から回帰している可能性が示唆された。一方、隔離水界においては、3年目にTN及びTPの値が下がっていることから、時間の経過とともに堆積物からの溶出量が減少している可能性が示唆された。なお、外界のTN/TP比の平均値に対する隔離水界の平均値の割合が、1年目109%、2年目108%、3年目122%となっており、隔離水界において窒素源よりもリン源の方が減少している可能性が示唆された。

相崎ら²⁴⁾は、植物プランクトンの分解による栄養塩類

の回帰に関する培養実験により、植物プランクトン由来の懸濁態窒素 (PTN) の 7~9 割程度は溶存態無機窒素 ($\text{NO}_3\text{-N} + \text{NO}_2\text{-N} + \text{NH}_4\text{-N}$) として回帰するが、懸濁態リン (PTP) は 2 割程度しか溶存態無機リン ($\text{PO}_4\text{-P}$) として回帰せず、残りは懸濁態の形で残ることを報告しており、今後の研究として、隔離水界における底泥からの栄養塩類 (硝酸態窒素を含む) の詳細な溶出量調査の課題が残された。

3.3(1) *Microcystis* 属と競争する植物プランクトンの出現状況

Fig. 10 に年間を通じて主な優占種となる珪藻類 (*Aulacoseira* 属、*Cyclotella* 属、*Synedra* 属) について、外界と隔離水界における季節変化を示す。

Fig. 10 (a) より *Aulacoseira* 属の現存量は、外界では 5~7 月に最大 (2012 年 6 月が 8,840 糸状体/mL、2013 年 7 月が 5,290 糸状体/mL、2014 年 5 月が 3,970 糸状体/mL) となり、隔離水界では 5~8 月に最大 (2012 年 8 月が 3,520 糸状体/mL、2013 年 6 月が 2,210 糸状体/mL、2014 年 5 月が 1,990 糸状体/mL) となる季節変化がみられたが、例年、外界の最大値の方が 2~2.5 倍高くなる傾向を示した。前述したように *Microcystis* 属の現存量が最大値を示したのは、外界では 7~9 月、隔離水界では 8~9 月であり *Aulacoseira* 属の現存量が最大値を示した後に増加する傾向が両系において例年みられた。*Microcystis* 属の現存量との関係性をみると、外界 (1 年目 ($n=11$, $r=0.18$, $p>0.05$), 2 年目 ($n=11$, $r=0.63$, $p<0.05$), 3 年目 ($n=8$, $r=0.55$, $p>0.05$)) では、2 年目に有意な相関があると判定されたが、隔離水界 (1 年目 ($n=11$, $r=0.55$, $p>0.05$), 2 年目 ($n=11$, $r=0.11$, $p>0.05$), 3 年目 ($n=8$, $r=0.68$, $p>0.05$)) では有意な相関があるとはいえないと判定された。

Fig. 10 (b) より *Cyclotella* 属の現存量は、両系において冬期 (12~3 月) に増加し、夏期 (8~9 月) に減少する季節変化がみられたが、外界では 2014 年より増加傾向 (最大値: 9,240 細胞/mL (2012 年)、26,400 細胞/mL (2013 年)、78,800 細胞/mL (2014 年)) を示したのに対し、隔離水界では減少傾向 (最大値: 40,700 細胞/mL (2012 年)、47,300 細胞/mL (2013 年)、12,600 細胞/mL (2014 年)) を示した。大概ら²⁵⁾は細胞サイズ 10 μm の *Cyclotella* はワムシ (*Keratella*)・枝角類 (*Bosmina*)・カイアシ類 (ノープリウス) に捕食されることを炭素・窒素同位体を用いた捕食実験で確認している。出現した *Cyclotella* 属の細胞サイズが 5~10 μm の単体であったこ

とから動物プランクトン (小型甲殻類、ワムシ類) による捕食が影響したと考えられた。*Microcystis* 属の現存量との関係性をみると、外界 (1 年目 ($n=11$, $r=-0.77$, $p<0.05$), 2 年目 ($n=11$, $r=-0.73$, $p<0.05$), 3 年目 ($n=8$, $r=-0.93$, $p<0.05$)) では例年有意な相関があると判定されたが、隔離水界 (1 年目 ($n=11$, $r=-0.42$, $p>0.05$), 2 年目 ($n=11$, $r=-0.74$, $p<0.05$), 3 年目 ($n=8$, $r=-0.66$, $p>0.05$)) では 2 年目に有意な相関があると判定された。なお、相関係数 (r) はすべて負の値となった。

Fig. 10 (c) より *Synedra* 属の現存量は、2012 年 9 月に両系において同程度の最大値 (外界: 16,400 細胞/mL、隔離水界: 16,600 細胞/mL) を示したが、その後、2013 年の最大値 (外界: 4,470 細胞/mL (10 月)、隔離水界: 1,810 細胞/mL (8 月)) と 2014 年の最大値 (外界: 1,290 細胞/mL (9 月)、隔離水界: 600 細胞/mL (6 月)) は 2012 年の値と比べると低い値で推移し、両水域で減少傾向がみられた。1 年目は両系において *Microcystis* 属の現存量が最大値を示した 9 月に *Synedra* 属の現存量が最大値を示したが、2 年目以降は対照区の 2 年目 (8 月) を

Fig. 10 Seasonal changes of (a) density of *Aulacoseira* spp., (b) density of *Cyclotella* spp., (c) density of *Synedra* spp. in the urban park pond (dotted line) and the enclosure constructed in the pond (solid line).

除くと、*Synedra*属と*Microcystis*属の現存量が最大値を示した月とは異なった。*Microcystis*属の現存量との関係性をみると、外界（1年目（ $n=11$, $r=0.51$, $p>0.05$ ）、2年目（ $n=11$, $r=0.77$, $p<0.05$ ）、3年目（ $n=8$, $r=0.36$, $p>0.05$ ））と隔離水界（1年目（ $n=11$, $r=0.50$, $p>0.05$ ）、2年目（ $n=11$, $r=0.67$, $p<0.05$ ）、3年目（ $n=8$, $r=0.48$, $p>0.05$ ））では2年目にそれぞれ有意な相関があると判定された。

3.3(2) 植物プランクトンを捕食する動物プランクトンの出現状況

Fig. 11に2011年6月～2014年9月の期間における水温と動物プランクトンの現存量（個/L）及び種組成の季節変化を示す。なお、動物プランクトンの種組成は、小型のBranchiopoda（*Bosmina longirostris*, *Diaphanosoma brachyurum*）、Copepoda（Cyclopidae, Diaptomidae）、ワムシ類の中で優占していた*Brachionus*属（*B. calyciflorus*, *B. angularis*, *B. forficula*）、*Keratella*属（*K. cochlearis*, *K. valga*）、*Monostyla*属（*M. bulla*, *M. quadridentata*）、Trichoceridae（*Diurella* sp., *Trichocerca capucina*）、それ以外のワムシ類の総量をその他として、それぞれ表記した。

Fig. 11より、現存量は、両系において7～9月に最大値となる季節変化がみられ（外界：40,000個/L（2012年7月）、59,400個/L（2013年7月）、37,700個/L（2014年8月）、隔離水界：34,900個/L（2012年8月）、43,500個/L（2013年8月）、31,300個/L（2014年9月））、

その平均値は、外界と隔離水界でそれぞれ14,700個/L

（710～59,400個/L）と17,200個/L（480～43,500個/L）であった。*Microcystis*属の現存量との関係性をみると、外界（1年目（ $n=11$, $r=0.55$, $p>0.05$ ）、2年目（ $n=11$, $r=0.51$, $p>0.05$ ）、3年目（ $n=8$, $r=0.81$, $p<0.05$ ））では3年目、隔離水界（1年目（ $n=11$, $r=0.50$, $p>0.05$ ）、2年目（ $n=11$, $r=0.71$, $p<0.05$ ）、3年目（ $n=8$, $r=0.80$, $p<0.05$ ））では2年目と3年目に有意な相関があると判定された。

また、種組成は年により異なったが、両系で同様な優占種が出現することが確認された。なお、*Branchiopoda*属は、外界で170個/L（2012年10月、2013年6～7月）、対照区で170～670個/L（2013年6～7月、2014年7月、9月）で現存量及び出現頻度は少なかった。一方、年間を通じて優占種として出現した*Keratella*属の現存量は、隔離水界の方が外界よりも増加する傾向が示され、特に2013年9月～2014年2月の期間における総量（外界：14,000個/L、隔離水界：42,700個/L）は外界の約3倍となった。また、Copepodaに関しても2012年（外界：総量4,720個/L、隔離水界：総量6,470個/L）と2013年（外界：総量2,680個/L、隔離水界：総量7,200個/L）は隔離水界の方が高い傾向を示した。隔離水界には魚類を投入していないが、外界にはヘラブナ、コイ、モツゴ等が生息しており、動物プランクトンの隠れ家となる水草がないために、それらによる捕食圧の影響を受けていた可能性が示唆された。

花里ら²⁶⁾は、湖底が開放された隔離水界内では、動物プランクトン群集が水界の外の湖水中と同様な変動を示し、湖底から動物プランクトンの卵が回帰することによ

Fig. 11 Seasonal changes of the herbivorous zooplankton (small-bodied cladocerans, copepods and rotifers were dominant.) density and communities and water temperature in the urban park pond (A) and the enclosure constructed in the pond (B).

り湖と似た生態系を長期間維持できることが報告されており、本研究でも隔離水界において外界と類似した季節変化が長期的に再現されることが確認された。

さらなる詳細な研究として原生動物における外界との類似性、再現性の評価が今後の課題として残された。

3.4 *Microcystis*属によるアオコの発生要因

隔離水界での*Microcystis*属によるアオコの発生は1年目と2年目ではほぼ再現できたのに対して、3年目はアオコを形成するものの (Fig. 3)、量的には大きく減少した。その一因としてはリンが制限的に働いているのではないかと考えられた。そこで、溶存態無機物である $\text{PO}_4\text{-P}$ の推移をみると (Fig. 5)、TPに対する $\text{PO}_4\text{-P}$ の割合 (外界: 0.5~15.6% (平均: 5.6%)、隔離水界: 0.7~10.8% (平均: 5.0%)) は低かったが、1年目 (外界: 0.028 mg/L (8月) ~ 0.048 mg/L (9月)、隔離水界: 0.018 mg/L (8月) ~ 0.050 mg/L (9月)) と2年目 (外界: 0.024 mg/L (8月)、隔離水界: 0.037 mg/L (8月) ~ 0.039 mg/L (9月)) において、*Microcystis*属の現存

量が最大値を示した8~9月に高くなる傾向がみられた。相崎ら²³⁾は、藍藻類は水温が高い条件下では容易に分解されることを報告しており、両系において夏期に栄養塩類を取り込み増殖した*Microcystis*属の一部は死滅・沈降・分解により、再び栄養塩類が池水に回帰している可能性が示唆された。栄養塩類の枯渇に伴う*Microcystis*属の現存量への影響について、中村ら²⁷⁾は、浅い富栄養湖である諏訪湖の*Microcystis*属は、降水量の低下により滞留時間が長期化 (80日以上) し、河川からの窒素流入負荷量の減少により窒素源 (硝酸態窒素) が枯渇し、その増殖が制限されることを報告している。しかし、Fig. 8とFig. 9で示したように外部からの流入負荷の無い滞留状態の隔離水界では窒素源よりもリン源の方が減少する傾向が示唆され、*Microcystis*属の増殖に影響を与える要因の一つと考えられた。

栄養塩類と*Microcystis*属の現存量との関係性を Table 3に示す。外界では、TPとPTPは3年間相関があると判定されたが、PTNは2年目まで、TNは2年目のみ相関があった。一方、隔離水界ではTNP、TN、TP、PTP全

Table 3 Spearman correlation coefficients between density of *Microcystis* spp. and concentrations of water quality parameter in the urban park pond (A) and the enclosure constructed in the pond (B) during the first year, Feb. 2012 – Jan. 2013, during the second year, Feb. 2013 – Jan. 2014 and during the third year, Feb. 2014 – Sep. 2014.

the pond in the urban park (A)	during the first year, Feb. 2012 – Jan. 2013		during the second year, Feb. 2013 – Jan. 2014		during the third year, Feb. 2014 – Sep. 2014	
Water quality parameter	Correlation coefficient (<i>r</i>)	<i>p</i> -value	Correlation coefficient (<i>r</i>)	<i>p</i> -value	Correlation coefficient (<i>r</i>)	<i>p</i> -value
Concentrations of total nitrogen (TN) (mg/L)	0.4738	0.134	0.6970	0.028	0.1667	0.659
Concentrations of particulate TN (PTN) (mg/L)	0.8909	0.008	0.6925	0.029	0.5238	0.166
Concentrations of dissolved TN (DTN) (mg/L)	-0.1515	0.649	0.3562	0.260	-0.6946	0.066
Concentrations of total phosphorus (TP) (mg/L)	0.6818	0.031	0.7563	0.017	0.9286	0.014
Concentrations of particulate TP (PTP) (mg/L)	0.7455	0.025	0.8018	0.011	0.9286	0.014
Concentrations of dissolved TP (DTP) (mg/L)	0.6000	0.072	-0.5068	0.109	0.0361	0.924
Concentrations of orthophosphate ($\text{PO}_4\text{-P}$) (mg/L)	0.6119	0.053	-0.3135	0.322	-0.5213	0.168

the enclosure constructed in the pond (B)	during the first year, Feb. 2012 – Jan. 2013		during the second year, Feb. 2013 – Jan. 2014		during the third year, Feb. 2014 – Sep. 2014	
Water quality parameter	Correlation coefficient (<i>r</i>)	<i>p</i> -value	Correlation coefficient (<i>r</i>)	<i>p</i> -value	Correlation coefficient (<i>r</i>)	<i>p</i> -value
Concentrations of total nitrogen (TN) (mg/L)	0.8975	0.005	0.6925	0.029	0.4431	0.241
Concentrations of particulate TN (PTN) (mg/L)	0.8476	0.011	0.7032	0.026	0.2515	0.506
Concentrations of dissolved TN (DTN) (mg/L)	0.7052	0.034	0.6105	0.054	0.6707	0.076
Concentrations of total phosphorus (TP) (mg/L)	0.9157	0.004	0.7836	0.013	0.6108	0.106
Concentrations of particulate TP (PTP) (mg/L)	0.9119	0.006	0.8474	0.007	0.6108	0.106
Concentrations of dissolved TP (DTP) (mg/L)	0.7409	0.026	0.2936	0.353	-0.5783	0.126
Concentrations of orthophosphate ($\text{PO}_4\text{-P}$) (mg/L)	0.4427	0.162	0.6674	0.035	-0.1482	0.695

$p < 0.05$

てで2年目まで相関があり、3年目は全て相関がなかった。また、 $\text{PO}_4\text{-P}$ は、外界では有意な相関があるとはいえないと判定され、隔離水界では2年目に有意な相関があると判定された。前述したように隔離水界においては、競争者である *Aulacoseira* 属（5～8月に最大値）と *Cyclotella* 属（12～3月に増加）が、その現存量に違いはあるものの外界と同時期に例年出現していることから *Microcystis* 属の増殖を抑制していた可能性が示唆された（Fig. 10）。また、捕食者である動物プランクトンの現存量が最大値となった時期と *Microcystis* 属の現存量が最大となった時期（外界では2012年9月、2013年9月及び2014年7月、隔離水界では2012年9月、2013年8月及び2014年8月）をみると（Fig. 3, Fig. 11）、隔離水界の2013年8月を除き、すべて異なる月であった。定性調査では、*Microcystis* 属を捕食する鞭毛虫の *Monas* 属、ワムシ類の *Philodina* 属が確認され、アオコ毒に耐性を持つ大型のワムシ類（*Brachionus calyciflorus*、*Asplanchna* 属）が *Microcystis* 属（5～10細胞程度）を吸い込んでいるのが観察されたことから動物プランクトンの増殖も *Microcystis* 属の増殖を抑制していた可能性が示唆された。

4. 総括

以下に本研究で確認された隔離水界におけるアオコの長期再現性及び水質の特性と、それらを踏まえた浄化技術の評価手法の有効性について述べる。

4.1 アオコの長期再現性及び水質特性

【生物的特性】

- ①2月に設置した隔離水界において、夏期の3年間（2012～2014年）は、外界と同様に *Microcystis* 属によるアオコの発生が再現された。例年8～9月に *Microcystis* 属の現存量が最大となったが、年々減少傾向を示した。
- ②水温の上昇に伴う全リンの底泥からの溶出、それにともなう *Microcystis* 属等の植物プランクトンの増加というアオコ発生メカニズムが外界と同様に働いていることが示唆された。
- ③優占種として例年出現した植物プランクトン（*Aulacoseira* 属（5～8月）、*Cyclotella* 属（12～5月）及び *Synedra* 属（6～11月））は、現存量に違いはあるものの外界と同時期に増加する季節変化を示した。
- ④動物プランクトン（ミジンコ類、カイアシ類及びワムシ類）は、外界と同様に7～9月に最大値となる季節変化を示し、種組成は年により異なったが、外界と同

様な優占種が出現することが確認された。

【物理的特性】

- ⑤隔離水界においては、水温（水深：5～80 cm）の季節変化と鉛直分布は外界と同様の傾向を示し、浮遊性藍藻類によるアオコが形成されやすい水温の鉛直分布を再現できることが確認された。

【化学的特性】

- ⑥隔離水界においては、水温、TP及びPTPが外界と類似した季節変化がみられ、約3年間継続して外界と有意な相関があると判定された。
- ⑦栄養塩類であるTN、TP、PTN及びPTPは、外界と同様にChl. aの増減に伴う季節変化を示した。
- ⑧隔離水界内の水容積に対する壁表面積の割合が0.40であれば、付着藻類等による栄養塩類への影響が少ない可能性が示唆された。
- ⑨植物プランクトンの増殖に伴うTP及びTNの変化量から推定した栄養塩類の溶出量より、隔離水界の栄養塩類は枯渇せずに、例年堆積物から回帰しているが、3年目以降はリン源が減少してくる可能性が示唆された。

4.2 浄化技術の評価手法の有効性

- ①隔離水界の生物的特性を利用することにより、池水内の生態系における食物連鎖を活用したバイオマニピュレーション、魚類除去等による改善効果の持続性評価に有効である可能性が示された。
- ②隔離水界の物理的特性を利用することにより、日成層の形成や底質の貧酸素化対策である流動化・曝気循環等の評価に有効である可能性が示された。
- ③隔離水界の化学的特性を利用することにより、底泥表層からの栄養塩回帰対策としての浚渫、覆砂及び底質改善、自然浄化作用を利用した対策としての浮島、ビオトープ及び沈水植物再生等の改善効果がすぐにあらわれにくい技術の長期的な評価として2年間は有効である可能性が示された。

本研究で構築した隔離水界を公園池に設置することにより、外界と同様に夏期の3年間は *Microcystis* 属によるアオコ発生の現象を再現できた。今後、さらに隔離水界の富栄養化モデルの詳細な解析をするために、今回評価できなかった原生動物、ピコプランクトン等を含めた生態系の関連性についても調査・研究を進める必要がある。

謝辞

本研究調査において多大なるサポートと貴重なご助言を賜りました元一般社団法人埼玉県環境検査研究協会の鈴木章氏に心より感謝申し上げます。

参考文献

- 1) 渡辺泰徳：都市公園池における景観と植物プランクトン発生の研究，総合都市研究/東京都立大学都市研究所編，75，137-145 (2001)
- 2) 藤井智康，松井美帆：奈良公園内のアオコ発生・消滅条件，奈良教育大学紀要，57(2)，41-47 (2008)
- 3) 伊藤政博，星野由典：名古屋市内における二箇所の都市公園内における池の水質について—中村公園と庄内緑地公園—，名城大学理工学部研究報告，49 (2009)
- 4) 針谷さゆり，若山正夫，東島正哉，五井邦宏：「別所沼の水質浄化に関する調査（第1報）—水質特性及び導水による浄化効果について—」，埼玉県公害センター研究報告，17，45-57 (1990)
- 5) 新矢将尚，北野雅昭，後藤薫，土永恒彌，鶴保謙四郎：大阪市内公園池におけるアオコによる水質変動，環境技術，26(11)，737-742 (1997)
- 6) 萩原拓幸，北野雅昭，新矢将尚，大島詔：都市公園池のミクロシスチン濃度，生活衛生，48(5)，269-275 (2004)
- 7) 環境省環境技術実証事業 (ETV) アンケート結果について，一般社団法人埼玉県環境検査研究協会，アンケート調査報告，2013年4月，http://www.saitama-kankyo.or.jp/pdf/24etv/h24etv_enq.pdf
- 8) Olguin, E. J., Sánchez-Galvan, G., Melo, F. J., Hernandez, V. J. and Gonzalez-Portela, R. E.: Long-term assessment at field scale of floating treatment wetlands for improvement of water quality and provision of ecosystem services in a eutrophic urban pond, Science of the Total Environment, 584-585, 561-571 (2017)
- 9) Teissier, S., Peretyatko, A., Backer, S., Triest, L.: Strength of phytoplankton-nutrient relationship: evidence from 13 biomanipulated ponds, Hydrobiologia, 689, 147-159 (2012)
- 10) 山岸知彦：都市公園池における水質の課題と水質改善対策，日本水処理生物学会誌，51(1)，19-28 (2015)
- 11) 環境省総合環境政策：環境技術実証事業，<http://www.env.go.jp/policy/etv/> (2019年6月時点)
- 12) 環境省総合環境政策：環境技術実証事業 湖沼等水質浄化技術分野 対象分野の概要，<http://www.env.go.jp/policy/etv/field/fp04/index.html> (2019年6月時点)
- 13) 高橋正征：メソコスム研究の歴史，メソコスム湖沼生態系の解析，西条八束・坂本充編，名古屋大学出版会，17-34 (1993)
- 14) 渡辺泰徳，沖野外輝夫，林秀剛，高橋正征，花里孝幸：メソコスムと湖の生態系の比較，メソコスム湖沼生態系の解析，西条八束・坂本充編，名古屋大学出版会，75-85 (1993)
- 15) 林秀剛：メソコスム実験の装置と問題点，メソコスム湖沼生態系の解析，西条八束・坂本充編，名古屋大学出版会，37-51 (1993)
- 16) 山岸知彦，鈴木章，西村修，須藤隆一：都市公園池におけるアオコ発生の環境要因，日本水処理生物学会誌，51(4)，115-126 (2015)
- 17) 国土交通省水質連絡会，河川水質試験方法（案）[2008年版] 河川管理者のために
- 18) 日本水道協会，上水試験方法（2011年版）
- 19) 中山新一朗，阿部真人，岡村寛：Convergent cross mappingの紹介：生態学における時系列間の因果関係推定法，日本生態学会誌，65，241-253 (2015)
- 20) 増田周平，野村宗弘，坪根史佳，千葉信男，藤本尚志，中野和典，西村修：漆沢ダム湖におけるアオコ発生メカニズムに関する検討，環境工学研究論文集，45，103-111 (2008)
- 21) 村上和仁，鷹野洋，吉岡敏行，荻野泰夫，森忠繁：児島湖における植物プランクトンの種構成と季節的消長，水環境学会誌，22(9)，770-775 (1999)
- 22) 高橋正征，岸野元彰，林秀剛：メソコスム内の水温と水の動き，メソコスム湖沼生態系の解析，西条八束・坂本充編，名古屋大学出版会，63-74 (1993)
- 23) 大島詔，新矢将尚，北野雅昭，萩原拓幸，後藤薫，土永恒彌：都市公園池の富栄養化特性とクロロフィル a との関係，水環境学会誌，31(11)，701-706 (2008)
- 24) Aizaki, M. and Takamura, N.: Regeneration of nutrient and detritus formation from aerobic decomposition of natural phytoplankton, Japanese Journal of Limnology, 52(2), 83-94 (1991)
- 25) 大槻晃，坂本充，安野正之，岩熊敏夫，花里孝幸，青山莞爾：同位体をトレーサーとした摂食実験，メソコスム湖沼生態系の解析，西条八束・坂本充編，名古屋大学出版会，287-296 (1993)
- 26) Hanazato, T., Hayashi, H., Ichikawa, T. and Watanabe, Y.: Dynamics of zooplankton community in enclosures of different types in a shallow eutrophic lake, Japanese Journal of Limnology, 50(1), 25-37 (1989)
- 27) 中村剛也，本間隆満，宮原裕一，花里孝幸，朴虎東：諏訪湖における藍藻の現存量・種組成変化に及ぼす滞留時間の影響，水環境学会誌，33(9)，123-129 (2010)

(受付 2019. 6. 29)

(受理 2020. 1. 27)