乳牛の肝臓機能診断に関する研究

一般および簡易尿検査所見による 肝臓機能異常の診断

星野邦夫^{*1}、鈴木慶信^{*2}、香本頼利^{*2}、大脇雄三^{*2}

(1981年8月1日 受理)

要 約

数量化理論Ⅱ類の方法を応用して、乳牛の一般臨床所見および簡易臨床検査所見から、肝臓機能が異常な乳牛を診断しようとする研究を行った。

検討1では、51頭のホルスタイン乳牛を用いた。

その結果、食欲・活力・糞の状態・脈拍・尿の潜血反応および尿の pH の検査所見から、肝臓機能の異常な牛を診断するための判別方程式を求めることができた。

検討2では、検討1で求めた判別方程式が日常の診療で、肝臓機能が異常かどうかを診断するのに使用できるかどうかをしらべた。

その結果、BSP（プロムサルファレイン）の排泄能検査によって、肝臓機能が異常と診断した11頭のうち9頭が、判別方程式によっても、肝臓機能が異常と診断された。しかし、BSP 排泄能検査によって、軽度の肝臓機能低下と診断した6頭のうち5頭が、判別方程式による診断では肝臓機能異常牛と誤診された。肝臓機能が正常な乳牛で、異常と診断されたものはなかった。

この研究の結論として、軽度の肝臓機能低下牛を軽度の異常牛と考えれば、検討1で求めた判別方程式は、野外での肝臓機能異常牛のスクリーニング用として応用できると考える。

牛の肝臓機能の異常は、一般臨床症状から診断することは困難である。従って、一般臨床症状のほか、肝臓機能診断に必要とされている血液・尿成分などを検査し、これらの所見を検討することによって診断が行われている。しかし、多くの所見は、肝臓以外の異常でも変動しているし、確実な診断を期して多種の検査を行っても、個体によってそれぞれの所見が相違するため、実際には、肝臓機能の診断は容易でない。このことから、著者らは、より確信のもてる実用的な診断法を求めて研究を行ってきた^{3,6)}。

今回は、数量化理論Ⅱ類の方法²⁾を応用し、一般および簡易臨床検査所見を、肝臓機能の総合判別得点というかたちで、客観的に要約する判別方程式を求めることができれば、この式を利用して、患者のかたわらでの肝臓機能の診断が可能になる、との仮定のもとに研究を行なった。

研究方法（材料と方法）

1. 判別方程式を求めるための材料と方法

材料：1980年7月から11月の間に、千葉県農共連家畜臨床研修所管内に飼育され、産後疾病あるいは繁殖障害等で診療経過中のホルスタイン乳牛51頭について調べた一般臨床所見、簡易尿検査所見（以上表1参照）および肝臓のプロムサルファレイン（以下BSPと略す）排泄能所見のデータである。

方法：まず、BSP 停滞の程度により、供試牛51頭を3グループに分類した。すなわち、BSP 注射後30分にBSP 停滞のなかったものを肝臓機能正常牛グループ(8頭)、30分後3～9%停滞していたものを肝臓機能軽度低下牛グループ(20頭)、30分後10%以上停滞していたものを肝臓機能異常牛グループ(23頭)に分類した。そして、これらを外的基準とした。各個体の一般および簡易尿検査所見データは、内的基準とし、数量化理論Ⅱ類のモデルを用いて判別分析を行い、判別方程式の係数、偏相関係数および相関比を求めた。これらの計算は、東京大学大型計算機センターのHITAC M-200Hシステムを利用し、PPSS II Quant 2 のプログラムによって行

* 1 東京農工大学農学部

* 2 千葉県農業共済組合連合会家畜臨床研修所

なった。

なお、BSP 排泄能検査は、5% プロムサルファレン注射液（第1製薬）を用い、所定の方法¹⁾によって実施し、判定は大脇ら³⁾の方法によった。簡易尿検査にはBM-6（中外製薬）を用いた。また、内的基準に用いた検査項目（表1参照）は、一連の研究のためにとりあげた全19項目について、数量化理論II類による分析をくり返し、相関比および偏相関係数の大きさを勘案しながら選出（過程は省略）した。

2. 判別方程式の実用性検討のための材料と方法

材料：1980年11月から1981年7月までの間に、同じ家畜臨床研修所管内で、新たに診療した22頭のホルスタイン乳牛の食欲・活力・糞の状態・脈拍数・尿潜血反応およびBSP排泄能を調べた。

方法：新たな個体の上記のデータを、1の方法で求めた判別方程式に代入して各個体の判別得点を計算し、22頭の肝臓機能を判定した。次いで、この判定結果が、それぞれの個体のBSP排泄能検査による診断結果と一致するかどうかを調べた。

なお、データの採取は、1と全く同じ方法で行なった。

成 績

表1に、分析に用いた検査項目、検査所見および分析結果を示した。基準化判別係数は、判別方程式（表の最下欄）の係数であり、診断しようとする乳牛の判別得点 Y は、その個体の各検査所見 $X^{(j)}$ （1または0）を、判別方程式に代入して求める。

各検査項目が診断に寄与する程度は、偏相関係数の大・小で示されるため、今回とりあげた検査項目が肝臓機能診断に寄与する順は、偏相関係数の大きさの順、すなわち食欲・尿pH・尿潜血反応・活力・糞の状態・脈拍数の順であった。判別方程式の判別力の指標である相関比は0.841であった。

表2に、グループ別に、対象牛51頭の判別得点を示した。肝臓機能正常牛および軽度低下牛の得点はすべて正であり、これに対し、肝臓機能異常牛の得点は、23頭中21頭が負で、他の2グループとよく分離した。

表2の結果を見やすくして図1に示した。BSP排泄能検査で肝臓機能異常牛と診断した23頭のうち22頭が、判別方程式によっても、他の2グループとは明らかに異なる位置（判別点30.7以下）に判別されている。肝臓機能軽度低下牛と正常牛は、判別点

211.0でおおむね判別されているが、正常牛の位置にある11頭のうち5頭が軽度低下牛であり、誤判別が多い。

なお、判別点は次の式²⁾によって求めた。

$$Z_c = \frac{x_1 s_2 + x_2 s_1}{s_1 + s_2}$$

x_1, x_2, s_1, s_2 は、それぞれのグループの判別得点の平均値および標準偏差

図2に、求めた判別方程式による新たな22頭の乳

表1 分析に用いた検査所見および分析結果

検査項目	検査所見	基準化判別係数	偏相関係数
$X^{(i)}$	$X^{(j)}$	$\beta^{(j)}$	
食欲 $X^{(1)}$	0～20%台	-258.1	0.75
	30～40 "	-138.1	
	50～60 "	-103.2	
	70～80 "	188.5	
	90～100 "	262.5	
活力 $X^{(2)}$	0～20%台	-30.5	0.51
	30～40 "	124.3	
	50～60 "	103.3	
	70～80 "	13.4	
	90～100 "	-142.2	
糞の状態 $X^{(3)}$	下痢・軟便	-92.5	0.43
	普通	40.9	
	硬便	-61.0	
脈拍 $X^{(4)}$	100回/分以上	-21.5	0.31
	90 " 台	9.6	
	80 " "	-3.0	
	70 " "	-38.9	
	60 " "	79.9	
尿潜血 $X^{(5)}$	250 Ery/ μ l	-237.2	0.56
	50 "	51.2	
	5～10 "	-137.4	
	neg.	22.0	
尿pH $X^{(6)}$	5 >	361.4	0.66
	6	-121.3	
	7	-141.8	
	8	24.4	
	9 <	50.4	
判別方程式	$Y = \sum_{j=1}^6 \beta^{(j)} X^{(j)}$ $X^{(j)}$ は、検査所見に該当のとき1、 該当しないとき0 $i=1, 2, 4, 6$ のとき $j=1, 2, \dots, 5$ $i=3$ のとき $j=1, 2, 3$ $i=5$ のとき $j=1, 2, 3, 4$		

注：相関比： $\eta^2=0.841$

表2 BSP 排泄能検査でグループ分けした個体の判別得点

正常牛グループ		軽度低下牛グループ		異常牛グループ	
個体No.	判別得点	個体No.	判別得点	個体No.	判別得点
1	243.2	9	167.3	29	-248.5
2	230.7	10	194.8	30	-338.4
3	243.3	11	287.6	31	-472.7
4	323.9	12	19.6	32	-255.4
5	225.9	13	193.4	33	19.5
6	126.2	14	194.8	34	-316.1
7	204.6	15	168.7	35	-184.5
8	311.3	16	86.8	36	-299.1
		17	152.2	37	-318.1
		18	157.7	38	-196.7
		19	287.6	39	-88.5
		20	243.3	40	-83.6
		21	243.3	41	-338.6
		22	156.7	42	-227.4
		23	132.4	43	71.2
		24	71.2	44	-268.0
		25	194.8	45	-201.5
		26	267.5	46	-238.1
		27	194.8	47	-316.1
		28	194.8	48	-375.9
				49	-280.5
				50	-333.1
				51	-228.4
$\bar{x}$	→ 238.7		180.5		-239.9
s	→ 57.7		67.3		122.1

注：対象牛 51 頭

牛の肝臓機能診断結果を示した。

判別方程式の実用にあたっては、できる限り誤診を避けなければならないので、次のような判定領域を設けた。すなわち、図1に示してあるグループごとの分布（判別得点による）について、1%水準の棄却限界を計算し、肝臓機能異常牛グループの上方（右限）棄却限界119.4と軽度低下牛グループの下方（左限）棄却限界-23.3の区間の判別得点の個体は、無理に判定しない立場をとり、この区間を診断保留域とした。また、判別得点-23.3以下は肝臓機能異常牛と診断する領域、判別得点119.4以上は（図1から判断して）肝臓機能軽度低下牛又は正常牛と診断する領域とし、図2に記載した。判定はこれに従って行った。

棄却限界の計算は次の式⁴⁾によった。

$$\bar{x} + s \sqrt{\frac{n+1}{n}} F_0 \geq \bar{x} - s \sqrt{\frac{n+1}{n}} F_0$$

$F_0 = F_{n-1} (0.01)$, n はグループ内の個体数, $\bar{x}$ および s はそのグループの判別得点の平均値および標準偏差

図2の結果を説明すると、BSP 排泄能検査で肝臓機能が異常と診断した11頭のうち9頭が、判別方程式によっても、肝臓機能異常牛と診断する領域に判別された。しかし、BSP 排泄能検査で軽度の肝

図1 一般および簡易臨床検査所見による判別（表2を図示したもの）

○：BSP 排泄能検査による正常牛
●：BSP 排泄能検査による異常牛
▲：BSP 排泄能検査による軽度低下牛

図2 判別方程式による実際の肝臓機能診断

- ：BSP 排泄能検査でも正常牛
- ：BSP 排泄能検査でも異常牛
- ▲：BSP 排泄能検査でも軽度低下牛

臓機能低下牛と診断した6頭のうち5頭もが、判別方程式による診断で肝臓機能異常牛と診断する領域に判別され、誤診であった。BSP 排泄能検査正常牛で、異常牛領域に判別されたものはなかった。119.4以上の軽度の肝臓機能低下牛又は正常牛の領域には、BSP 検査異常牛1頭が誤判別された。なお、診断保留域には、BSP 検査による正常牛4頭、異常牛1頭が入った。

考察およびまとめ

人の臨床診断面においては、早くから多くの臨床的情報を客観的に要約し診断する、計量診断法が開発されている⁹⁾。しかし、家畜疾病の臨床診断面においては、これらがいまだ開発されていない。

確実な臨床診断のためには、利用する臨床的情報は多いほど有利であると当然考えられる。しかし、実際には、診断に利用する多くの情報、すなわち稟告、一般所見および臨床病理検査所見は、同一疾病であっても個体によって相違するものが多く、かえって診断をまよわせてしまう。この問題を解決するには、各個体の示す所見の微妙なばらつきを、客観的に整理総合化する方法を見いださなければならない。これらの方法を模索するため、著者らは、現在も生前の診断が困難視されている肝臓機能診断にとりくみ、一連の研究を行っている。今回は、その一環として、数量化理論II類の方法を応用し、肝臓機能異常牛を診断するための研究を行った。

まず、ホルスタイン乳牛51頭の一般臨床所見、簡易尿検査所見および肝臓のBSP 排泄能所見のデータをもとに、判別分析を行った。その結果、高い相関比をもつ肝臓機能診断のための判別方程式を得ることができた。次に、分析に用いた同じ51頭のデータを判別方程式に代入し、判別得点を求め判別方

程式の診断力を調べた。その結果では、BSP 排泄能検査で肝臓機能異常牛と診断したものの95.6%が、判別方程式でも異常牛と診断され、この判別方程式が肝臓機能異常牛の診断に、かなり役立つことが示唆された。しかし、肝臓機能の軽度低下牛および正常牛の判別は不十分であった。従って、えられた判別方程式は、肝臓機能異常牛の診断には応用可能であるが、肝臓機能軽度低下牛と正常牛の判別には、応用できないと考えられた。

そこで、この判別方程式が、日常の診断に使用できるかどうか、新たな疾病治療牛について、実際に診断を行なってみた。その結果の中で、BSP 排泄能検査で肝臓機能異常牛と診断した11頭のうち9頭が、判別方程式によっても異常牛と診断され、約82%の適中率を示した。しかし、BSP 排泄能検査による軽度の肝臓機能低下牛6頭についての判別方程式の診断結果は、5頭までが異常牛に誤診され、この判別方程式の一般性の弱さが明らかとなった。このことは、判別方程式を求めるためのデータが51頭のものにすぎず不足であったこと、BSP 停滞率は連続量であるため、外的基準とした各グループを分類するための切点にあいまいさが存在したこと、実際には肝臓機能正常牛が少なく、データがえられず不足のまま分析を行ったことなどが関与した結果起った問題であると考えられる。今後は、これらの問題をふまえ、例数をふやし分析をやり直すなどして、一般性の高い判別係数を求める必要があると考える。

しかしながら、肝臓機能正常牛で異常牛と診断されたものがないことを考慮し、軽度の肝臓機能低下牛を軽度の異常牛として扱う立場をとれば、今回えられた判別方程式は、患者のかたわらでの肝臓機能異常牛のスクリーニング用として応用できるものと考えられる。なお、無理に診断しない保留域に入ったものが5頭あったが、これらについては、その他の検査を追加するなりして、別途に診断すべきであろう。

引用文献

- 1) 飯塚三喜：家畜衛生に必要な臨床生化学的検査法(農林水産省家畜衛生試験場共同監修)。日本獣医師会、173～188、東京、1975。
- 2) 林知己夫、樋口伊佐夫、駒沢勉：情報処理と統計数理。223～304、産業図書、東京、1976。
- 3) 大脇雄三ら：乳牛の肝臓機能診断に関する研究。異物排泄能試験の応用。家畜診療、214、16～22、

1981. 1~151, 275~293, 産業図書, 東京, 1972.
- 4) 鳥居敏雄, 高橋映正, 土肥一郎: 医学生物学のための推計学. 1~44, 東大出版会, 東京, 1966. 6) 上原喜久司ら: 乳牛の肝臓機能診断に関する研究. 1. 各種検査所見による肝臓脂肪化の計量診断. 家畜診療, 212, 11~17, 1981.
- 5) 高橋映正, 宮原英夫: 臨床診断とコンピュータ.

Studies on the Diagnosis of Liver Conditions in Dairy Cows with Special Reference to the Diagnosis of Hepatic Dysfunction on the Basis of General Symptoms and Results of Simplified Urinalysis

Kunio HOSHINO

Tokyo University of Agriculture and Technology, Saiwai-cho
Fuchu-shi, Tokyo 183

Yoshinobu SUZUKI, Hidemichi KOMOTO and Yuzo ŌWAKI

Veterinary Training Center of Chiba Agricultural Insurance
Association, Sueyoshi, Kimitsu-shi, Chiba 292-03

(Received August 1, 1981)

Summary

By the application of quantification model No.2 an attempt was performed to make a diagnosis of functional disorders of the liver in dairy cows on the basis of general symptoms and the results of simple laboratory examination.

Trial 1 was carried out on 51 Holstein cows. As a result, it was possible to obtain a discriminant function for the diagnosis of functional disorders of the liver in cows on the basis of appetite, energy, consistency and form of feces, pulse, occult blood, reaction, hemoglobinuria and hematuria, and results of examination on the pH of urine.

Trial 2 was conducted to determine whether the discriminant function obtained in the preceding trial was available for the diagnosis of hepatic dysfunction in the everyday practice of buiatrics or not. As a result, a positive diagnosis of hepatic dysfunction was made successfully by the application of this function in nine of eleven cows in which the bromsulphalein test had revealed the same hepatic dysfunction. On the other hand, when a diagnosis of slight depression of the function of the liver was made in six cows by the bromsulphalein test, an erroneous diagnosis of abnormality in the function of the liver was made in five of these cows by the application of the discriminant function obtained in trial 1 and used for diagnosis. It was not made, however, in any dairy cow with a normal hepatic function.

It was concluded from these studies that the discriminant function obtained in trial 1 was applicable to a screening test of cattle affected with abnormality in the function of the liver in the field, on condition that cattle with slight depression of the function of the liver were regarded as those with mild abnormality in the function of this organ.