若 齢 牛 に み ら れ た リ ン パ 肉 腫 の 一 例

佐野 弘* 溝口 徹* 大村康治* 梶尾規一* 水口博之*

(昭和 58 年 3 月 18 日受理)

A Case Report on Lymphosarcoma in a Calf

HIROSHI SANO et al. (Shizuoka Prefectural Institute of Animal Health,
Fujieda, Shizuoka 426)

SUMMARY

A 7-month-old female calf showed symptoms of leukosis, weight loss, lymphocytosis, exophthalmos, and remarkable swelling of general lymph nodes. Infiltration and accumulation of atypical lymphoid cells were observed in the lymph nodes, heart, abomasum, small intestine, uterus and brain, but not in Glisson's sheath of the liver, bone marrow, or thymus. These lesions were similar to those in leukosis of adult type.

On the farm where the calf was kept, the rate of cows positive for BLV-antibody test was 28-52%. The calf had also BLV-antibody, but no BLV could be isolated from her. In brief, these lesions were similar to those of the adult cow, although they were presented by the calf 7 months of age.

要 約

牛白血病ウイルス (BLV) 抗体保有率の高い農家で 1 子牛に白血病の発生があった。

発病牛は 7 カ月齢の雌で、臨床的には消瘦、全身の体表リンパ節の腫大、眼球突出、白血球数の増加 ($13,000/\text{mm}^3$) が見られた。寒天ゲル内沈降反応により微弱な (BLV) 抗体が証明されたが、剖検時に採取した末梢リンパ球からは BLV は分離されなかった。

剖検により、全身のリンパ節の腫大、左右眼窩内の腫瘍形成および心筋における白色病巣が見られた。組織学的検索により、心臓、第四胃、小腸、子宮、脳、各所のリンパ節および眼窩内腫瘍にリンパ様細胞の高度な増殖が見られたが、肝のグリソン鞘、骨髄および胸腺には腫瘍性変化は認められなかった。これらの病理所見は、成牛型白血病に類似していた。

今回の症例は病理学的には成牛型に類似していたが、7 カ月齢の子牛でしかも BLV 抗体が微弱であったことから成牛型白血病と断定できない興味ある症例であった。

牛白血病はリンパ系細胞の腫瘍増殖を主徴とする疾病であり、疫学および臨床的に成牛型、子牛型、胸腺型および皮膚型の 4 型に分離されている^{8,14)}。このうち成牛型の発生が最も多く、しかも特定地域に多発することから流行型とも呼ばれ重要視されている。1969 年 MILLER⁹⁾らは成牛型白血病牛の PHA 刺激培養リンパ球に C 型粒子を認め、その後この粒子は牛白血病ウイルス (BLV) であるとされた。他方、子牛型は主として 1 才未満の子牛に散発し、その病原体は今なお明らかにされていない⁸⁾。

牛白血病はヨーロッパおよび北アメリカをはじめ世界各国に発生しており、わが国では 1927 年に岩手県で第 1 例が報告された⁵⁾。近年、成牛型白血病の発生が増加してきており、なかでも青森、岩手、新潟、岐阜、大分の各県では集中的な発生が報告されている^{7,9,11)}。静岡県下においては過去 10 年間に成牛型 1 例、子牛型 3 例および胸腺型 2 例が確認されている。

今回、2 年間にわたって BLV 抗体調査を実施したところ、抗体保有牛が高率に存在していた農家の 1 子牛に白血病の発生があり、疫学、臨床、ウイルスおよび病理学的に検討したのでその概要を報告する。

* 静岡県家畜衛生研究所(静岡県藤枝市青葉町1-2-45)

1. 材 料 と 方 法

1) 発 生 農 家 の 概 要

発生農家は静岡県袋井市の A 酪農家で、1976 年に北海道より 16 頭の牛を導入し、それらを基礎牛とし規模を拡大し、現在 46 頭を飼養している。その間にはほかからの導入牛はなかった。なお、当農家では過去に白血病の発生はなかった。

2) BLV 抗 体 検 査

BLV 浸潤調査農家の 1 つとして、1980 年 10 月、1981 年 6 月、および白血病発生後の 1981 年 12 月に当農家の飼養牛について BLV 抗体検査を実施した。なお、発症牛については剖検時に実施した。抗体検査は、BLV の糖蛋白抗原を用いて寒天ゲル内沈降反応により行った。

3) 病 理 学 的 検 査

発症牛は放血殺され、病理解剖学的検査を行った。剖検時に採材した各所リンパ節、内部器官および消化管を 10% 中性ホルマリン液で固定し、パラフィン切片とし、ヘマトキシリン・エオジン染色を施し鏡検した。

4) ウ イ ル ス 分 離

発症牛からの BLV の分離は、農林水産省家畜衛生試験場に依頼し、剖検時に採材した末梢血液のリンパ球について牛胎児脾細胞を用いシンシチウム検出方法により実施した。

5) 血 清 生 化 学 的 検 査

総蛋白量は屈折法、蛋白分画はセルロースアセテート膜電気泳動法、その他は市販の測定用キットを用い分光光度計で測定した。

2. 成 績

1) 臨 床 所 見

発症牛は 7 カ月齢のホルスタイン種の雌子牛であった。畜主によると、5 カ月齢頃より眼球が軽度に出っぴり始め、6 カ月齢では食欲の減退、消瘦および流涙が認められた。さらに、2 週間後には眼球突出が顕著となり、体表リンパ節の腫大が見られた。剖検時の外景検査では、消瘦し全身の体表リンパ節が左右対称性に著しく腫大し、左右の眼球の突出が顕著に認められた(写真 1)。

2) 血 液 検 査

赤血球数 519 万/mm^3 、Ht 21% を示し軽度に貧血し、白血球数は $131,000/\text{mm}^3$ と著しく増加しており、大型リンパ球細胞が 90% 以上を占めていた。これらの細胞は大型・不整形で、細胞質は淡青色で狭く、核は類円形または不規則な分葉状を呈していた(写真 2)。

3) 血 清 生 化 学 的 検 査

総蛋白 50.9 mg/dl 、A/G 比 2.02、総コレステロール 74.8 mg/dl 、血糖値 18.5 mg/dl 、BUN 14.5 mg/dl 、LDH 1654.7 WU 、ALP 2.8 KAU 、GOT 104.5 KU 、ZTT

写真1 著しく腫大した体表リンパ節を示す(矢印)

写真2 大型リンパ球は不整形で、細胞質は狭く、核は類円形または分葉状を呈する(ギムザ染色 $\times 400$)

0.67 KU 、Na 255.7 mg/dl 、K 9.95 mg/dl であり、A/G 比・GOT・Na・K に上昇が見られたが、LDH は正常値内であった。

4) BLV 抗体検査およびウイルス分離

発症牛は寒天ゲル内沈降反応により微弱な陽性を示した。発症牛の母牛も BLV 抗体を保有していた。

発症牛の末梢血液リンパ球から BLV の分離を行ったが、BLV は分離されなかった。

5) 病 理 解 剖 所 見

全身の大部分のリンパ節は著しく腫大し、断面は乳白色で髄様を呈し膨隆していた。心臓は、右心耳が腫脹し乳白色を呈し、中隔の心筋部において心内膜側が限界不明瞭に白色化していた。左右の眼窩内にはうずら卵大の白色の腫瘍が認められた。

6) 病 理 組 織 所 見

腫瘍病変の分布は表 1 に示すように、心臓、第四胃、小腸、子宮、眼窩内および各所リンパ節にリンパ様細胞の著しい増殖が認められた。これらリンパ様細胞は大きく類円形で、細胞質はやや狭く、核は不整形でクロマチン分布が粗であった。一部に小型でクロマチンの密な核をもつ細胞も混在していた。さらに、核分裂像も散見された。

(1) リンパ節：検査した大部分のリンパ節において、髄質側より広範囲にリンパ様細胞の著しい増殖が認めら

表1 病理組織所見

部 位	腫瘍	部 位	腫瘍
肝	+	胸 腺	—
脾	—	骨 髄	—
腎	+	骨 格 筋	+
心	卅	皮 膚	+
肺	+	眼 窩 内	卅
脳	卅	肩 前 淋	卅
前 胃	—	腸骨下淋	卅
第 四 胃	卅	内腸骨淋	卅
小 腸	卅	縦 隔 淋	卅
大 腸	—	腸間膜淋	卅
子 宮	卅	その他淋	卅

注) +～卅: 病変の程度を表す

れ、固有構造は不明瞭となっていた(写真3)。しかし、一部のリンパ節では皮質が圧迫されて、わずかに固有構造が残っている部位も見られた。これらのリンパ様細胞は主としてリンパ洞内に浸潤していた。また、被膜上にリンパ様細胞の浸潤しているリンパ節も認められた(写真4)。

(2) 心 臓: 心内膜、心外膜およびそれらに隣接する心筋間にリンパ様細胞が浸潤していた。とくに、右心耳で最も高度に認められた。また、これらの部位の心筋は浸潤した細胞によって圧迫され、萎縮、疎開、一部は消失していた(写真5)。

写真3 耳下リンパ節の髄質におけるリンパ様細胞の著しい増殖を示す (HE 染色 ×50)

写真4 回盲リンパ節の被膜上におけるリンパ様細胞の著しい浸潤を示す (HE 染色 ×50)

写真5 リンパ様細胞の浸潤により心筋は萎縮、疎開し一部は消失している (HE 染色 ×100)

(3) 第四胃および小腸: 粘膜固有層から筋層に向かってリンパ様細胞が高度に浸潤しており、一部の筋層では細胞浸潤により平滑筋が軽度で疎開していた。

(4) 子 宮: 粘膜固有層はリンパ様細胞の浸潤により肥厚し、浸潤はさらに筋層まで波及していた。

(5) 脳: 大脳、脳幹部などの血管周囲にリンパ様細胞の浸潤が見られた。

(6) 肝 臓: リンパ様細胞の浸潤が類洞内にわずかに見られたが、グリソン鞘にはほとんど認められなかった。

その他、腎臓では腎門部に、肺臓では気管支周囲にわずかなリンパ様細胞の浸潤が認められたが、骨髄および胸腺ではリンパ様細胞の浸潤はほとんど見られなかった。

7) BLV 抗体調査

発生農家における白血病発生前後の BLV 抗体保有率は表2に示すとおりである。飼養牛全体の抗体保有率は、発生前の1980年10月(第1回)に25頭中13頭(52%)、同じく1981年10月(第2回)に36頭中15頭(42%)であるのに対し、発生後の1981年12月(第3回)には46頭中13頭(28%)であり、減少傾向が見られた。さらに、3回とも抗体検査を実施し得た牛の抗体保有率の推移を見ると、第1回検査で25頭中13頭(52%)、第2回検査で21頭中11頭(52%)、第3回検査では18頭中9頭(50%)と変化は見られなかった。なお、この期間中に陽転した牛は各調査の間にそれぞれ1頭ずつであった。また、抗体保有状況を年齢別にみると、3才以上において保有率が50%以上と高いのに対して、

表2 1年間における BLV 抗体の推移

検査年月日	55年10月	56年6月	56年12月
同一個体の抗体保有率	13/25(52)	11/21(52)	9/18(50)
群全体の抗体保有率	13/25(52)	15/36(42)	13/46(28)

注) () 内は %

3才未満では 10% 以下であった。

3. 考 察

牛白血病は従来、臨床疫学的観察により成牛型、子牛型、胸腺型および皮膚型の4型に分類されてきた^{9,14)}。病理組織学的には牛白血病はリンパ肉腫型とリンパ性白血病型に大別され、成牛型にはリンパ肉腫型、子牛型にはリンパ性白血病型に属するものが多いといわれている^{13,14)}。さらに、成牛型では腫瘍性病変の出現頻度がリンパ節、心臓、第四胃、子宮および腸間膜に高い傾向があるのに対して、子牛型は系統的にリンパ系組織に病変が見られ、骨髄が侵されるのが特徴であるといわれている^{13,14)}。

本報告例は7カ月齢の子牛で、肉眼的には大部分のリンパ節が左右対称性に腫大し、子牛型にかなり類似していたが、左右眼窩内に腫瘍形成が認められた。組織学的にはリンパ節の髄質側に腫瘍細胞の浸潤および集簇が強く、被膜にも腫瘍細胞の浸潤が見られた。また、一般に子牛型によく見られるリンパ性白血病の所見である肝のグリソン鞘や骨髄における腫瘍細胞の増殖巣を欠いていた。そのうえ、腫瘍細胞はリンパ節、心臓、第四胃、小腸および子宮に強く浸潤し、成牛型の病変好発部位と一致していた。これらの所見はリンパ肉腫の特徴を有し、本症例は病理学的には成牛型白血病に類似していた。血清生化学的には成牛型白血病においてしばしば上昇するLDHの上昇は認められなかった。

本間ら¹⁾は成牛型白血病牛の全例より、梶川ら⁹⁾はBLV抗体保有牛の全例よりBLVが分離されたと報告している。今回の症例では寒天ゲル内沈降反応で年齢的に移行抗体と考えにくいBLV抗体が微弱ながら証明されたが^{9,12)}、BLVは分離されなかった。

本症例の発生農家におけるBLV抗体保有率は、約1年間における3回の検査では28~52%であった。同期間に陽転した牛は2頭のみで、抗体保有牛の著しい増加

は見られなかった。

今回の症例は7カ月齢の子牛であったが、病理学的には成牛型に類似する変化を有していた。しかし、移行抗体とは考えられない微弱なBLV抗体が証明されたが、BLVは分離されず本症例とBLVとの関係は不明瞭であった。これらのことより本例は成牛型白血病と診断することが困難な症例であった。

甲野ら⁴⁾や一条ら²⁾は病理学的に成牛型と分類された白血病人のうち、ごく少数にBLV抗体を保有していない例があることを報告している。このように成牛型白血病とBLVとの関係にはまだ多くの不明な点が残されているので今後さらに検討が必要と考えられる。

文 献

- 1) 本間利夫, ほか: 第87回日本獣医学会講演要旨, III-52 (1979).
- 2) 一条 茂, ほか: 日獣会誌, 35, 17~22 (1982).
- 3) 梶川 治, ほか: 日獣会誌, 34, 423~427 (1981).
- 4) 甲野雄次, ほか: 第88回日本獣医学会講演要旨, IIIウ-46 (1979).
- 5) 窪田五郎: 中央獣医誌, 40, 375~378 (1927).
- 6) MILLER, J. M., MILLER, L. D., OLSON, C., et al.: *J. Natl. Cancer Inst.*, 43, 1297~1305 (1969).
- 7) 三浦定夫: 牛の白血病形態病理, 7~9, 三浦定夫教授定年退官記念事業会, 盛岡 (1978).
- 8) 小沼 操, ほか: 第87回日本獣医学会講演要旨, III-53 (1979).
- 9) 小沼 操: 日獣会誌, 32, 125~134 (1979).
- 10) 大島寛一: 獣医畜産新報, No. 702, 8~10 (1980).
- 11) 大島寛一: 岩手県獣医師会報, 4, 3~28 (1978).
- 12) PIPER, C. E., FERRER, J. F. and ABT, D. A.: *J. Natl. Cancer Inst.*, 62, 165~168 (1979).
- 13) YAMAMOTO, H., YOSHINO, T. and MATSUDA, I.: *Natl. Inst. Anim. Health Q. (Jpn.)*, 22, 115~129 (1982).
- 14) 山本春弥: 家畜診療, 228, 32~35 (1981).

小動物臨床におけるクスリの使い方(VI)

3. 抗 菌 性 薬 物 の 薬 理 (その1)

吐 山 豊 秋*

この稿でとりあげる抗菌性薬物は小動物の細菌・真菌感染症の化学療法に用いる薬物である。これらの薬物は

経口投与なり注射なりによって犬猫に直接投与されるので、十分な有効性が確保されるだけでなく、患者にとっても十分安全でなければならない。

現在の小動物臨床で使用される抗菌性薬物は動物用医

* 東京農工大学農学部 (東京都府中市幸町3-5-8)