頸管結紮犬子宮への大腸菌接種による実験的子宮蓄膿症の発症試験， とくに結紮を解除した場合の成績について

野村紘一* 鎌田洋一* 島田保昭*

(昭和 62 年 10 月 16 日受理)

Experimental Production of Canine Pyometra by Inoculation with *Escherichia coli*
into Uterus with Cervix Ligated: with Special Reference to Effects on
Removal of Cervix Ligature

KOICHI NOMURA, YOICHI KAMATA and YASUAKI SHIMADA (College of Agriculture,
University of OSAKA Prefecture, Sakai, Osaka 591)

SUMMARY

In 27 mongrel bitches be reproduced by inoculation of *Escherichia coli* was inoculated into the uterus with the cervix ligated. pyometra was detected in all the bitches by laparotomy 3 days after inoculation. The removal of cervical ligature resulted in a decline in the incidence of the disease 12 days after inoculation. The decline rate was the highest in postpartum, higher in anestrus, and low in proestrus + estrus and diestrus.

要 約

性周期の各時期における雑種成犬 27 頭を用いて、自然症例の犬子宮蓄膿症から分離培養した大腸菌を子宮頸管を結紮した子宮内に接種することによって、実験的に犬子宮蓄膿症を作成した。これらについて菌接種後 3 日で結紮を解除し、その後子宮蓄膿症が持続するか否かを検討した結果、おおむね次のような成績が得られた。

1) 子宮蓄膿症は菌接種後 3 日で全例 (27 例) に認められたが、結紮を解除した場合に、菌接種後 12 日では 16 例 59.3% に減少した。

2) 菌接種 12 日後の各性周期における発症率は、発情前期ないし発情期ならびに発情休止期においてはほぼ 100% であったが、無発情期と分娩後修復期ではそれぞれ 80%, 28.6% に低下した。

3) 結紮を解除することによって、無発情期と分娩後修復期においては子宮蓄膿症は治癒に向かう傾向が、また発情前期ないし発情期および発情休止期においては逆に充進する傾向がみられた。

犬子宮蓄膿症を実験的に作出するために、子宮頸管を結紮した子宮腔内に自然症例から分離培養した大腸菌を接種すれば、子宮蓄膿症は性周期の時期に関係なく比較的高率に発生することがわかった¹⁾。

いっぽう、自然症例では膿の排出している症例もあることから、それらの例では子宮頸管が哆開しているものと思われた。

そこで、今回、子宮頸管に結紮を施して作出した子宮蓄膿症について、一定時間後に結紮を解除した場合も、なお、子宮蓄膿症が持続するか否か、さらに、性周期においてその効果に差がみられるか否かを検討した。

1. 材 料 と 方 法

1) 実 験 犬

臨床的に健康とみなされる雑種成犬 27 頭を使用した。

2) 実 験 群

これらの供試犬は前報¹⁾と同様の方法で、第 1 群 (発情前期ないし発情期) 3 頭、第 2 群 (発情休止期) 5 頭、第 3 群 (無発情期) 5 頭および第 4 群 (分娩後修復期) 14 頭の 4 群に区分した。

3) 接 種 菌 お よ び 菌 量

前報¹⁾と同様のものを用いた。

4) 接種方法ならびに開腹試験

前報¹⁾と同様方法で子宮頸管を絹糸を用いて 2 重に結紮して、左子宮角内に菌液を接種した。本実験では、菌接種 3 日後に再び開腹手術を行い、子宮の形状を観察す

* 大阪府立大学農学部 (堺市百舌鳥梅町 4-804)

るとともに子宮角幅を数箇所て計測した。次いで、あらかじめ施してあった頸管部の2重結紮を解除し、頸管部分を漿膜面から軽くマッサージした。

次に、菌接種3日目の子宮組織標本を作るために子宮角の一部切除を行った。すなわち、左子宮角の卵巣端から約1/3の長さにあわせて子宮外膜(漿膜)を剝離し、子宮角を広間膜附着部から分離する。次に、卵巣ならびに子宮血管をできるだけ損傷せずに卵管端を切断し、子宮角前部1/3を切除する。切除端はPARKER-KERRの方法で2層縫合を行い、膿の漏出のないことを確かめ、さらにその上から一層の巾着縫合を施す。両断端を接合し、先に剝離した外膜で切断部を包み込むように縫合し、子宮角の部分切除を終える。

5) 剖検ならびに結果の判定

実験犬は菌液注入後12日(結紮解除から解除日を含め、まる10日後)で剖検に付し、子宮・卵巣・膈・外陰部を一括して摘出した。子宮の形状を観察したのち、子宮角幅を数箇所て計測した。その後、子宮内の菌の検査を実施するとともに、子宮内容の量と質を検査した。これらの摘出臓器はホルマリン固定し、後刻、病理組織標本作製用に供した。なお、子宮蓄膿症の判定方法は前報¹⁾と同様であるが、本実験では子宮蓄膿の推移の指標として、菌接種前、接種後3日および同12日の子宮角幅の平均値をもとめ、それぞれの差を比較することによって子宮肥大度を算出した。

2. 成績

性周期の各時期における子宮蓄膿症発症率は表1に示したとおりである。すなわち、菌接種3日(結紮解除

表1 犬子宮蓄膿症発症率

実 験 群	菌接種後3日*	12日
発情前期+発情期	3/3 (100)	3/3(100)
発 情 休 止 期	5/5 (100)	5/5(100)
無 発 情 期	5/5 (100)	4/5(80)
分 娩 後 修 復 期	14/14(100)	4/14(28.6)
平 均 発 症 率	27/27(100)	16/27(59.3)

注) *: 子宮頸管結紮解除時 発症例数/実験数(%)

日)では全群において100%の発症率を示した。菌接種後12日(結紮解除後10日)の剖検時では第1群(発情前期ないし発情期)ならびに第2群(発情休止期)においてはそれぞれ100%の高率を示したが、第3群(無発情期)および第4群(分娩後修復期)ではそれぞれ80%、28.6%となり、低下を示した。

蓄膿症を呈した例の子宮角幅の変化は表2に示したとおりである。第1群(発情前期ないし発情期)の子宮の状態は菌接種後3日で子宮角幅が接種前の1~2倍以上となり、多量の膿(50ml)を入れているものもあった。これらの子宮外形は屈曲蛇行を示すものや分節状ないしソーセージ様を示すものもみられ、漿膜面は著明な充うっ血のために汚穢赤褐色ないし暗赤色を呈し緊張していた。菌接種後12日の剖検時には3日の時点の結紮解除時に比べて、さらに子宮の拡張するものが多く、膿が多量に貯留するものもあった。第2群(発情休止期)では反応の不明瞭なNo.236の1例を除いて、第1群よりは子宮の肥大するものが多く、膿の貯留するもの(3~28ml)も多い傾向にあった。子宮外形は小分節形やソーセージ形を示した(写真1, 2, 5)。第3群(無発情期)では、

表2 発 症 例 の 子 宮 肥 大 度

実 験 群	犬番号	子 宮 角 幅 (mm)			肥 大 度		
		術前(A)	3日目(B)	12日目(C)	(B)-(A)	(C)-(A)	(C)-(B)
発情前期+発情期	130	8.37	8.50	11.97	0.13	3.60	3.47
	333	8.05	10.50	21.90	2.45	13.85	11.40
	338	4.55	12.50	4.00	7.95	0.45	-7.50
発 情 休 止 期	113	7.35	11.75	20.70	4.40	13.35	8.95
	116	7.55	14.50	17.38	6.95	9.83	2.88
	121	7.65	12.90	11.17	5.25	3.52	-1.73
	129	7.70	11.70	22.10	4.00	14.40	10.40
	236	10.85	10.75	10.50	-0.10	-0.35	-0.25
無 発 情 期	220	7.15	17.55	5.50	10.40	-1.65	-12.05
	269	4.95	17.00	12.00	12.05	7.05	-5.00
	233	5.20	16.80	4.00	11.60	-1.20	-12.80
	234	18.75	20.30	10.25	1.55	-8.50	-10.05
分 娩 後 修 復 期	181	22.03	34.70	11.67	12.67	-10.36	-23.03
	223	9.73	22.25	7.33	12.50	-2.40	-14.92
	112	16.05	18.98	14.13	2.93	-1.92	-4.85
	270	5.75	18.51	9.33	12.76	3.58	-9.18

頸管結紮犬子宮への大腸菌接種による実験的子宫畜膿症の発症試験，とくに結紮を解除した場合の成績について

写真 1

写真 2

写真 3 (HE 染色 ×40)

写真 4 (HE 染色 ×100)

写真 5

写真 6 (HE 染色 ×40)

写真 7 (HE 染色 ×100)

3日で子宮幅がもとの2～3倍の大きさになるものもあり、反応が大きかった〔表2の(B)―(A)〕。しかし、結紮解除後剖検時の大きさはNo. 269の1例を除いてほとんどのものではもとの値以下に減少していた〔表2の(C)―(A)〕。子宮外形はソーセージ様のものが多かった。この傾向は第4群(分娩後修復期)のものにも認められた。すなわち、第3、第4群においては菌接種後3日で急激に子宮幅の増加を見るが、結紮解除後はすみやかに減少を示し旧に復するか、むしろそれより縮小するものが多かった。これに対し、第1、第2群では結紮を解除したにもかかわらず、逆に剖検時には子宮幅が増大するものが多い傾向を示した(表2)。

子宮の組織所見は菌接種後3日で全例に急性化膿性炎が認められ(写真3, 4)、第1、第2群では12日の剖検時においてもこれが全例に持続して観察された(写真6, 7)。しかし、第3、第4群では12日の剖検時に炎症の見られないものもあり、特に第4群には多かった。これらは子宮内の膿も存在しなかったところから、子宮蓄膿症は剖検時にはすでに治癒していたものとみなされた。

3. 考 察

われわれは、先に子宮頸管を結紮した子宮腔内に大腸菌を接種することによって、犬子宮蓄膿症を作出することができることを報告した¹⁾。

今回、子宮頸管結紮の効果について検討するために、途中で結紮を解除することを試みた。その結果、結紮を解除したにもかかわらず発情前期ないし発情期および発情休止期では高率(100%)のまま変化しなかった。いっぽう、無発情期と分娩後修復期においては逆に発症率の

低下を見た。とくに、無発情期と分娩後修復期においては、結紮を解除することによって子宮角幅は著明に減少し〔表2(C)―(B)〕、かえって菌接種前より小さくなる傾向が示された〔表2(C)―(A)〕。しかし、前者の発情前期ないし発情期ならびに発情休止期では例外もあるものの、結紮解除にもかかわらず増大するものが多く〔表2(C)―(B)〕、したがって、菌接種前よりかなり子宮肥大を示すものが多い傾向にあった〔表2(C)―(A)〕。このことは、発情前期ないし発情期と発情休止期においては病変が進行中であることを示しているのに対し、無発情期ならびに分娩後修復期においては退行中であることを示しているものと解された。すなわち、後者の2群においては子宮収縮力(膿排泄と関連)が前者の2群より強力に作用したのかもわからないが、子宮蓄膿症は治癒に向かっているものと思われた。換言すれば、子宮頸管の結紮は無発情期と分娩後修復期の子宮においては子宮内容の排泄を人為的に阻止し、その結果強制的に子宮感染類似の現象を持続させる作用を発揮していると考えられたのに対し、発情前期ないし発情期と発情休止期では前述のとおり結紮を施さなくても子宮感染は持続する可能性が示唆されるものといえる。

したがって、今後の実験において、子宮頸管を結紮することなしに子宮内に大腸菌を接種した場合について、子宮感染が成立するか否かをさらに検討してゆきたいと考えている。

引用文献

- 1) 野村紘一, 政岡和彦, 島田保昭: 日獣会誌, 40, 252～256 (1987).

【写真説明】

写真1 第2群発情休止期の大腸菌液接種直前の子宮: 屈曲蛇行がみられる。子宮角幅は平均 75 mm であった。

写真2 菌接種3日後の子宮: 分節形を示し、子宮肥大が認められる。子宮角幅は平均 14.5 mm で、接種前の約2倍になっていた。子宮頸管の2重結紮を解除し、左子宮角の一部を切除する直前の子宮。

写真3・4 菌接種3日目に切除した子宮片の組織写真: 内膜表層部分を中心とした化膿性炎が瀰漫性に見られる。基底腺層の水腫が著明である。

写真5 菌接種12日目の子宮: 矢印部分は3日目の切除片。結紮を解除したにもかかわらず、子宮はソーセージ様となり、子宮角幅は平均 17.4 mm に肥大していた。内腔には膿の貯留も認められた。

写真6・7 菌接種12日目の子宮組織: 化膿性炎が一段と高度となり、基底腺の拡張増殖が認められる。