馬ノ後大動脈（弓部）ニ發生セル大動脈瘤ノ稀有ナル一例

陸軍一等獸醫正 西 城 正 之

陸 軍 技 手 加 藤 多 右 衛 門

I. 緒 言

文獻ニ徴スルニ動脈瘤ハ人ニアリテハ胸部動脈ニ多發スルガ如キモ馬ニアリテハ好シテ腹部動脈就中前腸間膜動脈根部ニ頻發シ胸部ニ發スルハ極メテ稀有ニ屬ス西曆 1923 年 W. Hughes 氏ニヨリ報告セラレタル一例ノ牝馬（18 歳）ハ勞役ヲ課スレバ忽チ大苦悶ト共ニ步様不確實トナリ休止ヲ命ズレバ症狀消散セリ而シテ其ノ剖檢ノ結果心臟附近ニおれんぢ大ノ動脈瘤ヲ有セシト余等ハ昭和 5 年 7 月偶々次ノ一例ニ遭遇セリ依テ其ノ概要ヲ摘録シ湖江各位ノ叱正ヲ乞ハントス

II. 發 病 前 ノ 經 歴

1. 馬 籍

本盛號 昭和 5 年 9 歳 鹿毛 騾

本馬ハ昭和 5 年 7 月 15 日野戰重砲兵第 4 聯隊ヨリ陸軍獸醫學校へ試験馬トシテ移管セラレタルモノナリ

2. 稟性及使役ノ狀況

藤森順一氏ノ調査ニ依レバ該馬ハ入隊時ヨリ恐怖心強ク新馬當時ハ減飼、放シ馬運動後辛ジテ騎乗セン程ニ悍威飽クマデ強クシテ頸固ク銜受不良、扶助柔軟ヲ缺キ剩エ反動高キタメ屢新馬掛兵士ヲ落馬セシメタルコトサヘアリシガ新馬卒業時ニハ調教概ネ順調ニ進ミ相當程度ニ達セリ爾後聯隊將校貸與馬トナリ何等異常ナク劇動シ發病前ニモ相當劇役ニ服セリト云フ

3. 既 往 症

大正 12 年 11 月 腺疫罹病

大正 15 年 7 月 原因不明ノ高熱ヲ發ス

昭和 5 年 5 月 16 日 疑似傳染性貧血ト決ス

III. 現 症 及 經 過

發病時ノ狀況及其ノ後ノ經過ニ就キ藤森順一氏ヨリ得タル情報左ノ如シ

昭和5年5月16日 食慾榮養不振トナリシニ依リ受診

5月16日 (受診當時) 結膜貧血, 脈搏軟弱, 心音濁濁, 打診上肝腫大ノ感アリ 體溫 38.6 脈搏 5.5 呼吸 17

自5月16日至5月25日

體溫 18日迄 38.6—39.1 爾後 38.0—39°C 朝夕ノ溫差 0.4—0.6 鋸齒狀曲線ヲ現ハス

脈搏 17日 61, 18日 63, 24日 59 他ハ概ネ 49—55 ノ間ニアリ

呼吸 初メ 30—40 爾後次第ニ減少

食思不振, 元氣沈衰, 結膜貧血, 赤血球 360 萬

自5月26日至6月15日

體溫 37.9—39.1

6月2日ヨリ4日迄ハ稍不正曲線ヲ描クモ他ハ 38.0—39.0 ノ間ヲ上下シ朝夕溫差 0.4—6.6 正シキ鋸齒狀曲線ヲ描ク 脈搏 45—50 呼吸 10—15 結膜黃白色浮腫, 靜脈搏動稍增加, 食思恢復セルモ末期減退 6月5日後肢管以下浮腫 6月9日消散, 赤血球 300 萬

自6月16日至7月15日

體溫 38.2—39.2 朝夕溫差 0.3—0.7 概ネ鋸齒狀曲線ヲ描ク

脈搏 45—55 概ネ體溫ト一致シタ 2—6 多ク熱曲線ト一致ス

呼吸 15—20 概ネ體溫ト一致シタ稍多シ

貧血症狀稍輕減ス

6月16日赤血球 400 萬

6月19日白血球 18,500 (中性多核 85% 淋巴球 13%
みおじん細胞 2%)

6月27日心臟打診時輕咳ヲ發ス糞便検査及尿検査異常ナシ

7月14日尿中ニ蛋白強陽性ニ現ル磷酸 0.02

IV. 剖 檢 所 見

本馬ハ本校ニ入廠後傳染性貧血ト決シ種々治療ヲ加ヘタルモ其ノ効ナク昭

和 5 年 7 月 30 日 午 前 1 時 30 分 斃 死 同 日 午 前 時 剖 檢 ヲ 行 ヘ リ 所 見 ノ 概 要 左
ノ 如 シ

外 景 檢 査

屍體ハ左側位ニ臥シ體格中等、榮養不良、屍強完全腹部僅ニ膨滿緊張ス、
可視粘膜蒼白色、牙關緊合肛門突出哆開ス

内 景 檢 査

皮下乾燥シ脂肪及血液ニ乏シク筋肉瘦削褪色ス、腹腔内ニハ稍多量ノ濁濁
帶褐黃色液ヲ含有シ前腸間膜淋巴腺ハ暗赤色拇指頭大ニ腫脹シ小腸漿液膜下
ニ微細ノ出血斑點ヲ散發ス

胃 中等度ニ膨滿シ之ヲ切開スルニ水分ニ乏シキ内容ヲ充滿シ粘膜ハ非薄
灰褐色ニシテ粘性ニ乏シ十二指腸粘膜ハ暗綠色ヲ呈ス

小腸 一般ニ内容ニ乏シク起始部ノ粘膜ハ暗綠色ニシテ後方ニ移行スルニ
從ヒ灰白黃色ヲ呈ス

大腸 稍膨滿シ盲腸尖及右側結腸漿液膜面ハ暗赤色網狀充血斑ヲ呈ス切開
スルニ内容ハ殆ンド水分ヨリナリ粘膜ハ灰綠色腫起シ脆弱ナリ

脾臟 大サ普通表面灰綠色諸所ニ豌豆大乃至蠶豆大ノ稍硬固ナル隆起部アリ
之ヲ切斷スルニ灰白色乃至暗赤色等ヲ呈ス其ノ他ノ斷面ハ淡赤色ニシテ脾
髓軟化シ泥狀ヲ呈ス脾門淋巴腺小指頭大淡赤色ヲ帶フ

肝臟 著シク大ニシテ表面灰黃色ヲ呈ス壓スルニ柔軟斷面ハ血液ニ乏シク
實質ハ著シク濁濁脆化シ容易ニ破碎セラル

腎臟 左右共大、包膜ノ剝離困難表面灰白色斷面血液ニ乏シク皮質腫脹シ諸
所ニ豌豆大乃至蠶豆大ノ灰白色部及暗赤色部ヲ散發シ殊ニ腎盂ニ近キモノハ
灰白色ヲ呈シ硬固ナリ其ノ他ノ實質ハ脆弱ナリ

胸腔 左右兩胸腔内ニハ纖維素ノ分離稍完全ナル血塊ト多量ノ血液トヲ含
有シ（左胸腔 2.000 c.c.）殊ニ左側ノ血塊ハ肺及心臟ノ表面ヲ覆ヒ後方ハ橫隔
膜ニ達シ更ニ其ノ血塊ノ表面ニハ肋骨ノ壓痕ヲ止ム後大動脈ハ大動脈口ヲ
距ル約 5 cm.（前後大動脈
分岐部直後）ヨリ後方ニ亘リ人頭大ニ膨隆シ橢圓形ノ一大動
脈瘤ヲ形成シ其ノ縱徑 22 cm. 横徑 20 cm. 周圍 45 cm. ニ達シ脊柱ニ近キ
部ノ瘤壁後面ニ於テ小指大ノ一裂孔ヲ有ス動脈瘤ハ其ノ表面稍凹凸シ灰

褐色粗糙ナリ動脈瘤壁ハ壓スルニ概ネ稍硬固ナルモ一部殊ニ前記裂口部附近ハ脆弱ナリ切開スルニ内腔ハ概ネ灰白色、灰褐色、纖維素様凝塊及豆腐粕様頽廢物ヲ以テ充填セラレ（殊ニ心臟ニ近キ部ノ内腔ハ該凝塊ヲ以テ殆ンド填充セラル）該充填物ハ亦腔ノ内壁ト硬ク癒着スレドモ概ネ脆弱ニシテ手指ヲ以テ脫離シ易ク腔ノ内面ハ頗ル凸凹不正ナリ寄生虫ハ發見セラレズ腔壁ハ一般ニ大ニ肥厚シ其ノ厚サ 15.6 cm. ニ達ス然レトモ裂孔部ノ壁ハ菲薄ナリ其ノ斷面ハ一般ニ灰白色ヲ呈シ明ニ血管壁ノ3層ヲ存シ其ノ間處々ニ暗黑色血塊ヲ包藏ス本動脈瘤及心臟共 6.500 g. (附圖第1 參照)

心臟 心嚢内ニハ濁黄褐色液 250 c.c. ヲ含有ス心臟ハ兩室共ニ空乏、半月狀瓣ハ稍肥厚ヲ呈スルモ房室瓣膜心内外膜及心筋ニハ特ニ異常ヲ認メズ

肺臟 退縮不全、表面黄白色ニシテ左葉ニハ點狀出血ヲ認ム

頭頸部 特ニ異常ヲ認メズ

血管 前腸間膜動脈根部ニハ約鶏卵大ノ一動脈瘤アリ切開スルニ瘤壁ハ著シク肥厚硬結シ（最厚部 1 cm. ニ達ス）内壁面ハ凹凸粗糙ニシテ拇指頭大不正形結節狀隆起ヲ現ハシ其ノ表面ニハ黄褐色ノ小血栓及硬口虫ノ幼虫2尾ヲ附着ス（附圖第2 參照）

病理解剖的診斷

後大動脈（弓部）動脈瘤及其穿孔、胸腔血腫、脾及腎梗塞、肝及腎實質炎

V. 組織學的所見

甲、後大動脈（弓部）ニ發セル動脈瘤ノ組織學的所見

（1）ヘマトキシリンえおじん染色

動脈瘤ノ血管外膜ハ稍肥厚シ同膜下ニ一層ノ脂肪組織層ヲ包藏シ以テ中膜ニ移行ス中膜ハ著明ニ肥厚シ主トシテ縱横ニ走行セル粗ナル増生結締組織ヨリ成リ比較的狹長ナル細胞ヲ有スルモノ多ク且ツ此ノ部ニ甚ダ多數ノ増生血管ヲ認メ各血管壁亦著シク肥厚ス稀ニ細胞ノ形態不明瞭ニシテ塵埃様無構造ヲナシヘマトキシリンニ濃染スル部分アリ中膜ノ深部ニ移行スルニ從ヒ粗大ナル結締組織纖維ハ漸次減少シ代フルニヘマトキシリンニ濃染スル稍狹長ナル細胞ヲ以テス尙此等ノ部位ニハ粗鬆ナル結締組織間ニ稍多數ノ纖維形成細胞淋

巴球及中性多核白血球ヲ宿セル部アリ然レトモえおじん嗜好細胞ノ浸潤ナシ筋纖維ハ殆ンド消失シ僅ニ所々其痕跡ヲ止ムルニ過ギズ内膜ト認ムベキ部分ハ一般ニヘマトキシリンニ濃染シ全ク無構造形態不明瞭ノ塵埃様細胞群ヨリ成リ血管ノ増生ナシ (附圖第 6) 参照

(2) わいげると氏彈力纖維染色

弱擴大ニテハ血管ノ内外中 3 層共何レモ肥厚シ就中中膜著シク肥厚ス又此部ニハ多數ノ血管増生シ其ノ壁大ニ肥厚ス中膜ヨリ内膜ニ移行スル部ハ明瞭ナラス

外膜ニ於テハ彈力纖維ハ纖細ナルモノト粗大ニシテ縦走セルモノトヲ存シ何レモ其數多カラズ (附圖第 6) 参照 此ノ部ヨリ中膜ニ移行スル部ニハ尙比較的二長ク連續セル彈力纖維ト脂肪組織ノ存スルヲ見ル

中膜ニ於テハ縦横ニ錯綜セル結締組織纖維ノ増殖ト血管ノ増生トヲ認メ此ノ部ニ於ケル彈力纖維ハ殆ンド消失シ僅ニ處々ニ纖細ナル遺殘彈力纖維ヲ認ムルニ過ギズ (附圖第 7) 又中膜層ニ増生セル血管ニモ彈力纖維ノ明瞭ナルモノハ稀ナリ (更ニ此ノ部位ニ Van Gieson ノ染色ヲ施シテ検査スルニ縦横ニ錯雜行ノ走セル纖維ハ何レモふくじんニ紅染シびくりん酸ニハ反應ヲ呈セズ) 内膜ニ於テハ其細胞形態ハ明瞭ヲ缺キ纖維素様ノモノ及比較的多數ノ稍連續セル彈力纖維ヲ認メ殊ニ動脈内膜ノ游離縁ニ於テ處々全ク彈力纖維ヨリ成レル部アリ

乙、肝臓ノ組織學の所見

(1) ヘマトキシリンえおじん染色

弱擴大ニテ検査スルニ肝小葉間結締組織幾分肥厚セルタメ小葉ノ境界明瞭ニシテ各小葉ノ中心靜脈ハ多クハ擴張シ肝索ノ配列不正ナリ更ニ強擴大ニテ検査スルニ擴張セル中心靜脈内ニハ小數ノ白血球ト稍多數ノ赤血球及えおじんニ淡染セル漿液様物質ヲ認ム肝索間毛細血管ハ極度ニ擴張シ爲メニ肝索壓迫セラレ互ニ離間シ其ノ配列甚ダ不正トナリ索狀或ハ所ニヨリテハ點々ト島嶼狀ヲ呈スル部アリ該擴張毛細血管内ニハ赤血球ニ乏シク主トシテえおじんニ淡染セル血樣液ヲ含有ス肝細胞ハ境界並ニ胞核ノ消失セルモノ相當多ク核ノ殘存セルモノハ染色力可良ニシテ核小體核顆粒共ニヘマトキシリンニ可染ス肝細胞内ニハ黃褐色ノ微細色素顆粒ノ沈着セルモノ可ナリ多シ然レドモ

星芒細胞ノ増生肥厚並ニ肝索間及小葉間ニ於ケル圓形細胞浸潤ハ之ヲ缺ク

(2) 凍結切片標本

肝臓凍結切片ノ脂肪染色及鹽酸ト黃血鹽ノ混合染色ニ依ル鐵顆粒ノ染色ハ何レモ陰性ナリ

V. 總 括

之ヲ要スルニ本馬ハ心臟ニ接近セル後大動脈ノ起始部ニ人頭大ノ一大動脈瘤ヲ形成シ其ノ一部ニ小指頭大ノ穿孔ヲ來タシ之レヨリ胸腔内ニ大量ノ出血ヲ發シ其ノ内出血ニ因テ急性ノ亡血死ヲ遂ゲタル誠ニ珍貴ナル病例ナリ蓋シ本例大動脈瘤ノ中膜ハ大ニ肥厚スルモ筋肉纖維殆ンド消失シ弾力性ニ乏シキヲ以テ高キ血壓ノ爲漸次膨大シ遂ニ其ノ一部破碎穿孔セルモノナラン重症傳染性貧血病ニ罹リ砒素劑ヲ以テ治療試驗ヲ試ミツ、アリシ患馬ノ胸部大動脈ニ動脈瘤ヲ認メタル病例ハ駒場ニ於テ古ク實驗セラレタルコトアリ然レドモ急性傳染病又ハ中毒病ニ來ルノ變生壞死ニ基ク動脈瘤ハ瘤壁必ズ菲薄ナルヲ常トスルモノナルニ反シ本例ノ瘤壁ニ於テハ中膜ハ悉ク筋肉纖維ヲ失ヒ結締組織性ノ被膜ト化シ其ノ厚サハ著明ニ増加シ且硬結ス加之組織學的檢査ニ於テハ本馬ハ殆全ク傳染性貧血病ノ所見ヲ缺如スルヲ以テ此大動脈瘤ノ發生ト傳染性貧血病トノ因果關係ハ全然存セザルモノト云ハザル可カラズ且又本例ハ動脈瘤中ヨリ寄生虫ヲ證明シ得ザリシモ既ニ寄生性動脈瘤ノ一大特色タル動脈瘤壁ノ著明ナル肥厚硬結ヲ認ムルノミナラズ前腸間膜動脈根部ニ於テモ亦之レト殆同性ノ寄生性動脈瘤ヲ確認スル以上必ズヤ此大動脈瘤ハ寄生性動脈瘤ノ痕跡タルベキモノナラン

本稿ヲ終ルニ際シ故獸醫學博士大塚猪一郎閣下ニ敬意ヲ表シ特ニ農學博士江本修、橋本庄太郎、吉村市郎、市岡朝祐、佐藤勝三郎、井上櫻文郎、藤森順一八各位ニ對シ厚意ヲ謝ス

附 圖 說 明

- 第 1 本盛號ノ心臟及後大動脈(弓部)ニ發生セル動脈瘤
- 第 2 本盛號前腸間膜動脈瘤ノ内面
- 第 3 本盛號後大動脈(弓部)ニ發生シタル動脈瘤ノ外膜層ノ切片標本

- (へまどきしりん, えおじん染色, 擴大率 48 倍)
- 第 4 本盛號後大動脈(弓部) = 發生シタル動脈瘤ノ中膜層ノ切片標本
(へまどきしりん, えおじん染色, 擴大率 48 倍)
- 第 5 本盛號後大動脈(弓部) = 發生シタル動脈瘤ノ内膜層ノ切片標本
(へまどきしりん, えおじん染色, 擴大率 48 倍)
- 第 6 本盛號後大動脈(弓部) = 發生シタル動脈瘤ノ外膜層
(わいげろと弾力纖維染色, 擴大率 48 倍)
- 第 7 本盛號後大動脈 = 發生シタル動脈瘤ノ中膜層
(わいげろと弾力纖維染色, 擴大率 48 倍)
- 第 8 本盛號後大動脈 = 發生シタル動脈瘤ノ中膜層
(わいげろと弾力纖維染色, 擴大率 208 倍)
- 第 9 健康馬ノ後大動脈(弓部)ノ中膜層
(わいげろと弾力纖維染色, 擴大率 48 倍)
-

A RARE CASE OF ANEURYSMA FOUND
IN THE BEGINNING PORTION OF
AORTA IN A HORSE

M. SAJJO and T. KATO

(From the Army Veterinary School, Tokyo)

(Received for publication January 12, 1934)

The majority of the aneurysma which break out among horses are aneurysma verminosa. Furthermore, the latter are those which make their appearances mostly on the root of arteria mesenterica anterior. Excepting this artery, occasions arises sometimes when arteries in abdominal cavity like Art. mesent. posterior, Art. coeliaca etc., will show the same affection. It can, however, be said that there can hardly be the case when the aneurysma verminosa will occur in arteries in thoracic cavity.

Authors have recently found a large aneurysma in the beginning part of aorta of a horse. As it is to be considered quite unusual, it has just been decided to write down an outline of the matter as follows:

This sick horse was transferred for experimental use from the 4th Heavy field artillery Regiment to the authority of the Military Veterinary School on July 15 in the year 1930, with anamnesis that he had suffered from strangles 7 years ago.

At the time of his arrival at the Military Veterinary School, he had a dull appetite, insufficient nutrition, no energy and remarkable anaemia (red blood corpuscles 3600000 in cmm). Therefore he was diagnosed that he was perhaps suffering from infectious anaemia. He died a sudden death on July 30 of the same year. Autopsy was held on it on the morning of the following day.

The result of the post mortem examination showed, as the most noticeable affection, that, a large aneurysma nearly as large as his heart had been formed in the beginning part of the aorta, namely quite close to the heart. The wall of the aneurysma was in many places extremely thick and stout (1.5~6 cm. in thickness), but on the upper surface had one comparatively thin part where there was an opening of the size of small finger.

From this opening great haemorrhage seems to have come. The thoracic cavity was filled with a great quantity of blood, i. e., this horse died a sudden death as the result of acute blood loss from the opening of the aneurysma. The internal cavity of the aneurysma was full of yellowish white fibrin coagula and speck like colored thrombus which was fixed slightly to the inside of the aneurysma. No worms were found in the internal cavity.

Although, in the histological examination of the aneurysma, 3 layers are still discernible there, yet every layer is found remarkably thickened in consequence of the proliferation of connective tissue. Eosinophile leucocytes infiltration is not to be seen.

According to the examination of his liver and spleen, he is absolutely free from infectious anaemy.

Judging from the non-existence of worms in the aneurysma, and from the lacking of eosinophile leucocyte infiltration there, this can hardly be called verminous aneurysma, but if viewed from the standpoint of the wall which is showing the remarkable thickening and sclerosis and again from that of the striking resemblance of this aneurysma in the nature to verminous aneurysma, which existed in the root of Art. mes. anterior, it can be inferred that this must be the verminous aneurysma.

(Authors' abstract from their Japanese paper)

第 1 圖

第 2 圖

第 3 圖

第 4 圖

第 5 圖

第 6 圖

第 7 圖

第 8 圖

第 9 圖