羊ノ傳染性流産ニ關スル研究. I
內蒙古林西滿鐵種羊場ニ發生セル羊ノ傳染性流
産並ニ人ノまるた熱感染例ニ就テ

板 橋 敬 一 渡 部 成 三

(奉天滿鐵獸疫研究所 所長: 實吉吉郎)

(昭和 11 年 11 月 11 日 受 附)

目 次

I. 緒 言	IV. 流産羊ノ血清反應
II. 林西種羊場ニ於ケル羊流産ノ 發生情況	V. 同場従業員間ニ頻發スル不明 熱性疾患ノ原因
III. 細菌學的檢索	VI. 考 按
1. 流産胎兒ヨリノ菌ノ分離	VII. 總 括
2. 流産母羊ヨリノ菌ノ分離	文 獻
3. 分離菌ノ性狀	

I. 緒 言

Brucella 菌屬ノ感染ニヨツテ惹起セラル、家畜ノ傳染性流産ハソノ分布
區域廣汎ニシテ殆ンド世界各國ニ亘リ本邦ニ於テモ西ケ原獸疫調査所ニヨ
リテ既ニ 20 數年前 *Br. abortus* Bang ニ因ル牛ノ傳染性流産ノ發生確認
セラレ爾來各地ニコレガ發生ヲ見ルニ到レリ滿洲ニ於テモ亦近年撫順及長
春ノ乳牛間ニ本症ノ發生ヲ見タルガ支那ニ於テハ家畜ノ傳染性流産ニ關ス
ル報文皆無ニシテ流行ノ有無ヲ窺知シ得ズ纔カニ人ノ波狀熱罹患例ヨリコ
レヲ見ルニ Maxwell⁽¹⁾ ハ 1916 年 Fukien ニ於テ 1 例ノ患者ヲ報告シ
Lim⁽²⁾ ハ Honan ニ於テ山羊ニ接觸セル 4 名ノ印度人患者ノ 1 例ヨリ *Br.*
melitensis ヲ分離セリ Zia and Wong⁽³⁾ ハ北平ニ於テ 3 名ノ患者中 2 例ヨ
リ培養セル菌ノ一ハ *Br. melitensis* ニシテ一ハ *Br. paramelitensis* ナルコ
トヲ確メタルモ感染經路ヲバ詳カニセズ Wong⁽⁴⁾ ハ上海ニ於ケル患者ノ
1 例報告ト共ニ同地方支那人ノ *Brucella* 凝集素保有率 1.9% ナルヲ報ジ更

ニ 'C. W. Lang ガ北平地方ノ支那人ニ就テ同様ノ檢索ノ結果 9.2% ノ陽性率ヲ得 Wong ノ報告ト對比シ北支ニ於テ本症ノ發生多キ事實ヲ指摘セリ Ts'un and Zia⁽⁵⁾ ハ北平ニ於ケル 3 名ノ患者中 2 名ハ感染經路不明ナルモソノ 1 例ヨリハ *Br. melitensis*, 1 例ヨリハ *Br. paramelitensis* ヲ分離セリ同氏等ハ更ニ過去 5 年間ニ 10 名ノ自然感染例ヲ見タルコトヨリ推シ本症ハ同地方ニハ地方病トシテ存在スルモノト解釋セリ上述ノ如ク支那特ニ北平地方ニ於テハ人ノ症例ニハ乏シカラザルモ家畜ノ *Brucella* 感染ニ關シテハ全ク不明ナリ

本年 1 月初旬ヨリ 3 月中旬ニ亘リ興安西省林西縣滿鐵林西種羊場ニ於テ羊ノ流産多發セルガ余等ハソノ病原ニ於キ檢索セル結果 *Br. melitensis* ニ因ル傳染性流産ナルコトヲ確メ且ツ偶々同場従業員間ニ頻發セル不明熱性疾患モ亦本菌ニ因ルマルヲ熱ナルコトヲ診斷シ得タリ今回ノ流行ハ本邦及滿蒙ニ於テハ嘗ツテ認メラレザリシ病原菌ニ因ル獸疫ナルト共ニ北支ニ於ケル人ノ波狀熱發生等トモ關連シ興味アル例ナリト信ズルヨリ以下簡單ニ現在迄ニ檢索シ得タル事實ヲ記載シ報告スルコト、ス

II. 林西種羊場ニ於ケル羊流産ノ發生情況

林西種羊場ニ於ケル飼育羊數ハ約 1600 頭ニシテ内交配牝羊ハ 700 頭分婉ハ昨年 12 月ヨリ始マレリ然ルニ本年 1 月 8 日雜種羊 1 頭ニ流産ヲ見ソノ後同月中引續キ 16 頭ノ流産羊ヲ同群中ヨリ出セリ又月末ニハめりの一種 2 頭, 改良種 1 頭流産シ 2 月ニ入リテハめりの一種 15 頭, 改良種 68 頭, 雜種 9 頭更ニ 3 月ニハ改良種 20 頭流産シ 3 月 19 日發生ノ 1 頭ヲ最後ト

Table I. Number of Ewes that aborted in Spring, 1936.

Race of Sheep	Covered Ewes	Pregnant Ewes	Sterile Ewes	Died Ewes	Normally Delivered	Aborted Ewes
Merino	108	91	17	4	70	17
Graded	458	424	34	3	331	90
Cross-breed	134	117	17	1	90	26
Total	700	632	68	8	491	133

シテ終熄セリ流産發生頭數ヲ表示スレバ第 I 表ノ如シ

交配ニ用ヒタル種牡羊ハめりの一種 11 頭, 改良種 15 頭ナリ流産ノ時期
= 關シテハ分娩豫定日前 20 日以内ニ流産スルモノ多クソノ内豫定日前 14
日ノモノ全流産羊ノ 1 割ヲ占メ最高率ナリ而シテ豫定日前 49 日ノ流産ヲ
最モ早期トシ遅キハ豫定日前 1 日ニ流産セルモノアリ

III. 細菌學的檢索

1. 流産胎兒ヨリノ菌ノ分離

流産胎兒ハ概ネ腹部膨大シ腹部及胸部ノ皮下ニハ血樣漿液浸潤ヲ見ル送
附胎兒 7 例ニ就キ培養ヲ試ミタル結果ハ第 II 表ニ示ス如シ

Table II. Results of Bacteriological Examination of Aborted Fetuses.

Aborted Fetus	Date of Examination	Results of Bacteriological Examination						Name of Isolated Strains
		Heart-blood	Lung	Spleen	Liver	Tonsil	4th Stomach	
Material I	29/II, '36	—	+++*	—	—	++	++	B.O. 1
" II	15/III, '36	++	++	+++*	++	++	++	B.O. 2
" III	"	—	?	—	—	?	—	
" IV	"	++	++	+++*	++	++	++	B.O. 3
" V	"	—	—	—	—	?	?	
" VI	"	—	—	—	—	?	—	
" VII	"	++	++	+++*	++	++	++	B.O. 4

N. B.: "*" indicates the organs from which the stock-cultures originated.

即チ内 4 例ノ脾, 肺, 肝, 扁桃腺, 第四胃ヨリ馬血液加寒天斜面上ニ
48 時間培養ニ於テ灰白色濕潤ナル小集落ノ純粹ナル發育ヲ見タリ他ノ 3
例ヨリハ菌ノ分離不能ニ終レリ

2. 流産母羊ヨリノ菌ノ分離

流産母羊ニ就キテハ 5 月 5 日流産後 68 日 (No. 633) 及 67 日 (No.
1224) ヲ經過セル 2 頭ヲ屠殺剖檢シタルガ子宮, 乳房及所屬淋巴腺共ニ聊
カノ變狀ヲモ有セズ培養結果モ陰性ニ終レリ然レドモ之等諸臟器ノ乳劑ヲ
12 頭ノもるもつとニ接種セルニ甚ダ興味アル結果ヲ得タリ之ヲ第 III 表

Table III. Results of Bacteriological Examination of Ewes that Aborted by Means of Inoculation with Organ Emulsions into Guinea-Pigs.

Aborted Ewes	Examined Organs	Number of Guinea-pigs	Agglutination after Inoculation			Complement-Fixation 121 days after Inoculation	Days from Inoculation to Autopsy	Results of Bacteriological Examination							
			22 days	32 days	121 days			Heart-blood	Spleen	Lung	Liver	Gall	Kidney	Mesenteric Lymphnodes	Uterus-body or Testicle
Sheep No. 633	Lymphnodes of Uterus	1	0	0	0	0	114	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	0	0	200	0.05	119	—	+	+	+	—	—	+	—
	Lymphnodes of Mammary Glands	3	50	800<	400	0.02	114	—	+	+	+	—	—	—	—
		4	100	400			37	—	+	—	+	—	?	—	—
	Uterus-Body	5	0	0	0	0	126	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	0	0	0	0	113	—	—	—	—	—	—	—	—
Sheep No. 1224	Lymphnodes of Uterus	7	0	0	0	0	119	—	—	—	—	—	—	—	—
		8	0	0	0	0	120	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lymphnodes of Mammary Glands	9	0	0	0	0	120	—	—	—	—	—	—	—	—
		10	200	800<			35	—	+	—	+	—	+	+	—
	Uterus-Body	11	100	100	1600	0.01>	121	+	+	—	+	—	+	—	—
		12	0	0	50	0.2	126	—	+	—	+	—	+	—	—

N.B. : “*” indicates the organs from which the stock-cultures named B.O.5 and B.O.6 originated.

ニ示スベシ

即チ羊 No. 633 ノ子宮附屬淋巴腺ヲ接種セル 2 頭ノ内 1 頭 (No. 2), 同羊乳房附屬淋巴腺ヲ接種セル 2 頭 (No. 3 及 No. 4) 並ニ羊 No. 1224 ノ乳房附屬淋巴腺ヲ接種セル 2 頭ノ内 1 頭 (No. 10) 及同羊子宮體ヲ接種セル 2 頭 (No. 11 及 No. 12) 以上合計 6 頭ノもるもつとハ接種後 22 日, 32 日及 121 日ニ於テ検査セルニ Widal 氏反應並ニ補體結合 反應共ニ陽性結果ヲ示シタリ而シテ接種後 35 日乃至 126 日ニ於テ剖檢培養ヲ試ミタルニ各例共肉眼上ノ病變ハ認メラレザリシモ反應陽性ノもるもつとヨリハ脾, 肺, 肝, 腎, 腸間膜淋巴腺及心血等ヨリ流産胎兒ヨリ得タルト同様ノ菌ヲ分離シ得タリ但シ血清反應陰性ノもるもつとハ培養結果モ亦陰性ナリキ

3. 分離菌ノ性狀

流産胎兒ヨリ分離セル 4 株 (B.O. 1, B.O. 2, B.O. 3 及 B.O. 4) 及流産母羊ノ臟器ヲもるもつとニ接種シテ得タル 2 株 (B.O. 5 及 B.O. 6) 計 6 株ノ細菌ハ諸種生物學の性狀全ク一致ス即チぐらむ陰性ノ極小短桿菌ニシテぶいよんヲ一様ニ潤濁スルモ運動性ヲ有セズらくむす牛乳ヲ青變シいんどーる反應ハ陰性ナリ *Br. melitensis* 並ニ *Br. paramelitensis* 各々一株, *Br. abortus* 5 株及 *Br. suis* 2 株ヲ對照トナシソノ生物學性狀ヲ検査セル

Table IV. Biological Characters of Our Strains.

Strains	Growth on Initial Culture	Fermentation of Carbohydrates	H ₂ S-Production	Bacteriortasis								
				Thionin			Basic Fuchsin		Methyl-Violet			
				1:10000	1:30000	1:50000	1:10000	1:50000	1:10000	1:50000	1:100000	
B.O. 1	aerobic	negative	—	—	+	卅	+	卅	卅	—	+	卅
" 2	"	"	—	—	+	卅	+	卅	卅	—	+	卅
" 3	"	"	—	—	卅	卅	+	卅	卅	—	+	卅
" 4	"	"	—	—	卅	卅	+	卅	卅	—	+	卅
" 5	"	"	—	—	+	卅	+	卅	卅	—	+	卅
" 6	"	"	—	—	+	卅	+	卅	卅	—	+	卅

<i>Br. melitensis</i> (80)		"	-	-	+	++	++	++	++	-	++	++
<i>Br. paramelitensis</i> (82)		"	-	-	+	++	++	++	++	-	++	++
<i>Br. abortus</i> B.B. 1	Microaerophilic	"	++	-	-	+	++	++	++	-	+	++
" 2	"	"	++	-	-	+	++	++	++	-	+	++
<i>Br. abortus</i> Bang 72		"	+	-	-	±	++	++	++	-	+	++
" 91		"	++	-	-	+	++	++	++	-	++	++
" 129		"	++	-	-	-	-	+	++	-	-	+
<i>Br. suis</i> Lister I		"	++	-	++	++	-	±	±	-	-	-
" II		"	++	-	-	++	++	++	++	-	-	+

* Rhamnose, laevulose, mannose sucrose, lactose, maltose, raffinose, dextrose, inulin, starch, adonitol, mannitol, dulcitol, sorbitol, salicin.

〔備考〕(1) 菌株 *Br. melitensis* (80) 及 *Br. paramelitensis* (82) ハ北里研究所ヨリ, *Br. abortus* 3 株 (Bang 72, 91 及 129) ハ西ヶ原獣疫調査所ヨリ及 *Br. suis* Lister I 及 II ハ北大家畜衛生學教室ヨリ分譲セラレタルモノナリ尙又 B.B. 1 及 B.B. 2 ハ當研究所ニ於テ伊藤定隆氏ガ流産牛胎兒ヨリ分離セラレタルモノナリ菌株ノ分譲ヲ賜ハリシ各位ニ厚ク感謝ノ意ヲ表ス

(2) 添加色素 Thionin 及 Basic Fuchsin ハ Merck 會社製品, Methyl-violet Grubler 會社製品ナリ

ニ第 IV 表ニ示スガ如キ結果ヲ得タリ

B.O. 1~B.O. 6 ノ 6 株ノ分離培養ハ既述ノ如ク何レモ馬血液加寒天斜面上ニ好氣性條件ノ下ニ於テ行ヒタルモノニシテ分離直後げらちん寒天ノ振盪培養ヲ試ミタルモ "microaerophilic" ノ發育ヲ認メザリキ且ツ爾後ノ繼代ニヨリテ發育ニ殆ンド變化ナシ之ニ反シ B.B. 1 及 B.B. 2 ノ *Br. abortus* ハ當研究所伊藤定隆氏ニヨレバげらちん寒天ニ於ケル振盪培養ニヨリ分離培養シタルモノニシテ表面ヨリ約 1.0 cm ノ深部ニ著明ナル發育層ヲ認メタリ而シテ後者ノ寒天斜面上ニ於ケル發育ハ分離後數代ハ甚ダ貧弱ナ

リシガ繼代ニヨリ漸次優勢トナリ數代後ハ前者ト略同様ノ發育ヲ示シタリ
炭水化物分解試験ハ Rhamnose, Laevulose, Mannose, Sucrose, Lactose, Maltose, Raffinose, Dextrose, Inulin, Starch, Adonitol, Mannitol, Dulcitol, Sorbitol, Salicin ノ 15 種ニ就キ検査セリ pH 7.0~7.3
ノペプトン水ニ上述炭水化物ヲ 1% ニ加ヘらくむすヲ指示藥トシ觀察ハ 2
週間行ヒタリ検査セル 15 株ノ菌ハ表示セルガ如ク皆同一態度ニシテ此等
炭水化物ヲ分解セス

硫化水素形成ハ鉛糖ヲ約 1/500 ノ割合ニ加ヘタル高層寒天培地ニ細菌ヲ
穿刺培養シ 5 日間 37°C ノ孵卵器ニ保チ檢シタルガ分離菌 6 株並ニ *Br. melitensis* 及 *Br. paramelitensis* ハ黒變ヲ呈セザルニ反シ對照ノ *Br. abortus* 5 株並ニ *Br. suis* 2 株ハ穿刺線ニ沿ヒテ黒線ヲ示スト同時ニ表在セル
菌苔ハ黒褐色ヲ呈セリ

ばくてりおすたーシスノ檢索ハ Thionin, Basic Fuchsin 及 Methyl-Violet ノ 3 種色素ヲ用ヒ之ヲ普通寒天培地 (pH 7.2) ニ添加シテ表示スル
如ク各々 3 種類ノ稀釋ヲ造レリ培養ハ可檢菌ノ普通ぶいよん 48 時間培
養ヲ用ヒソノ 1 白金耳ヲ以テ劃線シ 37°C ニ 3 日間保チ日々觀察シタリ
Thionin ノ 3 萬倍稀釋ニ於テ分離菌 6 株並ニ *Br. melitensis*, *Br. paramelitensis* 及 *Br. suis* Lister I ハ發育スルモ *Br. abortus* ノ 5 株及 *Br. suis* Lister II ハ全ク發育セズ Basic Fuchsin ノ 1 萬倍稀釋ニ於テ分離菌 6 株
並ニ *Br. melitensis* 及 *Br. paramelitensis* ハ貧弱ナル發育ヲ示スニ反シ
Br. abortus ノ 4 株ハ優勢ナル發育ヲ示セリ但シ Bang 129 ハ發育セズ又
Br. suis Lister I ハ發育セザルモ Lister II ハ優勢ニ發育セリ次ニ
Methyl-Violet ノ 5 萬倍稀釋ニ於テ分離菌 6 株並ニ *Br. melitensis*, *Br. paramelitensis* 及 *Br. abortus* 中 4 株ハ發育スルモ Bang 129 及 *Br. suis* 2 株ハ發育セズ

尙分離菌 6 株ハ *Br. abortus* ノ家兎凝集血清ニ對シ何レモ該菌ト同様
良ク凝集シソノ凝集價 (3200 倍) ニ殆ンド差ヲ認メズ

上述諸性狀ヲ以テ H. Habs⁽⁶⁾ 及 Zeller und Stockmayer⁽⁷⁾ 等ノ得タル結果ニ徴スルニ余等ノ分離菌ハ *Brucella melitensis* ト同定スル事ヲ得ベシ

IV 流産羊ノ血清反應

流産後 25 日乃至 66 日ヲ經過セル羊 20 頭ニ就キ最初 *Br. abortus* ヲ用ヒテ凝集反應及補體結合反應ヲ試ミタルニ 2 頭ヲ除ク 18 頭ニ於テ著明ナル陽性結果ヲ得タリ之ヲ第 V 表ニ表示スベシ

凝集價ハ 50 倍～3200 倍ニシテ補體結合價ハ 0.025～0.0005 ヲ示セリ更ニ分離菌ヲ用ヒテ凝集反應ヲ試ミタルガ *Br. abortus* ヲ抗原トセル場合ト同様陽性反應ヲ呈セリ

尙表中ノ羊 No 633 及 No. 1224 ハ本血清反應檢査時ヨリ 27 日ヲ經過セル 5 月 5 日ニ剖檢シソノ臟器乳劑ヲもるもつとニ接種シテ各々ヨリ *Br. melitensis* ヲ分離セルコト既述ノ如シ

以上細菌學的並ニ血清學的檢査ノ結果ヲ綜合スルニ今回林西種羊場ニ流産セル羊流産ハ *Br. melitensis* ノ感染ニ因ル傳染性流産ナルコトヲ診斷シ得タリ

V. 同場従事員間ニ頻發セル不明熱性疾患ノ原因

昭和 10 年 3 月下旬羊ノ分娩ヲ擔當セル同種羊場松尾獸醫ハ不明熱性疾患ニ冒サレ又之ト殆ンド時ヲ同ウシテ滿人牧夫ノ 3 分ノ 2 約 20 名ニ近キモノモ同様ノ疾患ヲ見タリ松尾氏ハ經過思ハシカラザル爲同年 10 月内地ニ轉地靜養後現在ハ當獸疫研究所ニ勤務シ居レリ

本年 3 月上旬同場佐藤（勝）獸醫ハ松尾氏ト同一症狀ノ下ニ發病シ 4 月中旬來奉滿洲醫大醫院高森内科ニ入院セリ 4 月上旬相次イデ山崎、伊勢地兩獸醫並ニ氣象及農耕擔當ノ佐藤（利）氏發病シ滿人牧夫間ニモ 10 數名ノ患者發生セリ症狀ハ弛張熱ヲ主トシ盜汗、筋肉痛、關節痛ヲ伴ヒ昨年ハ更ニ陰囊浮腫ヲ呈セルモノヲモ見タリト云フ醫師ハコレヲ地方病性ろいま

Table V. Serological Reactions of Ewes that Aborted.

Number of Ewes	Age	Race of Sheep	Date of Abortion	Days from Abortion to Examination	Agglutination									Complement-Fixation								
					25	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	Control	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005	
1157	6	Merino	23/II '36	46	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	##	##	##	##	+	+	-	
1223	4	"	3/II "	66	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	##	##	##	##	##	-	-	
1316	3	"	25/II "	44	+	+	+	+	+	±	-	-	-	-	##	##	##	##	±	-	-	
1364	3	"	28/II "	41	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	##	##	##	##	##	##	##	
17	5	Graded Race	29/II "	40	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	##	##	##	##	##	-	-	
160	10		"	15/III "	25	+	+	+	+	+	+	+	±	-	-	##	##	##	##	##	##	+
215	10	"	28/II "	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	±	-	-	-	-	-	
314	3	"	25/II "	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	±	-	-	-	-	-	
480	9	"	24/II "	45	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	##	##	##	##	+	-	-	
522	9	"	27/II "	42	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	##	##	##	##	+	-	-	
545	3	"	26/II "	43	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	##	##	##	##	##	##	+	
633	9	"	28/II "	41	+	+	+	+	+	+	+	+	±	-	##	##	##	##	##	##	##	
645	9	"	3, III "	37	+	+	±	-	-	-	-	-	-	-	##	##	+	-	-	-	-	
690	8	"	28/II "	41	+	+	+	+	+	±	-	-	-	-	##	##	##	##	##	+	-	
822	8	"	20/II "	49	+	+	+	+	+	±	-	-	-	-	##	##	##	##	+	-	-	
1053	7	"	24/II "	45	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	##	##	##	##	##	-	-	
1090	7	"	22/II "	47	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	##	##	+	±	-	-	-	
1224	7	"	29/II "	40	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	##	##	##	##	##	+	-	
1256	7	"	28/II "	41	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	##	##	##	##	##	-	-	
1257	7	"	22/II "	47	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	##	##	##	##	##	-	-	

ちす様疾患トシテ取扱ヒ低溫ナル土地ニ歸因スト解釋セルガ頻發ノ時期及發病者ノ環境等ヨリ考察スルニ *Br. melitensis* ノ人體感染ヲ疑ハシムルコト充分ニシテ症狀モ亦まるた熱ニ酷似スルコトヲ認メタリ因ツテ 5 月 22 日 *Br. abortus* Bang ヲ抗原トシテ昨春罹患セル松尾氏ノ血清ニ就キ凝集反應及補體結合反應ヲ試ミタルニ明ニ陽性ヲ示シタルヲ以テ更ニ醫大病院ニ入院中ノ佐藤(勝)及佐藤(利)(5 月上旬入院)兩氏ノ血清ヲ檢シ茲ニ再ビ陽性ノ定果ヲ得タリ此等 3 氏ノ反應成績ハ第 VI 表ノ如シ

Table VI. Serological Reaction of Human Patients Suffering from Malta-Fever in the Sheep-Breeding Farm in Rinsi.

Sera of Patients	Agglutination								Complement-Fixation							
	25	50	100	200	400	800	1600	3200	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005	
Matsuo	+	+	+	+	+	+	-	-	≡	≡	≡	≡	≡	≡	±	
K. Sato	+	+	+	+	+	±	-	-	≡	≡	≡	±	-	-	-	
T. Sato	+	+	+	+	+	+	+	-	≡	≡	≡	≡	≡	≡	+	
Control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

尙羊ヨリ分離セル *Br. melitensis* ヲ用ヒテ患者血清ニ對シ凝集反應ヲ試ミタルニ上表ノ成績ト同様ノ凝集價ヲ示セリ以上ノ結果ヨリシテ本病ノ原因ハ *Br. melitensis* ノ感染ニ因ル事疑ヒナクコトニ於テ林西種羊場ノ従事員間ニ頻發セル不明熱性疾患ハまるた熱ト診定シ得ルニ至レリ

VI. 考 按

林西種羊場ニ *Br. melitensis* ノ浸入セル經路全ク不明ニシテ昨年度ノ分娩期ハ勿論既往ニ於テモ少數ノ流産例ハ存シタルモ特ニ傳染性流産ヲ疑ハシメタルモノナカリシトノコトナリ然ルニ昨年 3 月松尾氏ヲ初メ多數ノ牧夫ガ同一症ノ下ニ發病シタルコトヨリ考フレバ昨年既ニ *Br. melitensis* ハ當種羊場ニ浸襲シオリタルモ飼育羊ハ何レモ正規分娩ヲ行ヒタル爲注意ヲ牽クニ至ラズ偶々潜伏感染ヲ蒙リキタル分娩羊ヨリ助産ニ携ハリシ従事員間ニ感染ヲ受ケタルモノト想像セラル而シテ本年ノ流産爆發ニ關シテハ本

冬期ハ林西地方ニ 60 年來ト稱スル酷寒襲來シノ影響ニヨリ動物ニ種々ノ障害ヲ生ジタルガ昨年度ニハ單ニ潜在性感染ヲ示セル傳染性流産モ本年ニ至リ該氣候ノ感作主因トナリ遽カニ本流行ヲ招來シタルモノト解釋セラレザルニ非ズ尙附近農家ヲ調査シタル結果モ本年ハ羊及山羊ノ流産多ク特ニ後者ニ於テハ 40~50% ノ流産ヲ示セリト云フ

Br. melitensis ノ人體感染ニ就テ特ニ興味アルハ佐藤(利)氏ノ例ニシテ同氏ハ氣象觀測ヲ擔當シ獸醫ニアラザルモ同僚病臥セルタメ止ムナク本年始メテ羊ノ助産ヲ 1~2 回援助シソノ結果不幸罹患スルニ至レリ又同場料理人ノ同様罹病セル原因ガ羊肉ノ調理ニアリト考ヘ得ラル、コト及同場内ニ居住スル老人、婦人、小兒間ニ本病ノ發生ナキ事實ハ罹患羊ト接觸シ又ハ生肉等ヲ處理スルコトニヨリテノミ人體感染ヲ惹キ起スコトヲ裏書キスルモノト云フベシ

VII. 總 括

1. 肉蒙古林西種羊場ニ於テ本年 1 月上旬ヨリ 3 月中旬ニ亘リ妊羊 632 頭中 133 頭流産セリ (第 I 表參照)
2. 該群ノ流産胎兒ヨリ 4 株及流産母羊ノ臟器ヲもるもつとニ接種シテ 2 株都合 6 株ノ細菌ヲ分離シ得タリ (第 II 表及第 III 表參照)
3. 6 株ノ細菌ハ性狀全ク一致シ生物學的檢索ヲ行ヘル結果 *Br. melitensis* ト同定シ得タリ (第 IV 表參照)
4. 流産羊ノ血清反應ハ 20 例中 18 例ニ於テ *Br. melitensis* ニ對シ陽性結果ヲ示シタリ (第 V 表參照)
5. 上述ノ結果ヨリシテ流産羊ノ殆ンド大部分ハ *Br. melitensis* ニ感染シタル結果流産セルモノト診斷シ得タリ
6. 同場従事員間ニ昨年ヨリ頻發セル不明熱性疾患ヲまるた熱ト診斷シ得タリ (第 VI 表參照)

稿ヲ終ルニ臨ミ實吉所長ニ敬意ヲ表シ御校閱ヲ忝ウシタル北里研究所部長葛西博士ニ深謝ス尙材料ヲ提供セラレシ林西種羊場庄司滋氏外各位ノ御厚意ヲ鳴謝シ

又血清診斷ニハ伊藤定隆君，細菌檢索ニハ依田八治，富岡秀義兩君ノ御援助ヲ賜ハ
リシコトヲ深ク感謝ス

文 獻

- (1) Maxwell, J. P.: Undulant and paratyphoid fevers in Fukien province. *Chin. Med. J.*, 1916, **30**, 100.
- (2) Lim, C. E.: Isolation of *M. melitensis* from patients in China. *Trans VI Congr. Far East Ass. Trop. Med.*, Tokyo, 1925, **2**, 763.
- (3) Zia, S. H., and Wong, D. H.: Brucella infection in Chinese. (Undulant fever) *Chin. Med. J.*, 1932, **46**, 243.
- (4) Wong, D. H.: Brucella agglutinins among the Chinese in Shanghai. *Chin. Med. J.*, 1936, Supplement 1, 280.
- (5) Ts'un, T., and Zia, S. H.: Undulant fever among laboratory workers. *Chin. Med. J.*, 1936, **50**, 1503.
- (6) Habs, H.: Brucellosis; Ergebnisse der neueren experimentell-bakteriologischen Untersuchungen über *Bact. abortus* Bang und *Bact. melitense*. *Zbl. Hyg.*, 1933, **28**, 481.
- (7) Zeller, H., u. Stockmayer, W.: Kulturelle Differenzierungsversuche mit Bakterien der Brucellagruppe. *Z. Inf. Haustiere*, 1933, **44**, 67.

**Studies on Contagious Abortion in Sheep. I.
Outbreak of Contagious Abortion among Ewes
and of Malta Fever among Veterinarians
and Shepherds at the Rinsi Sheep-
Farm in Rinsi (Inner Mongolia). ***

By

M. ITABASHI and S. WATANABE.

*(From the Mukden Institute for Infectious Diseases of
Animals, S. M. R. Co., Mukden, Manchukuo.)*

(Received for Publication, November 11, 1936)

In early spring of this year, contagious abortion broke out among ewes at the Rinsi Sheep-Farm (S.M.R.Co.) in Rinsi, Inner Mongolia, Manchukuo. The occurrence of the ovine contagious abortion seems to be the first one noted in the Far East, while the bovine contagious abortion has been recognized for 20 years in Japan, and recently even in Manchukuo. There was also observed a febrile attack among the greater number of staff and shepherds at the same farm. It, however, must be remembered that the occurrence of Malta fever has been several times reported up to this time in China, especially in Northern China.

By our investigation, it was established that this epizootic abortion and the human affection both were due to *Bruella melitensis*. The results obtained from the present experiments are summarized as follows:

(1) Out of 632 pregnant ewes at this farm, 133 aborted during a period extending from early January to middle of March. (Table I).

* Japanes original, pp. 286—295.

(2) A bacillus was uniformly isolated from 4 aborted fetuses by cultivation and from 2 ewes that aborted by inoculation of their organs into guinea-pigs. (Tables II and III).

(3) Having examined these 6 strains bacteriologically, the authors determined that the strains are the same one which they classified as *Br. melitensis*. (Table IV).

(4) Sera of 20 ewes that aborted were examined by agglutination and complement-fixation tests and 18 of them showed a positive reaction against *Br. melitensis*. (Table V).

(5) From the above-mentioned results, it was concluded that the ovine contagious abortion under discussion is due to *Br. melitensis*.

(6) A febrile disease also has been observed to prevail among persons of this farm since last year. Considering the above-mentioned circumstances as well as results of serological tests, the outbreak was diagnosed as undulant fever caused by *Br. melitensis*. (Table VI).