Über die durch Nekrosebazillen verursachten multiplen Leberabszesse der Rinder.*

Von

S. YAMAMOTO.

(Aus dem Veterinär-Pathologischen Institut, Landwirtschaftliche Fakultät,
Tokio Kaiserliche Universität, Prof. Emoto, Direktor)

(Received for publication August 15, 1938)

Die Ätiologie der Abszesse in der Bauchhöhle der Rinder ist nicht einheitlich.

Primäre Abszesse können bei direkter Infektion der Bauchorgane durch offene penetrierende Verletzungen durch vom Pansen verdringende Fremdkörper entstehen. Und als die mit dem Fremdkörper verdringenden Eitererreger ist das *Bacterium pyogenes* am häufigsten bei erwachsenen Rindern. Diese Tatsache wurde erklärt auch in Japan bei Rindern.

Die Leber sitzt in Bauchhöhle nahe dem Pansen also natürlich auch in der Leber die Fremdkörperabszesse treten häufig auf. Aber solche Fremdkörperabszesse treten in der Regel einzeln auf.

Die multiplen Leberabszesse sind meisten sekundäre Abszesse, die hämatogen, cholangiogen, oder lymphogen entstehen können.

Hier ist eine Gruppe der multiplen Leberabszesse, die in der Anzahl der Präparate, die zu unserem Institut von Schibaura Schlachthof (Tokio) erhalten werden, häufig vorkommt, ohne Gram positive *Corynebacterium pyogenes* sondern mit Gram negativen schmalen Bazillen.

Bakteriologischer Befund

Etwa 2 Jahre zurück kultivierte ich diese Gram negative schmale Bazillen durch anaerobische Methode. Aber in jener Zeit es wurde geglaubt, dass die Nekrosebazillen seien etwas selten in Tierkrankheiten in Japan. Also dachte ich nicht diese Gram-

* Japanese abstract, pp. 212—213.

negative anaerobe Bazillen seien die Nekrosebazillen. Und nur züchtete ich diese Organismen auf Leber-Leber-Bouillon weiter. Da am 10. Nov. 1937 beobachtete ich eine Nekrosebazillose des Hirsches von Ueno-zoologischem Garten und entdeckte, dass die früher vom Rinderleber-abszesse isolierte Gram negative anaerobe Bazillen zu den von diesem Hirsche gezüchteten Nekrosebazillen sehr ähnlich sind. Und da sammelte ich solche multiple Leber abszesse der Rinder und isolierte durch anaerobische Methode die Gram negativen Bazillen und während 2 Monaten bekam ich 17 Stämme von diesen Bazillen.

Hier schreibe ich kurz über die Eigenschaften dieser Bazillen. *Morphologie*: Diese kultivierten Bazillen sind fadenförmig etwa 1μ breit und längere 150μ lang, und allgemein etwas breiter und kurzer als der Stamm vom Hirsch. Die im Eiter liegenden Bazillen sind kürzer und schmaler als die neu kultivierten.

Ich finde keine Eigenbewegung und Sporenbildung. Die Bazillen färben sich mit Karbolfuchsin, Löfflers Methylenblau oder mit Karbolthionin, jedoch nicht nach Gram. Mitunter zeigen die längeren Stäbchen und Fäden ungefärbte Lücken, die mit kurzen, zylindrischen, intensiv gefärbten stäbchenförmigen Abschnitten abwechseln, und schauen aus wie die Japanische Fahnenstange. In der Beobachtung mit Dunkelfeld zeigen diese Bazillen eine Form der Fasiiformenbazillen, und jedes Ende ist schmaler als die übrigen Teile des Stäbchens.

Kultur: Dieser Bazillus ist obligat anaerob. Er wächst bei Körpertemperatur in hochgeschichteten Leberagar mit Zusatz von 2 % igem Traubenzucker, 2% Traubenzuckeragar, Leber-Leber-Bouillon, Leber-Bouillon mit Zusatz von Blutserum, Tarozzi-Bouillon mit Waselin (Chesebrough) aufgeschichtet gut.

In Leber-Leber-Bouillon wächst dieser Bazillus gut mit Gas und Indolbildung, aber ohne Schwefelwasserstoffproduktion.

Hirnbrei wird unter lebhafter Gasbildung rosarot verfärbt.

Pathogenität: Kaninchen und Mäuse werden durch subkutane, intramuskuläre, und intraperitoneale Impfung mit diesen Bazillen leicht infiziert. Beim Kaninchen bei Infektion am Ohr erstreckt sich die trockene, käsige Nekrose des Gewebes auf den Kopf und

den Hals hinab und in 20—30 Tagen führt den Tod herbei. Bei Infektion am Rückenunterhautgewebe senkt die trokene, käsige Nekrose des Unterhautgewebes mit vorangehendem Ödem fächerförmig unaufhörlich und endlich wird auf der Bauchseite grosse Masse der Nekrose gebildet und das Tier niederkauert sich und die Körpertemperatur ist niedriger als normal, und in etwa 15—20 Tagen stirbt.

Bei weissen Mäusen bei Infektion an dem Schwanzwürzel entsteht die Nekrose des Unterhautgewebes und Muskeln, und der Tod folgt etwa 14 Tage nach der Impfung. Bei Infektion am Schwanz, das Ende des Schwanzes verändert sich in trockene Gangrän und man kann ihn brechen wie ein Holzabfall.

Aber diese Bazillen von Rinderleberabszesse sind allgemein weniger virulent als der Stamm von Hirsch.

Dieses künstlich erzeugte Nekrosegewebe wird in Müllerscher Lösung gehärtet und durch die Schnittfärbung nach Jensen werden diese Bazillen schönrot gefärbt, und an der Grenze zwischen dem Ödem und dem abgestorbenen Gewebe finde ich diese Bazillen in enormen Mengen, in dicken Buscheln radiär angeordnet, die mit ihren Fäden senkrecht in das ödematöse Gewebe sich hinein erstrecken.

Mit obenerwähnten Fundamenten urteile ich diese Bazillen zu früher beschriebenen Nekrosebazillen zu entsprechen.

Pathologischer Befund

Nun schreibe ich über die Pathologie der multiplen Leberabszesse der Rinder von jenem Inhalt von dem ich obenbeschriebene Nekrosebazillenstämme bekommen konnte.

Makroskopischer Befund:

Diese Abszesse sind ziemlich haselnuss- bis walnussgross, in selteneren Fällen erreichen sie Taubenei- bis Hühnereigrösse, und treten in der Regel multipel, am zahlreichsten 72 haselnuss-grosse Abszesse, die ich nur von der Oberfläche zählen konnte. Wenn die Herde sitzen gerade unter der Serosa, so verdickt sich die sie bedeckende Serosa infolge der fibrinösen und fibrösen Peritonitis, und verklebt sich mit benachbarten Organen, meistens mit

dem Zwerchfell.

Auf Durchschnitten durch diese erkrankte Leber beobachtete ich, dass die obenerwähnte Abszesse auch in der Tiefe des Organs auftreten, und ihr Sitz ist regellos, unabhängig vom Aufbau des Organs.

Hier makroskopisch unterscheide ich diese Abszesse in zwei grosse Gruppen, bzw. erstens in dem Eiter eine gelb-braune leidlich feste Masse haltende Form, ich nenne sie sequestrierte Form, zweitens in dem Eiter keine feste Masse nachweisbare Form, ich nenne sie erweichte Form.

Sequestrierte Form: Bei dieser Form, 5 Fälle in meinen 17 Fällen, mit äusserer fester, derber, grauweisslicher bindegewebiger Kapsel sind nicht dick wie die erweichte Form, und von diesem umgebenen Eiter sind grüngelb zäh und mit etwas süssem Geruche. Im Zentrum solcher Herde sitzt eine gelbbraune, etwas feste Masse, welche durch die histologische Untersuchung als Sequester erklärt wird.

Erweichte Form: Bei dieser Form, 12 Fälle in meinen 17 Fällen, äussere bindegewebige Kapsel entwickelt sich sehr gut und bisweilen dringt in dem Eiter Granulationsgewebe und scheint wie eine Actinomykose, und in dem Eiter finde ich makroskopisch Sequester nicht mehr.

Ausser diesen 2 Formen beobachtete ich einen Fall (Nr. 24) bei welchem in der Leber haselnuss- bis walnussgrosse Herde etwa gleichmässig durchsetzt wie bei den anderen 2 Formen und als multiple Leberabszesse ausschauen aber auf den Schnittflächen sind die Herde verändert zum Narbengewebe und von diesem Herde konnte ich nicht die Nekrosebazillen züchten. Solcher Fall muss im Schlachthof als eine Leberzirrhose gehalten werden.

Histopathologischer Befund:

Sequestrierte Form: An im Zentrum der Herde liegender makroskopisch etwas fester gelbbrauner Masse fand ich durch Azanfärbung oder Weigertsche Elastikafärbung altes Lebergewebe besonders Blutgefässe, Glissonsche Scheide und Leberazini und Balken, aber mit Haematoxylin-Eosinfärbung gibt es ungefähr kein gesunder Zellkern, also erklärt es, dass diese Masse koagulations

Nekrosegewebe its.

Der um diese Nekrosemasse liegende Eiter besteht aus veränderten polymorphkernigen Leukozyten und mononukleären Rundzellen. Und in diesem ziemlich durch Haematoxylin gefärbtem Eiter schwimmt hier oder dort mit Eosin intensiv gefärbte rote Masse, welche zu *Actinomyces* Druse sehr ähnlich ist. Ich zweifelte die *Actinomyces* Mischinfektion und färbte die Schnitte durch Gram-Weigert Methode. Aber in dieser Masse wurden keine Gram-positiven Organismen gefunden, also diese Masse sind nicht die Drusen von *Actinomyces bovis*.

Durch Levaditi Imprägnation, mit welcher eben die etwas degenerierten Bazillen im Gewebe gut dargestellt werden können, eine buschige Masse der fadenförmigen Bazillen, welche nach dem Vorschein den Nekrosebazillen sehr ähnlich sind, im Zentrum der *Actinomyces* Druse ähnliche gesammelte Zellenmasse beweist wird.

Und noch dazu diese Eosinophilemasse ist auch in den Herden, in welchen die Nekrosebazillen ganz rein wohnen, nachweisbar also denke ich diese Masse steht zu Nekrosebazillen in Beziehung, besonders in etwas älteren durch diese Bazillen verursachten Lebererkrankungen vorkommen.

Und in etwas frischen Herden, wie erster Fall, finde ich nicht diese Eosinophilemasse und durch Levaditi Imprägnation die Bazillen liegen gleichmässig in dem Eiter, und bilden nicht das buschige Bündel.

Dann denke ich, dass diese Eosinophilemasse aus den Bündeln der Nekrosebazillen und diese umgebenen veränderten Leukozyten und anderen bestehen, und sind der Stützpunkt der Bazillen gegen alle Schutzwirkung der Gewebe.

Um diese Eiterzone herum sitzt die sogenannte Pyogenemembran, welche an Eiter anstossende Zone aus mit gelapptkernigen Leukozyten (Oxydasereaktion positiv) und durch Unna-Pappenheim-Färbung positiv dargestellte Plasmazellen infiltriertem Granulationsgewebe besteht.

Und hier betone ich, dass an die Grenzschicht der Granulationsgewebe gegen den Eiter viele schrecklich grosse fetthaltige Makrophagen eine Züge bilden. Und auf Haematoxylin-Eosin Prä-

parat scheint diese Züge hell.

Die äusseren Teile der Pyogenemembran, nach dem gesunden Gewebe, besteht dagegen aus kernarmen Fibrillen.

Wegen dieser fetthaltigen Makrophagenschicht scheint makroskopisch die innere Fläche der Granulationsgewebe gelblich, aber bei der Mischinfektion der H_2S bildende Bazillen, sie scheint leicht graugelb wegen der dort entstandenen winzigen Pseudomelanose. Also solches Material ist ungünstig als Material von welchem die Nekrosebazillen zu isolieren.

Übersichtlich sind diese Befunde die Erweichung der an Zentrum liegenden Nekrosemasse welche als Sequester von umgebenem Gewebe isoliert, die Sequestration, und die Organisation, und die Abkapselung.

Erweichte Form: Bei dieser Form gibt es keine Sequester im Eiter. Aber die Natur des Eiters und der Granulationsgewebe ist ganz ähnlich zu der sequestrierten Form. Nur die Entwicklung der Granulationsgewebe fortschreitet und die Grenzschicht derselben gegen dem Eiter ist sehr ungleich, besonders bei einigen Fällen, die Erwachsung der Granulationsgewebe sehr gut und die Eitermasse bleibt inselförmig hier oder dort im Granulationsgewebe, solche Herde scheinen makroskopisch als eine Actinomykose.

Nun denke ich auf folgenden Gründen, dass die obenerwähnten 2 Formen der multiplen Leberabszesse der Rinder, die auf den 2 verschiedenen Stufen der Krankheit liegende dieselbe Lebererkrankung zu sein.

1) Von jeden Formen konnte ich die Nekrosebazillen züchten, also diese Krankheiten sind ätiologisch identisch.

2) Die Grösse der Herde und der auftretende Modus sind sehr ähnlich jeden Formen.

3) Die Natur der Granulationsgewebe und des Eiters ist makroskopisch und histologisch ganz ähnlich.

4) In einigen erkrankten Lebern sind diese 2 Formen der Herde gemischt, die grösseren Herde zeigen sequestrierte Formen und die kleineren Herde zeigen erweichte Formen.

Dann bei erweichten Formen sind die Gewebsreaktionen, die Erweichung der Nekroseherde, die Sequestration, und die Organi-

sation, ziemlich fortgeschritten als bei sequestrierter Form.

Also bei gleicher Grösse der Herde die erweichte Formen sind auf dem vorgetretenen Stufen der Krankheitsdauer als die sequestrierten Formen. Aber natürlich bei kleineren Herden die oben erwähnte Gewebsreaktionen können schneller als bei grösseren Herden vollenden.

Hier vergleiche ich diese Lebererkrankungen, besonders die sequestrierte Form mit der sogenannten Nekrobazilliose der Rinderleber, die durch die Nekrosebazillen verursacht in der Mehrzahl der Fälle haselnuss- bis walnussgrosse multiplen Nekroséherde auftretenden Lebererkrankung, welche ich nur einmal in 5 Jahren in vom Schlachthof zu unserem Institut gebrachten pathologischen Organen beobachtet habe.

Und auch hier beurteile ich aus folgenden Gründen, dass diese 2 Krankheiten identisch sind.

- 1) Diese 2 Krankheiten sind ätiologisch identisch.
- 2) Die Grösse der Herde und der auftretende Modus sind sehr ähnlich.

3) Bei beiden Krankheitsherden sitzen im Zentrum der Herde das typische Nekrosegewebe. Die Demarkation, die Gewebsreaktion um den frischen Lebernekroseherd muss eine junge Form der Sequestration sein. Also gibt es histologisch verbundene Übergänge zwischen diesen 2 Krankheitserscheinungen.

Nun es wird erklärt, dass diese 3 Formen der Lebererkrankungen, sogenannte Nekrosebazilliose der Rinderleber, die 2 Formen der multiplen Leberabszesse der Rinder, identisch sind und stehen auf den 3 verschiedenen Stufen derselben Krankheit. Die sogenannte Nekrosebazilliose der Rinderleber ist jüngst, die sequestrierte Form der multiplen Leberabszesse ist mittler, die erweichte Form derselbe ist älter, und dazu der zu Narbe verheilte Fall (Nr. 24), welcher vielleicht im schlachthof als die Leberzirrhose gehalten wird, kommt als die älteste.

Die Nekrosebazillen dürften in der Regel auf dem Wege der Pfortader vom Darm oder auf anderem Wege der Leber zugeführt werden.

Und am Ort ihrer Ansiedelung bewirken sie infolge ihrer

Vermehrung und Absiedelung durch toxische Produkte eine umschriebene, fortschreitende Koagulationsnekrose des Lebergewebes. Das Auftreten sehr zahlreicher Nekroseherde in der Leber führt meist den Tod herbei oder verursacht schwere Erkrankung.

Bei günstigem Verlaufe erleiden die nekrotischen Leberherde sekundäre Veränderungen, die Gewebsreaktionen, demarkierende Entzündung in der Peripherie der Herde. Dann begann die Demarkation und Verflüssigung der Nekroseherde von Peripherie derselben.

Der Nekroseherd isoliert sich von Peripherengewebe und wird zu Sequester. Und andererseits die demarkierende Entzündung fortschreitet und da gebildetes Granulationsgewebe macht gegen die innere Seite mit zahlreichen Makrophagen und Mikrophen die Verflüssigung und die Resorption der Nekrosegewebe und an äusserer Seite verändert sich zum Bindegewebe und diese Herde kapseln ab.

Bei dem noch günstigeren Fall schreitet die Resorption, und Organisation sehr gut fort und die Herde verändern sich zu Narbe und können heilen.

Hier denke ich an die Verhältnisse zwischen der Häufigkeit dieser verschiedenen Formen der Nekrobazillose der Rinderleber und der Verlaufsdauer derselben. Der Verlauf der seltenen Koagulationsnekrose ist der kürzeste, und der Verlauf der sequestrierten Form ist nächst kurz und der Verlauf der erweichten Form ist länger, und die zur Narbe verheilte Form dauert zum Tode des Tieres.

Bis Heutzutage wurde in Japan die Nekrobazillose der Rinderleber besonders mit typischen Koagulationsnekrose etwas selten beobachtet, aber nach den obenerwähnten Ergebnissen enthält diese Krankheit diese verschiedene Stadia der Krankheit sind nicht selten vielmehr verhältnismässig häufig auch in unserem Vaterland.

Nummer d. Fälle	Anzahl d. aussen- befindlichen Herde	Grösse d. Herde	Form d. Herde	Eosinophile Masse	Bakterien
1	26	hn	sequ.	—	Gram — B.
2	6	hn	erw.	+	Gram — B.

3	4	hn-wn	erw.	+	Gram - B.
4	72	hn-wn	sequ.	+	Gram - B.
5	52	hn	erw.	+	Gram - B. Gram + B.
16	6	hn	sequ.	+	Gram - B.
17	1	he	erw.	-	Gram - B.
18	1	he	sequ.	+	Gram - B.
21	2	wn	erw.	+	Gram - B.
22	1	he	erw.	-	Gram - B.
23	3	wn	erw.	-	Gram - B.
24	8	hn	Narbe	-	-
29	1	hn	erw.	+	Gram - B.
30	1	wn	erw.	-	Gram - B. Gram + K.
31	2	wn	erw.	+	Gram - B.
32	3	wn	erw.	+	Gram - B.
33	Stück	wn	erw.	-	Gram - B.
35	7	wn	sequ.	+	Gram - B.

Anm. hn: Haselnussgross wn: Walnussgross he: Hühnereigross
sequ: sequestrierte Form erw: erweichte Form

Zusammenfassung

- 1) Auch in Japan gibt es verhältnismässig viele durch Nekrosebazillen verursachte multiple Leberabszesse der Rinder.
- 2) Verfasser beobachtete 2 Formen dieser Abszesse, die sequestrierte Form und die erweichte Form.
- 3) Und erklärt, dass diese 2 Formen der multiplen Leberabszesse und die sogenannte Nekrobazillose der Rinderleber aus mehreren Gründen identisch sind, und die letztere dem jüngsten, sequestrierte Form der Abszesse dem mitten und die erweichte Form dem älteren Stadium derselben Krankheiten entsprechen. Bei günstigstem Fall die Herde verändern sich zu Narbe und können heilen.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 3

Fig. 4

Literatur

- (1) Albrecht B. Infektionen durch Nekrosebacillen. In kolle Kraus Uhlenhuth Handbuch der Pathogenen Mikroorganismen 3. Aufl. Gustav Fischer Jena 1928 Bd. 5 S. 673.
- (2) Bang B. Über die Ursache der Lokalen Nekrose. Bernhard Bang selected works. Humphrey Milford, Oxford University Press London 1936.
- (3) Bongert J. Bakteriologische Diagnostik. 7 Aufl. R. Schoetz Berlin 1927.
- (4) Carpano M. Die nekrotisch-gangränösen Affektionen in der Veterinärpathologie. Zbl. f. Bakt. I. Orig., 1914 Bd. 74 S. 225.
- (5) Ellermann. Einige Fälle von bakterieller Nekrose beim Menschen. Zbl. f. Bakt. I. Orig., 1905 Bd 38, S. 383.
- (6) Ellinger. Zur Kasuistik der übertragbaren bösartigen Scheidenentzündungen des Rindes mit besonderer Berücksichtigung der Wirkungen des Nekrosebacillus zugleich ein Beitrag zur Lehre von der puerperalen Infektion. Berl. T. W. 1903 S. 25.
- (7) Jensen C. O. Die vom Nekrosebacillus (Bac. necroseos) hervorgerufenen Krankheiten. In Kolle Wassermann. Handbuch der Pathogenen Mikroorganismen, 2 Aufl. Gustav Fischer, Jena 1913 Bd. 6 S. 234.
- (8) Joest E. Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie der Haustiere. 2 Auflage R. Schoetz, Berlin 1936.
- (9) Kaspar F. u. Kern. Weitere Beiträge zur Ätiologie der pyämischen Prozesse. Zbl. f. Bakt., I. Orig., 1910 Bd. 55 S. 97.
- (10) Lund L. Pathologische Histologie der Haustiere. Schaper, Hannover 1931.
- (11) Schmidt F. Nekrobacilliose bei Saugferkeln. Berl. T. W. 1923 S. 94.
- (12) Seifried O. Die wichtigsten Krankheiten des Kaninchens. J. F. Bergmann, München 1927.
- (13) 渡楨, 二村: 斃犢の肝臓壊死病竈より分離せる壊死桿菌の生物學的性質に就て, 家畜衛生協會報第4年第4號

TAFELERKLÄRUNG

- Fig. 1. Sequestrierte Form der multiplen Leberabszesse. Durchschnitt durch den Herd. Natürliche Grösse.
- Fig. 2. Erweichte Form der multiplen Leberabszesse. Durchschnitt durch den Herd. Natürliche Grösse.
- Fig. 3. Mikroskopisches Bild der inneren Seite der Abszesswand.
links: Eiter mit 3 Eosinophilemasse.
rechts: Granulationsgewebe. ($\times 70$)
- Fig. 4. Mikroskopisches Bild der Abszesswand und Eiter, an der Grenzschicht viele Makrophagen sind deutlich. ($\times 283$)
- Fig. 5. Levaditi Präparat der Eosinophilemasse im Eiter. ($\times 900$)
- Fig. 6. Leberagar Schüttelkultur 4 Tage alt. (Infra-rot-photographie)
- Fig. 7. Neu kultivierte Bazillen. ($\times 900$)

牛ノ肝臓ノ壊死桿菌ニ起因スル多發性膿瘍ニ就テ*

山 本 脩 太 郎

(東京帝國大學農學部獸醫學科病理學教室)

(昭和 13 年 8 月 15 日 受 附)

一般ニ牛ノ腹腔内ニ發生スル膿瘍ハ異物性ノ膿瘍ガ多ク其ノ原因細菌トシテハ種々ナル化膿菌中特ニ化膿桿菌ガ目立ツテ居ルト云フ事ニナツテ居ルガ我々ガ屠場ノ病的臓器デ取扱ツテ居ル牛ノ肝膿瘍ノ内ニハ壊死桿菌ヲ原因トスルモノガ相當ニ多イ私ハ最近瓜生學士ノ御盡力ニヨツテ斯様ナモノヲ芝浦屠場カラ採集シ其ノ内容物カラ壊死桿菌ヲ分離シ得タ 17 例ニ就キ病理學ノ考察ヲ行ツタ

肉眼的ニ此ノ種ノ膿瘍ハ多發性ノモノガ多ク大キサハ榛實大カラ胡桃大ノモノ最モ多イ稀ニハ鶏卵大ニ達スルモノモアル斷面ニ於テ其ノ膿内ニ壊死片ヲ含有シテ居ルモノト然ラザルモノガ區別サレル

組織學ノ此等二型ノ膿瘍ハ所謂膿膜ニヨツテ包圍サレテ居ル此ノ膜ハ内ニ近ヅク程幼弱ナ肉芽組織カラナツテ居リ多形核白血球、ぶらずま細胞等ガ多數浸潤シテ居リ特ニ膿ニ隣接シタ所ニハ脂肪ヲ多量ニ含有スル大喰細胞ガ列ヲナシテ配列シテ居ルヘマときしりん、えおじん染色デハ此ノ細胞體ハ非常ニ明カルク見エルノデ弱擴大デハ此ノ大喰細胞ノ配列線ハ明カイ帶トナツテ見エル此ノ膜ニ包圍サレル膿ハ主トシテ變性シタ白血球及單核圓形細胞等カラナツテ居リ或ル例デハ其ノ内ノ所々ニえおじんニ濃染スル丁度放線狀菌ノ菌塊ノ様ナモノガ見エル之ハぐらむ染色ヲ行ツテモ内ニ *Actinomyces Bovis* ヲ認メナイ其ノ代リ *Levadii* ノ鍍銀法ニヨリ形ノ上デハ壊死桿菌ト區別出來ナイ長絲狀菌ガ束ニナツテ居ルノガ認メラレル即チ此レハ壊死桿菌ノ束ヲ中心トシテ周圍ヲ取り卷ク變性シタ白血球

等カラナツテ居ルモノデアル

膿内ニ壞死片ヲ認メルモノデハ此ノ膿ノ中心部ニ組織學的ニ確カニ離片ヲ認メル事が出來ル

今此ノ二型ノ膿瘍殊ニ壞死片ヲ含有スル膿瘍ト成書ニアリ又私ガ5年間ニ只一回觀察スル事ノ出來タ所謂牛ノ肝臓ノ壞死桿菌症ナルモノトヲ比較スルト兩者ハ原因學的ニ一致シ發生ノ狀態ガ共ニ多發性デアリ病竈ノ大キサガホ、同様デアル事及ビ定型的ノ壞死竈ノ周圍ニ起ル分割炎ハ早晚肉芽組織ノ發達ニヨツテ壞死竈ノ分離ヲ起ス一般法則ヨリ考ヘ此等ノ病變ハ同一ノ病變ノ時期ノ差ニヨル形態ノ差異ト認ムベキモノト考ヘラレル此ノ他第24例ハ外見ハ全ク此ノ種膿瘍ニ一致シテ居ルガ斷面デハ病竈ハ癰痕ト化シ最早其ノ内カラ壞死桿菌ヲ分離シ得ナカツタモノデアル

今私ガ採集シ得タ各病型ノ例數カラ其ノ各々ノ經過期間ヲ推定スル事ヲ許サル、ナラバ極稀レナ定形的ノ壞死竈形ノモノハ經過期間最モ短カク速カニ次ノ段階ニ移行スル即チ私ガ2ヶ月ニ5例ヲ得タ離片ヲ含ム膿瘍形ノモノトナル此レハ前者ヨリハ經過期間ハ長イガ次ノ12例ヲ得タ軟化ノ進行シタ膿瘍形ノモノハ更ニ經過期間長ク更ニ病竈ノ癰痕化シタ型ノモノハ動物ノ生命ト共ニ繼續スルモノデアロウス様ニ以上ノ各型ヲ總ベテ壞死桿菌症トシテ總括シテ考ヘルト本邦ニ於テモ本病ハ決シテ少イモノデハナイト云フ事ニナル

(自抄)