Etude sur les lésions histo-pathologiques provoquées chez le cheval par l'anémie infectieuse.

I.

Quelques observations sur le système nerveux. Cerveau et moelle épinière

par

N. NAKAMURA, S. ISHII et S. WATANABE.

Institute vétérinaire du Gouvernement japonais, Tokio

(*Cet é. sai est celui qui a reproduit du rapport de l'Office
International des Epizooties en 1938.*)

(reçu pour la publication Sept. 1, 1938)

INTRODUCTION.—Basées sur la notion d'après laquelle le virus de l'anémie infectieuse du cheval a la propriété de stimuler les parois différenciées et non différenciées des vaisseaux sanguins, diverses études d'histologie-pathologique ont été entreprises en vue de rechercher principalement les lésions produites dans la moelle des os, le foie, la rate, les ganglions lymphatiques, les reins, les poumons, le coeur, etc. Nous n'avons trouvé, en ce qui concerne le système nerveux central des chevaux malades, d'autre observation histologique que dans le rapport succinct sur l'épendymite de l'animal malade par Holz. Nous avons souvent constaté, dans nos travaux expérimentaux relatifs à la recherche du virus dans l'organisme de divers chevaux, chez lesquels la maladie avait été provoquée par l'injection sous-cutanée de sang virulent, que la quantité de virus, suffisante pour faire apparaître la maladie, n'était pas toujours présente dans le sang, le foie, la rate et les ganglions lymphatiques, mais qu'elle existait dans le cerveau, la moelle des os, aussi bien qu'en plusieurs organes endocriniens. Ces observations expérimentales nous ont incité à rechercher si des lésions histo-pathologiques pourraient être constatées dans le système ner-

véux central. Notre travail est décrit ci-dessous.

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

1. *Animaux utilisés.*—La maladie a été artificiellement provoquée chez 36 poneys de Corée, importés de l'île de Saishu-To, complètement indemnes d'anémie infectieuse. Six autres malades ont été choisis dans des régions infectées parmi des chevaux naturellement atteints. On a, en outre, utilisé les cadavres de trois sujets ayant succombé à des troubles de la nutrition ou à des maladies parasitaires. Enfin, six des chevaux consacrés, dans notre laboratoire, à la préparation de divers sérums immunisants, ont été ajoutés aux autres sujets de l'expérience pour servir de témoins.

2. *Méthodes expérimentales.*—La plupart des malades ont été abattus, mais quelques-uns d'entre eux moururent. Pour la fixation des fragments d'organes de plusieurs sujets, on a employé la solution de Zenker ; la coloration était pratiquée par la méthode de Laidlaw. Mais, dans des buts divers, on a souvent recouru aux modes de fixation et de coloration suivants :

<i>Fixation</i>	<i>Coloration</i>
Formaline.....	Hématoxyline-Eosine.
Formaline.....	Rouge écarlate.
Alcool	Unna-Pappenheim.
Regaud	Heidenhein-Fer-Hématoxyline.
Zenker	Lentz.

Anatomie pathologique macroscopique.

Bien que des lésions macroscopiques du système nerveux central ne soient pas toujours nettement démontrées, on observe d'habitude de la congestion de la membrane méningée. Dans le cas où un ramollissement du tissu cérébral est constaté, les lésions histo-pathologiques dépendent du degré du ramollissement. On trouve rarement des taches hémorragiques, mais le liquide céphalo-rachidien est en général plus abondant.

Constatations histo-pathologiques.

En ce qui concerne les lésions histo-pathologiques du système nerveux central, la maladie est vraisemblablement caractérisée par une inflammation non suppurative et par des processus de dégénérescence que l'on constate habituellement dans diverses maladies causées par les virus dits pseudo-neurotropes. Bien que les lésions dépendent de la durée de la maladie, on trouve, en règle générale, dans les prélèvements, une prolifération de cellules de la névroglie, de la neuronophagie, un afflux de leucocytes dans les vaisseaux, une dégénérescence des cellules nerveuses, de l'infiltration cellulaire périvasculaire, de la sub-épendymite et de l'épendymite, etc.

En général, de telles lésions histologiques se rencontrent rarement au stade de début de la maladie, tandis qu'il est démontré qu'elles se manifestent au fur et à mesure que la maladie progresse. Les descriptions succinctes données ci-dessous résument nos observations sur les lésions histologiques qui apparaissent aux divers stades de la maladie.

a) *Prolifération des cellules de la névroglie.*—Une prolifération des cellules de la névroglie est généralement observée avant toute autre lésion histologique au stade de début de l'infection. La cellule névrogliques que l'on rencontre à ce stade se différencie principalement en ce qu'elle est microglie diffusée dans toutes les parties du cerveau, mais surtout abondante sous le tissu de l'épendyme et de sa région voisine, affectant la forme d'un petit bâtonnet ou d'haltère, quelquefois celle d'un petit nodule.

Dans le matériel prélevé sur des malades présentant de fréquents accès fébriles, la prolifération diffuse de la cellule névrogliques est particulière, car celle-ci prend même l'aspect des cellules macroglies (principalement des cellules étoilées). Dans la couche superficielle du noyau Caudé (nucleus caudatus), la formation de ce qu'on appelle "étoiles névrogliques (astrocytes)" est démontrable. En outre, de telles trouvailles sont également faites dans le tissu du ventricule latéral, de l'aqueduc (de Sylvius) aussi bien que du bulbe olfactif, etc., tissu où l'on trouve de la sub-épendy-

mite avec prolifération microglie. Quelquefois, sa légère infiltration sous la pie-mère, sa formation en petits nodules dans la zone moléculaire du cervelet et son infiltration périvasculaire dans la couche superficielle du nucleus caudatus peuvent être également démontrées.

Ainsi, la prolifération diffuse des cellules névrogliques dans le nucleus caudatus peut se montrer différente suivant l'état de l'animal au moment de l'examen.

CONDITION (stade ou état)	Microglie	Macroglie
Dans le matériel de contrôle.....	18,0	1,0
Au stade de début de la maladie.....	15,0	6,0
Au stade fébrile ou au stade critique de la chute de la température chez le malade; démontrable après plus de deux accès	28,5	8,5
Etat grave se manifestant par l'anémie après de fréquents accès.....	28,2	9,0
En bon état apparent, sans accès pendant les huit derniers mois après le dernier paroxysme	24,5	2,0

Les nombres ont été établis avec une moyenne de quatre champs optiques (champs microscopiques), l'épaisseur de la préparation étant de 5μ (1×125).

Bien que le phénomène de neuronophagie soit également observé au cours de la maladie, il faut noter qu'il peut être mis en évidence, même chez le cheval qui, depuis longtemps, n'a pas eu d'atteinte fébrile. La neuronophagie se constate habituellement dans l'écorce cérébrale, spécialement dans le lobe frontal. Mais les mêmes modifications peuvent être observées dans une partie de l'hippocampe, dans la capsule interne, dans le noyau lenticulaire, dans les tubercules quadrijumeaux et dans la moelle allongée (bulbe rachidien), bien que, dans la règle, elles n'y soient pas aussi marquées (pseudoneuronophagie). L'attaque des cellules nerveuses par ces cellules névrogliques est d'ordinaire limitée aux petites ou moyennes cellules, et elle porte très rarement sur les grandes cellules.

Dans ces conditions, certaines cellules nerveuses étant complètement dévorées ne peuvent se présenter que sous l'aspect d'un petit groupe de cellules microgliales.

b) *Afflux des leucocytes dans les vaisseaux encéphaliques.*—La mobilisation des leucocytes dans les vaisseaux sanguins du cerveau est nettement démontrable dans l'anémie infectieuse, bien que le nombre de ces cellules varie avec la partie de l'organe examiné et avec le stade d'évolution de la maladie. On a observé qu'elle est le plus marquée dans la capsule interne du nucleus caudatus et dans les lobes frontaux de l'écorce cérébrale. Mais, elle est moins accentuée dans l'hippocampe, aussi bien que dans d'autres parties du cerveau. Ce processus est plus apparent dans la veine que dans l'artère, et il est démontré que les leucocytes sont plus nombreux dans les grosses veines. En conséquence, l'accumulation intense des leucocytes dans la veine peut être souvent rencontrée dans les cas graves.

L'afflux des leucocytes dans les vaisseaux est moins démontrable au stade de début de la maladie, mais, au cours d'un accès fébrile ou à la fin d'un tel accès, renouvelé plus de deux fois, on peut constater une augmentation du nombre de ces cellules. Néanmoins, si le malade s'affaiblit par suite d'une anémie grave, ou s'il passe huit mois sans attaque fébrile, on observe que le nombre des leucocytes diminue graduellement. En ce qui concerne l'espèce des leucocytes observés, ce sont les histiocytes qui ont été habituellement décelés au stade de début de la maladie. Le nombre de ces cellules tend généralement à augmenter en récurrence de nouvel accès fébrile. Au contraire, à la fin d'une atteinte de la maladie, accompagnée d'anémie grave, ce sont les cellules lymphoïdes qui semblent être en augmentation. Au moment critique de la chute de la température, on trouve, d'ordinaire, des leucocytes éosinophiles.

c) *Infiltration cellulaire périvasculaire.*—L'infiltration cellulaire périvasculaire est une des modifications histo-pathologiques qui se rencontrent au cours de la maladie. Mais, comme on l'a observé, cette modification ne consiste généralement pas en une forte infiltration de cellules névrogiales. Naturellement, cette constatation

n'est pas toujours la même dans tous les cas. Nous avons réparti en quatre groupes le degré d'infiltration observé chez 36 animaux examinés.

<i>Constatations.</i>	<i>Nombre des cas.</i>
—	—
Pas d'infiltration.	22
Légère infiltration.	7
Infiltration moyenne.	4
Infiltration marquée.	3

Par rapport à l'état du malade, l'infiltration peut être particulièrement bien observée dans les cas graves de la maladie, se manifestant par l'anémie, l'émaciation, ou un autre état encore plus grave, avec retour de l'accès fébrile, tandis que ce processus n'est pas observé dans les stades de début ou dans les atteintes modérées de la maladie. Quant aux points sur lesquels cette infiltration se produit, le premier envahi est en général la couche superficielle du nucléus caudatus ; on ne la rencontre, du reste, nullement dans un autre tissu. Néanmoins, à mesure que les lésions progressent, une telle infiltration se répand dans une région étendue du cerveau. Dans ces cas, les modifications dans les diverses parties s'effectuent comme suit :

Comme on le voit au tableau qui suit, les modifications les plus importantes se trouvent, en général, dans tous les cas, dans le nucleus caudatus de même que dans l'hippocampe. De plus, il faut se souvenir que chez le N°. 129, un des cas les plus graves de notre expérience, l'infiltration non seulement a pu être largement démontrée dans toutes les parties du cerveau, mais qu'elle a été aussi observée même dans les méninges de l'écorce cérébrale, de la moelle épinière et du cervelet, où l'on constatait de la méningite. L'infiltration cellulaire des méninges a été observée chez les Nos 102 et 103 ; celle des parties lombaires spécialement a pu être nettement démontrée ; elle s'étendait à toute la pie-mère depuis la portion du sillon ventral. En de pareils cas, on peut facilement supposer qu'un tel processus pathologique, atteignant les méninges et les cellules nerveuses de la région lombaire, est à même de provoquer la paralysie de l'arrière-train.

CAS OBSERVÉS	Nucl. Caud.	Hippocamp.	Bulb. Olfact.	Tubercules quadri.	Trigo. olfact.
N°. 102	++++	++-+++	±	-	-
N°. 103	++-+++	++	±	±	++
N°. 129	++++	++++	++	+++	+++

CAS OBSERVÉS	Moelle allongée	Pedonc céréb.	Pont	Cervelet	Moelle épin.	Mening.
N°. 102	-			-		++
N°. 103	±	++	+	-	-	+
N°. 129	++-+++	+++	++	++	+++	++++

En ce qui concerne les cellules infiltrantes, on a observé que, dans le nucleus caudatus, au premier stade de la maladie, ce sont, d'ordinaire, les cellules de la microglie qui interviennent. L'infiltration périvasculaire est répartie dans l'espace lymphatique, qui entoure le vaisseau, sous forme d'anneau, ou en amas. On la rencontre quelquefois mélangée de cellules névrogliales en forme dite de baguette. Toutefois, à mesure que progresse le processus pathologique, les cellules infiltrantes sont rencontrées périvasculairement sur différents points. L'infiltration est surtout considérable dans la région des artères moyennes. De plus, elle se trouve en dehors des cellules de la tunique externe du vaisseau, non dans l'espace lymphatique, dans lequel on peut rencontrer, si l'on agit par pression, des cellules infiltrantes.

Par utilisation de la coloration Van Gieson, les cellules de l'adventice qui se multiplient et qui sont comprises dans le tissu conjonctif, peuvent être nettement mises en évidence. Les cellules observées ne sont pas des cellules microgliales, mais des cellules lymphoïdes avec un noyau radié; elles ressemblent aux petites cellules dites plasma-cells; leur teneur variable en protoplasma est manifeste et la fragmentation de leur noyau est considérée comme un type de dégénérescence. Cependant, parmi elles, on ne rencontre guère les autres cellules qu'on trouve habituellement

dans le sang.

d) *Modifications dans les cellules nerveuses*.—Si des modifications des cellules nerveuses se rencontrent rarement à la période de début de la maladie, on observe, dans ces cellules, à mesure que cette maladie progresse, certains aspects pathologiques suivis processus inflammatoire habituel. Dans ces cas, les différents degrés de dégénérescence des cellules nerveuses peuvent être constatés ; c'est quelquefois la "maladie aiguë des cellules", la "grave altération cellulaire de Nissl". Mais, en général, on ne rencontre pas ces modifications par groupes ; elles sont le plus souvent éparpillées. On note avant tout, dans cette maladie, la dégénérescence des cellules nerveuses de la moelle épinière. D'après nos observations, ce processus peut être remarquablement démontré par la comparaison des petites cellules avec les grandes cellules nerveuses motrices. Il semble que le processus de dégénérescence de ces cellules nerveuses puisse être suivi : premièrement, leur protoplasma et leur noyau et particulièrement ceux des grandes cellules, semblent atrophiés ; les cellules présentant une coloration foncée, et les corpuscules de Nissl, également de teinte foncée, en s'unissant les uns aux autres forment une "sorte de zone" (Zone like). Deuxièmement, le protoplasme et le noyau sont gonflés, distendus, et offrent un contour arrondi, ils semblent transparents, et les corpuscules de Nissl peuvent être vus sous une forme arrondie, présenter un aspect pâle, homogène, mais être considérablement diminués.

e) *Hémorragie*.—De même que les modifications pathologiques, l'hémorragie ne se rencontre pas dans tous les cas, mais on peut parfois rencontrer une hémorragie périvasculaire récente en forme d'anneau, dans diverses parties du cerveau ou près de l'aqueduc des tubercles quadrijumeaux, dans le nucleus caudatus, dans la couche superficielle de l'hippocampe, dans la corne latérale de la moelle épinière, etc. sans qu'il y ait, dans la règle, apparence d'infiltration cellulaire.

f) *Inclusion de corps (enclaves)*.—1. Inclusion de corps dans les cellules de Purkinje.—Quelques corps se trouvent inclus dans le protoplasma ou dans le noyau des cellules de Purkinje. Ces corps sont de très petite dimension, d'environ 1/4 ou 1/10 du diamètre

du nucléole ; ils sont quelquefois entourés d'un halo non coloré. Dans la plupart des cas, on les rencontre disséminés dans une cellule, le plus souvent disposés à la périphérie, mais il est rare que leur nombre dépasse cinq, et le corps qui se trouve dans le nucleus est généralement seul. Mais de tels corps peuvent être également démontrés dans le matériel prélevé sur des chevaux sains.

2. Inclusion de corps dans les cellules de l'épendyme.—En ce qui concerne la forme et la dimension des corps inclus dans les cellules de l'épendyme, on ne trouve aucune différence entre eux et ceux qu'on observe dans les cellules de Purkinje ; mais, dans quelques cas, par suite de leurs dimensions infimes, ils sont à peine visibles. On en rencontre, en général, un ou deux, parfois un groupe de dimensions diverses, de préférence dans le protoplasma des cellules qui avoisinent le canal central du tissu (canal de l'épendyme). D'habitude, la plupart d'entre eux se trouvent dans le quatrième ventricule ; on les observe en nombre modéré dans le bulbe olfactif et le ventricule latéral, mais en très petite quantité dans la moelle épinière. Cette démonstration peut être faite d'une manière positive sur le matériel prélevé sur l'animal malade, mais elle peut aussi être réalisée, bien que moins fréquemment, sur celui provenant d'un animal sain.

3. *Inclusion de corps dans les cellules nerveuses.*—L'inclusion de corps dans le protoplasme des cellules nerveuses peut être nettement mise en évidence dans le processus de dégénérescence du cerveau et de la moelle épinière. Les cellules nerveuses avec inclusion de corps sont principalement observées dans les différentes parties des centres, dont l'énumération suit :

Dans la partie antérieure du canal central du pont (de Varole), ou protubérance annulaire, autour de la pyramide bulbair, dans la partie latéro-interne du canal central des tubercules quadrijumeaux, dans le pédoncule cérébral, le noyau caudé (*nucleus caudatus*) et la substance grise de la moelle épinière. On rencontre souvent aussi un petit nombre de tels corps dans quelques cellules nerveuses de l'écorce cérébrale, de l'hippocampe et du trigone olfactif. La forme de ces corps, de dimensions différentes, corres-

pond à peu près à la description que nous avons donnée ci-dessus. Ces corps sont habituellement seuls ou par paires, mais quelques-uns sont aussi en groupes. Les cellules nerveuses, dans lesquelles les corps se trouvent groupés, se rencontrent parmi les petites cellules et elles sont caractérisées par des altérations dégénératives. D'autre part, les grandes cellules renferment d'ordinaire moins de petits corps, on en observe sans altérations. Dans les quelques endroits où les corps peuvent se trouver inclus dans le noyau de la cellule, pédoncule cérébral, moelle épinière, etc., ces corps sont généralement observés seuls, certains ressemblant, sous le rapport de la forme et de la dimension, aux corpuscules de Joest-Degen.

4. *Inclusion de corps dans l'hippocampe.*—D'après nos observations, les inclusions peuvent aussi, dans certains cas d'anémie infectieuse, se rencontrer dans l'hippocampe. Elles existent habituellement dans quelques cellules nerveuses groupées en forme de fer à cheval. Fréquemment, leur dimension est celle du nucléole. Les cellules nerveuses, où il existe des inclusions, se trouvant généralement en voie de dégénérescence, le noyau de quelques-unes d'entre elles peut avoir disparu et les corps inclus, nombreux, peuvent être observés dans la cellule. Les corps que l'on rencontre dans ces cas sont d'ordinaire entourés d'un halo clair.

Il faut se rappeler, cependant, que la présence de semblables inclusions dans l'hippocampe peut aussi être relevée dans d'autres maladies.

Discussion.

Les observations histo-pathologiques faites dans différentes parties du cerveau et du système nerveux des chevaux atteints d'anémie infectieuse montrent que le principal processus morbide paraît se dérouler dans les cellules nerveuses, le tissu mésodermique et les cellules de la névroglie de la partie antérieure du cerveau — noyau caudé (*nucleus caudatus*), capsule interne, noyau lenticulaire et lobes frontaux de l'écorce cérébrale, etc., — ces parties étant supposées subir l'action du virus. Les altérations histo-pathologiques principales sont la prolifération des cellules gli-

ales ou névrogliques, l'afflux des leucocytes dans les vaisseaux, l'infiltration cellulaire périvasculaire, la neuronophagie, etc. Naturellement, en ce qui concerne l'apparition de ces lésions, des différences sont observées aux divers stades de la maladie. Par exemple, l'afflux des leucocytes dans les vaisseaux du cerveau se manifeste d'ordinaire nettement lors d'un accès fébrile ou après cet accès, et ce phénomène semble presque marcher de pair avec l'apparition d'histiocytes dans la circulation sanguine du malade. Les observations que nous avons faites au cours de nos expériences ne nous ont pas encore permis d'établir avec assez de certitude l'origine de ces histiocytes.

Se basant sur la description antérieurement donnée, Dunning et Furth (1935) ont écrit que les petites cellules de la microglie (microgliales) seraient identiques aux histiocytes au double point de vue morphologique et fonctionnel, et que les monocytes de la circulation sanguine ne peuvent être différenciés des deux formes de cellules précitées. En outre, Beizky a reconnu que la cellule histiocyte du mésenchyme de l'embryon de poulet est la même que les petites cellules de la microglie (cellules microgliqués), que l'on rencontre dans les tissus nerveux, les histiocytes qui, par les vaisseaux, peuvent envahir la membrane chorioïdienne et la pie-mère, devenant ainsi des cellules microgliqués. D'après nos observations, il est à noter que beaucoup de ces dernières cellules se trouvent dans la paroi des capillaires du tissu cérébral des animaux malades, tandis que les vaisseaux cérébraux de ceux-ci contiennent de nombreux leucocytes qu'il est impossible de différencier des lymphocytes ou des histiocytes. L'apparition de telles cellules dans les vaisseaux du cerveau semble imputable à l'influence stimulante qu'exerce le virus sur la mobilisation cellulaire. L'infiltration cellulaire périvasculaire dans les diverses parties du cerveau doit être considérée comme le résultat de l'accumulation de cellules, due à la réaction, directe ou indirecte, à l'action excitante du virus, les cellules infiltrantes provenant de la réaction directe, la première en date, étant les cellules de la névroglie, et celles issues de la réaction indirecte étant les cellules lymphoïdes qui tirent leur origine des cellules de l'adventice.

De telles infiltrations sont habituellement observées en abondance dans la région des artères moyennes, où elles sont trouvées siégeant entre les cellules adventicielles. En ce qui concerne l'espèce des cellules, il n'est pas possible de mettre en évidence des leucocytes pourvus de granulations, ni aucune des variétés de leucocytes, que l'on trouve dans le sang. D'après nos observations, la méningite ne se rencontre guère au stade de début de la maladie. Mais, il faut considérer que la méningite peut apparaître lors d'une augmentation de la gravité du processus pathologique dans le tissu cérébral, comme nous l'avons constaté dans les cas 129, 102 et 103. Les diverses observations histo-pathologiques décrites ci-dessus peuvent généralement se rencontrer dans les différents cas où la maladie évolue sous la forme chronique, ou parfois lorsque le malade n'a présenté aucun symptôme clinique pendant plusieurs mois après le dernier accès de fièvre.

Les lésions du tissu d'origine mésodermique peuvent être mises en évidence avant que n'apparaissent d'autres altérations sous la forme d'infiltration cellulaire de la paroi des vaisseaux, d'afflux leucocytaire dans les vaisseaux et d'augmentation des petites cellules de la microglie (cellules microgliales). On peut cependant relever un autre processus pathologique dans le tissu d'origine ectodermique, processus qui se traduit par une augmentation des grandes cellules de la névroglie (cellules macrogliales) et par la dégénérescence des cellules nerveuses. En accord avec de telles observations, on doit nettement reconnaître, comme l'a fait Dobberstein, que le virus de l'anémie infectieuse peut, au stade de début de l'infection, exercer une très grande action, son action principale, sur le tissu mésodermique et stimuler les parois non différenciées comme les parois différenciées des vaisseaux sanguins, et provoquer l'augmentation des histiocytes.

On peut ajouter à cette donnée que, au cours de l'évolution de la maladie, une altération peut également être observée dans le tissu ectodermique. L'inclusion de corps enclaves dans diverses cellules telles que les cellules de Purkinje, de l'épendyme et la cellule nerveuse ordinaire est nettement établie, mais nos connaissances actuelles ne nous permettent pas encore de déterminer la

nature des corps en question. En ce qui concerne leur situation, ces enclaves se trouvent généralement dans le protoplasma de la cellule, mais quelquefois à l'intérieur du noyau. Dans la règle, les cellules avec corps inclus apparaissent sous une forme dégénérée, mais il faut observer que de tels corps peuvent aussi se rencontrer dans des cellules normales. N'oublions pas aussi que, d'après nos observations, de telles inclusions peuvent aussi être mises en évidence dans la cellule nerveuse du cheval, chez lequel l'inoculation artificielle du virus est restée sans résultat; toutefois, dans ce cas, les corps en question sont moins nombreux.

Explication des clichés.

- Fig. 1. Neuronophagie dans les lobes frontaux de l'écorce cérébrale (*cortex cerebri*). Coloration de Laidlaw, Leitz, oc. 3 ob. 1/12.
- Fig. 2. Neuronophagie dans les lobes frontaux de l'écorce cérébrale (*cortex cerebri*). Coloration de Laidlaw, Leitz, oc. 3 ob. 1/12.
- Fig. 3. Infiltration cellulaire périvasculaire de début dans la couche superficielle du noyau caudé (*nucleus caudatus*). Coloration de Laidlaw, Leitz, oc. 3 ob. 1/12.
- Fig. 4. Infiltration cellulaire périvasculaire dans le noyau caudé (*nucleus caudatus*) (au dernier stade). Coloration de Laidlaw, Leitz, oc. 4 ob. 4.
- Fig. 5. Infiltration cellulaire dans la pie-mère de la partie lombaire de la moelle épinière. Coloration de Laidlaw, Leitz, oc. 4 ob. 4.
- Fig. 6. Accumulation des leucocytes dans le vaisseau du noyau caudé (*nucleus caudatus*). Coloration de Laidlaw, Leitz, oc. 4 ob. 4.
- Fig. 7. Inclusion de corps dans le protoplasma des tubercules quadrijumeaux (*corpora quadrigemina*). Coloration de Laidlaw, Leitz, oc. 3 ob. 1/12.
- Fig. 8. Corps inclus dans le protoplasma d'une cellule de Purkinje. Coloration de Laidlaw, Leitz, oc. 3 ob. 1/12.
- Fig. 9. Corps inclus dans le protoplasma de la cellule nerveuse de l'hippocampe. Coloration de Laidlaw, Leitz, oc. 3 ob. 1/12.
- Fig. 10. Corps inclus dans le noyau de la cellule nerveuse du noyau du pédoncule cérébral. Coloration de Laidlaw, Leitz, oc. 3 ob. 1/12.

Bibliographie.

- (1) Holz: Berl. T. W., 1937, 5, 65—68.
- (2) Dobberstein: Berl. T. W., 1934, 12, 192—196.
- (3) Seifried: J. Exp. Med., 1931, 53, 2, 277—288.
- (4) Larsell, Harling a. Meyer: Am. J. Path., 1934, 10, 3, 361—374.
- (5) Dunning a. Furth: Am. J. Path., 1935, 11, 6, 895—914.
- (6) Dobberstein: Z. f. Inf. para. Kh. u. Hyg. d. H., 1928, 33, 290—305.
- (7) Emoto, Kondo a. Watanabe: J. Jap. Soc. Vet. Sci., 1936, 15, 4, 41—62.
- (8) Ishimitsu: Jap. J. Exp. Med., 1937, 21, 8, 910—923.
- (9) Ichii, Kato a. Wada: Juidampo., 1937, 339, 1221—1223.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

傳染性貧血馬ノ病理組織學的研究*

1. 腦 竝 脊 髓 ノ 知 見

中 村 哲 哉 石 井 進 渡 邊 昇 藏

(農 林 省 獸 疫 調 査 所)

(昭 和 13 年 9 月 1 日 受 附)

余等ハ別報本病經過馬ニ於ケル病毒分布狀態ニ關スル研究ニ於テ記載シタ如ク熱發作ヨリ遠ザカツタ本病馬ニ於テ病毒ガ血液、肝臟、脾臟、淋巴腺等ノ血液關係臟器ニ證明困難ナル場合却テ骨髓、腦竝内分泌腺等ニ濃在スル事實ヲ認メタノデアアル右ノ如ク本病經過馬ニ於テハ病毒ガ永ク腦ニ存在スル事實カラシテ之ニヨル病的變化ヲ豫想シ主トシテ本病毒接種朝鮮馬(朝鮮濟州島産ぼに一種)36頭ニツキ中樞神經系ノ病理組織學的研究ヲ行ツタ所甚ダ興味アル知見ヲ得タノデソノ大要ヲ茲ニ報告スル次第デアアル

即チ本病ニ於テ所見スル中樞神經系統ノ組織學的变化ハ其ノ病期ニヨツテ異リ且ソノ程度ハ劣ルガ大體所謂或種ノ腦親和性病毒ニ認メ得ラレルヨウナ非化膿性炎症竝退行性機轉ヲ知見シ得タノデアアル

即チ白血球殊ニ組織球様白血球血管内集積 glia 細胞ノ瀰蔓性又ハ竈狀性増殖竝 neuronophagic 現象神經細胞ノ退行性變化血管周圍性細胞集簇等ノ變化ガ之デアアル血管内ニ集積スル白血球ハ主トシテ組織球様白血球デ動脈ヨリ靜脈ニ多クソノ程度ハ流血中ノ之等細胞ト消長ヲ同ジウス様ニ思ハレル

glia 細胞ノ瀰蔓性増殖竝 Pseudoneuronophagic ハ比較的廣ク中樞神經系統ニ認メラレタガ竈狀性増殖ハ主ニ尾狀核四疊體ノ cellule de l'épendyme ノ附近又ハ小腦軟腦膜下ニ眞性 neuronophagic ハ時ニ大腦皮質前頭部又ハれんす核等ニ所見シタ

神經細胞ノ退行性變化ハ散發性ニ來ルコトガ普通デアアルガ腰髓、脊髓ニ

*原著歐文 64—76 頁參照

於テハ集團的ニ來ルコトガ注目ニ價スル

血管周圍細胞集簇ハ比較的稀ニノミ所見セラレ動脈靜脈ヲ問ハズソノ周圍ニ認メラレルガ特ニ中等大動脈周圍ニ多ク集簇細胞ハ車軸狀核ヲ有スル淋巴球樣細胞デ動脈ニ所見スルモノハ腫脹シタ血管外膜細胞間ニ浸潤シテキル

又此ノ變化ノ顯著ナル例ハ總テ慢性瀕死期患馬デ腦膜（特ニ腰髄，軟腦膜）ニモ腦實質ニ劣ラナイ細胞浸潤アリソノ程度ハソノ際認ムル後體痲痺ニ比例スルガ如キ結果ヲ得タノデアル

以上ノ諸所見ハ一般ニ病期ノ初期ニハ認メ難ク之ヨリ漸次經過スルニ從ツテソノ程度ヲ増シテクル之ヲ部位的ニ觀察スレバ尾狀核，あんもん核，大腦皮質特ニ前頭部等ノ終腦部ニ著明デ他ノ部位ニ於テハ以上ノ變化ハ認メラレルガソノ程度ハ比較的低イ

本患馬ノ中樞神經細胞就中あんもん核，えべんでいむ細胞，ぶるきんえ細胞竝其ノ他各部神經細胞ノ原形質稀ニ細胞核内ニ多クノ好酸性小體ヲ發見シタ

該小體ハ一般ニ多クノ本病馬ニ所見シタガ非傳貧馬ニモ亦認メラレタノデアル