UEBER RINDERPIROPLASMOSE IN
HOKKAIDO (JAPAN).

Von

KISAJIRO OGURA.

(Aus dem Institut für Tierhygiene und Mikrobiologie der Kaiserlichen
Universität Hokkaido. Leiter : Prof. Dr. K. Kasai.)

(Received for publication February 4, 1929.)

Babes hatte bereits 1888 diese Blutparasiten als die Ursache der seuchenhaften Hämoglobinurie bei Rindern in Rumänien entdeckt, sie aber nicht richtig gedeutet und *Haematococcus bovis* genannt, somit als Bakterium aufgefasst. Im Jahre 1893 hat Starcovici, ein Schüler von Babes, der die Protozoennatur des Parasiten bemerkte, den Namen *Babesia bovis* den Entdecker zu ehren gegeben.

Im Jahre 1889 fanden Smith und Kilborne im Blute von Rindern, welche an einer den Farmern der Südstaaten von Nordamerika schon seit zehn Jahren bekannten Rinderseuche, dem Texasfieber, litten, endoglobuläre rundliche oder birnförmige Parasiten als Erreger, denen sie den Namen *Pyrosoma bigeminum* gaben, und auch die alte Voraussetzung der Farmer bestätigten, dass die Krankheit durch Zecken übertragen würde. Da der Name *Pyrosoma* bereits für eine Gattung der Tunikaten vergeben war, hat Wandolleck denselben im Jahre 1895 in *Apiosoma* abgeändert. Diese Bezeichnung war aber ebenfalls bereits an einem parasitischen Protozoon vergeben, und fast gleichzeitig hat Patton (1895) den Namen *Piroplasma* vorgeschlagen, der allgemein zur Anwendung kam.

Dem Prioritätsgesetz entsprechend, hat der Name *Babesia* freilich das Vorrecht. Trotzdem erscheint es mir ganz zulässig und zweckmäßiger, diese Parasiten im allgemeinen *Piroplasma* und nicht *Babesia*, somit diese Krankheiten Piroplasmosis zu nennen, weil von den meisten Autoren, die diese Krankheitsgruppe eingehend untersucht hatten, in deren Mitteilungen der Name *Piroplasma* gebraucht worden ist. Seit Smith und Kilborne diese Krankheit in die Tiermedizin eingeführt hatten, untersuchten viele Forscher der verschiedenen Länder diese Krankheiten bei den verschiedenen Säugetieren, und

konnten von ihnen viele Arten von *Piroplasma* gefunden werden ; als wichtigste Arten des Rinderpiroplasma sind gegenwärtig folgende 5 zu rechnen :

1. *Piroplasma bigeminum* Smith et Kilborne, das Texasfieber.
2. *Piroplasma bovis* Babes, seuchenhafte Hämoglobinurie bei Rindern in Europa.

Ueber den Unterschied dieser 2 Arten fehlt noch ein sicherer Nachweis.

3. *Piroplasma mutans* Theiler, Pseudoküstenfieber der Rinder.
4. *Piroplasma parvum* Theiler, afrikanisches Küstenfieber der Rinder.
5. *Piroplasma annulatum* Dschunkowsky et Luhs, tropische Piroplasmose in Transkaukasien.

Geschichtliches in Japan.

In Japan wurde ein Rinderpiroplasma, das im Innern von Rindererythrozyten schmarotzend vorkommt, bereits im Jahre 1905 von Shibayama und Miyajima gelegentlich ihrer Rinderpestforschung beobachtet und gleichzeitig von ihnen nachgewiesen, dass es der Form nach dem Texasfiebererreger, *Piroplasma bigeminum*, sehr ähnlich, aber ganz virulenzlos ist.

Zuerst wurde von Tokishige (1909) eine Rinderpiroplasmose in Kyushu (Saga, Kumamoto, Oita) Südjapans genau untersucht, und durch seine Untersuchung 2 verschiedene Arten von *Piroplasma*, nämlich hochvirulente grosse und schwachvirulente kleine, als ihre Erreger gefunden.

Im Jahre 1914 hatten Migita und Kondo bei der Untersuchung einer Rinderpiroplasmose, die im Oitagebiete damals epidemisch vorgekommen war, viele Fälle des Texasfiebers sowie nur einen der tropischen Piroplasmose ähnlichen Fall beobachtet. Zehn Jahre später untersuchte auch Izeki die in Oita- und Kumamotogebiete heimische fieberhafte Rinderpiroplasmose, und fasste als ihre Erreger 2 Arten von *Piroplasma* auf, nämlich ein Amakebeerreger ähnliches, hauptsächlich die Kälber befallendes *Piroplasma* und ein *Piroplasma bigeminum* oder *Piroplasma divergens* ähnliches, gewöhnlich erwachsene Rinder befallendes *Piroplasma*.

In Taiwan (Formosa) bemerkten Hatono, Ito und Goto (1918) im Blute vieler Rinder, welche aus anderen Gebieten Japans (Nord-

taiwan, Honshu) in Koshun von Südtaiwan gebracht wurden, und nach einiger Zeit an einer Piroplasmose erkrankten, ein Piroplasma, das von Koizumi (1918) mit *Babesia bigemina* identifiziert wurde.

Vor kurzem wurde der Erreger von einer in Chosen (Korea) existierenden Rinderpiroplasmose von Inoba (1925) als *Babesia bigemina* angesprochen.

In Hokkaido beobachteten Farmer und Tierärzte bereits seit etwa 20 Jahren häufig eine Rinderseuche auf den Weiden im Sommer, allein niemand hatte eine Mitteilung über sie bis zum Jahre 1917 veröffentlicht, in welchem viele Rinder der Tierzüchtereie zu Makomanai (in der Nähe von Sapporo) an der Seuche so heftig epidemisch litten, dass 10 Patienten in kurzer Zeit nacheinander starben, worauf die Krankheit erst von Migita mikroskopisch untersucht wurde. Von seinen Untersuchungsergebnissen, die aus anatomischen Befunden einiger Leichen und aus mikroskopischen Befunden der Blutaussstrichpräparate stammten, wurde ohne weiteres die Krankheit als Texasfieber angedeutet. Diese Seuche, die hier nach im allgemeinen als "Daninetsu" (Zeckenfieber) bekannt wurde, befällt jährlich mehrere Rinder, und bringt den Tod bei einigen Prozentsen der Patienten. Im Jahre 1925 wurde ein kurzer Bericht über diese Krankheit von Kohanawa und Ogura veröffentlicht.

Seit 5 Jahren hat der Autor über diese Rinderseuche Untersuchungen angestellt, und besonders über ihre Aetiologie einige Experimente ausgeführt. Hiermit sei über das bis zur Zeit gewonnene Ergebnis zusammenfassend berichtet.

Kasuistik.

Der Autor hat seit seinem Versuch über diese Piroplasmose sehr viele Krankheitsfälle (über 200) beobachtet und einzelne derselben eingehend beschrieben; die Protokolle einiger wichtiger Fälle seien an dieser Stelle kurz ausgenommen.

Die Fälle, welche nach einiger Zeit geheilt worden waren:

Fall 1. Dreijährige Holstein-Kuh.

Tier-Nr. 1.

Das Tier wurde am 23. Juli 1923 in unserer Klinik aufgenommen. Es zeigte sich erheblich matt und traurig. Alle sichtbaren Schleimhäute waren stark anämisch und ikterisch. Der Harn sah gelbbraun aus, und enthielt Eiweiss in grossen Mengen, Hämoglobin konnte aber nicht nachgewiesen. Bei der mikroskopischen Untersuchung des Blutes konnten viele abnormale Erythrozyten und endoglobuläre Parasiten, welche

zu den kleinen Piroplasma gehören, gefunden werden. Am 24. erschien das Tier etwas schlechter, die Temperatur betrug 38°C. Die roten Blutzellen betrugen 1,448,000 pro 1 mm, die weissen 10,150, der Hämoglobingehalt (Fleischl-Miescher) 3.36%. Die Milchabsonderung war stark vermindert. Nach 13 Tagen war das Tier genesen. Am 26. wurde 2 g Trypanblau (Cassella) subkutan eingespritzt, allein es erfolgte keine besondere Besserung, sowohl klinisch als auch mikroskopisch (Erythrozytenveränderung), sondern verlief die Krankheit wie üblich. Siehe Tabelle 10.

Fall 2. Vierjährige Holstein-Kuh.

Tier-Nr. 2.

Am 24. Juli 1923 wurde sie in unserer Klinik aufgenommen. Temperatur: 40.3°C, Puls: 96, rote Blutzellen: 1,560,000, weisse: 8,300, Hämoglobingehalt: 3.81%. Der Harn war dunkelbraun und enthielt sehr reichlich Eiweiss. Mattigkeit, Anämie und Gelbsucht waren hochgradig. Piroplasma (Kleinform) sowie abnormale rote Blutzellen waren zahlreich. Nach 9 Tagen verschwanden die abnormalen Erythrozyten im Peripherblute. Am 26. wurde 1.5 g Trypanblau subkutan injiziert, der Erfolg war aber wie im vorstehenden Fall. Siehe Tabelle 10.

Fall 3. Einjährige Ayrshire-Kuh.

Tier-Nr. 3.

Am 22. Juli 1924 wurde das Tier auf der Weide an dieser Krankheit leidend gefunden. Mattigkeit, Anämie und Gelbsucht sehr deutlich. Die Fresslust und das Wiederkauen waren fast völlig unterbrochen. Das Blut war schon bräunlich rot und stark dünnflüssig. Kleinpieroplasma und abnormale rote Blutzellen waren sehr zahllos, besonders das erstere befiel 51 Prozent der roten Blutzellen. Der Harn war dunkelrotbraun, undurchsichtig, schwach sauer gegen Lackmuspapier; und beim Stehen sammelte sich ein hoher Bodensatz an; Eiweiss und Hämoglobin waren reichlich enthalten. Gallenfarbstoffe konnten aber im Harn nicht nachgewiesen. Am 25.: rote Blutzellen; 1,424,000. Die Temperatur zeigte 3 Tage hindurch 40—41°C. Hiernach begannen allmählich alle Symptome zu verschwinden, und am 20. August betrugen die roten Blutzellen 3,040,000, die Abmagerung blieb jedoch stark.

Das Drosseladerblut dieses Kranken wurde am 25. Juli 5 gesunden Kälbern intravenös eingespritzt. Siehe Tabelle 15.

Bei der Viehzüchterei zu Makomanai ist der Weidegang der Rinder, besonders der jungen (etwa 1 Jahr alten) regelmässig im Sommer, ein Ausbruch der Seuche erfolgt jährlich auf den Weiden. In ungünstigen Jahren erkranken beinahe alle Weiderinder an dieser Krankheit und einige Fälle schwer infizierter Rinder verlaufen gewöhnlich tödlich, doch in günstigen Jahren kann man die Patienten mindestens in der einen Hälfte der ganzen Weiderinder beobachten. Die Mortalitätsziffer beträgt jährlich nur 2–5 Prozent. Bei dieser Tierzüchterei werden jährlich fast alle Rinder ausser kleinen Kälbern auf nahe (die erwachsenen) oder entfernte (die etwa einjährigen) Weiden im Frühling hinausgetrieben, und der Ausbruch der Seuche findet gewöhnlich erst zu Beginn des Juli statt.

Mitte Juli 1924 wie in vorigen Jahren war der Ausbruch in einer Herde auf entfernter Weide erfolgt. Hierauf wurden an Ort und Stelle die ganzen Weiderinder von mir klinisch sowie mikroskopisch untersucht. Von ihnen erkrankten bereits zwölf Rinder klinisch an dieser Seuche; in der einen Hälfte war die Krankheit so schwer, dass Mattigkeit, Gelbsucht, Anämie, Hämoglobinurie, Fieber und beschleunigte Herzstätigkeit (charakteristische Symptome der Piroplasmose) sehr deutlich erkennbar waren, in der anderen Hälfte war sie dagegen etwas leichter und wies nur einige von diesen

Erscheinungen auf. Als Beispiel ist ein typisch infizierter Fall oben beschrieben.

Fall 4. Einjährige Ayrshire-Kuh.

Tier-Nr. 4.

Am 27. Mai 1925 wurde das Tier im Stall erkrankt gefunden. Vormittags : Temperatur : 39.9°C, Puls : 100 ; nachmittags : Temperatur : 40.1°C, Puls : 96. Mattigkeit, Hinfälligkeit erheblich stark. Alle sichtbaren Schleimhäute blass (anämisch) und stark ikterisch. Atmung und Herztätigkeit heftig beschleunigt. Die Fresslust und das Wiederkauen aber nur wenig verändert. Das Blut war dünn und wässerig, und enthielt mehrere pathologische Erythrozyten. In zahlreichen roten Blutzellen fanden sich kleines Piroplasma. Der Harn war gelbdraun und neutral gegen Lackmuspapier; Eiweiss und Gallenfarbstoffe wenig; Hämoglobin fehlte im Harn. In 3 Wochen ging die Erkrankung in Heilung über.

Fall 5. Dreijährige Holstein-Kuh.

Tier-Nr. 5.

Am 11. Juli 1925 wurde das Tier in unserer Klinik aufgenommen : hochgradige Anämie, Temperatur : 41.7°C. Das Tier war schwach und hinfällig, frass jedoch gut. Am 16. sichtbare Schleimhäute etwas ikterisch ; Herztätigkeit beschleunigt. Das Blut dünn und wässerig ; die roten Blutzellen betrugen 1,664,000, die weissen 9,000, der Hämoglobingehalt 3.3%. Die Temperatur 38.5°C, der Puls 98. Darnach begann das Tier allmählich sich zu bessern, und am 25. verliess es die Klinik.

Fall 6. Dreijährige Holstein-Kuh.

Tier. 6.

Das Tier wurde im Jahre 1924 aus Nordamerika in die Viehzüchtereier zu Mako-manai importiert. Am 6. August 1925 wurde sie im Stall an Piroplasmose erkrankt gefunden. Sie war damals hochschwänger geworden und am 21. zu gebären erwartet. Die Fresslust war gut, die Temperatursteigerung sowie die Beschleunigung der Herztätigkeit und der Atmung nur im geringen Grade. Die etwas hochgradige Gelbsucht wurde erst am 9. bemerkt. Das Blut war so dünn und wässerig, wie das bei dieser Krankheit üblich ist, es zeigt abnormale rote Blutzellen, und darin lassen sich Kleinpieroplasmen zahlreich (in 14 Prozent der Erythrozyten) sehen. Am 12. betrugen die roten Blutzellen 2,936,000, die weissen 11,200, die Temperatur 39.3°C, der Puls 126. Der Harn war braun, enthielt reichlich Eiweiss, Gallenfarbstoff nur in Spuren. Uebrigens war der Zustand wie am vorhergehenden Tage. Am 15. sah der allgemeine Zustand besser aus, und entfärbten sich die gelb gefärbten Schleimhäute etwas. Trotzdem war das Blut viel dünner als am vorigen Tage, und die pathologischen Erythrozyten nahmen auch zu (über 40% der roten Blutzellen). Die roten Blutzellen betrugen 2,384,000, die weissen 9,300 ; Parasiten nur sehr wenig, Temperatur : 38.6°C, Puls : 77. In einigen Wochen ging die Krankheit allmählich in Heilung über.

Und gleichzeitig waren noch 5 von den Kühen, welche aus Nordamerika mit der obengenannten Kuh importiert wurden, und damals kein Piroplasma im Blute trotz den mehrmaligen mikroskopischen Untersuchungen zeigten, an dieser Seuche ziemlich schwer erkrankt, genasen aber in einigen Wochen ohne besondere Schädigung. In dieser Viehzüchtereier waren zwar viele Weiderinder an der Seuche wie in den übrigen Jahren erkrankt, aber kein tödlicher Fall kam vor.

Fall 7. In einer Herde dieser Viehzüchtereier auf einer entfernten Weide kam Anfang Juli 1926 ein Ausbruch der Seuche wie in den vorigen Jahren vor. Erst am 7. Juli wurden 3 Rinder erkrankt gefunden, und sie sofort im Stall behalten, dann mit besserer Fütterung, sorgfältiger Pflege und Ruhe behandelt. Am 15. betrug die Zahl der inzwischen behandelten kranken Rinder über 11.

Nachgenannte Fälle sollen einen Ueberblick dieses Ausbruches zeigen:

1). Einjähriger Ayrshire-Stier.

Tier-Nr. 13.

Am 7. Juli erkrankte das Tier an dieser Krankheit. Mattigkeit, Anämie und Gelbsucht waren deutlich. Er war schwach und appetitlos. Herztätigkeit und Atmung stark beschleunigt. Die Parasiten waren etwas weniger, die roten Blutzellen aber zum grössten Teile abnormal. Im Harn wurde Eiweiss in grossen Mengen nachgewiesen, Hämoglobin dagegen nicht. Während der 4 ersten Tage waren die Symptome schwer, danach wurde das Tier allmählich stark, und am 19. konnte man keine abnormalen Erythrozyten oder Symptome, ausser der Abmagerung, mehr sehen.

2). Einjährige Ayrshire-Kuh.

Tier-Nr. 14.

Am 14 Juli wurde sie leidend gefunden. Hochgradige Hinfälligkeit, Anämie, Gelbsucht, stark beschleunigte Herztätigkeit und fliegende Atmung. Das Blut war dünnflüssig, enthielt zahlreiche abnormale Erythrozyten und Kleinpiroplasmaen. Der Harn war rotbraun, reagierte sauer (gegen Lackmuspapier) und enthielt Eiweiss, Hämoglobin und Gallenfarbstoffe. Temperatur: 40,6°C, Puls: 102. Hierauf trat allmählich Besserung ein.

Um die Erkrankungsbeschaffenheit bei den übrigen Weiderindern kurz zu schreiben, sei das Versuchsergebnis in 2 Tabellen zusammengefasst. Siehe Tabelle 1 und 2.

Zufolge dieser Tabellen kann mit grosser Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass mindestens unter dem Mikroskop fast alle Weiderinder bei dem ersten Weidegang von dieser Seuche befallen worden waren.

Ausserdem erkrankten viele Rinder, welche am 12. Juni aus Nordamerika importiert wurden, Mitte August sehr heftig an dieser Krankheit. Tabelle 3 weist eine kurze Uebersicht darüber auf.

Tabelle 1. (Siehe Kasuistik, Fall 7.)

Befund am 16. Juli 1926.

Tier-Nr.	Klinischer Befund	Blutbefund								Piroplasmehaltige Erythrozyten vor Weidegang (100 Gesichtsfelder)	
		Abnormal-erythrozyten	Differentialzahlen der Leukozyten					Piroplasmehaltige Erythrozyten (100 Gesichtsfelder)			
			L	N	M	E	B	Grosser Typus	Kleiner Typus	Grosser Typus	Kleiner Typus
7	Schwer	##	656	273	68	3		0	1400	0	3
8	Leicht	+	753	177	64	6		0	2200	0	9
9	"	+	713	187	92	3	5	0	1300	0	12
10	"	+	649	337	98	8	8	0	650	0	4
11	"	+	781	136	83			0	1100	0	1
12	Schwer	##	743	202	56			0	10800	0	0
13	Leicht	##	722	215	60	3		0	4200	0	3
14	"	##	707	207	83	3		0	1300	0	0
15	Verdacht	##	856	79	65			0	99	0	200
16	"	+	761	107	123	6	3	0	1500	0	33
17	"	##	630	204	166			0	2800	0	15

18	Verdacht	+	694	122	178	3	3	0	220	0	2
19	Normal	+	796	111	89	2	2	0	428	0	30
20	Verdacht	+	713	189	43	55		0	42	0	20
21	Leicht	+	682	218	73	27		0	403	0	19
22	Verdacht	##	784	115	85	16		0	700	0	50
23	Normal	+	561	283	84	63	9	0	25	0	7
24	"	-	572	312	42	74		0	182		
25	"	-	552	214	70	157	7	0	1025	0	25
26	"	-	675	218	60	47		3	530	0	300
27	"	-	665	223	71	39	2	0	451	0	5
28	"	-	599	195	104	98	4	0	30	0	91
29	"	+	610	274	82	32	2	2	37	0	100
30	"	-	719	165	107	6	3	0	204	0	5
31	"	-	683	153	80	82	2	0	36	0	12
32	"	-	724	168	84	21	3	0	489		
33	"	-	610	237	112	39	2	0	608	0	100
34	"	-	628	240	54	74	4	0	25	0	5
35	"	-	680	179	63	70	8	0	19	0	200
36	"	-	743	143	85	29		0	250	0	105
37	"	-	685	183	100	30	2	0	18	0	28
38	"	-	661	191	38	100		0	158	0	21
39	"	-	661	171	83	81	4	0	80	0	63
40	"	-	622	274	61	38	5	0	76	0	53
41	"	-	680	114	138	66	2	0	31	0	88
42	"	-	655	137	165	40	3	0	12	0	5
43	"	-	685	162	74	79		13	81	0	40
44	"	+	487	357	62	93	1	0	31	0	60

- Bemerkung: 1. Abnormalerythrozyten ## zeigt an, dass fast alle Erythrozyten pathologisch verändert sind, ## : eine Hälfte, + : zum Teil, + : in geringer Zahl, - : kein.
2. Gesichtsfeld : Mikroskop Leitz : 1/12 Imm , Ok. 1.
3. Leukozyten L : Lymphozyten, N : Neutrophile Leukozyten, M : Monozyten, E : Eosinophile Leukozyten, B : Basophile Leukozyten.
4. Alter der Tiere ohne Ausnahme : 10-15 Monate.
5. Alle Tiere waren beim ersten Weidegang.
6. Fünf Rinder wurden mit 2-3 g Trypanblau (Höchst) behandelt (subkutan), aber zeigten keine besondere Besserung.

Tier-Nr.	10.	Datum	Dosis.
"	13.	8. VII.	2.0
"	7.	"	2.0
"	8.	11. VII.	3.0
"	8.	"	2.0
"	11.	"	2.0

Tabelle 2.
Befunde am 19. August 1926.

Tier-Nr.	Klinischer Befund	Blutbefund		
		Abnormal-erythrozyten	Grosspiro.	Kleinpiro.
7	Normal	—	0	15
8	"	—	0	50
9	"	—	0	260
10	"	—	0	100
11	"	—	0	1
12	"	+	0	555
13	"	—	0	27
14	"	—	0	800
15	"	—	0	111
16	"	—	0	210
17	"	—	0	1400
18	"	—	0	600
19	"	—	0	2100
20	"	—	0	29
21	"	—	0	30
22	"	—	0	44
23	"	—	0	3
24	"	—	0	8
25	"	+	0	270
26	"	—	0	2
27	"	—	0	9
28	"	+	0	339
29	"	+	0	1020
30	"	+	0	2800
31	"	—	0	21
32	"	—	0	65
33	"	+	0	776
34	"	—	0	14
35	"	+	0	66
36	"	—	0	18
37	"	—	0	50
38	Verdacht	+	0	4080
39	Normal	—	0	3
40	"	+	0	195
41	"	+	0	320

42	Normal	+	0	200
43	"	—	0	255
44	"	—	0	100

Bemerkung: Siehe die vorstehende Tabelle.

Tabelle. 3.

Erkrankung der aus Nordamerika importierten Rinder.

Name	Blutbefund								Klinischer Befund 17. VIII.
	16. VI.		26. VI.		18. VIII.		17. VIII.		
	E	P	E	P	E	P	E	P	
S. Datches ♀	—	0	—	0	—	3	##	2000	Leicht
Echo ♀	—	0	—	0	—	11	##	1700	Schwer
Witt ♀	—	0	—	0	—	3	##	2200	Leicht
Ladganer ♀	—	0	—	0	—	11	+	1200	"
Butter ♀	—	0	—	0	—	1	+	1100	Verdacht
Perfection ♀	—	0	—	0	—	25	##	3500	Schwer
P. Datches ♀	—	0	—	0	—	4	+	1000	Verdacht
Hengar ♀	—	0	—	0	—	13	—	600	Normal
Stead ♀	—	0	—	0	—		—	400	"
Ormsby ♀	—	0	—	0	—	5	##	4000	Schwer
Change ♂	—	0	—	0					

Bemerkung: 1. E=Abnormale Erythrozyten.

2. P=Klempiroplassenhaltige Erythrozyten
in 100 Gesichtsfeldern.

3. Uebrigens siehe Tabelle 1.

Fall 8. Dreijährige Holstein-Kuh.

Tier-Nr. 45.

Am 2. August 1926 liess sich das Tier in unserer Klinik untersuchen.

Anamnese: Drei Wochen vorher hatte das Tier ein Kalb geboren, danach ihre Fresslust stark vermindert. Milchabsonderung war sehr gering und nicht einmal die Hälfte der erwarteten Menge konnte erreicht werden.

Symptome an diesem Tage: Mattigkeit, Anämie der sichtbaren Schleimhäute, Beschleunigung der Herztätigkeit und der Atmung ziemlich deutlich. Temperatur: 40°C, Puls: 62. Bei der Untersuchung der Blutpräparate wiesen sich Klempiroplasma und abnormale Erythrozyten zahlreich auf. Am 9. Temperatur: 39.1°C, Puls: 70, allgemeiner Zustand unverändert. Nach einigen Wochen ging die Krankheit in Heilung über.

Fall 9. Vierjährige Holstein-Kuh.

Tier-Nr. 46.

Am 20. November 1926 wurde sie in unserer Klinik aufgenommen. Abmagerung, Mattigkeit, hochgradige Schwäche. Alle sichtbaren Schleimhäute blass (anämisch) und stark ikterisch. Auf der Augenbindehaut waren manche Blutfleckchen von Hirsekorngrösse erkennbar. Herztätigkeit und Atmung beschleunigt. Im Harn wurde kein Hämoglobin

globin nachgewiesen, sondern viel Eiweiss. Die mikroskopische Untersuchung des Blutes zeigte viel Piroplasmen (Kleinform) und zahlreiche abnormale Erythrozyten. Am diesen Tage wurde das Blute von der Drosselader entnommen, defibriniert und im Eiskasten aufbewahrt. Am folgenden Tage wurde das Blut einem gesunden Kalb subkutan injiziert. Siehe Tabelle 15.

Fall 10. Unter den Weiderindern der Viehzüchtere zu Makomanai trat ein Ausbruch von Piroplasmose Mitte Juli 1927, wie in den vorigen Jahren, epidemisch auf. Folgende Tabelle weist den Untersuchungserfolg kurz auf. Am 10. wurden einige Tiere (Nr. 50, 56, 60, 64. 67) mit Chinin (10—20 g) per os behandelt, wiesen aber keine Besserung (Verkürzung des Verlaufs) ausser temporärer Fieberstillung auf.

Tabell. 4.

Tier-Nr.	13. VII.		8. V. vor Weidegang		Tier-Nr.	13. VII.		8. V. vor Weidegang	
	E	P	E	P		E	P	E	P
47	—	31	—	52	* 66	—	7	—	1
48	+	3400	—	2	67	+	1200	—	0
49	+	900	—	1	* 68	—	48	—	0
50	+	12	—	1	69	—	330	—	2
51	+	2700	—	2	* 70	—	2800	—	62
52	+	300	—	5	* 71	—	211	—	6
* 53	—	6	—	23	* 72	—	300	—	(Gross 19) 82
54	+	1700	—	8	* 73	—	200	—	300
* 55	—	34	—	58	* 74	—	21	—	88
56	+	6700	—	120	* 75	—	600	—	56
* 57	—	72	—	23	76	+	68	—	2
* 58	—	500	—	36	77	—	4	—	1
59	+	2300			* 78	—	98	—	1
60	+	300	—	2	79	—	90	—	5
61	+	3200	—	5	80	—	24	—	12
62	—	700	—	8	* 81	—	105	—	3
63	—	16	—	11	82	—	51	—	8
64	+	5100	—	0	83	—	20	—	29
65	+	3200	—	0	84	—	232	—	502

Bemerkung: 1. E=Abnormale Erythrozyten.

2. P=Kleimpiroplasmenhaltige Erythrozyten
in 100 Gesichtsfeldern.

3. *: Siehe Tabelle. 12.

Fälle mit tödlichem Ausgang:

Der Autor hat bisher 11 akut oder subakut verendete Fälle seziert und makroskopisch sowie mikroskopisch untersucht. Ausserdem wurden noch 4 künstlich infizierte chronische Fälle getötet und seziert. Von diesen Fällen wurden 8 wichtige Fälle er-

wählt, um an dieser Stelle zu beschreiben.

Fall 1. Einjährige Shorthorn-Kuh.

Tier-Nr. 85

Vorbemerkung : Am 31. Juli 1923 wurde das Tier an der Krankheit leidend gefunden. Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Anämie und Gelbsucht vorhanden. Die Excremente derb und dunkel gefärbt. Temperatur : 39.6°C die Herztöne unregelmässig, die Herzstätigkeit beschleunigt, die Atmung fliegend. Der Harn dunkelrotbraun, stark getrübt, und enthielt Eiweiss und Hämoglobin sehr reichlich. Am 1. August die Symptome bösartiger als am vorhergehenden Tage. Temperatur: 40.6°C , Puls: 108, Atmung : 25. Am 2. morgens früh trat der Tod ein.

Sektionsbefund : Die Subkutanlymphdrüsen deutlich geschwollen, die Schnittfläche rot und ödematös. Das Blut dünnflüssig und gar nicht geronnen. Der Herzmuskel blass und stark getrübt. Die Lungen von der Tracheabis zur Bronchia waren mit einer schaumigen, serösen Flüssigkeit erfüllt. Die Milz etwa dreifach geschwollen ; die Milzkapsel stark gespannt ; die Ränder rundlich und dick ; die Pulpa rötlich dunkelbraun und teils ausfliessbar, teils noch fest ; die Bälkchen und Lymphknötchen fast unsichtbar. Die Leber etwas geschwollen ; die Blut- und Gallenstauung sehr erheblich : Parenchym getrübt. Die Nierenkapsel leicht abziehbar ; Parenchym etwas ödematös und stark getrübt. Darmschleimhaut hyperämisch und katarrhalisch. In den Schnittpräparaten der Lunge ist das grosse Piroplasma leicht nachzuweisen.

Fall 2. Dreijährige Holstein-Kuh.

Tier-Nr. 86.

Vorbemerkung : Erst am 23. Juli (1924) wurde das Tier ikterisch und schwach befunden. Einige Tage vorher hatte sie ein Kalb geboren. Am 28. beschleunigten sich Herzschläge, Appetitlosigkeit und Durchfall wurden bemerkt. Die Gelbsucht war so stark, dass Haut und alle sichtbaren Schleimhäute tiefgelb gefärbt waren. Das Blut war dünnflüssig ; die roten Blutzellen betrugen 1,040,000, fast alle Erythrozyten waren pathologisch verändert. Der Harn war grünlich braun, enthielt Gallenfarbstoffe und Eiweiss in grossen Mengen ; die Hämoglobinreaktion (Benzidinprobe) war nur schwach positiv. Die Körpertemperatur schwankte von Anfang bis zu Ende zwischen 38.5°C — 39.5°C . Am 10. August morgens früh trat der Tod ein.

Sektionsbefund : Alle Gewebe sahen stark ikterisch aus. Das Blut war bräunlich, und gar nicht geronnen. Herzmuskel blass, etwas weich und deutlich getrübt. Magen und Därme blass, die Schleimhäute katarrhalisch. Die Leber war gelbbraun und etwa dreifach vergrössert ; die Gallenstauung war ganz hochgradig, so dass durch Pressen die schmutzigidkflüssige Galle von der Schnittfläche abfloss. Die Nieren waren stark getrübt, sehr weich und schmutzig grün : in der Rinde befanden sich zahlreiche Eiterpunkte, welche durch einen Bacillus und einen Streptococcus verursacht worden waren. Lymphdrüsen waren dunkelrot gefärbt und ödematös geschwollen. Die Milz war nur etwas vergrössert ; Pulpa so weich, dass sie beim Durchschneiden zerfloss ; Bälkchen und Körperchen nicht erkennbar.

Fall 3. Einjähriger Shorthorn-Stier.

Tier-Nr. 87.

Vorbemerkung : Am 9. Juli 1926 war er auf Weide erkrankt. Anämie und Gelbsucht waren sehr stark. Temperatur : 41.0°C , Puls : 120. Die allgemeine Symptome waren äusserst ungünstig. Am 10. Temperatur : 41.3°C , Puls : 108. Allgemeiner Zustand wie am vorhergehenden Tage. Am 11. Temperatur : 40.8°C , Puls : 126. Die Schwäche des Kranken nahm noch mehr zu. Am 12. morgens ist er gestorben.

Sektionsbefund : Alle äusseren Schleimhäute, Unterhaut und Fettgewebe von stark ikterischer Farbe. Anämie ganz hochgradig, in fast allen Organen mit Ausnahme der

rechten Herzkammer und der Anfangspartie der Aorta keine Blutgerinnsel erkennbar. Die Muskulatur des Herzens blass, trocken und trüb. Lungenödem war so heftig, dass von der Schnittfläche eine schaumige, seröse Flüssigkeit reichlich ausfloss. In den Bronchien füllte sich die schaumige Flüssigkeit sehr dick an. Vergrösserung der Milz deutlich (ca $\times 2.5$), die Pulpa war zerflüssbar weich. Die Leber auch etwas vergrössert; die Schnittfläche, gelbbraunlich, zeigte starke Gallenstauung; Parenchym trüb. Die Gallenblase war mit einer dickflüssigen, klebrigen Galle angefüllt. Die Nieren blass und trübe. Die Lymphdrüsen ödematös geschwollen. Die Harnblase enthielt den dicken, dunkelrotbraunen Harn, der gegen Lackmuspapier sauer reagierte und die Eiweisssowie Hämoglobinreaktion stark positiv zeigte.

Fall 4. Erwachsene Holstein-Kuh.

Tier-Nr. 88.

Vorbemerkung: Am 27. Juli 1926 war das Tier auf der Weide an der Seuche erkrankt. Am 29. hatte sie ein kalb geboren. Mattigkeit, Anämie hochgradig. Am 10. August wurde 2 g Trypanblau (Höchst) subkutan injiziert. Am 17. Morgens früh war die Kuh gestorben und am folgenden Tage wurde der Kadaver sezirt.

Sektionsbefund: Die Subkutis war mit seröser Flüssigkeit durchtränkt, und blassblau gefärbt. Die Fettgewebe zeigten sich erheblich ikterisch. Die Lymphdrüsen schwellen etwas ödematös, und sahen auf der Schnittfläche rötlich aus. Der Herzmuskel war blass und etwas getrübt. Die Lungen rotbraun; auf Durchschnitte floss eine schaumige Flüssigkeit in Ueberfluss aus; die interstitiellen Bindegewebe nahmen seröse Infiltration an. Die Leber war kaum geschwollen; die Blutstauung war in den Azini stark, während die Gallenstauung fast unerkennbar war; das Parenchym matt und getrübt. Die Milz dunkelstbraun, nicht vergrössert; die Pulpa breiähnlich (stark ödematös); die Lymphknötchen und die Bälkchen erkennbar. Die Nieren blassblau gefärbt; die Rindensubstanz stark getrübt. Das Knochenmark (Oberschenkelbein) war in den Rindenpartien gerötet.

Fall 5. Einjähriger Shorthorn-Stier.

Tier-Nr. 64.

Vorbemerkung: Am 3. Juli 1927 war das Tier auf der Weide erkrankt. Am 10. wurde es mit 15 g Chinin (Chininum hydrochloricum) per os behandelt. Am 15. trat heftige Hämoglobinurie auf. Die Excremente derb und klein; Appetit blieb aus. Anämie und Gelbsucht erreichten fast den höchsten Grad. Am 16. vormittags starb das Tier.

Sektionsbefund: Ernährungszustand des Kadavers war gut. Alle äusseren Schleimhäute und Subkutis waren hochgradig ikterisch gefärbt. Seröse Infiltration der Unterhaut war gar nicht erkennbar. Die punktförmigen Blutfleckchen befanden sich zahlreich unter dem Brustfell. Das rötlich gefärbte Fibrin steckte in geringen Mengen an der Unterrändern der Lungen. Das Brustfell war ikterisch und etwas getrübt. Die Lungen: die Farbe rotbraun; die Schnittfläche etwas ödematös; die interstitiellen Bindegewebe gelblich gefärbt. Das Herz: das Herzbeutelwasser gelbbraun und etwas vermehrt; unter Epicardium, besonders längs der Furchen waren viele punktförmige, stecknadelkopfgrosse Blutflecke vorhanden; die Muskulatur war zart und etwas getrübt; unter dem Endocardium beim linken Kammer waren auch viele grössere Blutflecke erkennbar. Die Lungenhilusdrüsen waren etwas vergrössert und ödematös. Alle Baucheingeweide stark ikterisch und anämisch. Unter serösen Häute in den Gebieten von Dünn-, Dickdarm und der Milzspitze zeigten sich die kleinen Blutflecke sehr reichlich. Die Leber erreichte etwa $1\frac{1}{2}$ Grosse der Norm; die Farbe gelbbraun; die Ränder dick und rund-

lich ; auf der Schnittfläche Azinuszeichen etwas verwasched, die Gallenstauung hochgradig und leicht erkennbar ; das Parenchym stark getrübt. (Nach Formalinfixierung hat sich die Farbe der Leber in einen tiefgrünen Ton geändert.) In der Gallenblase befand sich die dicke, pasteähnliche Galle. Die Milz war stark vergrössert ; die Milzkapsel heftig gespannt ; die ganzen Ränder sehr dick und rundlich ; die Länge betrug etwa 70 cm, die Breite etwa 25 cm, die Dicke etwa 6 cm ; die Pulpa war pasteähnlich und dunkelrötlich, stark vermehrt, und quoll über Schnittfläche hervor, leicht ausstrichbar ; die Bälkchen und Malpighische Körperchen zeigten sich gar nicht ; viele Blutflecke in der Pulpa, besonders unter der Kapsel waren vorhanden. Die Nierenrinde stark getrübt, rötlich braun ; Blutstauung mässig ; stellenweise waren die Blutflecken vorhanden. Die Nierenkapsel leicht abziehbar. Die Harnblase enthielt den undurchsichtigen, dunkelrothbraunen, sauer reagierenden Harn in mittlerer Menge. In Harn Eiweiss und Hämoglobin (Methämoglobin) in sehr grosser Menge nachgewiesen. Der Labmagen etwas hyperämisch und katarrhalisch ; die kleinen (stecknadelkopfgrossen) nekrotischen Herde der Schleimhaut in Pyrolusgegend stellenweise erkennbar. Die Därme katarrhalisch. Gehirn etwas hyperämisch, sehr weich und ödematös. In allen Organen die Blutgerinnsel kaum anwesend ausser dem Herz und dem Anfangsteile der Aorta.

Die Infektion des Grosspiroplasma zu bestätigen, hat der Autor viele Ausstrichpräparate von verschiedenen Organen (Milz, Leber, Niere, Lunge, Herzmuskel, Gehirn, Lymphdrüse, Knochenmark usw.) hergestellt und sorgfältig untersucht, konnte aber nur ein negatives Resultat erzielen.

Fall 6. 5 Monate altes Holstein-Kalb (♂)

Tier-Nr. 89.

Vorbemerkung : Am 30. Oktober 1927 wurde das Tier mit dem piroplasmehaltigen Blute (70 cc) subkutan injiziert. Am 22. Januar 1928 wurde es durch Blutausleerung erlegt. Siehe Tabelle 14.

Sektionsbefund : Die Milz rotbraun, etwas vergrössert (Länge 32 cm, Breite 12 cm, Dicke 5 cm) ; die Ränder von beiden Enden dick und rundlich ; die tiefdunkelroten Blutflecke befanden sich im Oberend und sind schon durch die Kapsel erkennbar ; die Schnittfläche etwas feucht, die Pulpa weich und ausstrichbar, die Bälkchen und die Körperchen erkennbar. Das Knochenmark des Oberschenkelbeines gleichmässig tiefdunkelrot gefärbt.

Verbreitung von Piroplasmen in den verschiedenen Organen zu erkennen, hatte der Autor viele Ausstrichpräparate von verschiedenen Organen hergestellt und sorgfältig untersucht. Tabelle 5 zeigt den Erfolg.

Tabelle 5.

Name des Organs	Piroplasmehaltige Erythrozyten in 100 Gesichtsfeldern		Abnormalerythrozyten
	Grosstypus	Kleintypus	
Ohrenblut	0	560	—
Karotisblut	0	610	—
Milz	0	30	++
Knochenmark	0	10	+++

Blutlymphdrüse	1	19	+
Lymphdrüse	0	0	—
Leber	0	50	—
Niere	0	10	—
Nebenniere	0	2	—
Lunge	4	300	+
Herzmuskel	0	32	—
Hoden	0	1	—

Fall. 7. Finjähriger Holstein-Stier.

Tier-Nr. 90.

Vorbemerkung : Am 21. Januar 1928 wurde das Tier mit dem Drosseladerblute (100 cc) vom vorigen Tier (Tier-Nr. 89) subkutan eingespritzt. Am 9. September wurde es durch Blutausleerung getötet. Siehe Tabelle 12.

Sektionsbefund : Milz war von Normalgrösse : Pulpa etwas weich und ausstrichbar. Leber etwas ödematös, und ziemlich getrübt.

Verbreitung von Piroplasmen in verschiedendn Organen.

Tabelle 6.

Name des Organs	Piroplasmenhaltige Erythrozyten in 100 Gesichtsfeldern		Abnormalerythrozyten
	Grosstypus	Kleintypus	
Ohrenblut	0	111	—
Karotisbult	0	202	—
Pfortaderblut	0	72	—
Milz	0	4	—
Knochenmark	0	3	+
Hämolymphdrüse	0	30	—
Leber	0	109	—
Niere	0	1	—
Nebenniere	0	2	—
Lunge	4	40	+
Herzmuskel	0	1	—
Gehirn	0	2	—

Fall 8. Zweijährige Holsten-Kuh.

Tier-Nr. 91.

Vorbemerkung : Am 18. Juli 1928 wurde sie an dieser Seuche leidend gefunden. Als sie aber untersucht wurde, war sie schon im Verfall der Kräfte. Anämie äusserst stark, Herzöne unregelmässig, Atmung sehr schwach. Temperatur : 35°C, Puls : 80, Atmung : 25. Das Wiederkauen fehlte. Die Excremente trocken, derb, fingerkopfgross und vermischt mit Blut und Schleim. Der Harn rötlich und enthielt viel Eiweiss sowie Hämoglobin. Das Blut zeigte zahlreiche Abnormalerythrozyten und viel Kleinpieroplasmen. Am folgenden Tage war sie gestorben.

Sektionsbefund : Alle Organe waren äusserst blass (stark anämisch), aber nicht von gelber Farbe. Die Leber etwas vergrössert; die Trübung des Parenchyms und die Stauung der Galle ein wenig vorhanden. Die Vergrösserung der Milz fehlte fast und war die Milzpulpa sehr ödematös und leicht ausstrichbar. Der Labmagen hatte einige Blutflecken auf der Schleimhaut in der Pyrolusgegend. Die Nieren waren etwas getrübt.

Beschreibung der Krankheit.

Da die Beschreibungen in Kasuistik sehr kurz waren, müssen an dieser Stelle die Symptome und die anatomischen Befunde der Seuche etwas genauer geschrieben werden.

1. Krankheitserscheinungen.

Im sommer in der Umgebung von Sapporo, besonders in Makomanai erkrankten viele Rinder auf den Weiden an der Piroplasmose, im Winter dagegen sehr selten. In Makomanai tritt die Krankheit gewöhnlich nach etwa 3–5 Wochen nach dem Weidegang auf, manchmal bereits schon nach 2 Wochen. Im Anfange der Erkrankung steigert sich häufig die Körpertemperatur mehr oder minder, während in manchen Fällen besonders bei Stallfütterung kein Fieber beobachtet wird. Bei einer zur heftigen Bewegung zwingenden Misshandlung kann oft der tödliche Ausgang in solch fieberlosen, leicht erscheinenden Fällen plötzlich oder mindestens in einigen Tagen stattfinden. In den meisten Fällen steigert sich die Temperatur über 40°C, dann hält sie sich einige Tage hindurch auf 40°–41°C, worauf sie in den leichten Fällen allmählich wieder zur Norm zurückgeht, dagegen in den schweren mit dem Tod endet und zuweilen vor dem Sterben ihr rasches Sinken auf 37°C und darunter auftritt. Die kranken Tiere bleiben hinter der Herde zurück, fressen wenig, legen sich hin und zeigen sich matt und hinfällig. Alle sichtbaren Schleimhäute sind anfangs stark anämisch, später zeigen sie häufig eine ikterische Färbung. Das Haarkleid wird glanzlos. Die Herzschläge und die Atmung beschleunigen sich in der Regel. Die Fresslust und das Wiederkauen sind während der Erkrankung in allgemeinen stark vermindert, von Durchfall (aufangs) oder von Konstipation (später) werden die meisten Fälle befallen, vor allem zweiteres häufiger. Der Harn zeigt in schweren Fällen eine dunkelbraune Farbe und enthält gewöhnlich Eiweiss in grosser Menge, etwas seltener auch Blutfarbstoffe.

(Methämoglobin). Die Gallenfarbstoffe sind nur in geringer Zahl bei schweren Fällen im Harn nachzuweisen. In leichten enthält der Urin weder Blutfarbstoff noch Gallenfarbstoff, Eiweiss dagegen ist fast immer darin nachgewiesen, während seine Farbe meist normal ist. Bei dem Zentrifugieren oder langem Stehen von Urin kann man stark vermehrten Bodensatz gewinnen und untersucht man ihn mikroskopisch, so kann man viel gelbe Körnchen sowie Nierenepithel nachweisen.

Einmal die Seuche überstehend, erkrankten die Tiere lebenslänglich daran klinisch nicht mehr, oder nur leicht, allein es ist von mir mehrmals gehört worden, dass nach dem Gebären zuweilen solche durchseuchte Tiere wieder erkrankten. Weil die Piroplasmose eine der wichtigsten Blutkrankheiten vorstellt, deren Hauptsymptome aus Blutveränderungen bestehen, so möchte der Autor etwas eingehend das Blut an dieser Stelle beschreiben.

Erythrozyten : Durch die Erkrankung sinkt die Zahl der Erythrozyten sehr rasch auf $1/2$ – $1/6$ von der Normalzahl oder darunter herab. Der Hämoglobingehalt sinkt auch bis auf 3% herab (Fleischl-Miescher oder refraktometrische Bestimmung). Ausserdem gibt es eine wichtigste, bemerkenswerte Tatsache, dass die qualitativ veränderten Erythrozyten sich immer während der Erkrankung zahlreich im strömenden Blute zeigen. Ueber die von mir beobachteten Veränderungen der roten Blutzellen ist folgendes zu sagen :

Anisozytose (in fast allen Fällen), Polychromasie, basophile Körnerung, Erythroblastose, Normoblastose, Poikilozytose (selten). In den schweren Fällen kann man die Normalerythrozyten nur wenig finden, in den leichten dagegen zum grössten Teile. Nach mehreren Tagen langen, klinischen sowie mikroskopischen Untersuchungen vieler Rinder hat der Autor die interessante Wahrnehmung gemacht, dass die Stärke der Veränderung der roten Blutzellen und die Schwere der klinischen Erscheinungen immer fast parallel verlaufen. Bei der Rekonvaleszenz verschwinden diese pathologischen Erythrozyten vor der Wiedererlangung ihrer Zahl, und gleichzeitig kommen die klinischen Erscheinungen deutlicher zum Ausdruck,

Leukozyten : Während der Erkrankung vermehren sich die Leukozyten nur wenig, in machen Fällen (die erwachsenen) wird

die starke Neutrophilie beobachtet, und selten auch eine leichte Eosinophilie oder Basophilie.

Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutzellen (Methode nach Westergren) : Bei den gesunden Rindern ist die Senkung sehr langsam, und erst nach 24stündigem Stehen weist sie durchschnittlich etwa 8 mm auf. Die der kranken Tiere ist etwas schnell und zeigt 15–30 mm und darüber.

Einige Blutbefunde solcher Fälle möge in den folgenden Tabellen summarisch beschrieben werden. Siehe auch Tabelle 1, 13, 14.

Tabelle 7. Blutbefunde von Tier-Nr. 89.

(Siehe Tabelle 14 und Kasuistik.)

Datum	Erythrozytenzahl (1000)	Leukozytenzahl	Hämoglobingehalt (%)	Serumviskosität (Hess)	Reflexindex des Serums	Cholesteringehalt des Serums (100 cc)	Senkung der Erythrozyten		Abnormalerythrozyten
							nach 2h	nach 24h	
30. X, 1927	7,140	10,300	10.4	1.6	1.346907	48.0	1.5	10.0	—
31. " "	6,200	11,000	8.8	1.65	1.347425	45.0	1.5	9.5	—
2. XII, "	3,480	10,300	4.5	1.5	1.346009	30.0	1.5	20.5	+
11. " "	2,520	11,200	3.0	1.55	1.346500	26.5	3.0	27.0	+
15. " "	2,120	12,300	3.1	1.7	1.347055	22.1	3.0	38.0	+
20. " "	2,736	11,000	4.8	1.8	1.347980	22.2	1.5	27.0	—
28. " "	3,540	10,100	6.1	1.95	1.348730	26.5	1.0	23.0	—
5. I, 1928	4,700	11,300	8.1	1.8	1.348360	27.0	1.5	13.0	—

- Bemerkung: 1. Am 30. Oktober 1927 mit virulentem Blute subkutan eingespritzt.
 2. Refraktometer = Eintauchrefraktometer von Pulfrich (Carl Zeiss, Jena).
 3. Cholesterinbestimmung nach Myers und Wardell.

Tabelle 8. Tier-Nr. 120. (Siehe Tabelle. 12).

Datum	Erythrozytenzahl (1000)	Leukozytenzahl	Hämoglobingehalt (%)	Serumviskosität (Hess)	Reflexindex des Serums	Bilirubingehalt des Serums (100 cc)	Cholesteringehalt des Serums (100 cc)	Senkung der Erythrozyten		Abnormalerythrozyten
								nach 2h	nach 24h	
3. IX, 1928	8,910	7,500	10.8	1.5	1.346648	0.08	42	0.5	7.0	—
20. IX, "	8,464	9,300	10.4	1.6	1.346907	0.28	36	0.5	7.5	—
16. X, "	5,296	9,600	7.2	1.6	1.347314	0.12	25.5	1.0	12.0	+
30. X, "	6,424	10,200	9.1	1.65	1.347462	0.06	25.5	0.5	9.0	—
8. XI, "	6,790	8,200	9.7	1.7	1.347943	0.10	36	0	6.0	—

- Bemerkung: 1. Am 3. September 1928 mit virulentem Blute Subkutan eingespritzt.
 2. Bilirubinbestimmung nach Hijmans von den Besgh und Muller.

Tabelle 9. Blutbefunde bei natürlich infizierten Rindern. (Serum.)

Tier-Nr. oder Name	Datum	Serumviskosität	Reflexindex des Serums	Bilirubin- gehalt des Serums (100 cc)	Cholesterin- gehalt des Serums (100 cc)	Wassermannreak- tion (Browningsche Modifikation)	Abnormale erythro- zyten	Klinischer Befund	Farbe der Serums
45	9.VIII, 1927	1.95	1.349988	mg 0.64	mg 39	---	+	Leicht	Tiefbraun
S. Datches	26.VII, 1926	1.5	1.346234	0.20	78	±---	±	Leicht (Gelbsucht)	"
Echo	"	1.8	1.348582	0.16	45	±---	±	Schwer (Gelbsucht)	"
Witt	"	1.6	1.347425	0.16	72	---	±	Leicht (Gelbsucht)	"
Butter	"	1.6	1.347425	0.24	76	---	±	Leicht (Gelbsucht)	"
92	3. IX, 1928	2.0	1.349544	0.18	42	---	+	Leicht (Gelbsucht)	Tiefbraun
	8. IX, "	1.9	1.348804	0.24	24	±---	±	Etwas schwer (Gelbsucht)	"
	14. IX, "	2.0	1.349692	0.12	27	±±±	+	Leicht	Gelbbraun
93	5. IX, 1928	1.75	1.347980	0.36	24	±±±	±	Leicht (Gelbsucht)	Tiefbraun
	8. IX, "	1.9	1.349026	0.1	33	+---	+	Leicht	Gelbbraun
94	3. IX, 1927	2.15	1.349988	0.96		---	±	Schwer (Gelbsucht)	Gelbbraun
95	"	2.25	1.351098	1.0		---	±	Schwer (Gelbsucht)	"

Bemerkung: 1. Tier-Nr. 92, 93 : ♂, 1 Jahr alt.

2. Tier-Nr. 45 : Siehe Kasuistik.

3. S. Datches, Echo, Witt, Butter : Siehe Tabelle 3.

4. Tier-Nr. 94, 95 : ♀, die Erwachsenen.

Ich spreche Herrn T. Ito für seine Hilfe (Wassermannreaktion) meinen herzlichen Dank aus.

Tabelle 10. Blutbefunde bei natürlich oder künstlich infizierten Tieren.
(Blutkörperchen.)

Tier-Nr.	Datum	Abnormal- erythrozyten	Piroplasma- haltige Erythrozyten (o/oo)	Erythro- zytenzahl (1000)	Leukozyten- zahl	Hämoglobin- gehalt (%)	Differentialzahl en der Leukozyten				
							L	N	M	E	B
	24. VII, 1923	±	40	1.448	10,150	3.3	428	454	99	17	2
	26. "	±	31	1.240	13.000	3.3	527	358	113	2	

1	27. VII, 1923	###	10	1,380	12,000	3,8	270	689	36	3	2
	28. "	###	5	1,284	9,600	3.4	364	560	61	15	
	29. "	###	4	1,352	12,000	4.2	489	418	80	13	
	30. "	###	0	1,584	10,650	4.8	544	367	62	17	10
	31. "	###	0	1,648	11,300	4.6	556	357	67	16	4
	1. VIII, "	###	0	1,428	10,950	5.1	608	329	45	13	5
	2. "	###	0	1,852	6,250	4.1	629	327	35	9	
	3. "	+	0	1,900	5,400	4.8	646	259	79	16	
	4. "	+	0	1,872	4,400	5.3	755	155	70	20	
	5. "	—	1	1,840	4,200	5.6	731	208	46	9	6
2	24. VII, "	###	100	1,560	8,300	3.8	298	568	83	42	9
	26. "	###	58	1,432	10,950	4.1	565	302	104	29	
	27. "	###	54	1,396	8,800	4.2	297	662	34	6	1
	28. "	###	46	1,606	10,500	5.8	559	372	53	16	
	29. "	###	55	2,128	8,700	5.5	449	449	77	5	
	31. "	+	31	1,984	10,000	6.3	488	449	77	6	
	2. VIII, "	+	16	2,600	7,600	6.0	533	425	23	19	
	4. "	—	21	2,586	6,550	7.7	738	188	50	24	
96	7. "	—	8	2,824	4,950	8.7	740	154	31	75	
	14. VII, "	###	60	1,888	8,050	4.8	658	251	66	21	4
	16. "	###	20	1,896	9,650	4.5	492	430	68	8	2
	18. "	+	23	2,300	9,750	4.4	675	231	88	6	
	20. "	+	4	2,552	10,100	5.0	527	407	58	8	
	22. "	—	1	2,884	9,400	6.5	599	327	68	6	
97	24. "	—	3	3,200	8,400	7.0	699	232	58	11	
	31. I, 1927	—	0.06				691	207	101	1	
	6. II, "	—	1				688	247	63	2	
	13. "	+	7.5				652	200	144	4	
	20. "	+	6				669	183	148		
	27. "	###	18				456	355	189		
	6. III, "	###	20				513	194	291	2	
	8. "	###	2.5				658	130	209	3	
	13. "	+	3				772	73	153	2	
	21. "	—	5				818	99	81	2	
	27. "	—	2				812	83	105		

Bemerkung: 1. Tier-Nr. 1, 2 : Siehe Kasuistik.

2. Tier-Nr. 96 : Dreijährige Kuh. Am 13. Juli wurde sie in unserer Klinik aufgenommen.

3. Tier-Nr. 97 : Siehe Tabelle 12.

Im Anfall ist eine Hypo- oder eine Hypercholesterinämie nachzuweisen.

Pathologische Anatomie.

(Fig. 3, 6, 7, 8, 9.)

Von den vorerwähnten Sektionsbefunden lassen sich die wesentlichen Veränderungen der Organe folgendermassen zusammenfassen.

In den Gefässen ausser dem Herz und dem Anfangsteile der Aorta sind keine Blutgerinnsel vorhanden, sondern eine gelbbraune, seröse Flüssigkeit findet sich nur in den grossen Venen. Im Peritonealraum sowie in den Brustfellsäcken finden sich gewöhnlich Ansammlungen einer klaren, gelbbraunen Flüssigkeit.

Der Pansen, die Haube und der Psalter sind ohne Besonderheiten, dagegen ist die Schleimhaut des Labmagens mitunter katarrhalisch geschwollen und zeigt auch Rötungen. In einigen Fällen war die Schleimhaut in der Pyrolusgegend stellenweise mit kleinen Blutaustritten oder kleinen nekrotischen Herden versehen. Der Regel nach besteht ein Katarrh der Schleimhäute des Dün- und Dickdarms. Die Gekrösymphknoten sind mehr oder weniger geschwollen, ihre Schnittfläche ist sehr feucht und zuweilen gerötet.

In den akuten Fällen weist die Milz eine mehr oder minder starke Schwellung in der Regel auf. Die Milzkapsel ist durchsichtig und erheblich gespannt. Die Milz ist gewöhnlich um das 2–4 fache und darüber vergrössert. Die dunkelrotbraune Pulpa ist zum Teile noch fest, zum Teile zerfliessend infolge Ueberfüllung derselben mit roten Blutzellen. Mitunter befinden sich auch in das Gewebe zerstreute schon durch die Kapsel zu erkennende, dunkelrote Flecken, die Blutungen in des Gewebe darstellen. Bei stärker Blutfüllung springt zuweilen die Pulpa über die Schnittfläche hervor. Das trabekuläre Gewebe und die Lymphknoten machen sich makroskopisch nicht oder nur schwer erkennbar. Bei akuter Milzschwellung ergibt die mikroskopische Untersuchung vor allem eine grosse Blutfülle, aber keine besondere Leukozytenzunahme in der Pulpa. Malpighische Körperchen sind sehr locker und weisen kein sich vermehrendes Keimzentrum auf. In subakuten Fällen kann man die Milzschwellung nicht beobachten, sondern eine stark ödematöse, ganz zerfliessende Milz. Auf dem Durchschnitte fliesst die braunrote, breiähnliche Pulpa aus, somit kann man eine Schnittfläche kann bilden. Die Bälkchen und Lymphknoten sind schwer oder nicht

erkennbar, In den leichten Fällen war die Milz etwas vergrößert (bis zu $1\frac{1}{2}$) oder auch nicht, die Pulpa war mehr oder minder feucht und weich, wodurch sie ausstrichbar war. Die Bälkchen und die Körperchen waren ziemlich deutlich nachweisbar. Die Milz zeigte unter dem Mikroskop eine leichte Blutfüllung, aber kein Leukozytenzunahme.

In den akuten Fällen war das Lebertumor nur etwas oder mittelgradig, eine ziemliche Blutstauung vorhanden, das Parenchym etwas getrübt. Bei der mikroskopischen Untersuchung kann man stets eine schwere Gallenstauung beobachten, ebenso in den ganzen Lebergeweben, besonders in den Azinusrändern, sind gelbbraune Netze von Galle nachweisbar. Die Leberzellen im Azinuszentrum leiden an Verfettung und trüber Schwellung mehr oder minder, dagegen sind sie in den Azinusrändern ziemlich gesund geblieben. Die Kupferschen Sternzellen enthalten gewöhnlich viel Hämosiderinkörnchen und Gallenmassen. Bei subakuten Fällen zeigte sich die Leber eine geringe Vergrößerung oder keine. Auf dem Durchschnitt weist sie eine schwache Blutstauung auf, mitunter auch Blutarmut. Die Gallenstauung und fettige bzw. trüber Metamorphose der Leberzellen ist ab und zu unbedeutend, dagegen in anderen Fällen sehr stark. In einem subakuten (Tier-Nr. 86) war die Verfettung der Leberzellen äusserst stark, wie Figur 7 zeigt; sämtliche Leberzellen leiden an dieser Degeneration, häufig lassen sich in der Umgebung der Centralvenen keine Kerne nachweisen. Die Gallenstauung ist auch erheblich und in den Azinusrändern befinden sich viel Y-förmige oder zylindrische Gallenmassen, welche in den Sternzellen oder erweiterten Gallenkapillaren vorkommen. Infolge chronischer Gallenstauung tritt die Durchbrechung der Gallenkapillaren und die Ausstossung der Gallezyylinder deutlich auf.

In den Nieren ist die albuminöse Entartung von Rindensubstanz am höchsten: die Nierenepithelien besonders jene der gewundenen Harnkanälchen zeigen sich etwas geplatet und enthalten viel braune sowie rot (Eosin) gefärbte staubartige Körnchen. Das Lumen der Harnkanälchen ist etwas erweitert. Viele gewundene Kanälchen sind mit den diffus hämosiderinhaltigen Eiweissmassen erfüllt, zuweilen können auch in manchen Kanälchen keine Epithelien nachgewiesen werden. In einigen Fällen treten die interstitie-

llen Blutungen in der Rindensubstanz vereinzelt auf. Die Glomeruli sind gewöhnlich ohne Besonderheiten.

In den Lungen sind die Blutkapillaren mehr oder minder hyperämisch, eine Desquamation der Alveolarepithelzellen kann nur selten gefunden werden, in manchen rasch verendeten Fällen erfüllen sich die meisten Alveoli mit den amorphen albuminösen Massen, welche das Vorhandensein der serösen Infiltration (Lungenödem) darstellen.

Die Knochenmarke von Röhrenknochen sind entweder überall oder nur zum Teile gerötet. Die lebhaften Neubildungen der Blutzellen lassen sich unter dem Mikroskop sehen.

Die übrigen Organe sind fast ohne Besonderheiten ausser dem Oedem.

Von den in vielen Organen sich ablagernden Pigmenten sind 2 Farbstoffe, Hämosiderin und Gallenfarbstoff, zu nennen. In schweren Fällen ist die starke Ablagerung dieser 2 Farbstoffe in den Zellen und den Zwischengeweben fast aller Organe, besonders in der Milz, Leber, Nieren und Lungen reichlich nachzuweisen.

Trotzdem das Kleinpieroplasma sich im Blute zahlreich findet, kann man doch in den Organen nicht mit Sicherheit nachweisen, denn die Färbung das durch Fixierung der Organe verkleinerten Kleinpieroplasmas ist sehr schwer. Dagegen ist das Grosspieroplasma in den Organen leicht mit Sicherheit infolge seiner grossen Gestalt nachweisbar. (Ueber die Verbreitung der Pieroplasmen in Organen siehe Kasuistik.)

Erreger.

In diesen Gegenden kann man immer viele endoglobuläre Pieroplasmen in Peripherblute der kranken oder gesunden Rinder bemerken. Diese Pieroplasmen sind der Grösse nach in 2 verschiedene Formen, in grosse und kleine einzuteilen. Im Blute der Kranken wurde die kleine Form stets gefunden, die grosse aber nur selten.

Das kleine Pieroplasma.

(Fig. 2, 5.)

Dieses Pieroplasma bildet in der Regel feine stäbchenförmige, endoglobuläre Gebilde. Die Oval- und Kommaform werden

auch ziemlich häufig gesehen, die ringsförmigen oder unregelmässigen Gebilde dagegen etwas seltener. Ausserdem zeigen sich die Teilungsformen nicht selten.

Ergebnis der Grössen-Messung.

	Länge (μ)		Breite (μ)	
Feinstäbchenform	1.8-3.5,	durchschnittlich 2.5	0.6-0.8,	durchschnittlich 0.5
Ovalform	1.9-2.7,	" 2.2	1.2-1.5,	" 1.3
Kommaform	2.3-3.0,	" 2.5	0.8-1.0,	" 0.9

Bei Giemsa-Färbung enthält die blau gefärbte Feinstäbchen- oder Ovalform einen endständigen roten Punkt, welcher als Kern des Parasiten aufzufassen ist, die kommaform auch einen solchen roten Punkt im stumpfen Ende. Eine rote Blutzelle enthält gewöhnlich 1-2 Piroplasmen, in den schweren Krankheitsfällen kann sie aber 5-6 Individuen enthalten. Die Anordnung dieser Individuen ist unregelmässig. Bei diesen Parasiten fehlt die Pigmentbildung völlig.

Die Fortpflanzung des Parasiten geschieht ausschliesslich in den roten Blutzellen durch Vierteilung (hauptsächlich), Zweiteilung (selten) oder Dreiteilung (sehr selten). Die Schizogonie, wie sie bei *Piroplasma parvum* als sog. Kochsche Plasmakugel vorkommt, ist bei diesem in den Ausstrich- und Schnittpräparaten der verschiedenen Organen (Blut, Milz, Leber, Niere, Lymphdrüse, Hämolymphe, Knochenmark, Gehirn, Lunge, Herzmuskel usw.) niemals gesehen worden.

Im Krankheitsfalle ist die Parasitenzahl so gross, dass 10-20 % (selten 50 %) der Gesamtzahl der Erythrozyten von diesem Parasiten befallen werden. Bei den gesunden Tieren kann man noch die parasitenhaltigen Erythrozyten spärlich (meistens 10 oder darunter : 100 Gesichtsfelder) nachweisen. Bei den Kälbern, die im Winter geboren wurden, besteht die Schmarotzung dieser Parasiten erst im Frühjahr, die im Sommer geborenen Kälber zeigen aber zuweilen das Piroplasma im Blute bereits in einigen Wochen nach Geburt.

Morphologisch ist dieses Piroplasma dem Pseudoküstenfiebererreger, *Piroplasma mutans*, sehr ähnlich.

Das grosse Piroplasma.

(Fig. 1, 4.)

Mit ganz frischen Präparaten untersuchte der Autor mehrmals

die Bewegung des Parasiten, trotzdem konnte nur ein negatives Resultat erzielt werden, weil die amöbenartige Eigenbewegung und die andern nichteigentlichen Bewegung (durch Brownsche Bewegung oder durch Rotation und Strömung der Erythrozyten verursacht) des Parasiten nicht unterscheidbar waren. In gefärbten Präparaten fallen besonders die Doppelbirnformen auf. Daneben finden sich rundliche ($1.5-2\ \mu$) oder amöbenartige, unregelmässig gestaltete Parasiten. Diese verschieden gestalteten Parasiten sind gewöhnlich nur endoglobulär zu sehen, aber sehr selten auch ekoglobulär.

Ueber die Grösse der einzelnen Gebilde ist folgendes zu sagen : Länge beträgt $2.5-4.5\ \mu$, durchschnittlich $3.3\ \mu$, die Breite $1.8-3\ \mu$, durchschnittlich $2\ \mu$.

Bei der Giemsa-Färbung zeigt oft das birnförmige Individuum (Doppelform) 2 rote Körperchen (Kerne) und eine rote Linie (Axis), welche die 2 Kerne verbindet. In den roten Blutzellen pflegen sich diese Parasiten durch Zweiteilung zu vermehren, aber die Vermehrung durch Drei- oder Vierteilung kommt selten vor. Im Blute der natürlich infizierten Rinder ist dieses Grosspiroplasma nur äussert selten zu finden. Im Falle der künstlich mit diesem Parasiten infizierten Rinder kann man es fast immer im Blute nach etwa 10-tägiger Inkubationsdauer finden.

Morphologisch ist dieses Piroplasma dem Texasfiebererreger oder dem Erreger der europäischen Rinderhämoglobinurie ähnlich.

Künstliche Uebertragung.

Diese 2 Arten des Piroplasmas sind auf die normalen Rinder durch direkt Impfung leicht übertragbar. Die natürliche Uebertragung durch Zecken ist bisher von mir noch nicht mit Erfolg erreicht worden. Diese natürliche Uebertragung untersucht jetzt der Autor mit 5 verschiedenen Arten der Zecken, welche von ihm der mehrzahl nach aus verschiedenen Gegenden Hokkaidos gesammelt und klassifiziert wurden, nämlich *Ixodes ricinus* Linnaeus, *Ixodes frequens* Ogura et Takada, *Haemaphysalis bispinosa* Neumann, *Haemaphysalis concinna* Koch und *Haemaphysalis jezoensis* Ogura et Takada. Daher sei in diesem Berichte nur die künstliche Uebertragung etwas eingehender beschrieben.

Experiment mit Kleinpiroplasma.

Mit dem diesen Parasiten enthaltenden Blute wurden 11 Rinder subkutan oder intravenös injiziert, welche erst nach einige Wochen langer Inkubationsdauer das kleine Piroplasma im Peripherblute zeigten, das ferner einige Wochen nach der Inkubationszeit sich sehr stark vermehrte, aber jedes infizierte Rind blieb ganz gesund. Einmal gefunden, verschwinden diese Parasiten niemals mehr aus dem Peripherblute, obgleich ihre Zahl im Blute nachzuweisen oft äusserst gering ist (einige Parasiten pro 100 Gesichtsfeldern). Es ist zweifellos, dass das kleine Piroplasma für Rinde, mindestens bei künstlicher Uebertragung, nicht pathogen ist.

Experiment mit Grosspiroplasma.

In dieser Gegend wird das Piroplasma niemals in der Reininfektion gefunden, sondern jedesmal in der Mischinfektion mit dem Kleinen. An dieser Stelle sei diese Mischinfektion vorläufig als die Infektion der Grossform beschrieben, weil in dieser Gegend meistens schon gesunde Rinder mit der Kleinform natürlich angesteckt werden und auch diese künstliche Uebertragung selbst keine Erkrankung verursacht.

Im März 1924 wurden 3 piroplasmenfreie Kälber, 3 Tage-2 Monate alt, mit dem Blute einer gesunden Kuh intravenös eingespritzt, welche seit ihrer Geburt niemals an dieser Krankheit litt, aber bereits damals das Kleinpiroplasma im Blute sehr wenig gezeigt hatte. Von diesen 3 Kälbern zeigten 2 im Innern der Erythrozyten ein grosse Piroplasma während anderthalben Monate nach Inkubationsstadium von etwa 2 Wochen, allein trotz der mehrere Monate langen Beobachtung waren immer die Kälber klinisch sowie mikroskopisch ganz gesund geblieben. Das Ergebnis dieser ersten künstlichen Uebertragung von Grosspiroplasma lässt sich in der Tabelle 11 zusammenfassen :

Tabell 11.

Tier-Nr.	Alter	Datum der Impfung	Impfdosis	März (1924)			April					Mai				Juli			
				17	23	30	6	8	13	20	27	4	11	18	25	8	15	22	
98	3 Tage	17. März	5 cc	—	—	1*	1*			2*	2*	3	1*	3	100	315	152	100	30
99	2 Monate	"	5 cc	—	—	1*	2*	1*	1*	3	50	60	300	400	1300	300	3100	1400	
100	2 Monate	"	10 cc	—	—					5	50	10	50	82	400	300	200	100	
101	1 Monate	Kontrol		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	2 Monate	"		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Bemerkung: 1. Namen der Kälber.

Tier-Nr. 98 : Cavalier's Expression 7.

" 99 : Grand Eselbutter 26.

" 100 : " 25.

" 101 : Willow Moor 51.

" 102 : Grandmary 8.

2. Ziffer zeigt die Zahl der proplasmenhaltigen Erythrozyten in 100 Gesichtsfeldern.

3. Ziffer ohne Zeichen : Kleimpiroplasmenzahl.

4. Ziffer mit * " : Grosspiroplasmenzahl.

Im Juli 1926 waren die Weiderinder der Tierzuchterei zu Makomanai auf der Weide an dieser Seuche epidemisch erkrankt, wie bereits in vorstehender Kasuistik dargelegt wurde. Damals konnte der Autor gelegentlich das Grosspiroplasma in 3 Fällen bemerken. Mit diesem grossparasitenhaltigen Blute wurden hierauf viele Rinder nacheinander eingespritzt und jedes Rind wurde einige Monatelang nach Infektion mikroskopisch und klinisch beobachtet, in manchen Fällen auch noch anatomisch. Um die Beschreibung zu verkürzen, wird das Ergebnis in einigen Tabellen zusammengefasst. Siehe Tabelle 12, 13, 14.

Werfen wir einen Blick auf diese Tabellen, so können wir leicht die folgende kurze Zusammenfassung darus gewinnen.

1. Das Grosspiroplasma ist wie das Kleine auf die gesunden Rinder ohne Schwierigkeit künstlich übertragbar.

2. Das Grosspiroplasma zeigt sich im peripheren Blute (Ohrenblut) nach einer Inkubationsdauer von 6–10 Tagen, aber im Gegensatz zum Kleinpiroplasma wird es nach dem ersten Vorkommen nur selten im peripheren Blute gefunden.

3. Etwa die eine Hälfte der geimpften Rinder erkrankte an dieser Seuche ohne besondere Umstände, und jedes zeigte die Symptome wie bei der natürlichen Erkrankung.

4. Die Inkubationsdauer der Erkrankung beträgt gewöhnlich etwa 4–7 Wochen. Die Symptome kommen in den meisten Fällen erst einige Wochen nach dem ersten Auftreten des Grossparasiten im Peripherblute zum Vorschein, in einem Falle (Tier-Nr. 81) zeigten sie sich aber gleichzeitig mit diesem ersten Vorkommen.

6. In allen Fällen ist die Erkrankung sehr gutartig und kein Fall verläuft tödlich.

Die Beziehung zwischen Piroplasmeninfektion und Erkrankung.

Durch die Versuche der künstlichen Uebertragung wurde festgestellt, dass keine Erkrankung durch Reininfektion von Kleinpiroplasma selbst verursacht wird, während durch Mischinfektion von Klein- und Grosspiroplasma eine Piroplasmose in der halben Zahl der infizierten Tiere verursacht. Weil die Trennung beider Piroplasmen für den Autor unmöglich war, konnte er jetzt noch nicht feststellen, zu welchem Piroplasma der Haupterreger dieser Seuche

Tabell 15. Uebertragungsversuche

Tier-Nr.	Namen der geimpften Rinder	Alter	Namen der Rinder von denen Impfstoff (Blut) entnommen wurde	Datum der Impfung	Geimpfte Blutdosis cc	
99	Grand Eselbutter 26	6 Mon.	Tier-Nr. 3 (Kasuistik)	25. Juli 1924	10 (i. v.)	Parasiten zahl
100	" 25	"	"	"	"	"
102	Grandmarry 8	"	"	"	"	"
121	Matsushima 8	"	"	"	"	"
122	Ackigrace 15	5 Tage	"	"	"	"
81	Barboigh	1 Jahr	S. Datches (Tabelle 3)	15. August 1926	180 (")	"
105	Duke 4	"	Echo (Tabelle 3)	"	150 (")	"
123	" 10	1 Mon.	Tier-Nr. 46 (Kasuistik)	21. November "	20 (s. c.)	"
124	December	3 "	Queen Johanna Ormsby	21. August 1928	30 (")	"
125	Unhappy Bull	"	Davidson Major	5. September "	20 (")	"
126	Lady 3	"	" Junior	"	" (")	"
127	Dora 9	"	Decl Ormsby 2	"	" (")	"

Bemerkung: 1. Siehe Tabelle 11, Bemerkung.

gehört. Aber falls es glücklich nachgewiesen ist, dass in allen Krankheitsfällen bei künstlicher oder natürlicher Infektion es sich bei dieser Piroplasmose notwendigerweise um Anwesenheit des Grossspiroplasma handelt, so wird das Grossspiroplasma mit grosserer Wahrscheinlichkeit als Haupterreger sich erkennen lassen. Um die zu erreichen, hat der Autor das Blut von vielen kranken Rindern unter dem Mikroskop und durch Uebertragungsversuch untersucht, ausserdem in verendeten Fällen noch das Grossspiroplasma in Organen nachzuweisen versucht.

Tabelle 15 zeigt einen Teil des Ergebnisses dieser Untersuchungen.

Ausserdem wurden 6 kranke Rinder durch Uebertragung untersucht und bei 3 von ihnen wurde das Grossspiroplasma nachgewiesen.

Wie oben nachgewiesen wurde, ist das Grossspiroplasma durch mikroskopische Untersuchung in den meisten Fällen nicht nach-

mit dem Blut der Kranken.

Tage nach Impfung																									
(↓)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	26	30	35
19			3						3							200						100	300	300	
45			2						15							200						2	30	50	
0	0	0	0	1	1	8	10	4	9							200						100	31	31	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	2						100	20	33	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1						4	100	50	
14	16						100							18				82					22		
3	11						23							9				48					31		
0	0		20*				1*				0		0								0				20
0			0				0		0			1*						2*							
0		0						0						0				2*			0				
0		0						0						0				3*			0				
0		0						0						2*				1*			0				

2. Queen Johanna Ormsby, Davidson Major, D. Junior, D. Junior und Decol Ormsby 2 Ende Juli schwer erkrankt.

weisbar, dagegen durch Uebertragungsversuche ohne Mühe positiv. Nach meiner Meinung ist die Infektion des Grosspiroplasma in allen Krankheitsfällen ohne diese Experiment nicht zu verneinen. Trotzdem bei dem Nachweis von Piroplasmen die Experiment mit solcher Berücksichtigung sorgfältig gemacht werden, konnte bei vielen Patienten das Kleinpiroplasma einzig und allein nachgewiesen werden. Bei solch reiner Infektion des Kleinpiroplasmas kann man doch typische Symptome, nämlich Fieber, Anämie, Mattigkeit, Hämoglobinurie, Gelbsucht, abnormale Erythrozyten usw., und einen Verlauf wie bei einer Mischinfektion beobachten. Diesen Untersuchungen zufolge ist zwar die Rinderpiroplasmose in dieser Gegend durch die Reininfektion des Kleinpiroplasma oder durch die Mischinfektion der beiden verursacht, allein bei natürlich infizierten Tieren kann man ohne genaue Untersuchung niemals sagen, welche Infektion sie erlitten haben. Wie oben bereits gesagt wurde, be-

deutet die Infektion der Proplasmen nicht immer die Erkrankung, sondern nur mitunter. Es sei mindestens mit kleine Virulenz für Rinder haben, mit anderen Worten, ihre Beziehung nur ein Commensalismus ist, die Seuche somit auf andere Art verursacht sein muss, aber aus unten genannten Gründen eine solche Voraussetzung nicht besteht.

Den Uebertragungsversuchen zufolge können mindestens die künstlich mischinfizierten Rinder ohne besondere Bedingung an dieser Seuch erkranken. Bei allen kranken Tieren kann man immer die Infektion von einem Piroplasma oder von beiden nachweisen, während bei den parasitenfreien Tieren, welche aus dem Auslande importiert oder in dieser Gegend geboren wurden, kein Patient beobachtet werden kann. Diese parasitenfreien Tiere können immer erst nach der Infektion erkranken.

Um die Beziehung zwischen Infektion und Erkrankung klar zu stellen, wurde viele Kälber in der Viehzüchterei zu Makomanai seit der Sägezeit von mir sorgfältig klinisch und mikroskopisch untersucht. Die meisten Tiere zeigen in der Regel schon vor dem Weidegang das Kleinpiroplasma im Blute in kleinerer oder grösserer Zahl, aber das Grosspiroplasma kann nicht nachgewiesen werden. Der Autor musste daher zahlreiche auf die Weide zu treibende Tiere das Grosspiroplasma enthaltende Blute einimpfen, um diesen Fehler zu beseitigen. Im Juli 1927 wurden viele Rinder (20), die früher als Versuchstiere für Uebertragungsexperiment mit Grosspiroplasma gebraucht worden waren, auf die Weide getrieben. Die eine Hälfte dieser Tiere ist bereits in Tabelle 4 beschrieben worden.

Die Tiere, die bereits vor dem Weidegang nur das Kleinpiroplasma getragen hatten, sind mindestens zur Hälfte auf der Weiden an dieser Seuche erkrankt, und in einigen schweren Fällen (Tier-Nr. 64, 87) ist die Krankheit tödlich verlaufen (Tabelle 1, 2, 3, 4.). Umgekehrt sind die Tiere, die im voraus mit dem Grosspiroplasma geimpft wurden, ganz gesund geblieben. Ueber die Beziehung zwischen Infektion und Erkrankung kann folgendes gesagt werden :

Auf Mischinfektion der beiden Piroplasmen haben jedenfalls die Rinder auf etwa 50% mit einer Seuche ohne besondere Umstände reagiert, und die diejenigen Rinder, welche solche Mischinfektion überstanden haben, erkranken ohne Unterschied der vorläufigen Re-

aktion gewöhnlich nicht mehr auf der Weide. Durch Reininfektion des Kleinpiroplasmas erleiden die Tiere erst unter besonderen Umständen, ausschliesslich auf der Weide eine Krankheit, die von jener Krankheit klinisch und anatomisch bisher sich nicht unterscheidet. Es kann daher mit grosser Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass der Ausbruch der Seuche durch solche Abänderungen der Umstände, wie Abweidung (bei jungen Tieren), Gebären (bei alten) usw. sehr von günstigem Einfluss sind, und auch, dass die Tiere natürlich verhältnismässig in geringer Zahl durch die Reininfektion des Kleinpiroplasma erkranken, weil erstere sehr leicht auf der Weide zur Mischinfektion übergehen kann.

Immunität und Schutzimpfung.

In dieser Gegend ist gegenwärtig die Vernichtung der Zecken auf den Weiden ganz unmöglich, und die Abweidung der Rinder unvermeidlich. Man muss also die Prophylaxe und Therapie dieser Seuche untersuchen, ihre Schädigung zu beseitigen.

Dass die meisten Kälber bereits einige Wochen (geboren im Sommer)— einige Monate (georen im Winter) nach Geburt vom kleinen Piroplasma angesteckt werden, ist die Regel in diesem versuchten Gebiete. Die eine Hälfte derart infizierter Kälber erkrankte bei dem ersten Weidegang klinisch an dieser Seuche, aber bei der mikroskopischen Untersuchung sind sie fast ohne Ausnahme von ihr befallen (Tabelle 1, 2.). Wenn sie die Seuche einmal überstehen, dann werden sie in der Regel nicht mehr angesteckt. Fast ausnahmsweise tritt die Seuche noch bei diesen früh befallenen Kälbern auf, aber sie ist gewöhnlich sehr leicht. Umgekehrt bleiben die infizierten Tiere bei der Stallfütterung im allgemeinen ganz gesund während ihrer Jugend, und erst bei Mündigkeit erkranken sie zum Teile, aber die Erkrankung ist dafür so schwer, dass die kranken Tiere häufig ums Leben kommen. Solche Erkrankung tritt bei Stallfütterung ausschliesslich nach Abänderung der Umstände, nämlich Gebären, Transportation usw., ein. In kurzen Worten, die Reininfektion des Kleinpiroplasmas kann nicht mit Piroplasmose Hand in Hand gehen, sondern nur unter gewissen Bedingungen kann sie die infizierten Rinder mit charakteristischen Symptomen befallen. (Ueber Pathogenität der Mischinfektion siehe vorstehende Abschnitte.)

Dass die früher von *Klempiroplasma* verseuchten Rinder noch durch die Mischinfektion an der Seuche leiden können, ist selbstverständlich. Ohne Abänderung der Umstände oder bei Jungtieren im Stall kann auch die Mischinfektion nur eine leichte Erkrankung zur Folge haben. Wie im vorigen stellenweise dargelegt wurde, können doch diejenigen Rinder, welche die Krankheit oder Mischinfektion bestanden haben, gegen dieser Seuche eine gewisse Immunität erwerben, obwohl darnach mitunter sie an Rezidiven erkranken (sehr leicht). Die Reininfektion des *Klempiroplasmas* ist ohne Erkrankung dagegen nicht möglich, um Immunität zu erwerben. Bevor die künstliche Mischinfektion (der beiden *Piropasmen*) als Schutzimpfung in der Praxis zu brauchen ist, muss derjenige Zeitraum, in welchem man die Tiere nach der Impfung im Stall zu erhalten hat, bestätigt werden. Um dies zu bestimmen, müssen wir nochmals einen Blick auf den vorstehenden Abschnitt (Uebertragung) werfen. Dieser Zeitraum ist darin genau festgelegt.

In dieser Jahre (1928) wurden 28 abzuweidende Kälber (etwa 1 Jahre alt) nach der folgenden Methode schutzgeimpft. Ausser 3 Kälbern, welche an dieser Seuche sehr leicht erkrankten, sind alle übrigen Kälber auf der Weide ganz gesund geblieben, während 20 Kälber, welche als Kontrolle nicht schutzgeimpft worden waren, ohne Ausnahme an dieser Seuche erkrankten, und bei 8 von ihnen die Krankheit sehr schwer war. Hiermit sei die folgende Methode der Impftechnik als beste für die Praxis empfohlen :

Als Impfstoff muss man das Blut der Drosselader von Kälbern, die eine künstlich hervorgerufene Mischinfektion bestanden hatten, sorgfältig aseptisch entnehmen und sofort defibrinieren. Das frisch entnommene Blut ist zweifellos am zweckmässigsten. Für die Impfdosis genügen gewöhnlich 10 cc solches Blutes. Als Impfort ist die Subkutis des Halses zu erwählen. Die geimpften Tiere sind mindestens 2–3 Monate lang im Stall zu halten, bevor sie auf die Weide getrieben werden.

Behandlung.

Trypanblau und Chinin wurden aus chemotherapeutischen Gründen erwählt, und viele kranke Rinder damit behandelt. (Kasuistik, Uebertragung.)

Trotzdem es als ein sehr zweckmässiges Heilmittel gegen Piroplasmose im Anslande (Texasfieber, Europäische Hämoglobinurie der Rinder usw.) empfohlen worden ist, nach meiner Untersuchung hat Trypanblau keine Wirkung gegen diese Piroplasmose in Hokkaido ausser einer mässigen Temperatursteigerung.

Chinin hat ebenfalls keine chemotherapeutische Wirkung, sondern symptomatische Wirkung, namentlich aber eine fieberstillende Wirkung.

Vor der symptomatischen Behandlung ist Ruhe am wichtigsten.

Zusammenfassung.

1. Als Erreger der Rinderpiroplasmose in diesem Gebiete sind 2 Arten des Piroplasmas, nämlich eine grosse, Bigeminum ähnliche und eine kleine, Mutans ähnliche, zu erkennen.

2. Die Mischinfektion dieser beiden Arten kann etwa die eine Hälfte der infizierten Rinder mit charakteristischen Symptomen mindestens ohne besondere Bedingung befallen, während die Reininfektion der kleinen erst mit besonderer Bedingung (Abweidung, Gebären, Transportation usw.) befallen kann. Die durch diese Misch- und Reininfektion verursachten Krankheiten machen fast keinen Unterschied.

3. Unten dem Mikroskope zeigt sich die kleine Art immer im peripheren Blute der infizierten Rinder, die grosse dagegen nur selten. Für die Bestimmung der Grosspiroplasmeninfektion ist somit der Uebertragungsversuch die sicherste Methode.

4. Die Krankheit oder die Mischinfektion der beiden zu bestehen gibt den Rindern eine gewisse Immunität, die Reininfektion der kleinen selbst gibt aber keine.

5. Die künstliche Mischinfektion mit besonderer Berücksichtigung ist als Schutzimpfung gegen diese Krankheit in diesem verseuchten Gebiete zu brauchen.

6. Die charakteristischen Symptome dieser Krankheit sind folgende: Mattigkeit, Anämie, Gelbsucht, Hämoglobinurie und Abnormale erythrozyten in Peripherblute. Von allem spielt die letzte die Hauptrolle, diese Krankheit zu diagnostizieren.

7. Die wichtigste Sektionsbefunde sind: Milz: Vergrösserung infolge Ueberfüllung mit Blut, ausstrichbare Pulpa (häufig weich

zerfliessend in subakuten Fällen). Leber : Stark Gallenstauung, parenchymatöse Degeneration. Niere : Parenchymatöse Degeneration und Hämosiderose (besonders in den gewundenen Harnkanälchen. Lunge : Oedem (mitunter). Ausserdem in fast allen Organen Oedem, Gelbsucht und Hämosiderose.

8. Trypanblau (Cassella, Höchst) gibt keine besondere (chemotherapeutische) Wirkung gegen diese Piroplasmose.

Der Autor hat viele Mitteilungen über Rinderpiroplasmose studiert und auch die Blut- und Organausstrichpräparate von *Piroplasma bigemium*, *mutans* und *parvum*, die Sir A. Theiler, Herrn Prof. Dr. Ch. Kohanawa gegeben hatte, und die Blutausstrichpräparate von *P. bovis*, die P. Iwanoff (Kharkov) dem Autor freundlich geschenkt hatte, genau untersucht. Von diesen Präparaten zeigen einige Abnormalerythrozyten aufweisende Präparate ziele Kleinpiroplasmen (*P. mutans*), aber die Grosspiroplasmen (*P. bigemium* oder *P. bovis*) nur gering oder gar nicht. Morphologisch ist das Grosspiroplasma in dieser Gegend dem *Piroplasma bigeminum* oder *Piroplasma bovis* und das Kleine dem *Piroplasma mutans* sehr ähnlich. Durch diese vergleichenden Untersuchungen wurde folgende Annahme vom Autor gewonnen: Es kann möglich sein, dass die Kleinpiroplasmen und die Grosspiroplasmen (ausschliesslich des *P. parvum*) die gemeinschaftlichen Erreger einer über verschiedene Länder verbreiteten Piroplasmose sind, die in ihren Symptomen verschiedene Variationen zeigen, mit anderen Worten, es müssen die Rinderpiroplasmen ausser dem Küstenfieber in verschiedenen Ländern für gleich gehalten werden.

Zum Schlusse spreche ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. K. Kasai, für seine jederzeit freundliche Belehrung und Unterstützung meinen besten Dank aus. Herrn Prof. Dr. K. Ichikawa danke ich herzlich für seine wertvollen Ratschläge. Den Herren Prof. Dr. S. Takamatsu, R. Kurosawa, Ch. Kohanawa und P. Iwanoff, bin ich für die freundlich Erlaubnis, das Material für diese Krankheiten benutzen zu dürfen, zu grossem Danke verpflichtet.

Literatur.

1. Babes, V. (1889): Die Aetiologie der seuchenhaften Hämoglobinurie des Rindes. *Virchows Arch. Path. Anat.*, CXV, 81.
2. Dodd, S. (1910): Piroplasmosis of cattle in Queensland. *J. Comp. Path. and Ther.*, XXIII, 141.
3. " (1913): Anaplasms or Jolly bodies? *Ibid.*, XXVI, 97.
4. Doyle, T. M. (1924): The occurrence of blue bodies as a developmental stage of Theileria mutans. *Ibid.*, XXXVII, 18.
5. Dschunkowsky, E. und Luhs, J. (1904): Die Piroplasmosen der Rinder. *Centralbl. Bakt. etc.*, I, Orig., XXXV, 486.
6. França, C. (1913): Quelques considerations sur le genre Theileria et description d'une nouvelle espèce de ce genre (Theileria Stordii). *Ibid.*, LXVII, 171.
7. Gonder, R. (1911): Die Entwicklung von Theileria parva, dem Erreger dem Küstenfiebers der Rinder in Afrika. *Arch. Protist.*, XXI, 143 u. XXII, 170.
8. " (1911): Theileia parva und Babesia mutans, Küstenfieberparasit und Pseudoküstenfieberparasit. *Ibid.*, XXI, 222.
9. Goodall, A. (1914): The trypanblue treatment in piroplasmosis of domesticated animals in South Africa. *Parasit.*, VII, 62.
10. Hatono, M., Ito, Ts. und Goto, S. (1911): Ueber die Rinderbabesiose. (Die Beschreibung im Japanischen.) *Saikingakuzasshi*, Nr. 188, 393.
11. Inoba, K. (1925): Die Rinderbabesia in Chosen. (Japanisch.) *Chuojuikaizasshi*, XXXVIII, 13.
12. Izeki, K. (1924): Ueber die in einer hochgelegenen Gegend von Kyushu heimische, fieberhafte Rinderpiroplasmose. (Japanisch.) Die Berichte für Pathologie der medizinischen Hochschule zu Aichi, I, Nr. 3, 1.
13. Knuth, P. (1912): Erwiderung auf den Artikel des Herrn Prof. Dr. Miessner "Die Milzruptur bezw. perakute Form der Hämoglobinurie des Rindes". *Centralbl. Bakt. etc.*, I, Orig., LXI, 557.
14. Koch, R. (1904): Vorläufiger-Dritter Bericht über das Rhodesische Rotwasser oder "Afrikanische Küstenfieber." *Arch. wiss. u. prakt. Tierh.*, XXX, 281—319. Vierter Bericht. *Ibid.*, 586.
15. " (1905): Vorläufige Mitteilungen über die Ergebnisse einer Forschungsreise nach Ostafrika. *D. med. Woch.*, XXI, 1865.
16. " (1906): Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Piroplasmosen. *Z. Hyg. u. Infekt.*, LIV, 1.
17. Kohanawa, Ch. and Ogura, K. (1925): On a prioplasmosis-like disease of cattle in Sapporo and its neighbourhood. *J. Jap. Soc. Vet. Sci.*, IV, 301.
18. Koizumi, M. (1911): Studien über die Rinderbabesia in Taiwan Vorläufige Mitteilung. (Japanisch.) *Saikingakuzasshi*, Nr. 188, 427.
19. " (1912): On the nature of the "marginal point" occurring in the blood corpuscles of cattle. *Centralbl. Bakt. etc.*, I, Orig., LXV, 337.
20. Kossel, H. und Weber (1900): Ueber die Hämoglobinurie der Rinder in Finnland. *Arb. Kaiserl. Gesundheitsamte*, XVII, 460.
21. Kossel, H., Weber, A., Schütz und Miessner (1904): Ueber die Hämoglobinurie der Rinder in Deutschland. *Ibid.*, XX, 1.
22. Krebs (1883): Beobachtungen über das Blutharnen beim Rinde. *Arch. wiss. u.*

- prakt. Tierh.* IX, 216.
23. Mayer, M. (1910): Ueber das Ostafrikanische Küstenfieber der Rinder. *Arch. Schiffs-u. Tropenhyg.*, XIV, *Beihefte*, 301.
 24. M'Fadyean, J. and Stockman, S. (1911): A new species of piroplasm found in the blood of British cattle. *J. Comp. Path. and Ther.*, XXIV, 340.
 25. Miessner, H. (1911): Die Milzruptur bzw. parakute Form der Hämoglobtunurie des Rindes. Vorläufige Mitteilung. *Centralbl. Bakt. etc.* I, *Orig.*, LX, 246.
 26. " (1912): Die Milzruptur des Rindes bzw. perakute Form der Hämoglobinurie des Rindes. *Ibid.*, LXII, 471.
 27. Migita, H. (1917): Ueber die Zeckenfieber der Rinder in Japan. (Japanisch.) *Chuojuikaizasshi*, XXX, 736.
 28. Migita, H. und Kondo, Sh. (1914): Ueber die im Jahre 1914 in einer Gegend von Oita epidemisch auftretende Rinderseuche. (Japanisch.) VIII. Bericht der Regierungsinstitut für Tierseuchen, S. 714.
 29. Miyajima, M. und Shibayama, G. (1906): Ueber das in Japan beobachtete Rinderpiroplasma. *Z. Hyg. u. Infekt.*, LIV, 186.
 30. Nicolle, M. et Adil-Bey (1899): Première note sur la malaria des bovidés. *Ann. Inst. Past.*, XIII, 336.
 31. Nuttall, G. H. F. (1909): Note on the mode of multiplication of *Piroplasma bovis* as observed in the living parasite. *Parasit.*, II, 341.
 32. Nuttall, G. H. F., Fantham, H. B. and Porter, A. (1909): Observations on *Theileria parva*, the parasite of East Coast Fever of Cattle. *Ibid.*, 325.
 33. Nuttall, G. H. F. and Hadwen, S. (1909): The drug treatment of piroplasmosis in cattle. *Ibid.*, 236.
 34. Ogura, K. and Takada, K. (1927): The ticks parasitic on cattle and horses in Hokkaido, Japan. *J. Coll. Agri., Hokkaido Imp. Univ.*, XVIII, 199.
 35. Ollwig, H. (1909): Diskussion über das Küstenfieber. *Centralbl. Bakt. etc.*, I, Ref., 42, *95. (2. Tagung der Freien Vereinigung für Mikrobiologie in Berlin 1908).
 36. Shein, H. (1907): Hématozoaires des bovidés en Indo-Chine. *Ann. Inst. Past.*, XXI, 659.
 37. " (1908): Obserbation sur la piroplasmose des bovidés d'Indo-Chine et constatation de piroplasmose chez des buffles. *Ibid.*, XXII, 1005.
 38. Schmidt, A. (1903): Die Zeckenkrankheit der Rinder-Haemoglobinaemia ixodioplasmatica boum- in Deutsch-, Englisch-Ostafrika und Uganda. *Arch. wiss. u. prakt. Tierh.*, XXX, 42.
 39. Sergeant, Ed. (1921): Étude morphologique du *Piroplasma* (*Gonderia*) mutans du boeuf. *Ann. Inst. Past.*, XXXV, 193.
 40. Sergeant, Ed., Donatien, A., Parrot, L., Lestoquard, F., Plantureux, E. et Rougebief, H. (1924): Études expérimentales sur les piroplasmoses bovines d'Algérie. *Ibid.*, XXXVIII, 273.
 41. Shibayama, G. und Miyajima, M. (1905): Ueber das zum erstenmal in Japan beobachtete Rinderpiroplasma. Vorläufige Mitteilung. (Japanisch.) *Saikinga-kuzasshi*, Nr. 114, 293.
 42. Smith, Th. and Kilborne, F. L.: Investigations into the nature, causation and prevention of Southern Cattle Fever. 8. and 9. *Annual Reports of the Bureau*

- of *Animal Industry* for 1891 and 1892. p. 177.
43. Strarcovici, C. (1893): Bemerkungen über den durch Babes entdeckten Blutparasiten und die durch denselben hervorgebrachten Krankheiten, die seuchenhafte Hämoglobinurie des Rindes (Babes), das Texasfieber (Th. Smith) und der Carzeag der Schafe (Babes). *Centralbl. Bakt. etc.*, I, XIV, 1.
 44. Stiles, Ch. W. (1895): Bemerkung über Parasiten.-XXXIX. *Ibid*, I, XVIII, 282.
 45. Stockman, S. (1909): The treatment of redwater in cattle (bovine piroplasmosis) with trypanblue. *J. Comp. Path. and Ther.*, XXII, 321.
 46. Stockman, S. and Wragg, W. G. (1914): Cross immunization with *Piroplasma bigeminum* and *piroplasma divergens*. *Ibid*. XXVII, 151.
 47. Tokishige, H. (1909): Der Versuchsbericht der Rinderepidemien in Kumamoto. (Japanisch.) *Tokishige (Dr. med. vet.) Rombunshu* (Die Arbeitssammlung), S. 347. (1918).
 48. Vrijburg, A. (1913): Einige Untersuchungen über *Babesia bigemina*. *Z. Infekt. Parasit. Hyg. d. Haustiere*, XIII, 180.
 49. Wandolleck, B. (1895): *Pyrosoma bigeminum*. *Centralbl. Bakt. etc.*, XVII, 554.
 50. Weisser und Maassen, A. (1895): Zur Aetiologie des Texasfiebers. *Arb. Kaiserl. Gesundheitsamte*, XI, 411.

ERKLÄRUNG DES ABBILDUNGEN.

- Fig. 1, 4. Das grosse Piroplasma (Tier-Nr. 81). Vergrößerung 1300, 700.
 Fig. 2, 5. Das kleine Piroplasma (Tier-Nr. 89). Vergrößerung 1300, 700.
 Fig. 3. Niere, Berliner Blaureaktion (Tier-Nr. 64). Vergrößerung 300.
 Fig. 6. Niere (Tier-Nr. 64). Vergrößerung 120.
 Fig. 7. Leber (Tier-Nr. 86). Vergrößerung 120.
 Fig. 8. Leber (Tier-Nr. 64). Vergrößerung 120.
 Fig. 9. Lunge (Tier-Nr. 85). Vergrößerung 120.

北海道ニ於ケル牛ノびろぶらずま 症ニ就キテ

小 倉 喜 佐 次 郎

(北海道帝國大學農學部家畜衛生學教室 主任葛西教授)

(昭和4年2月4日受付)

著者ハ數年來本症ニツキテ研究シ次ノ如キ結果ヲ得タリ

1. 北海道ニ於ケルびろぶらずま症ノ原因トシテハ2種ノ *Piroplasma* ヲ認メザルベカラズ而シテソノ一ハ大形ニシテ *P. bigemi-*

num ニ酷似シ他ハ小形ニシテ *P. mutans* ニ類似ス

2. 該兩種ノ混合感染ハヨク畜牛ヲシテ本症ノ特徴的症候ヲ發セシムルモ小形種ノ純粹感染ハ放牧、分娩等ノ誘因ヲ俟ツテ初メテ發症セシムルモノナリ大形種ヲ小形種ヨリ分離スルコト不可能ニシテ大形種ノ純粹感染ヲ生ゼシムルコト能ハズ

3. 小形種ハ感染牛ノ流血中ニ一度現出スレバ爾後常ニ鏡檢ニヨリ檢出シ得ベキモ大形種ハ反之一旦現出スルモ臆テ消失シ爾後其證明極メテ困難ナリ大形種ノ感染確定ニハ接種試驗ニ依ルヲ最良トス

4. 本症ニ罹病スルカ或ハ發症スルニ至ラザルモ該兩種ノ混合感染ヲ受クル時ハソノ耐過後ニ於テ該牛ニ本症ニ對スル一定ノ免疫性ヲ附與ス但シ小形種ノミノ感染ヲ蒙リ而モ發病セザル際ハ該免疫ヲ獲得セズ

5. 一定ノ注意ヲ以テ行ハレタル兩種ノ混合接種ハ有毒地方ノ畜牛ニ對シ豫防接種トシテ用フルコトヲ得ベシ

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 9.

Fig. 8.

Fig. 7.