鼠咬症すびろへーてノ藥品耐性 ニ關スル研究

I 蒼鉛耐性ニ就テ

赤 澤 笹 雄

(朝鮮總督府獸疫血清製造所寄生虫部 主任：葛西博士)

(昭和4年5月6日受附)

内 容 目 次

緒 言

- I. Bi耐性ノ成立並ニソノ遺傳
- II. 毒力ヨリ見タル耐性種及原種間ノ比較
- III. 化學療法生物學上ヨリ見タル耐性種及原種間ノ比較
- IV. 總 括
文 献

緒 言

1904 年 Ehrlich 及志賀⁽¹⁾ ガとりばん赤ヲ以テ *Trypanosoma equinum* 感染まうすノ滅芽療法ヲ試ミタルハ實ニ化學療法ノ出發點ニシテ又同時ニ寄生病原體ノ藥品耐性ニ關スル實驗的研究ノ動機トナリタルモノナリ

乃チ Ehrlich⁽²⁾ ハ Franke, Röhl 及 Browning^(3, 4) ト共ニ *Trypanosoma brucei* ヲ以テばらふくしん、とりばん赤、とりばん青及あさきしいーるノ耐性種製造ニ成功シ之ヲ以テ藥品耐性ニ關スル根本的研究ヲ開始セリ

次デとりばのぞーまと多クノ類似點ヲ有スルすびろへーてニ於テ Gonder⁽⁵⁾ ハさるわるさん耐性成立ノ可能ヲ認メ更ニ赤津及野口⁽⁶⁾ ハ *Treponema pallidum*, *Tr. microdentium* 及 *Sp. refringens* ノ純培養ヲ用ヒ試験管内ニ於テ亦此等すびろへーてノ砒素、水銀及沃度耐性ヲ證明セリ

著者⁽⁷⁾ ハ大正 15 年以降鼠咬症すびろへーて感染動物ニ對スル

化學療法ノ試験中、偶々鼯系すびろへてニ於テ比較的容易ニ蒼鉛耐性種ノ成立スルヲ認メ續イテ人系すびろへてニ於テモ同一事實ヲ證明シ得タリ是ニ於テ著者ハ該 Bi 耐性鼯系すびろへてヲ以テ毒力並ニ化學療法生物學ノ兩方面ヨリ之ヲ原種ト比較。蒼鉛耐性ニ依テ生ズル生物學的變化ヲ探及セント欲シ本試験ニ着手セリ以下著者ノ今日迄ニ得タル實驗成績ヲ簡單ニ記載スルコト、ス

I Bi 耐性ノ成立並ニソノ遺傳

鼠咬症すびろへてハ蒼鉛劑ノ體內消毒ニ對シ元來著シキ抵抗性ヲ有スルモノニシテ例ヘバ感染まうすニねをどれぼ一ノ大量 $[0.5 \text{ c.c.}]_{\text{Ms}}^{20 \text{ g}}$ (まうす體重 20 g. ニ對シ皮下注射ニヨリ 0.5 c.c.) ヲ注射スルモ注射後僅ニ數日間末梢流血中ヨリすびろへてノ消失ヲ見ルニ過ギズ從ツテ本すびろへてノねをどれぼ一ノ耐性種ヲ得ルハ必ズシモ困難ナラザルヲ想像シ得ルモノナリ

余ハ鼯系すびろへて感染まうすニねをどれぼ一 (Laboratoire Chenal & Douilhet, Paris) ノ 0.5 c.c. ヲ注射シ再發毎ニ注射 (皮下或ハ筋肉内) ヲ反覆シタルニ大正 15 年 11 月 4 日ヨリ昭和 2 年 3 月 3 日ニ至ル 119 日間, 5 回, 總量 2.75 c.c. ノ本劑注射ヲ受ケタル 1 頭ニ於テ爾後ノ注射ニ對シ耐性ヲ示スヲ見タリ亦人系すびろへて感染まうすニ本劑ノ $[0.3 \text{ c.c.}]_{\text{Ms}}^{20 \text{ g}}$ ズ、ヲ反覆注射シタル 1 例ニ於テモ昭和 2 年 4 月 15 日ヨリ 9 月 22 日ニ至ル 160 日間, 7 回, 總量 2.3 c.c. ノ本劑注射後 0.5 c.c. ノ增量ヲ以テスルモ最早流血中ノすびろへて出現ニ何等ノ影響ヲ及ボサザルニ至レリ

余ハ上述ねをどれぼ一ノ耐性鼯系すびろへてヲ用ヒ先ヅソノ耐性ノ單ニねをどれぼ一ニノミ限ラル、モノナリヤ或ハ各種蒼鉛劑ニ對シ共通スルモノナリヤヲ試験セント欲シねをどれぼ一ノ外みゆたのーる (Laboratoire du Muthanol, Paris) 及かすびす

(Cassella) を以テ感染まうすノ治療試験を試ミタリソノ成績第 1
表ニ於ケルガ如シ

第 1 表

注射藥品 及 注射量	すびろ へーて	ま う す 番 號	血 液 檢 査 成 績																
			注 射 前			注 射 後													
3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
れをされ ぼーる 0.5 c.c.	耐性種	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	原 種	4	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		5	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+		
		6	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+		
みゆたの ーる 0.5 c.c.	耐性種	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	原 種	10	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+		
		11	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+		
		12	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+		
かすびす 0.5 c.c.	耐性種	13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		14	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		15	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	原 種	16	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		17	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		18	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

(備考) 上表(一)ハ暗視野装置(Leitz, Ocul. 4 x Obj. 1/12)ヲ以テ100視野ヲ
検査シすびろへーてヲ見ザルモノ(+)ハ1—9個(++)ハ10個以上毎視野1個
迄ノすびろへーてヲ證明シタルモノナリ

上表ノ成績ニヨリ考フルニ本ねをどれぼーる耐性種ハ亦同時ニ
他ノ蒼鉛劑みゆたのーる及かすびすニ對シテモ耐性ヲ示スモノナ
ルコト明カナリ乃チ本耐性ハ3種蒼鉛劑ニ共通ナルガ故ニ余ハ本
耐性種ヲ以テ Bi 耐性種ト見倣サント欲スルモノナリ

次ニ本すびろへーてニ於ケル該 Bi 耐性種ハ如何ナル程度ニ固

定セラレ如何ナル程度ノ遺傳力ヲ有スルモノナリヤヲ知ラザルベカラズ既ニ Ehrlich⁽²⁾ ハあどきしーる耐性 *Trypanosoma brucei* ノ 1 系ニ於テまうす體通過 103 代其經過期間約 10 ケ月ニ及ビテ猶ホ其ノ耐性ヲ完全ニ保持スルヲ認メタリ余モ該 Bi 耐性種ヲ以テまうす體通過ヲ試ミ 5—10 代毎ニねをどれぼーる (0.5 c.c.) ヲ注射シ耐性ノ存續如何ヲ觀察シツ、50 代ニ及ビタルニ第 2 表ノ如キ成績ヲ得タリ

第 2 表

通 過 代 數	通 過 日 次	ま う す 番 號	血 液 檢 査 成 績									
			注 射 前			注 射 後						
			3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
I	25/IV 1927	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
V	4/VII "	4	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
		5	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
		6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
X	7/IX "	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		8	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
		9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
XV	29/XI "	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
XX	14/II 1928	13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		14	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		15	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
XXV	4/V "	16	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		17	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		18	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
XXX	30/VI "	19	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+
		20	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
		21	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+

XL	24/X "	22	卅 卅 卅	卅 + + + 卅 卅 卅
		23	卅 卅 卅	卅 + - + + 卅 卅
		24	卅 卅 卅	卅 + + + + 卅 卅
L	13/II 1929	25	卅 卅 卅	卅 卅 卅 卅 卅 卅 卅
		26	卅 卅 卅	卅 卅 卅 卅 卅 卅 卅
		27	卅 卅 卅	卅 卅 卅 卅 卅 卅 卅

(備考) 上表まうす 15 號ハ藥品注射後第 10 日目ニ於テ血中すびろへてノ出現ヲ見タリ

乃チ本耐性ハ耐性種ノまうす體通過 50 代其間約 2 ケ年(昭和 2 年 4 月 25 日—昭和 4 年 2 月 13 日)ヲ經過スルモ猶ホ能ク遺傳セラル、モノナルコトヲ認メ得タリ

更ニ斯ノ如キ Bi 耐性すびろへてハまうす以外ノ動物體感染ニ於テモ其ノ耐性ヲ保持スルモノナリヤ否ヤヲ知ラント欲シらつてヲ用ヒテ第 3 表ノ試験ヲ行ヒタリ

第 3 表

すびろ へて	藥 品 及 注 射 量	らつて 番 號	血 液 檢 査 成 績									
			注 射 前			注 射 後						
			3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
耐性種	ねむされぼーる 2c.c.	1	卅	卅	卅	卅	+	卅	卅	卅	卅	+
		2	+	卅	卅	卅	+	+	+	+	-	-
		3	卅	卅	卅	卅	+	卅	卅	卅	卅	+
	對 照	4	卅	+	卅	卅	卅	卅	+	+	+	+
		5	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	-	-	+
原 種	ねむされぼーる 2c.c.	6	+	卅	卅	-	-	-	-	-	+	
		7	+	+	+	-	-	-	-	+		
		8	卅	卅	卅	+	-	-	-	-	-	+
	對 照	9	卅	+	+	+	+	+	+	-	+	+
		10	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+

(備考) 上表(+)ハ斃死ヲ示ス

乃チまうす體感染ニ於ケル鼠咬症すびろへてノ蒼鉛耐性ハ耐性種ヲらつて體ニ移植スルモ完全ニソノ耐性ヲ保持スルモノナル

コトヲ知レリスノ如キ事實ハまうすニ於ケルあときし一耐性とりばのぞーまがらつてニ移植セラレ其ノ耐性ヲ消失スル Mesnil 及 Brimont⁽⁸⁾ ノ成績ト相反スルモノナリ

然ラバ本耐性ハ何等カ適當ナル處置ヲ加フルコトニヨリ之ヲ容易ニ消失シ得ルモノナリヤ既ニ Bilfinger⁽⁹⁾ ハひにん不感性トナレルまらりや病源體ヲさるわるさん療法ニヨリテ再びひにん感性ニ還元シ得ルヲ認メ Morgenroth^(10,11) ハあんちもに一耐性とりばのぞーまヲあるざつえちんニヨリ又ひにん耐性種ヲさるわるさん或ハ吐酒石ヲ以テ處置シソノ不感性ヲ消失シ得ルコトヲ實驗的ニ證明セリ

是ニ於テ余ハ本耐性種感染まうすニねをさるわるさん (1:1000—5回, 1:750—2回, 1:700—8回) 銀さるわるさん(同上)げるまにん (1:200), どりばふらがん (1:4000) 及ばらふくしん (1:500)ヲ應用シ再發ノ都度同一藥品ノ注射ヲ反覆シ5回注射經過毎ニ再發まうすノ血液ヲ健常まうすニ移植シソノ流血中ニ多數すびろへーテノ出現スルヲ俟チテねをされば一之ニ注射シ耐性ノ存否強弱ヲ檢セリ其ノ成績第4表ノ如シ

乃チ Bi 耐性種感染まうすニ反覆ねをさるわるさんヲ注射スレバ漸次耐性減退シ 10回應用後著シク原種ニ接近スルヲ知レリ又銀さるわるさん及げるまにん應用ノ際ハ5回注射後一見稍々著明ナル耐性ノ低下ヲ見タルモ 10回注射後ニハ却テ耐性復活ノ傾向ヲ呈セリ但シどりばふらがん及ばらふくしんハ何等ノ影響ヲ之ニ與ヘズ

II 毒力ヨリ見タル耐性種及原種間ノ比較

Bi耐性種ト原種トヲ夫々まうす、らつて及もるもつとニ接種シソノ感染狀態ヲ精査シ兩種すびろへーて間ニ於ケル毒力ノ強弱ヲ比較セリ

第 4 表

薬品 注射 回数	ねんさるるさん (1:1000-1:700)							銀さるるさん (1:1000-1:700)							げるまにん (1:200)							とりばふらぶらん (1:1000)							ばらふくしん (1:500)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	まうす 番 號			薬品注射後の血液 検査成績				まうす 番 號			薬品注射後の血液 検査成績				まうす 番 號			薬品注射後の血液 検査成績				まうす 番 號			薬品注射後の血液 検査成績				まうす 番 號			薬品注射後の血液 検査成績																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I	1	+	+	+	+	+	+	13	+	+	+	+	+	+	25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	34	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2	+	+	+	+	+	+	14	+	+	+	+	+	+	26	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	35	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3	+	+	+	+	+	+	15	+	+	+	+	+	+	27	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	36	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
V	4	+	+	+	+	+	+	16	+	+	+	+	+	+	28	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	37	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

(備 考) 上表藥品注射量 1:1000 ハ [0.001]^{20g}_{MS} 即チまうす體重 20g ニ對シ皮下注射ニヨリ 0.001 g

ノ應用ヲ意味ス

まうす及らつてハ兩種すびろへてニ對シ各々 5 頭づ、ヲ用ヒ使用まうすハ體重 20 g. 内外らつてハ 110 g. 内外ノモノヲ選ベリ接種血液ハ感染 2 週間目ノまうすノ心臟ヨリ之ヲ採取シ耐性種及原種ノ兩者ニ於テ各々含有すびろへて數ヲ 100 視野約 1 個ノ割合ト爲シツノ 0.3 c.c. ツ、ヲ腹腔内ニ接種セリ此等兩種動物ニ於ケル耐性種及原種ノ感染狀態即チツノ潜伏期日數ヲ第 5 表ニ示セリ

第 5 表

試 驗 動 物	すびろへて	動物番號	潜伏日數
ま う す	耐 性 種	1	4
		2	4
		3	3
		4	5
		5	6
	原 種	6	3
		7	<1
		8	3
		9	4
		10	4
ら つ て	耐 性 種	1	5
		2	5
		3	3
		4	3
		5	5
	原 種	6	3
		7	3
		8	2
		9	5
		10	5

(備考) 上表(<1)ハ接種翌日既ニすびろへてノ血中ニ證明セラレタルモノナリ

上表ノ成績ニ徴スルニまうす及らつてニ於テハ耐性種感染ノ原種ニ比シテツノ潜伏期稍々遅延セラル、傾向アルモ著シキ差ヲ認メズ換言スレバ耐性種及原種間ニ於テ兩種動物ニ對スル毒力ノ差ヲ明瞭ニ證明スルコト能ハズ

もるもつとニ於テハ 2 回試験ヲ反覆セリ第 1 回試験ニ於テハ兩種すびろへてニ對シ夫々體重 600 g. 内外ノ牡 3 頭づ、ヲ選用セリ又接種材料トシテハ感染 2 週間ヲ經過シ流血中ニ多數すびろへてノ出現スルニ至リタルまうすノ全心血ヲ採取シ之ヲ 1 頭づ、ノもるもつとニ接種セリ第 2 回ノ試験モ第 1 回ト略ボ同一ノ注意ヲ以テ行ハル第 1 回ノ試験ニ於テ原種ヲ接種シタル 3 頭ノもるもつとハ何レモ定型的ノ感染ヲ蒙

リ死ノ轉歸ヲトリタルモ耐性種ヲ接種シタル3頭ニ於テハ1例ノ斃死ヲ免カレ而モ血中ニすびろへてノ出現セザルモノヲ目撃セリ該例ハ感染第2週前後ニ發熱ヲ示シタル外爾後何等ノ症狀ヲ呈セズ又血中ニ鏡檢上すびろへてヲ證明スルコトナク且ツ血液ノまうす接種ヲ3回(接種後42日、56日、及70日)反覆シタルモ常ニ陰性ヲ呈セリ但シ第2回試驗ニ於テハ耐性種並ニ原種接種もるもつと共ニ何レモ能ク感染シ而モ相互ニ何等症狀ノ差ヲ認ムルコト能ハズシテ了レリ

要スルニ耐性種接種もるもつとニ於テハ6例中1例ニ不發性感染ヲ見タルモ之ヲ以テ直ニ本 Bi 耐性種ハ之ヲ原種ニ比シテもるもつとニ對スル毒力ノ低下ヲ來シタルモノト見做スコト能ハザルナリ

斯ノ如クシテ健常まうす、らつて及もるもつとヲ使用シタル範圍ニ於テハ耐性種ト原種トノ間ニ殆ド毒力ノ差ヲ認ムルコト能ハザルモ豫メ試験動物ニ網狀織内被細胞系ノ除去填塞ヲ行ヒ兩種すびろへてヲ接種セバ或ハ耐性種ト原種トノ間ニ多少毒力ノ差ヲ認ムルコトナキヤヲ想起シ先づ6頭ノまうす第1群ニ脾臓摘出ト共ニ加糖酸化鐵注射ヲ行ヒ第2群ノ6頭ニ脾臓摘出第3群ノ6頭ニ加糖酸加鐵注射ノミヲ施シ更ニ第4群ノ6頭ヲバ對照トシテ何等ノ前處置ヲ加フルコトナク斯シテ各群ニ於テソノ半數即チ3頭ヅ、ニ夫々耐性種ト原種トヲ接種セリ耐性種及原種感減まうすノ各例ニ於テすびろへてノ末梢血液中ニ出現スル狀態ヲ第6表ニ記載ス

第 6 表

脾摘日	臓出次	糖注日	鐵射次	接日	種次	耐性種				原種			
						ま番	うす號	潜日	伏數	ま番	うす號	潜日	伏數
1/VI '28	8/VI '28	8/VI '28				1			3	13			3
						2			4	14			4
						3			5	15			6
"	—	"				4			4	16			4
						5			5	17			4
						6			4	18			2
—	8/VI '28	"				7			6	19			4
						8			5	20			>3
						9			6	21			4

—	—	"	10	5	22	4
			11	6	23	4
			12	6	24	2

(備考) 加糖酸化鐵ハ Iron Oxide Saccharated "Merck" ニシテ滅菌生理的食鹽水ヲ以テ 20 % 溶液ト爲シまうす體重 20 g. ニツキ 0.5 c.c., ナ尾靜脈内ニ注射セリ

上述ノ試験成績ニ徴スルニ原種接種まうすニ於テハ脾臟摘出又ハ填塞ノ有無ニ拘ラズ感染まうす潜伏期間ニ殆ド差ヲ認ムルコト能ハザルモ耐性種接種例ニ於テハ脾臟摘出ト同時ニ加糖酸化鐵注射ヲ施シタルモノ及單ニ脾臟摘出ノミヲ行ヒタルモノハ之ヲ對照及單ニ加糖化酸鐵注射ノミヲ施シタルモノヨリ潜伏期ノ短縮セラル、傾向アリ換言スレバ耐性種ハ健常まうすニ比シ脾臟摘出まうすニ對シテ一見感染力ノ微ニ増大スル感アリ斯ノ如キ所見ハ赤澤⁽⁷⁾ガ脾臟抽出らつてニ弱毒ノ野鼠系 *Spirochaeta laverani* ヲ感染セシメタル際ノ成績ト一致ス但シ加糖酸化鐵注射ニ依ル填塞ノミニテハ耐性種感染ニ於テモ何等ノ影響ヲ蒙ラザルガ如シ

次ニ加糖酸化鐵ニ代ユルニ墨汁ヲ以テ同一試験ヲ反覆シタルニ第7表ニ示スガ如ク耐性種感染ニ於テ再ビ脾臟摘出まうすノ潜伏期間稍々短縮セラレタル觀アリ

第 7 表

脾 摘 日	臟 出 次	糖 注 日	鐵 射 次	接 種 日	種 次	耐 性 種			原 種		
						ま 番	う す 號	潜 日	ま 番	う す 號	潜 日
10/IX '28	17/IX '28	17/IX '28	17/IX '28	17/IX '28	17/IX '28	1	4		13		2
						2	3		14		—
						3	3		15		—
"	—	"	"	"	"	4	2		16		3
						5	2		17		2
						6	2		18		—

—	17/IX '28	"	7	4	19	4
			8	5	20	2
			9	3	21	4
—	—	"	10	4	22	2
			11	4	23	<1
			12	3	24	3

- (備考) 1. 墨汁ハ其質ノ唐墨ヲ硯磨シ生理的食鹽水ヲ以テ約2%トシテ滅菌シタルモノナリまうす體重 20 g. ニ對シテソノ 0.5 c.c. ナ静脈内ニ注入セリ
2. 潜伏日數(—)ハ潜伏期中ニ動物ノ斃死シタルモノナリ

III 化學療法生物學上ヨリ見タル耐性

種及原種間ノ比較

第1表ニ記述シタルガ如ク本 Bi 耐性種ハねををこれぼーる、みゆたのーる及かすびすノ3種蒼鉛劑ニ對シ著明ナル不感性ヲ示ス從テ蒼鉛劑ヲ作用セシムル時ハ固ヨリ容易ニ本耐性種ト原種トヲ區別シ得ルモノナリ

然ラバ此等兩種すびろへーてノ間ニ於テ異列化學療法劑ニ對スル感度ニ差ヲ認ムルコトナキヤ既ニ Mesnil⁽⁸⁾ 及 Plimmer⁽¹²⁾ ノ研究ニヨリとりばのぞーまノあときしーる耐性種ハ原種ニ比シテ異列化學藥タル吐酒石ニ對スル感受性ヲ低下スル傾向アルコト知ラレ次デ Kudicke⁽¹³⁾ ハをるとききのいざ化合物ヲ以テとりばのぞーまヲ處置スレバ容易ニ砒素耐性トナルヲ實驗シ又逆ニ Gonder⁽⁵⁾ ハ砒素耐性種ノをるとききのいざ化合物ニ對シ不感性ヲ帶ブルヲ證明セリ然ルニ一方ニ於テ最近 Lewy⁽¹⁴⁾ ハぱらふくしん耐性とりばのぞーまノ却テぶりるらんと綠及びをくたにんニ對スル感度ヲ増進スルヲ證明セリ是ニ於テ余ハげるまにん $[0.005]_{\text{Ms}}^{20\text{g}}$ 、ねををさるわるさん $[0.001]_{\text{Ms}}^{20\text{g}}$ 及銀さるわるさん $[0.001]_{\text{Ms}}^{20\text{g}}$ ヲ以テ兩種すびろへーて感染まうすノ治療ヲ試ミタリ其結果第8表ニ示スガ如シ

第 8 表

注 射 薬 品	すびろへーて	ま ち す 番 号	滅 日 芽 数
げるまにん	耐 性 種	1	6
		2	4
		3	4
	原 種	4	3
		5	3
		6	3
ねをさるわ るさん	耐 性 種	7	11
		8	13
		9	14
	原 種	10	10
		11	11
		12	9
銀さるわる さん	耐 性 種	13	13
		14	10
		15	13
	原 種	16	15
		17	10
		18	11

上表ニ依レバげるまにん並ニねをさるわるさん療法ニ於テハ原種ニ比シテ耐性種ノ再發稍々遅延スル傾向アリ換言スレバ耐性種ハ原種ヨリ此等兩種藥品ニ對シ鋭敏ナルガ如シ乃チ上述ノ成績ハ Lewy ノ成見ト類似スルモノナリ但シ銀さるわるさんは兩種すびろへーてニ對シ一見ソノ滅芽力ヲ同フス

更ニ該所見ヲ確證センガ爲メニ使用異列藥品中特ニげるまにんヲ選ビ之ヲ Bi 對性種ト原種トニ反覆作用セシメ果シテ感受性低キ原種ニ於テ容易ニげるまにん耐性ヲ證明シ得ルヤ否ヤヲ試験セリ即チげるまにんノ 0.005 g. ヲ以テ兩種すびろへーて感染まうすヲ累代治療シすびろへーて移植幾代換言スレバげるまにん治療幾回ニシテげるまにん不感ヲ招來スルモノナリヤヲ耐性種及原種ニ

第 9 表

げるまに ん注射代 數	耐 性 種								原 種									
	まうす 番 號	前日	注射後ノ血液検査成績							まうす 番 號	前日	注射後ノ血液検査成績						
			1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
L	1	+	-	-	-	-	-	+		+	-	-	-	+	+			
	2	+	-	-	-	-	+	+	+		+	-	-	-	+	+		
	3	+	-	-	-	-	+	+	-		+	-	-	-	+	+		
V	4	+	+	-	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	
	5	+	+	+	-	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	
	6	+	+	-	-	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	
X	7	+	-	-	-	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	
	8	+	-	-	-	-	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	
	9	+	-	-	-	-	-	+	+		+	+	+	+	+	+	+	

次ニけるまにん及ねをどれぼ一るノ合併療法ヲ試ミタルニ第10
表ニ見ルガ如ク Bi 耐性種ハ原種ニ比シテ無蟲期間稍々短カシ

第 19 表

す び ろ ー て	注射薬品及注射量	ま う す 番 號	薬品注射後ノ血液検査成績															
			前日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
耐	げるまにん 0.005 g.	1	卅	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	卅	+	+	+	
	+	2	卅	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	ををををを 0.5 c.c.	3	卅	—	—	—	—	—	+	+	+	+	—	+	卅	+	卅	
性	げるまにん 0.005 g.	4	卅	+	—	—	—	+	+	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	
		5	卅	+	—	+	+	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	
		6	卅	+	—	—	—	+	+	+	+	+	卅	卅	卅	卅	卅	

第 11 表

薬品注射量		もうす番號	滅芽日數	
げらふくじん	ねなるさん わるさん		耐性種	原種
1:500	1:10000	1	10	12
		2	13	9
		3	10	—
1:1000	"	4	10	8
		5	10	8
		6	10	9
1:2000	"	7	8	8
		8	7	6
		9	9	8
1:4000	"	10	7	7
		11	7	10
		12	7	8
—	"	13	8	10
		14	7	7
		15	10	6
1:500	—	16	0	0
		17	0	0
		18	0	0

第 12 表

薬品注射量		もうす番號	滅芽日數	
えちーる紫	ねなるさん わるさん		耐性種	原種
1:2000	1:1000	1	13	11
		2	12	11
		3	12	9
1:3000	"	4	13	10
		5	10	9
		6	10	8
—	"	7	7	7
		8	6	9
		9	8	8

1:2000	—	10	0	0
		12	0	0
		12	0	0

第 13 表

薬 品 注 射 量		まうす番號	滅 芽 日 數	
とりげろさん	れ ね る さ る わ る さ ん		耐 性 種	原 種
1:2000	1:1000	1	12	13
		2	16	13
		3	>16	11
1:3000	"	4	>12	8
		5	11	8
		6	—	7
—	"	7	7	7
		8	6	9
		9	8	8
1:2000	"	10	0	0
		11	0	0
		12	0	0

(備考) 上表滅芽日數 (>16) ハ藥品注射後 16 日間血液検査陰性
ニシテ翌日斃死シツノ材料チまうすニ接種スルモ感染ヲ見
ザル場合ナリ

斯克ノ如ク以上 3 表ノ試験成績ニ於テハ耐性種及原種感染ヲ通
シ毫モ干渉現象ノ出現スルヲ認ムルコト能ハズ但シ茲ニ注意ヲ要
スルコトハ耐性種感染まうすニ於テ之ヲ原種ニ比シ藥品治療後ニ
於ケル血液ノ滅芽期間稍々延長セラル、傾向ヲ見ルコトナリ乃チ
耐性種ハ原種ニ比シテ此等藥品ノ合併作用ニ對シテモ亦感受性ノ
少シク増進セラレタル觀アリ

然ルニ第 II 劑タルねをさるわるさんノ量ヲ 1:1000 ヨリ 1:500
ニ増加スル時ハ耐性種感染ノ場合ニ於テノミ一見干渉現象出現ノ
傾向ヲ認メ得ルガ如ク第 14 表ニソノ試験成績ヲ表示スベシ

第 14 表

すびろ へて	注射薬品及注射量		まうす 番號	薬品注射後4週間ニ亘ルまうす血液検査成績																						
	ばら く	ふれん じん		さる ん	前 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
耐 性 種	1:500	1:500	1	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			2	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			3	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	1:1000	"	4	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
			6	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1:2000	"	7	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			8	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			9	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1:4000	"	10	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			11	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			12	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	—	"	13	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			14	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			15	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	1:500	—	16	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			17	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			18	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
原	1:500	1:500	19	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			20	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			21	+	+																					
	1:1000	"	22	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			23	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			24	+	-	+																				
	1:2000	"	25	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			26	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			27	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1:4000	"	28	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
			29	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
			30	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	

原 種	11/IX /28	18/IX /28	18/IX /28	28/IX /28	13 14 15	16 — —
	—	—	—	—	16 17 18	— 15 —
	—	18/IX /28	—	—	19 20 21	<13 — —
	—	—	—	—	22 23 24	25 — 16
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

(備考) 滅芽日數 (<13) ハ治療後 13 日ヲ經テ始メテ血液ヲ検査シタル時既ニ
ソノ血中ニすびろへてヲ證明シタルモノナリ

該療法ニ於テ注意ヲ要スルコトハ耐性種並ニ原種感染例ヲ通シ單ニ墨汁填塞ノミヲ
施シタル感染まうす (第 7 及 19 號) ニ於テれなざるゐるさん療法ニヨル血液ノ淨芽
期間著シク短縮セラル、事實ナリ換言スレバ寄生すびろへてハ墨汁填塞ヲ行ヒタル
まうす體ニ於テれなざるゐるさんノ滅芽作用ニ對シ著シク抵抗力ヲ増進スル傾向アリ

IV. 總 括

著者等ハ鼠咬症すびろへてニ感染まうすヲ反覆ねをどれぼーる
(蒼鉛製劑)ヲ以テ處置シタルニ黼系並ニ人系すびろへてニ於テ
蒼鉛耐性種ノ成立スルヲ見タリ是ニ於テ耐性黼系すびろへてヲ
用ヒ毒力並ニ化學療法生物學ノ兩方面ヨリ之ヲ原種ト比較シ耐性
ニ依テ生ズル生物學的變化ヲ探及セント欲セリ其ノ成績ヲ總括ス
レバ次ノ如シ

1. ねをどれぼーる耐性トナリタリ鼠咬症すびろへてハ同ジ
ク蒼鉛劑タルみゆたのーる及かすびすに對シテモ亦耐性ヲ示ス即
チ該ねをどれぼーる耐性種ハ又同時ニ蒼鉛耐性種ナリ

2. 該蒼鉛耐性ハ耐性種ノまうす體通過 50 代其ノ間約 2 ケ年
ヲ經過スルモ猶ホ能クソノ性質ノ遺傳セラル、モノナルコトヲ知
レリ

3. 本耐性ハ耐性種ヲまうす體ヨリらつて體ニ移植スルモ完全ニ保持セラル

4. 該蒼鉛耐性ハ耐性種感染まうすヲ異列化學劑ヲ以テ反覆處置スル際消失スルコトアリ例ヘバねをさるわるさん (1:1000) ヲ以テスレバ 10 回應用後ニ既ニ耐性種ノ原種ニ還元スルヲ見ル又銀さるわるさん (1:1000) 及げるまにん (1:200) 應用ノ際ハ 5 回注射後ニ耐性消失ノ傾向ヲ示スモ爾後注射ヲ繼續スレバ再ビ耐性トナル但シどりばふらぬん及ばらふくしんハ何等ノ影響モ之ニ及ボスコトナシ

5. 蒼鉛耐性種ト原種トハ健常まうす、らつて及もるもつどヲ使用シタル範圍ニ於テハソノ毒力ニ殆ト差ヲ認ムルコト能ハズ然ルニ豫メ脾臟ヲ摘出シタルまうすを使用スレバ耐性種ニ於テ脾臟摘出まうす感染ノ場合對照健常まうす感染ニ比シテ稍々毒力ノ増進ヲ示ス傾向ヲ見ル

6. 加糖酸化鐵又ハ墨汁注射ニヨルまうすノ網狀織内被細胞系ノ填塞ハ耐性種原種ヲ通ジ其ノ感染ニ何等ノ影響ヲ及ボサルガ如シ

7. 本蒼鉛耐性種ハ之ヲ原種ニ比シテげるまにん及ねをさるわるさんノ如キ異列化學劑ニ對シ感受性ノ増進スルヲ見ル

8. 耐性種及原種ヲ以テげるまにん耐性成立ノ遲速ヲ比較シタルニ原種ニ於テハげるまにん應用 5 回ニシテ既ニソノ耐性ノ成立ヲ見タルモ蒼鉛耐性種ニ於テハ 10 回應用後猶ほげるまにん耐性ヲ帶ブルニ至ラズ該成績ハ蒼鉛耐性種ニ於テ對げるまにん感受性ノ増進ヲ見ル前項記載ノ事實ヲ確證スルモノナリ

9. ねをどれぼーるニ異列藥品タルげるまにんヲ配シ合併療法ヲ行ヒタルニげるまにんノ介在スルニ拘ラズ蒼鉛耐性種ハ依然原種ニ比シテ滅芽作用ヲ受クルコト少シ但シ該耐性種ハ蒼鉛耐性ナ

ルモげるまにん單用ノ場合ニ比シテねをさるゐる添加ニヨリ強度ノ滅芽作用ヲ蒙ルハ稍々興味アル所見ナリ斯ノ如キ事實ハげるまにんノ所謂再發阻止作用 (Morgenroth u. Freund) ニ歸因スルモノト見做スヲ得ベキカ

10. 第 I 劑トシテぱらふくしん、えちーる紫或ハとりばろざん及第 II 劑トシテねをさるゐるさんノ 1:1000 ヲ以テ耐性種及原種ヲ處置シタルニ兩者ニ於テ干涉現象 (Browning) ノ出現ヲ認ムルコト能ハズ但シ茲ニ再ビ耐性種ハ此等第 I 及 II 劑ノ合併作用ニ對シテ原種ヨリ感受性ノ稍々高キ觀アルハ注意ヲ要スル點ナリ

11. ぱらふくしん (特ニ 1:500 及 1:1000) トねをさるゐるさんノ 1:500 トヲ使用シタル場合耐性種ニ於テノミ干涉現象出現ノ傾向ヲ見ル

12. 墨汁注射ニヨリテ網狀織内被細胞系ノ填塞ヲ行ヒタルまうすニ耐性種又ハ原種ヲ接種シ然ル後ねをさるゐるさん療法ヲ施シタルニ非填塞感染まうすニ比シ血液ノ滅芽期間著シク短縮セラル、ヲ見タリ然ルニ脾臟摘出まうす並ニ脾臟摘出ト同時ニ墨汁填塞ヲ施シタルモノニ於テハ斯ノ如キ事實ヲ認ムルコトナシ

終ニ蒞ミ望月所長ニ敬意ヲ表シ且終始懇篤ナル御指導ト嚴密ナル御檢閲トヲ賜ハリタル葛西主任ニ深甚ナル謝意ヲ表ス

引 用 文 獻

1. P. Ehrlich u. K. Shiga : Farbentherapeutische Versuche bei Trypanosomenerkrankung. *Berl. kl. W.*, 1904, xli, 329 u. 362.
2. P. Ehrlich : Chemotherapeutische Trypanosomen-Studien. *Ibid.*, 1907, xlv, 233, 280, 310 u. 341.
3. C.H. Browning : Experimental chemotherapy in trypanosome infections. *Brit. Med. J.*, 1907, II, 1405.
4. C. H. Browning : Chemotherapy in trypanosome-infections: An experimental study. *J. Path. & Bact.*, 1908, xii, 169.
5. R. Gonder : Experimentelle Studien mit Trypanosomen und Spironemen (Spirochäten). *Z. Imm.*, 1912, xv, 257.
6. S. Akatsu & H. Noguchi : The drug-fastness of spirochetes to arsenic,

- mercurial, and iodide compounds in vitro. *J. Exp. Med.*, 1917, xxv, 349.
7. 赤澤笹雄 : *Spirochaeta laverani* = 關スル研究補遺、日本獸醫學會雜誌 1927, vi, 32.
8. F. Mesnil et E. Brimont : Sur les propriétés des races de trypanosomes résistantes aux médicaments. *Ann. Inst. Past.*, 1908, xxii, 856.
9. Bilfinger : Ueber Beeinflussung der Chininfestigkeit durch Salvarsan bei Malaria. *Med. Kl.*, 1911, vii, 486.
10. J. Morgenroth u. L. Halberstädter : Zur Kenntnis der Arzneifestigkeit der Trypanosomen. *Arch. Schiffs- u. Tropenhyg.*, 1911, xv, 141.
11. J. Morgenroth u. F. Rosenthal : Experimentell-therapeutische Studien bei Trypanosomeninfektionen. III. Mitt. Arzneifestigkeit der Trypanosomen gegenüber Verbindungen der Hydrocupreinreihe. *Z. Hyg. u. Infektionskr.*, 1912, lxxi, 501.
12. H. G. Plimmer & H. R. Bateman : Further results of the experimental treatment of trypanosomiasis : Being a progress report to a committee of the Royal Society. *Proc. Roy. Soc. London*, Ser. B, 1908, lxxx, 477.
13. R. Kudicke : Beiträge zur Biologie der Trypanosomen. *Centralbl. Bakt.*, I, Orig., 1912, lxi, 113.
14. F. Lewy u. M. Gurewitsch : Gewinnung und Eigenschaften von Parafuchsinfesten Trypanosomen. *Z. Hyg. u. Infektionskr.*, 1926, cvi, 532.
15. J. Morgenroth u. R. Freund : Ueber die Wirkungsweise von "Bayer 205" bei der experimentellen Trypanosomeninfektion der Maus. *Kl. W.*, 1924, iii, 53.
16. C. H. Browning & R. Gulbransen : An interference phenomenon in the action of chemotherapeutic substances in experimental trypanosome infections. *J. Path. & Bact.*, 1922, xxv, 395.
17. C. H. Browning & R. Gulbransen : Interference phenomenon in the action of chemotherapeutic agents in trypanosoma infection *Ibid.*, 1927, xxx, 513.
18. R. Schnitzer : Untersuchungen zur Chemozeptorentheorie I. Das Interferenzphänomen von Browning und Gulbransen. *Z. Imm.*, 1926, xlvii, 116.
19. R. Schnitzer u. E. Rosenberg : II. Die Hemmungswirkung des Parafuchsin gegenüber trypanoziden Arsenikalien. *Ibid.*, xlviii, 22.
20. R. Schnitzer u. W. Silberstein : III. Die Hemmungswirkung des Parafuchsin gegenüber Brechweinstein. *Ibid.*, 1927, xlix, 387.
21. R. Schnitzer u. E. Rosenberg : IV. Vergleich des Interferenzphänomens an parafuchsinfesten und normalen Trypanosomen. *Ibid.*, 393.
22. I. L. Krischewski u. I. S. Meersohn : Ueber die Zusammenhänge zwischen dem therapeutischen Effekt und dem retikuloendothelialen Apparat. *Ibid.*, 1926, xlvii, 407.
23. N. W. Kolpikow : Der Einfluss der zur Zeit der Infektion schon lang vollendeten Splenektomie auf den therapeutischen Effekt des Salvarsan. *Ibid.*, xlvi, 182.
24. C. W. Jungeblut : Ueber die Beziehungen zwischen retikuloendotheliale System und chemotherapeutischer Wirkung. *Z. Hyg. u. Infektionskr.*, 1927, cvii, 357.
25. A. Feldt u. A. Schott : Die Rolle des Retikuloendothels beim chemotherapeutischen Heilungsvorgange. *Ibid.*, 453.

STUDIES ON THE DRUG-FASTNESS OF RAT-BITE
FEVER SPIROCHETE,
SPIROCHAETA MORSUS-MURIS.

I. Bismuth-Fastness.

S. AKAZAWA.

(From the Laboratory of Parasitology, the Government Institute
for Veterinary Research, Fusan. Chief: Prof. K. Kasai)

(Received for publication May 6, 1929.)

If mice infected with rat-bite fever spirochete, either the human or ermine strain, are repeatedly treated with a neotrepol (bismuth preparation), it is not difficult to produce the spirochete resistant to bismuth. The biological modification in the bismuth-fast strain thus produced was studied by its comparison with the original strain in virulence and chemotherapeutic biology. We carried out the present experiments with the ermine strain of *Spirochaeta morsus-muris* and the results obtained are summarized as follows:

1. The rat-bite fever spirochete rendered resistant to neotrepol is also resistant to the other bismuth preparations, as muthanol and casbis. This neotrepol-fastness therefore may be considered as the bismuth-fastness.

2. The Bi-fast strain is still resistant to bismuth after 50 passages through mice for about 2 years.

3. This Bi-fastness developed in the mouse body is positively retained, if the resistant strain is transferred to the rat body.

4. When mice infected with the Bi-fast strain are repeatedly treated with compounds of the other groups than bismuth preparation, the Bi-resistance occasionally disappears. For example, the Bi-resistant strain seemingly returns to the original sensitive strain after 10 treatments with neosalvarsan (1:1000), while this result is not as clearly noticeable with silver salvarsan and germanin ("Bayer 205"). Trypaflavin and parafuchsin exert no influence upon this Bi-fastness.

5. Between the resistant and sensitive strains, there is no obvious distinction in virulence, whenever normal mice, rats and

guinea pigs are used. If mice previously splenectomized are employed, however, the Bi-fast strain shows a slightly higher virulence in animals thus treated than in mice untreated. The original spirochete does not show such a result.

6. When the reticulo-endothelial system of mice is blocked by an injection of iron oxide saccharated or Indian ink, either the blocked or normal animals, contract with the same readiness the infection with both the resistant and sensitive strains.

7. The Bi-fast strain, compared with the original, was found to be more sensitive to germanin and neosalvarsan.

8. Between the Bi-resistant and sensitive strains the development of germanin-fastness having been compared, the resistant spirochete remained still sensitive to germanin even after 10 applications, while the original strain became tolerant to it after 5 treatments. Such a phenomenon proves clearly that the Bi-fast strain is more susceptible to germanin than the original is.

9. The Bi-fast spirochete shows also an increase of resistance to the combined therapy of neotrepol and germanin, where a drug of the other group as germanin is administered with this bismuth preparation. Here it is interesting to note that the Bi-resistant strain is decidedly more susceptible to the combined action of germanin and neotrepol than to the single application of germanin. Is this due to the so-called "antimutative action" (Morgenroth and Freund) of germanin?

10. Whenever parafochsin, ethylviolet or trypanosin as the I substance and 1:1000 of neosalvarsan as the II substance are used, the "interference phenomenon" (Browning and Gulbransen) is not observable in mice infected with both the Bi-fast and original strains. Here also the resistant strain shows a higher susceptibility to the combined action of I and II substances than does the original strain.

11. Parafochsin (especially 1:500, 1:1000) being combined with 1:500 of neosalvarsan, however, the chemotherapeutic interference tends to take place only in mice infected with the Bi-resistant strain.

12. In mice whose reticulo-endothelial system is previously blocked with Indian ink, the infecting spirochete, either Bi-fast or original, shows an increased tolerance to the treatment of neosalvarsan. On the other hand, such an increase of tolerance is not detected in splenectomized mice.